

بہارِ حقوق و مفادِ بشر

ہو اللہ علی آلہ کبیر

اعمالِ یدِ یعنی فنِ جراحی کی بے مثل کتاب

علم الجراحات

جو ارکانِ کلیہ طبیبہ (طبیعیات) دہلی کا یاس ہے، جماعتِ سالِ سیم
و چہارم کی تعلیم کے لیے نہایت عرق ریزی و ہانپٹائی سے لکھی گئی۔

معاونتِ خصوصی

تألیف و ترجمہ

ڈاکٹر محمد عثمان خان صاحب، امہس

زہد و احکامِ حکیم محمد کبیر الدین بہاری

ناٹورجی (سید علی آفیسر) ریٹائرڈ افی

نولف پریڈیسیٹبہ کانج و جلی

(درمطہ)

مدیرِ مکتب

۱۳۲۱ھ
۱۹۰۲ء

ناظم دفتر ایسے قروں باغ و جلی

قیمت پانچ روپے
علاوہ محصول

(مطبوعہ ولی پرنٹنگ ورکس مدرسی
بہارِ علم لاہور شاگرد اس جہا)

نقد و طبع اول

طیہ کالج دہلی کے نصاب کی جدید کتابیں

رازدہ قاضی محمد کبیر الدین صاحب لکھنؤ فوٹو پریس کلچر دہلی

درجہ شریعہ و جواز قانون کی کتاب کی ابتدا دہلی کتاب کالج کے جماعت اول کا نصاب قیمت پندرہ روپے محصول ڈاک علاوہ +

(۱) افان کبیر

معاملات کی معتبر درسی کتاب کالج کی جماعت سال سویم اور چارم کا نصاب پر تصویب ہے فی جلد ۱۰ روپے ۱۰ جلد فی جلد ۱۰ روپے +

(۲) ترجمہ شرح ابی

دفعہ ثانی (تشریح) انسانی کی سب سے واضح معتبر درسی کتاب مع بینا رفقہ اور رنگین مسودہ کالج کی جماعت سال اول و دوم کا تشریحی نصاب تشریح

(۳) تشریح کبیر

پیر و قدیم کا بہترین مجموعہ ۱۰ جلد دسایں فی جلد ۱۰ روپے ۱۰ جلد فی جلد ۱۰ روپے +

(۴) منافع الاعضاء

کلیات قدیم و جدید کا کتابلہ انحال اعتقاد کا دیکھتے گروہ بیان تھا سلسلہ و خاتم ختم کالج کی جماعت اول و دوم کا نصاب ۱۰ جلد ۱۰ روپے +

(۵) علم الادب و تفسیر

علم الادب کا معتبر اور مفید متن بیان ادبیہ و تفسیر و ترمیم کے افکار و خواص زبان تہذیب تہذیب اہم فن ماغیہ کا طرز سند لالہ علی ملکہ

(۶) علم الجراحات

یہ کتاب کی طرح روشن ہے طبیہ کالج میں مسلم الادب کی تعلیم سال دوم و سویم میں اس سے ہوتی ہے کاغذ سفید کتب و طباعت دیدہ ازب قیمت ۱۰ روپے ۱۰ جلد فی جلد ۱۰ روپے +

(۷) علم الجراحات

قیمت ۱۰ روپے ۱۰ جلد فی جلد ۱۰ روپے +

(۸) دہلی کے مہکبات

چند دیگر کتب

(۹) دہلی کی دوا سازی

ریاض کبیر حصہ اول دہلی کی معتبر ریاض کتب دہلی کے معونات و ہزبات اور اصول مطلب و علاج اسکے پچھلے سے پہلے مستندین بغیرہ کالج کے سواد و سرور کو شک سے بچانے کے لئے دہلی کے قومی ریاض کتب مستندین بغیرہ راز رکھا کرتے تھے ۱۰ جلد ۱۰ روپے +

(۱۰) دہلی کی دوا سازی

ریاض کبیر حصہ سویم یونانی دوا سازی کے اصول اور انکے ما طبیوں کے لئے دوا سازی کا رہنما اور عماروں دوا سازی کی کتاب ۱۰ جلد ۱۰ روپے +

(۱۱) دہلی کی دوا سازی

علم الجاحث

فہرست عنوانات

صفحہ

تہذیبہ دیاچہ معتدہ

۹۴ - ۱

باب اول - علم الحسد شیم - عدوی - مناعت

۱۴۴ - ۹۵

باب دوم - التهاب سورم حار -

۲۵۵ - ۱۴۵

باب سوم - عدوی صدیدیہ غیر نوعیہ اور جراحات
عدوی اخراج عادی و مزمن - مجری و ناصور
درم فلغونی و التهاب غلوی - یقظن دم -

۲۶۶ - ۲۵۶

باب چہارم - تقرح - قرعہ بننا -

۳۳۴ - ۲۶۶

باب پنجم - غانغرانہ و شفا قلوں

باب ششم - امراض نوعیہ عفونیہ - سر خبادہ - ۳۳۵ -

خناق - ۳۴۶ - کزاز - ۳۴۹ - نعلب رگزیگی سگ و شام

۵۰۸ - ۳۳۵

۳۶۳ - جبرہ خبیثہ - ۳۶۹ - سوزاک - ۳۶۶ - قرعہ رخہ

رزا آتشک - ۴۰۰ - آتشک - ۴۰۶ - تدرن سل - ۴۴۴ -

سراجہ - ۴۹۸ - جذام - ۴۹۹ - فطریہ شعیہ - ۵۰۱ - درم فطریہ

تہذیب

میں غایتِ فخر و مباہات کے ساتھ اپنی اس طبی خدمت کو حضور
والا شانِ عظیم، افضل و الاحسان، منبعِ جود و عطا، سراپاِ بذل و کرم،
کپتانِ ہزما فی انس، رانا سرِ نجبیت سنگھ جی صاحبِ ہر دامِ قبائِلہ

کے، سی، ایس، آئی

والی ریاست بڑوانی (وسطِ ہند)

کے نام نامی و اسمِ سامی کے ساتھ معنون کرتا ہوں۔ والا جاہ
کی علم پر و طبیعت اور علمی مذاق سے اُمید ہے کہ اس ناچیزِ مدیہ
کو شرفِ قبولِ بخشِ کرم مجھے گرویدہ احسانِ مستنان بنایا جائیگا۔

اگر ایسا ہو تو نئے قسمت

محمد حبیب الدین




CAPTAIN HIS HIGHNESS RANA SIR RANJIT SINGHIJI, K.C.I.E.
Rana Sahib of Barwani State, C.I.

دیجیٹل

انسانی امراض تقریباً پچاس فیصدی وہ ہیں جن کا تعلق علم الجبراحت اور
 وینکاری سے ہے۔ پھر کس قدر بد بخت ہر وہ طب جس کے حاملین نامعقول ہوئے
 اس اہم حصہ کو قطعی خیر باد کہیں، اور اس کے نازک اعمال کو طبقہ بھال کے بقاعدہ
 نامتوں میں دیکر الگ ہو بیٹھیں۔ یہ محض ہماری غفلت و جہود کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنے
 آبائی فن کی صریح مخالفت کی، اور کس اہم اور ضروری شعبہ کو اس طرح بھٹلایا کہ
 جالینوس اور نہرواوی کے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی یاد نہ رہے، اور ان کے
 کارنامے نمایاں کی اب اگر ہم کوئی فہرست پوچھے، تو ہم میں بہت کم ایسے نکلنے
 جو ان کے چند اعمال جراحیہ کے نام بھی بتا سکیں۔ ہماری طب کے زوال و انحطاط
 کے وجود میں سے، حکومت کی سردہری کے علاوہ، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے
 جراحیات کو چھوڑ کر مریضوں کی نصف تعداد کو اپنے مطبوں سے یا ہوس پھیر دیا۔
 یہ ایک ایسی زبردست غلطی ہم لوگوں سے ہوئی کہ مدتوں اس کا خمیازہ ہیں
 بھگت پڑے گا اور اس کھوئی ہوئی دولت کے اکٹھا کرنے میں کئی نسلیں گزر
 جائیں گی۔ مگر یہ متام شکر ہے کہ اب ہمارے ارباب فن کو کافی طور پر اس
 غلطی کا احساس ہو چکا ہے، اور اس وقت ہر چھوٹی بڑی طبی درسگاہ میں اس
 امر کی کوشش جاری ہے کہ کسی طرح پھر ہم نہرواوی و جالینوس کے اعمال
 جراحیہ کو زندہ کر سکیں۔ جس سے یہ اُمید بندھتی ہے کہ اب ہمارا مستقبل ماضی
 کی طرح تاریک نہ رہے گا، اور کچھ دنوں کے بعد ہم ملک میں ایسے اطباء کا
 ایک گروہ دیکھ سکیں گے، جو دیگر معالجات کے ساتھ جراحی اعمال بھی خوبصورتی کے ساتھ
 انجام دیتے نظر آئیں گے۔ اور ہماری محبوب طب بھییں بدل کر نئے روپ میں

عرصہ کی تاریکی کے بعد جلوہ آ رہا ہوگی +




اس کتاب کی ترتیب و تالیف اور ترجمہ میں اگرچہ جالینوس و زہرا دی کے قدیم اصول سے کام نہیں لیا گیا ہے، مگر وہ دن بھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے، جبکہ ہم جدید جراحیات سے واقف ہونے کے بعد قدیم اصول و مراسم کے احترام کو پورے طور پر سمجھ سکیں، اور صحیح طور پر وہ اعمال کر سکیں + اگر قدیم اعمال جراحیہ کے سمجھنے اور کرنے والے اساتذہ اس وقت ناپید نہ ہوتے، تو پہلے ہم زہرا دی و جالینوس ہی کے اعمال جراحیہ کا اقتباس پیش کرتے، اور اس میں جو کمی ہوتی، اُسے ہم جدید ترتیب سے پُر کرتے + مگر شرم اور ہزار شرف کا مقام ہے کہ ہم ایک ایسی مثال بھی پیش نہیں کر سکتے



یہ کتاب اصل طب جدید کی جراحیات کا ترجمہ ہے، جس میں موجودہ معتبر کتب سید (انگریزی و مصری) سے مدد لی گئی ہے + ترجمہ کی مصوبت کا اندازہ تو صرف مترجمین ہی کر سکتے ہیں، مگر سب سے زیادہ کوشش و محنت اس کتاب میں اصطلاحات کے انداز کی گئی ہے + اہل نظر اسے دیکھ کر اندازہ کر سکیں گے کہ اس کتاب کے ترجمہ کی افوکی خصوصیت اسی کا نام ہے + ملک کے علم پر درحلقہ میں یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ انگریزی اور لاطینی اصطلاحات ہماری زبان کے لیے مفید نہیں + ہماری زبان کی ترقی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ علمی اصطلاحات کسی ایسی زبان کے ہوں، جس سے ہمارے کان قطعی نا آشنا ہیں + زبان اردو کے لئے عربی اور فارسی کا تعلق اس قدر گہرا اور وسیع ہے کہ ہندوستان کا ایک جاہل ہنسان بھی اداسے مطلب کے لیے سیکڑوں فارسی اور عربی الفاظ استعمال کرتا ہے + ہم نے اس کتاب میں پوری عرق ریزی اسی طرف عہد کی ہے اور نہ لاکھا شکر ہے کہ ہمیں امید سے زیادہ میں کامیابی ہوئی ہے +

اصطلاحات کے باب میں میرا اصول یہ ہے کہ حقیقی الامکان میں بزرگوں کی پہائی زبان میں الفاظ تلاش کرتا ہوں، اور دیگر مشتقات کے لیے انھیں کو اصل قرار دیتا ہوں۔
امراض، آلات، اور اعضاء کے ناموں میں مجھے قدامت کی کتب سے کافی ذخیرہ ملا ہے۔
مگر جدید معلومات و انکشافات مثلاً غیر مدون امراض، جدید ترقی یافتہ علم کیمیا، علم جراثیم وغیرہ کے لئے مجھے نئی اصطلاحات وضع کرنی پڑیں، جس میں نے اصول تشبیہ کا امکان کو مشش بھر لحاظ کیا ہے۔ مجھے اسکا بھی اعتراف ہے کہ موجودہ وضع کردہ اصطلاحات میں سے بعض رد و بدل کے قابل بھی سمجھے جائیں گے، اور مزید متع و تلاش اور غور و فکر کے بعد چند الفاظ اسے بہتر بھی مل سکیں گے۔ یہ بھی ظاہر کرنا ضروری ہے کہ چونکہ یہ کتاب کلیہ طبیہ و ہلی کے جراحی نصاب کی تکمیل کے لیے لکھی گئی ہے اور پہلے سے کوئی کتاب تعلیم کے لئے موجود نہ تھی، اس لیے اسکی تکمیل میں بہت کچھ عجلت کی گئی ہے۔ اور اس عجلت میں فروگزاشتوں کا ہونا زیادہ قرین قیاس ہے۔



ادائے سپاس

ابتداء کار اس خدمتِ فن کی تحریک ایمان میں جن بزرگوں کا حصہ ہے میں فائیت امتنان کے ساتھ ان کی خدمت میں مخلصانہ نامہ سپاس پیش کرتا ہوں۔ مجدد طب عالمیجناب استاذی حضرت سید الملک حکیم حافظ محمد اجمل خاں صاحب قبلہ مدظلہ سکرٹری طبیہ کالج ہلی، والدالاجاہ شیخ علم و علم، حضرت پیر زادہ محمد حسین صاحب جوائنٹ سکرٹری، والدالاجاہ مجتہد خلق و احسان، عالمیجناب ڈاکٹر محمد حبیب الرحمن صاحب پرنسپل کالج، انہی حضرات کی تحریک و تقریب سے یہ خدمت منزل مقصود تک پہنچی ہے۔ اور یہ کام انہی بزرگوں کے دستِ کار فرماکار بہنِ منت، اور ان کی مساعی جیلہ کی نیک یادگار ہے۔

مُعَادِثُ خُصُوصِی

ترجمہ کے دشوار گزار مصلحت میں قد و سب برتر کی چشمِ حُسن نے میری تہائی کو ایک ایسی بے مثال رفاقت سے بدل دیا کہ اس سفر کی بہت سی کلفتیں کا فوراً ہو گئیں۔ سرِ پابِ دل و کرم عالیجناب ڈاکٹر محمد عثمان خاں صاحب مامورِ طبی (سینڈیکل آفیسر) ریاست بڑوانی وسط ہند کی طبیعتِ فیاض سے خازنِ ترجمہ میں جو بے لوث امداد پہنچی ہے، میری زبانِ ادا سے پاس سے قاصر ہے۔ اس بے مثل فریقِ طریقت کی معادِث و مشارکت اس کی مستحق تھی کہ اس خدمت کو تنہا میرے نام سے منسوب نہ کیا جاتا، اگر اس فیاضِ مہبتی نے مجھے ایسا کرنے کی بھی اجازت نہ دی۔ خدمتِ فن کے خلوصِ جذبہ اور بے لوثی کی ایسی مثال دُنیا میں بہت کم مل سکتی ہے۔ اس کتاب کا طویل و عریض تبصرہ، جو جراحات کی پوری تاریخ پر مشتمل ہے، آپ کی وسعتِ معلومات کی ایک روشن دلیل ہے۔ ساری ریاست بیک زبان آپ کے حیرت خیز اعمالِ جراحہ کی معترف اور شاخِ ان ہے۔ اس عملی جہاد کے بعض کرشمے اُمید سے زیادہ عجیب و غریب صورت میں ظاہر ہوئے ہیں کہ مذاقِ فن بھی سکر حیرت و استعجاب میں آجاتے ہیں۔ ایسی رفاقت پر ہم کیوں نہ مجھے فخر و زہر؟

— ۳ — ۱۹۳۵ — ۴ —

میں اپنے کرم دوست جناب حکیم محمد عبدالوحید صاحب ناظمِ ساکن ضلع میرٹھ کا بھی رہنِ احسان ہوں کہ انہوں نے کافی توجہ سے تصحیح و غیرو میں مدد فرمائی۔ اس موقع پر میں اپنے مکرّمِ حافظ محمد ضیاء الدین صاحب کاتبِ دہلوی کی عنایت کو فراموش نہیں کر سکتا، جنہوں نے ازل سے آخر تک پوری توجہ سے اس کتاب کو لکھا۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

محمد کبیر الدین

۵ ذیقعدہ ۱۳۵۱ھ + ۲۱ جون ۱۹۳۳ء

مقدمہ علم الجراحہ

هُوَ السُّتَعَانُ

فن جراحہ

فن جراحہ، جو آج طب مغربی کا اعلیٰ ترین سرمایہ نازش و افتخار ہے، ہزاروں سال پیشتر مشرقی دنیا میں اُدِجِ کمال کو پہنچ چکا تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ بعض نہایت اہم آلات اور دقیق ترین اعمال جراحیہ، جو آج فضائے مغرب سے رنگارنگ صورتوں میں جلوہ گر ہو کر حیرت زدہ شرقیوں کی نگاہوں کو خیرہ و درمان کے دل و دماغ کو بہت بے جا ہیں اپنی اصلیت میں شرقی نژاد ہیں اور تہذیبِ یام میں مشرق ہی کے گہوارہ تہذیب میں نشوونما پائے ہیں۔

در اصل فن جراحہ بھی اسی طرح قدیم ہے جس طرح انسان کی مادی ضروریات۔ سیلانِ خون کا روکنا، زخموں کی مرہم چکنا، تیروں کو بدن سے کھینچ کر نکالنا، مضروب اور شکستہ ہڈیوں کو لکڑی اور تختی کے سہارے باندھنا، یہ اور اسی طرح کے بہت سے اعمال جراحیہ ابتداء زمانہ سے کم و بیش ہر ملک و قوم میں با قضاے ضرورت رائج رہے ہیں۔ اصول علاج کے دیگر اعمال کی طرح دقیق اور باقاعدہ اعمال جراحیہ کی مشق و مزا دستِ بھی آریائی نسل کی دونوں بڑی جماعتوں (مشرقی و مغربی) میں نہایت قدیم زمانہ ہی سے علاجِ کمال کو پہنچ چکی تھی۔ لیکن مہترین کو اس امر کی تعیین میں اختلاف ہے کہ آیا علم طب (جس میں علم جراحی بھی شامل ہے) مشرقی جماعت یعنی ہندوؤں سے مغربی جماعت یعنی یونانیوں کو پہنچا، یا ہندوؤں کا طبی و جراحی کمال رجو ماہر طبِ چرک اور ماہر جراحہ سکشہرت کے علمی کارناموں سے ہو یا ہے (در اصل مغربی تہذیب کا پر تو ہے جو سکندر اعظم کے فتوحات کے ساتھ ایشیا اوسط و سمتان تک پہنچ چکے تھے۔ عمدہ یورپی دماغوں کا فطری رجحان کچھ ایسا واقع ہے کہ وہ صرف یونان ہی کو منبعِ کمالات اور سرچشمہ علوم و فنون سمجھنے کے عادی ہیں، اور ہر اُس علم و فن

کو جہر میں ایشیائے انتہائی کمال کا ثبوت دیا ہے، وہ یونان کی مدیوہ گری پر محمول کر لیتے ہیں۔ ۱۱۔ انہم مغربی مؤرخین میں چند مقدس نقوش ایسے بھی ملتے ہیں جنہوں نے حقیقت بینی اور بے تعصبی کا قرار دیا ہے اور تاریخ نویسی کو عملاً واقعہ نویسی کا مترادف سمجھا ہے۔ مستند شہادات سے اس امر کا کافی ثبوت ملتا ہے کہ خراج کا

۱۲۔ علامہ دہلوی اپنی کتاب ”تبصرۃ تاریخ طب“ گریو آف ہسٹری آف میڈیسن کے مقدمہ میں مغربی حسن ظن کے متعلق یوں تاویل فرماتے ہیں: ”طب کی قدیم تاریخ کے متعلق واقعات کی بنیاد عموماً اہل یونان و روم کی قدیم تصانیف پر رکھی جاتی ہے، اور ترتیب افہام اور استنباط نتائج میں صرف ایک خود ساختہ اصول کی کارفرمائی ہوتی ہے، جسکی رو سے یہ پہلے ہی فرض کر لیا گیا ہے کہ ہر وہ نظام طبی و فنی جو یونانی الاصل نہ ہو غیر معتبر و غیر مستند ہو۔ اہل عربی سے جو نصیباتی تاریخیں ہمارے دل و دماغ پر یونان کی علمی عظمت کے کارنامے متفق کر دیتی ہیں، ان مستقل سابقہ تاثرات اور ذہنی نقوش کو نسبتاً منہایت کیلئے لابی ہے کہ ہر قوم اور یکٹ کی نہایت باریک تحقیق کی جائے۔ جوئے خواہ وہ دلائل تاریخی ہوں یا سائنس بعد میں آئی ہو، انکو بخوبی جانچا اور پرکھا جائے، اور کافی جدت طبع سے کام لیا جائے۔ صداقت اور حق پسندی کا یہی اقتضا ہے کہ ہر نئے تاریخی واقعہ کی اصلیت کو بغور محسوس کیا جائے۔ تاکہ ہم صحیح نتائج اخذ کر سکیں۔“

۱۳۔ مغربی محقق علامہ دہلوی اپنی مشہور کتاب ”تاریخ طب اقلیم ایشیائی“ میں ہسٹری آف میڈیسن (سنگ دی ایشیا) میں اس نہایت قابلیت و وضاحت سے اس امر میں استناد کیا ہے کہ ہندو کا علم طب مصری پیشوایان مذہب کے ذریعہ سکونائیوں تک پہنچا۔

۱۴۔ فاضل دہلوی اپنی کتاب ”تاریخ ادب ہندو“ میں ہسٹری آف انڈین لٹریچر میں لکھتے ہیں کہ حکیم فیثا غورث نے اپنے علم الاسرار اور ابعاد الطبیعیات کو ہندی برہمنوں سے حاصل کیا۔

۱۵۔ علامہ روئیل نے اپنی کتاب ”مقدمت طب ہندی“ میں لکھی کوئی فی آئن ہندو میڈیسن میں مستند شہادات تاریکی سے ہندوؤں کو تاریخ ادویت کا سنجی ثابت کیا ہے۔

۱۶۔ اسی طرح دلکسن، جین، این سلی، ہورنی، آئرلین، اسٹراو، اور دیگر مغربی محققین نے صحیح تاریخی بنیاد پر ہندوؤں کی علمی جدت اور طبی کارناموں کا اعتراف کیا ہے۔ ان تاریخی شواہد کی تفصیلی بحث کو یہاں ہم خوفِ تطویل سے نظر انداز کرتے ہیں۔

و اولیت کے حقیقی مستحق اور تاج اختران کے بے سزاوار دراصل ہندو ہی ہیں۔ میلادی
 علاج میں سسٹرت اور یقراط کے ذخائر فیما بین قریبی ماہمت و مشابہت رکھتے ہیں +
 عملیۃ الحاصلات کے متعلق سسٹرت کا بیان سکسوس کے بیان کردہ مصری طریقہ عمل سے
 تقریباً مشابہ ہے + اسی طرح چند اعمال ایسے ہیں جن کے متعلق ہندی اور یونانی
 طبوں کا بیان مشترک و مماثل ہے، جس سے ان کے ماخذ کا ایک ہونا قرین قیاس ہو
 باہمہ اس میں بھی شک نہیں کہ بعض حکم اور ہنایت و دقیق اعمال جراحیہ (مثلاً مصنوعی ک
 بنانا) جسکا بیان سسٹرت نے دیا ہے، اور جن سے بے انتہا ذہانت و جدت کا پتہ چلتا
 ہے، بلاشبہ خاص ہندوستان کی ایجاد ہیں + اصول علاج جو عظیم الشان اور اعلیٰ پایہ
 کے ہیں، خالص برہمنی ماخذ پر دلالت کرتے ہیں + ہندی مخزن الادویہ جس میں کلی
 جرمی بریوں کے علاوہ معدنیات (مثلاً سنگیہ، پارہ، جست و غیرہ) اور دیگر کثیر اقسام
 بیل قیت و مفید ادویہ شامل ہیں، ایک ایسا نامور و مکمل مجموعہ ہے جو کسی غیر ملکی دوا
 کے وجود کا رجحان منت نہیں + علاوہ ازیں ہنایت و شیق ذرائع سے یہ بھی پایہ تحقیق
 کو پہونچ چکا ہے کہ سکندر اعظم کے زمانہ سے پہلے ہی مشرقِ معلوم طبعیہ اور کمالات جراحیہ
 میں شہرہ آفاق ہو چکا تھا +

الغرض ان سب حالات کی بنا پر کافی وجہ اس امر کی سند میں موجود ہیں کہ ارتقا
 فن جراحی میں آریائی النسل کی مسند قی شانہ ہی کو فخر اولیت حاصل ہے +



۱۔ ہندی جراحی

جیسا کہ اوپر درج ہو چکا ہے ہندی طب کے ابتدائی اور قدیم ترین قانون میں دو
 متذہبتیاں گزری ہیں جو چرک اور سسٹرت کے نام سے بقائے دوام حاصل کر چکی
 ہیں + چرک اور سسٹرت کے نام سے جو تصانیف لمبیۃ و جراحیہ منسوب ہیں ان کی
 صحیح تاریخ کا تعین اب تک ایک متنازع فیہ مسئلہ ہے + یورپین مؤرخین کو ان کے زمانہ کے

سہ حمیت الحکامات (مشارقی) شانہ سے پوری قاری کرنے کا عمل +

سہ آخرین اور اسٹرابو اور دیگر محققین کی تحریرات میں اس کا مفصل تذکرہ موجود

ہے +

مطلق اس قدر اختلاف ہے کہ وہ انکو ولادت حضرت مسیح سے پانچ سو سال ماقبل یا مابعد کے ازمہ میں کہیں سمجھتے ہیں۔ مگر جدید تحقیقات کی بنا پر اس بات کو باور کرنے کے لیے صحیح مستند وجہ موجود ہیں کہ ہندی طب و کمالات جراحہ کے یہ دوا ابتدائی معالجین ایسے قدیم زمانہ سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ یونانی تہذیب و یونانی علوم طبیہ کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا۔

چرک نام ویدیک یعنی طب ہندی کا مشہور ابتدائی معنی ہے، جبکہ بعض محققین کشمیر کا اور اکثر بنارس کا رہنے والا سمجھتے ہیں۔ اس نے "چرک سنگھتا" نام کی جامع کتاب موضوع طب پر لکھی۔ ہندو موزعین کا عقیدہ ہے کہ چرک ابتداً عالم یا آغاز دنیا میں پیدا ہوا اور ایک برہمنی تھا۔ مگر یورپی محققین کا خیال ہے کہ چرک چرک سنگھتا میں علم طب کا نہایت تفصیلی تذکرہ موجود ہے، اس لئے وہ آہر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں طب کا بیان محض مجمل طور پر ہے) نہایت مابعد زمانہ میں لکھی گئی ہوگی۔

جس کی وسعت ممکن ہے کہ ہزار سال سے بھی زائد ہو۔ مشہور فرانسیسی مستشرق ملوین کے دی نے چینی ذرائع کی بنا پر پتہ لگایا ہے کہ چرک نام کا ایک طبیب راجہ ککلیک راجہ ہندوستان میں دو صدی قبل مسیح راج کرتا تھا۔ کار دھانی معلوم تھا۔ مگر چونکہ ویدوں میں چرک کا نام بطور لقب کے موجود ہے اور سنسکرت صرف و نحو کی کتاب موسومہ "پانینی" میں تابعین چرک کو چرکون کے نام سے بطور لقب کے پکارا گیا ہے اسلئے اس سے پہلی چرک کی تخصیص ثابت نہیں ہو سکتی۔ چرک اپنی کتاب میں صرت انہیں ویدتاؤں کا ذکر کرتا ہے جو ویدوں جیسی قدیم مقدس کتابوں میں گنتے گئے ہیں۔ ویدوں سے بہت بعد میں پڑانوں کی ترتیب ہوئی ہے اور پڑانوں میں بیان کردہ پڑانوں کا کوئی تذکرہ چرک کی کتاب میں مطلق نہیں پایا جاتا۔ چرک نے انسانی ڈاکٹری کی ڈیولپمنٹ کی کل تعداد ۳۶ بتائی ہے اور یہی تعداد قدیم ویدک زمانہ کی کتب میں درج ہے۔ ان مختصران سب وجوہ سے ثابت ہوتا ہے کہ چرک بلاشبہ پڑانوں سے زیادہ پرانا ہے اور یورپی مصنفین جو اسے کچھ تازہ کرنا مابعد مسیح میں لاتے ہیں اور اس طرح یونانی طب کی اولیت ثابت کرتے ہیں اس طرح مخالفین میں ہوتا ہے۔

ملوین نے یہ عقیدہ قائم کیا کہ ہندوستان کا پہلا اور نامور ڈاکٹر غلام جیلانی صاحب تہذیب و تمدن کی تاریخ میں لکھتا ہے۔

سُشُرَت یہ علم جراحی کا اولین قائم اعظم مانا جاتا ہے + اس کے زمانہ حیات کے متعلق مختلف روایات ہیں + غالباً یہ دیدوں کے زمانہ میں گذر رہے کیونکہ مقدس فیہ کے بہت سے اشعار اس کے نام سے منسوب ہیں + مہا بھارت جیسی قدیم کتاب جس کی صحیح عمر کا زمانہ مستند وجوہ کی بنا پر ایک ہزار سال قبل از مسیح شمار کیا گیا ہے) میں سُشُرَت کے باپ کا نام ویشوا متر درج ہے + لہذا سُشُرَت مہا بھارت سے بہت پہلے گذرا ہوگا + ویشوا متر ایک گوشہ نشین زاہد تھا جو ہنود کے مقدس پیغمبر یا اوتار "رام" کا معاصر تھا + ست پتہ براہمنہ رجو دیدوں سے دوسرے درج کی کتاب ہے اور غالباً حضرت مسیحؑ سے چھ صدی قبل لکھی گئی ہے) کا مصنف سُشُرَت کے مسائل سے بخوبی واقف تھا + آٹھ روید درج حضرت مسیحؑ سے ہزار سال پیش کی تصنیف ہے) کے دسویں باب میں انسان کی پیدائش کے متعلق ایک نظم ہے جس میں جسم انسانی کے ڈانچ کا بیان سُشُرَت اور آتوری کے حالات سے بتھریج دیا گیا ہے + مروی ہے کہ سُشُرَت تحصیل طب و جراحات کے لیے کاشی (بنارس) کے راجہ قیو داس رے دھن و فتری کا اوتار سمجھا جاتا ہے) کے پاس گیا + سُشُرَت پہلا شخص ہے جس نے ہندو فن جراحی کو اپنی کتاب "سُشُرَت سمہتا" سُشُرَت سنگت" میں جمع کیا + اور فن جراحی میں کمال حاصل کیا +

محققین کی عام رائے ہے کہ چرک، سُشُرَت سے پہلے پیدا ہوا + لیکن پرازن سے ثابت ہے کہ سُشُرَت دھن و فتری ہمارا راج (موجود طب و حکیم ربانی) کا شاگرد ہے + چونکہ دھونتری ہمارا راج ست یگ کے فردن اولیٰ میں پیدا ہوئے، لہذا رام آتے ہیں کہ اونکا شاگرد سُشُرَت ہی اسی زمانہ میں پیدا ہوا + علاوہ انہیں چونکہ چرک محض طبیب تھے اور خود اپنی کتاب میں تسلیم کرتے ہیں کہ وہ جراحی کے ماہر نہ تھے بلکہ کتاب کے شریک استہان باب پنجم میں جنہیں کی پیدائش و نشو و نما کے متعلق دھن و فتری ہمارا راج کی رائے کا حوالہ دیتے ہیں یہ وہی رائے ہے جو سُشُرَت نے اپنی کتاب میں درج کی ہے) لہذا ثابت ہوا کہ سُشُرَت چرک کا پیش رو

سُشُرَت کی تحریرات میں طبیعوں کی صرف ایک ہی جماعت کا تذکرہ ہے جو

علاج الامراض اور اعمال جراحیہ ہر دو فرائض کو مشترک طور پر ادا کرتے تھے۔ البتہ نشان امتیاز صرف اس حد تک تھا کہ جراحی معالجات بیشتر ادنیٰ قوتوں کے ہاتھ میں تھے مثلاً نانی، کان صاف کرنے والے، دانت کھینچنے والے، فساد وغیرہ جو برہمنی فرقہ سے خارج تھے۔ عملیہ انحصات (پتھری خارج کرنے کا عمل) ابھی خاص ماہرین تک محدود نہ تھا بلکہ ہر کس و ناکس جو اس وقت کے راجہ سے اجازت حاصل کر لیتا پتھری نکال سکتا تھا۔ برخلاف اس کے اسکندریہ کے اطباء میں یہ عمل مخصوص ماہرین ہی کر سکتے تھے۔

مگر یہ مسلم ہے کہ چرک کے زمانہ میں ہندو اطباء دو جدا گانہ جماعتوں میں منقسم ہو چکے تھے۔ ایک جماعت ”کاپاچکیت سکا“ (طیبوں) کی تھی اور دوسری ”سلیہ چکیت سکا“ (جراحوں) کی جنکو دھن و نتری ہماراج کے متبعین ہونے کے باعث ڈھن و نتری منہ پرا دیہ کے نام سے بھی منسوب کیا جاتا تھا۔ امراض جراحیہ کے متعلق اکثر چرک نے اس آخری گروہ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چونکہ چرک اور سشرت کی تصانیف الہامی ماخذ کی بھی جاتی تھیں، اس لئے آئی وائی نملوں میں عموماً انکا ادب و احترام ملحوظ رکھا گیا اور اس زمانہ کے اطباء و جنکو انسانی اصلاح اور نکتہ چینی سے بہت بالاتر سمجھے رہے۔ اسی وجہ سے کسی کو ان کتب کے عام اصول و قواعد پر اضافہ کرنے کی کبھی ہمت نہ ہونی اور صرف انہی کے مسلمہ اصول کی تشریح و تفسیر کی صورت میں منظم کرنے کی کوشش کافی بھی گئی۔

سشرت کی تصنیف فن جراحی اور امراض جراحیہ کے متعلق سب سے پہلی کتاب ہے جو بجا طور پر عالمگیر شہرت کی مستحق ہے۔ اس میں امراض جراحیہ کے متعلق نہایت وضاحت اور اصول کے ساتھ اون معالجات و آلات جراحیہ کا بیان ہے جن کی مدد سے شدت مدد و الم کا ازالہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کی عجیبیوں اور نادر خصوصیت یہ ہے کہ اس میں علم الغتابلہ (دواہی گری) کے متعلق ایسے حکم ۱۵ بحوالہ ڈاکٹر کھوڈیا دیبا۔ کبیراج سین گپتا، ڈاکٹر عثمان جیلانی، ہٹاکر صاحب گونڈل وغیرہ۔

کلیات و مہم گیر نکات موجود ہیں کرنا وجود ہزار سال گزر جانے کے آج ہی طب جدید شاذ خصوصیات ہی میں اونٹنے آگے بڑھی ہوئی، اس شرت نے ہی، چرک کی طرح، اپنی کتاب کو آٹھ جلدوں یا حصوں پر منقسم کیا ہے، جن کی تفصیل یہ ہے:-

(۱) ”سلیہ“ جس میں خارجی و غیر طبی اجسام کو انسانی بدن سے خارج کرنے اور خراج (پھوٹوں) وغیرہ کو بذریعہ آلات جراحیہ، قلویات، محرقات کا دیا وغیرہ کے قطع و نابود کرنے کا بیان ہے +

(۲) ”ساکلیہ“ جس میں ان اعضاء کا بیان ہے جو شانوں سے اوپر واقع ہوئے ہیں یعنی امراض گوش، چشم، الف، چہرہ وغیرہ +

(۳) ”کایا چکیٹا“ جس میں ان امراض کا بیان ہے جو بحیثیت مجموعی سائے بدن پر طاری ہو سکتے ہیں، مثلاً حیات (بخار)، اسہال، سیلان خون، التہاب، جنون، صرع، جذام، ذیابیطس، وغیرہ +

(۴) ”موت و دیا“ اس میں اوراد و وظائف، صدقات و قربانیوں وغیرہ کا بیان ہے، جن کے ذریعے سے بھوت، پلید، رکشش و دیگر ارواح خبیثہ کے پیدا کردہ امراض کی روک تھام ممکن ہے +

(۵) ”مار بھرتیا“ کا تعلق امراض صبیان اور دودھ کے نقائص و معالجات اور آتاؤں کی ضروری خصوصیات و صفات وغیرہ سے ہے +

(۶) ”اکر گوتھرو“ اس کا تعلق حیوانی سمیات کے تریاقت سے ہے +

سہ شاید ہندو طب جدید کے متوالے اسکو مضحکہ خیز سمجھیں، مگر ہم سوچتے ہیں کہ آج ہندو دنیا میں جمہور تعزیم (سمریزم و ہیناٹزم) تلخ ذاتی رائے کو جس شعلہ علم لاسرور آکھٹ سائنس (تبدیل خیال و تعلیم نفس ریشی پتی) قوت ارادی (رول پاور) وغیرہ کے نام سے رائج ہیں، اور جن میں سے بعض کی اس قدر دھوم ہے کہ نامور علماء زمانہ ان سے امرہن کا علاج کرتے ہیں، اور امریکہ و جرمنی میں بجائے دارو سے بیہوشی کے ان کے ذریعہ مرض کو: عمال جراحیہ کے لیے پیشکش کیا جاتا ہے + نیز ان سے جنوں اور اختناق الرحم وغیرہ کا علاج کیا جاتا ہے، آخر یہ سب کیا ہیں +

(۶) "رسالین منتشرہ" اس میں افزائش عمر اور اصلاح ذہن و عقل کے ذرائع اور مقویات وغیرہ کا بیان ہے +

(۷) "داجی کرن منترہ" اس میں مشتبہی و مہمی ادویہ کا بیان ہے +

کتاب شرت کے تفاسیر تراجم

الگ چھ دہند و شارضین نے شرت سنگھت کی شرحین اور تفسیرین لکھیں مگر اس کے مدونہ و مفردہ کلیات سے سب موخراف کی گئی جو جرات نہیں ہوئی + عامۃً لکھنا شرت کی تعلیم کو الہامی اور آسمانی تقدس سے لبریز نہ سمجھتے تھے اور اسے دانی منسلک اسی بیکر کے تفسیر ہی رہیں + مسئلہ امیں یو اسی وقت صاحب نے اور لکھنا امیں چاہا + صاحب نے اس کے بعض حصص کا انگریزی ترجمہ کیا + علامہ بیور نے بھی مسئلہ ام میں اسکا انگریزی ترجمہ کیا + ہیل صاحب نے لاطینی زبان میں اور وکرکس صاحب نے جرمانی زبان میں ترجمہ کیا +

آٹھویں صدی عیسوی کے ختم سے قبل شرت کا عربی ترجمہ ہو چکا تھا۔ جو کتاب "شوتون الہندی" کے نام سے منسوب ہے، ابن ابی اصیبعہ نے اسکا تذکرہ "کتاب شوتون" کے نام سے کیا ہے + رازی نے اپنی تصانیف و تحریرات میں "شروت" کا حوالہ بطور ایک فاضل جراحیات کے دیکر اکثر جگہ اس سے استناد دیا ہے +

شرت ایک سوسے زائد فوادی کے جراحی آلات کا بیان ہندی آلات جراحیہ

دیتا ہے اور اوزاروں کے خواص و صفات نہایت وقت نظری کے ساتھ یوں درج کرتا ہے :-

"اوتھے دستے اچھے اور جوڑ سخت ہوں، چمک اچھی ہو، دہا راہی تیز و بار یک ہو کہ ہل بھی بخوبی کٹ جائیں، صاف ٹہرے ہوں اور زنگ آلود نہ ہوں، او کو غلامین کے فدا میں پیٹ کر کڑی کی صندوق میں رکھنا چاہئے، وغیرہ" ان اوزاروں میں سے چند کے نام یہاں درج کیے جاتے ہیں + انکا مقابلہ آجکل کی ہتھکڑیاں یا فستہ جراحی ساز و سامان سے کیجئے اور ہندو اسلاف کی ذہانت اور دقیقہ رسی کا

سہ ماخوذ کر کے اگر نہ کہو، کیا کیا ہوگا +

اندازہ کیجئے۔ بہ مشروط تشریح (ایک چھوٹا سا سیدھا چاقو) خمیدہ پھل کے بائو۔
 جیرے کے مشروط، منقطع (نشر) تیز زرع (رہنے) منٹا یا آری، لقطہ (مقطع) م،
 باڈی توڑنے کے چٹے، قینچاں، آلہ باڈر (شکر کا پانی خارج کرنے کا آلہ) مختلف قسم کی
 سوئیائیں، بیشکٹ، دو وزر (گندھی دار ہیک) (مقطع) مرستہ (دخم کی سلائی) (معدہ سال
 (کا دھج) (مجن منقذی) (مجن بٹلی) (میشاب کی سلائی) (مقطع) (رہجی) (مقطع) یعنی
 چٹے مختلف اقسام کے، لقطہ (خم زائد یعنی ناک کے مستوں یا اورام جیہ کے پھونے
 کے چٹے) (قائم طیر) (میشاب پہانے کی سلائی) (محققات یعنی پچکھاریاں، منظار البرز
 سنار (سومے) (عضایہ) اور رفاند (زخموں پر باندھنے کی ٹپیاں اور بند شین) مختلف
 مقامات و اقسام کی، اوکھڑے ہوئے جوڑوں اور شکستہ اعضا پر باندھنے کے لئے
 تختیاں یا جبار جن میں سب سے معتبول و عام وہ ہوتی جو باش کی پتھریوں کو باریک
 رسی سے باندھ کر بالدار شعل میں بنا لیتے تھے۔ علامہ وائز انکی تعریف میں یوں شب

السان میں:-
 "میں نے اس عجیب و غریب جیرہ کو مختلف مقامات کی شکستہ ٹپریوں پر باندھنے کے
 لیے نہایت مفید پایا ہے، خصوصاً ران، بازو، کلائی اور ہاتھوں کی ٹپریوں کی شکستگی
 میں" اس بات کے جالدار جیرہ کی مقبولیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ چند ہی
 سال پہلے تک اسکو انگلستان کے فوجی شفا خانوں میں بکثرت استعمال کیا جاتا تھا۔

۱۔ اسکاں پل۔	۲۔ نیٹل۔	۳۔ فارکسپس۔
۴۔ بسٹوریز۔	۵۔ ہنسٹائٹس۔	۶۔ ہڈی میں فارکسپس۔
۷۔ لین سٹ۔	۸۔ لوپس۔	۹۔ لکھے ٹ۔
۱۰۔ اسکیری ٹیکے ٹ۔	۱۱۔ پربوب۔	۱۲۔ سرش۔
۱۳۔ ساؤ۔	۱۴۔ کاسنگ ہولڈر۔	۱۵۔ رکش اسپرے کیولم۔
۱۶۔ بون فارکسپس۔	۱۷۔ ڈائرکٹر۔	۱۸۔ برقی۔
۱۹۔ سیریز۔	۲۰۔ ساؤڈ۔	۲۱۔ ہنڈج۔
۲۲۔ ڈاکار۔	۲۳۔ اسکوپ۔	۲۴۔ اسپانٹ۔

آج بھی ہندوستانی غرباء اور دیہاتی لوگ اسی ترکیب سے ٹوٹی ہڈیوں کا علاج نہایت حیرت انگیز کامیابی کے ساتھ بلامدد جراحوں کے عام طور پر کرتے رہتے ہیں۔

ہندی محالجات جراحیہ ٹوٹی ہڈی کی شناخت دیگر علامات کے علاوہ

علامت فرقتہ (دکڑا ہٹ) سے کی جاتی تھی + قطعہ جوڑا دکھانے کی مختلف اقسام نہایت باریکی کے ساتھ مقرر کی گئی تھیں اور مختلف قسموں کے قطع کی شناخت کے لیے اوکی مخصوص تغیراتی علامات بتائی گئی تھیں + قطع کا علاج بھی آجکل کے علاج کی طرح شدہ مقابل، حرکت بخروطیہ، حرکت دوریہ اور دوسری ترکیبوں سے کیا جاتا تھا + زخموں کے اقسام میں جروح مشقوقہ، جروح مشقوبہ، جروح مزقہ، جروح رقتہ وغیرہ متفرق کر دیے گئے تھے + کھوپری اور چہرہ کے زخم سے جلتے تھے + جسم کے اندر سے خارجی غیر طبعی اشیاء اور اتفاقیہ طور پر داخل جسم ہو گئی ہوں نکالنے کے لیے ہندوؤں کی ذہانت و طبائی نے نہایت اعلیٰ مہارت کی ترکیبیں اختراع و ایجاد کر دی تھیں، اور بعض مخصوص حالات میں آہنی ذرات کو خارج کرنے کے لیے مقامی طور پر استعمال سے ہی دریغ نہیں کیا جاتا تھا + اور ام و التهابات کا علاج بھی آجکل کی طرح، مضاد التهاب ادویہ، پچھنے، اور مضادات سے کیا جاتا تھا + وضاحت کہی کے مقدمہ حصہ کے علاوہ اور کئی مقامات پر لی جاتی تھی + چونکہ (علق) کا استعمال نشتر سے زائد رائج تھا + سنگنی کچھانے (جھامت) کا رواج عام تھا + بنیائے اور تھیمہ (نکور سینک) وغیرہ کی ترکیبیں بھی آج عام ہیں اور سوت بھی رائج ہیں + عمل ٹیٹریا قطع عضوی اکثر کیا جاتا تھا، اگرچہ اس وقت سیلان خون کی روک

۱۔ جروح مشقوقہ، پچھر ڈونڈوز۔

۲۔ جروح مزقہ، یسی رٹھڈونڈوز۔

۳۔ جروح رقتہ، کن ٹیوز ڈونڈوز۔

۴۔ ہنڈ۔ پولش۔

۵۔ ہنڈ۔ امپوٹیشن۔

۱۔ شدہ مقابل، کاوتھرکس کشن۔

۲۔ حرکت بخروطیہ، سرکم وکشن۔

۳۔ حرکت دوریہ، سرکم گائی ریشن۔

۴۔ جروح مشقوقہ، انٹراڈونڈوز۔

ہتام کے متبتن ذرائع جیسے آج حاصل ہیں اور سوت موجود نہ تھے + قطع شدہ عضو کے سرے (عُصَے) پر اوہتا ہوا تیل لگا کر پیالہ ماسٹک کی بندشی پشیاں لگا دی جاتی تھیں + اجسام و اورام سلیعہ یا رشتوں اور رُٹے ہوئے غدود مغاین کاٹ کر نکال دئے جاتے تھے اور اعادہ مرض سے بچنے کے لئے نازہ سلج پر سلیکا کا ایک مرہم لگا دیا جاتا تھا + جلد صحر (استسقاء زنی) اور قیلہ مائتہ کا پانی آرد بازار کے ذریعہ کالیا جاتا تھا + فریق علی مختلف اقسام میں نیز کی جاتی تھی اور فنی شری کے خارج کرنے کے لئے مصنف کے مقام پر غلہ پالید کیا جاتا تھا + مرض انور سما کی تغضیض نوکی جاتی تھی مگر اسکا علاج نہیں کیا جاتا تھا + شریان کے کٹے ہوئے منہ پر گرہ لگانا (رزبط) جیسا کہ انور سما اور سیلان خون کے علاج میں آجکل رائج ہے قدیم ہندی جراحی میں مفقود ہتا + اس کی دجہ بلاشبہ ہی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ شراٹن کی سمت درفتار داد و صلح سے واقف اور دوران خون کے مسئلہ سے نااہل تھے + نہایت حیرت انگیز واقعہ یہ ہے کہ اس زمانہ کے ہندو اہلباء عل شق البطن یعنی ہیٹ چاک کرنے کے عمل سے واقف تھے جسے وہ ایک اسلوب خاص کرتے تھے + ایسے زیر ثبات قدس بائیں جانب شکاف دیکر یہ لوگ شکم کو چاک کرتے تھے اور اسعاس کے خفیف حصص کو باقسط اس شکاف سے باہر نکال نکال کر ہر حصہ کا بخوبی امتحان کرتے اور اگر اس میں متعے یا اور کسی قسم کی رکاوٹ موجود ہوتی تو انترہی کے ماؤف حصہ

۱۰ ہاڈروسیل -

۱۱ فنی - ہرینا -

۱۲ ادنٹل ہرینا -

۱۳ عص - آٹمپ -

۱۴ سلو - رسولی - ٹیوٹر

۱۵ مسئلہ دوران خون، جس کی ایکب دکا ہرہ مغوی دینلھااروسے کے سر رکھی ہے طب مغوی کی بابہ الاستیاز عملی تحقیق ہے + مگر میں نے کہیں پڑا ہے کہ علامہ ملا علی قزخی نے سب سے پہلے یہ دریافت کر لیا تھا کہ شراٹن دل سے اعصاب کی طرف خون کو لے جاتی ہیں اور اذن میں ارواح نہیں + بلکہ رشتیں خون سیلان کرتی ہیں + اگر یہ صحیح ہے تو اردو کے لئے قزخی کی تقسیم سے سبق سیکہ کہ دوران خون کے مسئلہ کو حل کیا +

میں شکات لگا کر اوسکو خارج کر دیتے، پہر انتہائی کے زخم گولہ انگوں سے سی کر بند کر دیتے اور اون پر گھی یا شہد کا صنادکر کے خلا سے شکم میں راسپس داخل کر دیتے پتھر ہی نکالنے کا عمل بغیر سلاخی درجن اٹھ صنادکر کی مدد سے کیا جاتا تھا۔ کئی ہونئی ناک بنانے کے لیے ناک کے قریب چار اور گالوں کی جلد نکال کر اوس سے نئی ناک بنائی جاتی تھی + یہ عمل انتہائی نزاکت اور کراہی کا ہے اور اس وقت ہندوستان میں کیا جاتا تھا جب یونانی معمولی جراحی اعمال سے ہی بے خبر تھے +

عملیات ترقیج یعنی زندہ جند کو تراش کر پیوند لگانے کا عمل جس میں آجکل یورپ و اوس نے بھرا عقول ترقی کی ہے۔ دراصل قدیم ہندو کے رہین سنت ہیں + اس نے زمانہ میں بھی اندور کے مشہور انگریز ڈاکٹر کرل کی لگن صاحب نے مصنوعی ناک بنانے کے عمل کو نئی نئی ترکیبوں سے ہندوستانی مریدوں پر کر کے ایسا کمال حاصل کیا کہ اوس کے خاص خاص نکتہ یورپ کی معتبول عام جراحی کتب و رسائل میں قصوروں کے ساتھ شائع ہوئے اور یورپ نے اس کی تقلید کی + فرانس کے بعض ڈاکٹروں نے بھی اسی ہندوستانی ترکیب کا متبع کر کے اس عمل میں موشگافیاں کیں + انکھ کے اعمال جراحی میں نزول الما، یعنی موتیا بند کے نکلنے کی ترکیب شامل تھی +

اعمال ہستہ بلہ یعنی دایہ گری کے کام مختلف انواع و اقسام کے تھے، حتیٰ کہ علیحدہ فیصد سید کے ذریعہ زندہ بچہ شکم چاک کر کے نکالا جاتا تھا، اسی طرح مردہ جنین کو کاٹ کاٹ کر رحم مادر سے خارج کیا جاتا تھا +

امراض جراحہ کے علاج میں اعمال بالید کے علاوہ مناسب

علاج بالید واد

ادویہ اور عام بہنی معالجات سے ہی اداولی جاتی تھی جس میں اس کی مہتم بالشان مخزن الادویہ کی وسعت اور علم العلاج کے عظیم الشان اصول کی باقاعدگی سے مہمت موزنی تھی + اوس کے خارجی استعمال کے مہموں اور صنادکر میں سے اکثر میں گھی یا نمکین کی زمین کے اندر معدنی اجزاء مثلاً پادہ، شکبہ، جست، اٹابہ، تاج اخضر، ہیر کیس، ادخیر و شامل ہوتے +

عملیات مقررہ - وہ عمل جس میں شکم اور رحم میں شکات دیگر بچہ خارج کیا جاتا ہے +

معاخص الحصاد - امشانت
ملا بلا سنگ سرجری

فن جراحی کی تعلیم و تربیت

ہر حادثہ اور ہر مرض کے لیے جو ادویہ علم میں تھے،

مذہبی کتب (شاستروں) میں تفصیل قواعد منضبط تھے اور یہی مذہبی پیشوا شالقیں طلبہ کو سکھاتے، کتابی تعلیم بغیر عملی تجربات اور دستی مشق کے بیکار محض بھی جاتی۔ اعمال بالید کی مشق طلبہ کو موم کے مجسموں اور دوسرے نرم پھلوں مثلاً خیارین، تربوز، خربزہ وغیرہ پر عمل کرائی جاتی۔ اقلع و برید، شش و بطن کی مشق کے لیے چڑے کی پتیلیوں میں ہانی یا کچڑ بھرا جاتا۔ تشریط یعنی پچھنے لگانے اور فاسد خون کے نکالنے کی مشق تازہ مردہ چھڑوں پر اونگے بال نکالنے کے بعد کرائی جاتی۔ نشتر لگانے اور چھیدنے کے اعمال کنول کے پوسے تنوں یا مردہ جانوروں کے عروق پر سکھائے جاتے۔ عصابات (پٹٹیوں) کی بندش کی مشق و ترکیب معصومی مجسموں اور پتھلوں پر کرائی ادا ہوتی جاتی۔ درز بندی اور ٹانگے لگانے کی عملی تربیت کپڑے اور چھڑے پر دی جاتی۔ اعمال تریقہ مثلاً جس میں صنایع شدہ ٹانگ یا کان وغیرہ کو جلدی پیوند کے ذریعہ از سر نو بنایا جاتا ہے (مردہ جانوروں پر سکھائے جاتے۔ تشریح کی ضرورت تو سنم ہی مگر تشریح کی تعلیم کا کوئی باقاعدہ نظام ہندو جراحیات میں پایا نہیں جاتا۔

اسباب تنزل و انحطاط

ہندی جراحیات کے اس مختصر تبصرہ کے بعد یہی قدر تاہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قدام ہند نے فن جراحی میں ایسے روشن کارنامے چھوڑے ہیں، تو اب متاخرین کی موجودہ نسلیں اور آج کل کے حیلاجہا کیوں اس ضروری شعبہ طب سے اس قدر نفور اور مستغنی ہیں؟ اور کیوں جراحی کی ایسی عالی شان اور بلند عمارت، جس کی بنیادیں ہزاروں سال پیشتر انتہا سے ہنرمندی کے ساتھ رکھی گئی تھیں اب ایک ایسے حقیر گم نام و بے نشان کہندہ کی صورت میں ہے کہ موجودہ نسلیں اس کے مٹے ہوئے آثار سے ہی ناواقف محض ہیں؟ ذیل میں چند وجوہ مختصر بیان کیے جاتے ہیں، جن کی تفصیلی بحث ڈاکٹر کہوپا دھیما صاحب کلکتہوی نے اپنی کتاب میں نہایت قابلیت سے درج کی ہے۔

۱۱ تشریح سے ہندو کی نفرت۔ نہایت ابتدائی زمانہ میں قدام ہندو لاشوں کے چیرنے سے پرہیز نہیں کرتے تھے، مگر اونگے بعد کی نسلوں نے تشریح جیسی ضروری چیز کو

ذیل، ناپاک اور مذہبی رسوم وغیرہ کے لئے مفید طہارت تصور کر لیا۔ یہ ظاہر ہے کہ جراحیات کی صحت و ترقی منترج کی مزاولت کی کس قدر محتاج ہے۔

(۲) داعیان تقدس اور مذہبی پیشواؤں نے بتدریج اعمال جراحیہ غیر ضروری اور فضول ثابت کرنے کی کوشش کی اور بجائے جراحیات کے جادو ٹونا، منتر جتر، اور دواؤں کے رواج کو مقبول بنالیا۔ ابتداً یورپ اور یونان میں بھی یہی حال تھا اور ہندوستان میں اب بھی واہمہ پرستی کی یہی دبا عالمگیر ہے۔

(۳) مرلیض فطری طور پر نشتر اور چیر بھاڑ سے خائف رہتے تھے خصوصاً جبکہ نمل اخضر (کلورو فارم) جیسی یقینی عمومی دارو سے بیہوشی اس زمانہ میں موجود تھی۔ ہندو جراحین نشتر کے معق بلہ میں محرقات، ٹنگور، صنادات اور کاویات وغیرہ کو زیادہ مفید اور سہل الحصول سمجھتے رہے۔ جراحی علاج کے متعلق خود سسٹم کا عقیدہ تھا کہ ”معمولی محرقات کے نسبت گئی بانڈر (داعنا) بہت بہتر علاج ہے کیونکہ داغی سے اندرونی امراض ایسے تابودہ ہوتے ہیں کہ پھر عود نہیں کر سکتے اور اخلاط فاسد بھی دور ہو جاتے ہیں۔“ اس طرح ہندو جراح خارجی مقدی علاج کو زیادہ پسند کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ اعمال جراحیہ سے بالکل نااہل اور غافل ہو گئے۔ اسی غفلت کے باعث اور سوقت کے علم جراحیت میں بجائے ترقی کے زوال آ گیا۔

(۴) مذہبی پیشواؤں کی خود پسندی اور عوام کی واہمہ پرستی اور ضعیف الاعتقاد کی نے طبی اور جراحی کتب کو الہامی تقدس کی حد تک پہنچا دیا۔ عامۃً انسان کے دلوں میں اس آسمانی تعلیم کی اس قدر عظمت و ہیبت پیدا کر دی گئی کہ وہ چرک و سسٹم کے مسلمات کو انسانی رائے زنی، تنقید و ترمیم اور اصلاح و اضافہ سے بہت بالاتر سمجھنے لگے۔ سسٹم کے مفسرین و شارحین کلم ظرف نقال ہی رہے اور کبھی کسی نے اس کے مفروضہ اصول و کلیات سے سر مو انحراف و اختلاف نہ کیا، اور جہاں مسائل غیر محقق دیکھے اور غلط بیانی صریح پائی وہاں بھی نقد و اصلاح کی جرأت نہ کی۔ الغرض اس طرح کلیات و اصول جراحیات بھل رہ گئے اور فن جراحی محدود ہوتا گیا۔ اس قسم کی خوش اعتقادی ابتداً یورپ والوں میں بھی یونانی علوم و فنون کے متعلق عام تھی، جس کی بدولت بقراط و جالینوس

کے پیش کردہ مسائل بلا امتیازِ رطب و یابس تقریباً دو ہزار سال تک یورپ بھر کو تنہا کرتے رہے ۔

(۵) ہندی جراحی کے انخطاط میں مذہب بودھ کی مخالف تعلیمات نے ہنایت قوی اور نمایاں حصہ لیا اور فن جراحی جو کچھ برہمنی تعصب کے باوجود باقی رہ گیا تھا اوسکو اس نئے مذہب کے نشر و اشاعت نے بالکل تباہ کر دیا ۔ اگرچہ بودھ مذہب کے بانی نے بعض مرضوں میں نشتر کے استعمال کی اجازت دی مگر بیشتر امراض جراحیہ میں جن کی حقیقت و ماہیت مشکوک تھی ، جراحی آلات کا استعمال شرمناک و ناجائز قرار دیا مثلاً پھنڈا نشتر سے چیرنا جائز تھا مگر نا صوبہ برہمن جراحی عمل کی صریح ممانعت تھی ۔

(۶) سب سے آخری اور اہم سبب حکومت کی سرد مہری ہے ۔ ہندو حکومت کا تختہ الٹ گیا اور غیر ملکی فاتحین اپنے ساتھ نئے طبیب اور ڈاکٹر و جراح لائے جن کی پرورش و وصلہ افزائی کا خیال نسبتاً زیادہ مقدم تھا ۔ مفتوح قوم کے بھولے بسے فن کی تجدید کی نہ کوئی کوشش ہوئی ، نہ عوام کے جذبات و خیالات ایسے بلند تھے کہ وہ اپنے سیکڑوں سال کے جمے ہوئے عقاید کے خلاف کسی قسم کی خارجی مداخلت پسند کرتے یا اوسکو نظرِ استحسان دیکھتے ۔ ملکی خیالات کچھ بھی ہوں ، مگر سلطان حکمرانوں اور ان کے بعد علم و حکمت کے دلدادہ انگریزوں نے ہی ویسی طب کی تجدید و احیاء کے متعلق اب تک کبھی کوئی قابل ذکر کوشش نہیں کی ۔ حیاء و تجدد تو درکنار ، ویسی فن کے جو کچھ قدیم ذخائر موجود تھے ، ان کے ہانپنے یا بچھنے کا خیال بھی دلدادگانِ جدت کو نہ ہوا ، ہاں نظرِ عنایت ہوئی تو یہ کہ اسے اور بڑے سب کو بے اصول ، غیر علمی اور ناقابلِ التفات سمجھ لیا ۔

تغافل سے جو باز آیا ، جفا کی قمانی کی بھی ظالم نے تو کیا کی

ہندی جراحی کے عظیم اہلِ شان نظام اور سلسلہٴ مکالمات کا جو بیان اوپر درج ہوا ہے وہ بیشتر مغربی مصنفین و محققین ہی کی آراء کا خلاصہ ہے ، اور ان ابتدائی اور ان میں رہنے والہ دیگر مصنفین کے دائرۃ المعارفِ برطانیہ (انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا) سے بالخصوص استفادہ کیا ہے ۔ دراصل ہندی فن جراحی کی بحث اس قدر دلچسپ ،

اہم اور طویل ہے کہ ان مختصر اوراق میں اس کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالنا اور
جا بجا مختلف محققین و مؤرخین کے اقوال کی تمام وکال نقول پیش کرنا ممکن نہیں۔
اس موضوع پر ڈاکٹر گندرناتھ صاحب کہہ چکے ہیں کہ کلکتہ یونیورسٹی نے نہایت فائدہ مند
تحقیق اور تاریخی جدت سے کام لیکر طویل محنت و دماغی کاوش کے بعد دو ضخیم جلدیں
انگریزی زبان میں تالیف کی ہیں جو جامع کلکتہ ریکلکٹہ یونیورسٹی کی طرف سے
سالانہ میں شائع ہوتی ہو چکی ہیں۔ ہم بڑور سحران کرتے ہیں کہ شاہین ادلکے مطالعہ
سے ضرور مستفید ہوں، ڈاکٹر صاحب موصوف کی تحقیق کی داد دیں اور مقدمہ
کے مخفی علی خزانے سے واقف ہوں، اس کتاب کی ایک جلد میں ہندی آلات
جراحی کی تصاویر بھی ہیں اور ادلکے مقابل عربی اور انگریزی آلات جراحیہ بھی
دلکات گئے ہیں جن سے ارتقاء جراحی کی تصویر آنکھوں کے سامنے پیش
ہو جاتی ہے۔

(۲) یونانی و رومی فن جراحی

الف یونانی جراحی

یونانی جراحیات کی ابتدائی تصویریں جس طرح ہندوؤں کا جراحی کماں منکوت
کے قدیم مسیحت اور مقدس کتب سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح یونانی کتب قدیمہ
سے یونانیوں کے جراحی صنایع و ذرائع کی تفسیر و ترقی کا پتہ چلتا ہے۔ یونان کے نہایت
قدیم و مشہور طبی شاعر ہومی کی نثر بادیہ زریہ نظریں یونانی جراحیات کی ابتدائی تصویریں آتی ہے۔
یونانی عقیدہ کے مطابق خدا نے طب آپولو سے علم طب کی پیدائش منسوب ہے۔
آپولو کے بعد اسکالپینوس خدا نے طب مشہور ہوا۔ دراصل
اسکلیپیوس ایک نہایت نامور اور کامیاب حکیم تھا، مگر ایشیائی یونان کی طرف، اشل
خون عقیدہ کی اور واسہ ہستی نے اس باکمال ہستی کو ”طبی دیوتا“ بنا دیا۔ ادلکی
وفات کے بعد اس کی قبر زیارت گاہ عوام بن گئی اور ایک خاص معبد میں اس کے
مجسمہ کی پرستش ہونے لگی۔ ایوس الطلاق مرلیس اس مجسمہ کے گرد سرنگوں ہو کر
سالہ دی سر جیکل ہسٹرومنش آفدی ہندو۔

دعائیں مانگتے اور اقسام اقسام کے چڑھا دے چڑھاتے، رات کو دہیں سوتے اور مقدس خوابوں سے تعبیر کے لیے اپنا علاج کرتے۔ ان خوابوں میں نہ صرف مناسب دواؤں اور جڑی بوٹیوں کے استعمال کے متعلق الہام ہوتا بلکہ پرہیز، مناسب غذا اور روزہ رکھنے کی ہدایت بھی ہوتی تھی۔ اب اسے خوش عقیدگی کا نتیجہ سمجھتے یا مناسب غذا و خوراک اور پرہیز کا اثر کہ اکثر مریض شفا یاب ہوتے اور خوش خوش اپنے گھر واپس آتے۔ مندرجے ہو جاری اس قسم کی الہامی ہدایتوں اور مقدس علاجوں کی تفصیل مع مریضوں کی تصویر کے اوس مروج خلافت عمارت کے سنوٹوں اور محرابوں پر کندہ کرتے جاتے تاکہ آنے والی نسلیں اسے مستفید ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس قسم کے الہامی علاجوں کا اثر ہر قسم کے مریضوں پر عرصہ دراز تک جاری و عادی نہیں رہ سکتا تھا۔

لہذا ہو جاریوں نے جڑی بوٹیوں کے خواص و استعمال کی تفتیش کی ضرورت نہایت چابکدستی سے محسوس کر کے ہندو رج علم الادویہ اور علم العلج کی تدوین و تنظیم کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہی تقدس باب بزرگ ابتداء ہر ملک و قوم میں حاصل طب تھے۔ اسقلیبیوس کے دبیٹے، صاخون اور بوذا الراہن مشہور محامدہ ٹورائے میں جراحی خدمات پر مامور تھے اور بحر دین جنگ کا پرہیز کیا کرتے تھے۔ خصوصاً صاخون (جو کا تذکرہ ہومر نے اپنی زیرہ نظریں تفصیل کی) بحر دین جنگ کے جہول سے قیروں کے نکلنے میں خوب مشاغل تھا۔ چونکہ وہ زخموں کو جڑی بوٹیوں اور شفا بخش مریضوں کے استعمال سے بہت جلد درست کر سکتا تھا، اس لئے یونان کے جنگی کارناموں میں وہ ایک متاثر حیثیت رکھتا ہے۔ جنگ آزماسورا جب مخرج ہوتے، اوس کے علاج سے بہت جلد شفا یاب ہو کر دوبارہ شامل جنگ ہوتے اور فتح و نصرت کے پرچم اڑاتے۔ اگرچہ ہومر کے زمانہ کی تشریح داجی کی بہت تعریف کی جاتی ہو مگر عرصہ دیکھا جاتے تو اوقت کا فن جراحی چاموں کی دستکاری و توجہ و تفتیش اس طرح یونانی فن جراحی نے نہایت ابتدائی زمانہ تہذیب میں واپس و حقائق پرستی سے جنم لیا اور خوش عقیدگی کے آغوش تربیت میں ہندو رج منازل ارتقاء طے کیے، حتیٰ کہ ایک طویل زمانہ توہم اور تفتیش کی توہم حالت میں گزر گیا۔

فیثاغورث نے ابتداً علوم طب کو رواج دیا، جس کے بعد ایک طویل استدر
متا ازہیج (بقراط) نے فنانے یونان کو علم و کمال کی درخشندگی سے منور کر کے
اصول طب و فن جراحی کی بنیاد رکھی +

بقراط کی جراحی بقراط (جس کا زمانہ شایعاً چار سو سال قبل از مسیح بتایا
ہی نے سب سے پہلے طبی و فنی حیثیت سے فن طب کی باقاعدہ
تدریس و تنظیم کی + اس نے طب کی مختلف شاخوں پر متعدد دکتائیں لکھیں + اس کے
طبی ذخائر میں چند کتابیں علم الجراحات کے موضوع پر ہیں جن سے یونانی ایام جہاں
کے مقابلہ میں بقراط کے زمانہ کے فن جراحی کی عظمت و شان اور ترتیب ترقی کا اندازہ
ہوتا ہے +

کسر و غلغ و ہڈی ٹوٹنے اور جوڑا دکھڑنے پر اسکی دو دکتائیں استدر مبسوط ہیں
کہ بعض لحاظ سے آجکل بھی، جبکہ ترقی آلات و کمالات جراحہ کا انتہائی زور و خروش
ہے، اس کے مدونہ اصول معلومات پر شاید ہی کچھ اضافہ ہوا ہو + "غلغ" شانہ
کی چار قسموں میں سے بقراط نے صرف "مخروج تحتانی" (جس میں عظم العنصر یعنی
بازو کی ہڈی کا بالائی سرا اپنی لمبی رصیح سے اوپر کر دیر بغل آجاتا ہے) ہی کو ایک
عام اور کثیر الوقع مقرر بتایا ہے اور یہی خیال آجکل کے ماہران جراحی کا ہے +
"غلغ عظم العنصر" کے اقسام میں "مخروج معتمد" اور "مخروج مؤخر" کو ہی عام
بتایا ہے + کریم کے پچھلے خازن (رسان) کے کسر کا بیان دیا ہے اور تنبیہ
کی ہے کہ انکے ٹوٹنے کو غلطی سے "کسر قلب" نہیں سمجھ لینا چاہئے + "خمیدگی قلب"
کے اسباب میں وزن کمزوری ایک اہم سبب بتایا ہے جو سیکڑوں سال بعد غرض
پاٹ کے نام سے مخصوص کیا گیا + ان سبب خصائص کے باعث بقراط کی تخفیف
کو زمانہ ابعد کی تخفیف پر سبقت و اولیت مائل ہے + علم العلاج کے متعلق ہی
بقراط میں دہی رخت و بلند پائیگی موجود ہے جو ہندو طب کی شان استیادہ ہے +
بقراط کی جراحیات میں کسر و غلغ کے متعلق نہایت تفصیلی مقالات موجود ہیں،
جن کی شناخت اور تحقیق میں اگرچہ اسے عملی تشریح سے مدد ملنے کا موقع نہ ہوتا

مگر ادسوقت کے اکھاڑوں، اور فن کشتی و پہلوانی کے حادثات سے معتد بہ مد
نی + بقراط نے ایک مقالہ ضربات و جراحات سر کے لئے مختص طور پر درج کیا ہے،
جس میں نہ صرف سر اور کھوپڑی کے زخموں کی نہایت باریک اور دقیق تقسیم موجود
ہے، بلکہ ”کسر انخافضی“ اور کسر تاجہ خوب مقابل تک کا بیان درج ہے + بقراط
کے زمانہ میں کھوپڑی کی ہڈیوں کو آری سے قطع کرنے کا عمل رقتبہ منشاری +
نہایت عام طور پر کیا جاتا تھا، بلکہ اس عمل کا استعمال ادسوقت ہی جائز وباح
سمجھا جاتا تھا جبکہ منقطعہ صانع موجود نہ ہو + بقراط نے دیگر اعضا و جسم کے جرح
و قرح بھی کثیر التعداد اقسام میں مخصوص طور پر لکھے ہیں +

اوس زمانہ میں قنق - بواسیر - مستقیم کے اور ام
لحمیہ - ناصور المقعد - سقوط المقعد - استسقاء
کے لئے رنج تجویف شکم کو پانی پیٹ سے نکالنے

زمانہ بقراط کی جراحی کا ہندو
کی جراحی سے معتد بہ

وغیرہ امراض جراحیہ کا جراحی علاج کیا جاتا تھا + لیکن بعض دیگر اعمال مثلاً ستر
یا اور ام سلیحہ (درسولی) وغیرہ کی تقطیع + جوا ابتدائی ہندی جراحی میں عام طور
پر رائج تھے، ادسوقت کی یونانی جراحی میں نہیں کیے جاتے تھے + پتھری نکالنے
(علیہ الحصاصات) کا عمل بھی مخصوص ماہرین ہی کر سکتے اور وہ بھی شاذ و نادر
نتیجہ صُدُر کی مشناخت کا علم تھا اور اس کے جراحی علاج کا طریقہ یہی تھا
کہ ہلیوں کے درمیان کی فضاء (بین الاضلاع) میں خشکاف دیکر پپ خاسج
کر دی جاتی، مگر آجکل کی طرح ہلی کی ہڈی کا ٹکڑا کاٹ کر نہیں نکالا جاتا تھا + بقراط
کے شاگردوں کو نہایت سخت قسم اس بات کی دی گئی تھی کہ جسم انسانی کا کوئی عضو
(عمل بہتر کے ذریعہ) ہرگز نہ کاٹیں + غالباً یہ مانعت ادسوقت کے یونانی مذہب کے
اصول کے مطابق تھی جس کے خلاف کوئی چارہ نہ تھا + یونانیوں کا علم تشریح
بھی بہت زیادہ وسیع نہیں تھا کیونکہ وہ انسانی لاشوں کو مذہبی روایات کے خلاف
سلہ کسر انخافضی - کھوپڑی کی ہڈی کا ٹکڑا کر دیا جاتا +

سلہ کسر بہ ضرب مت بل - وہ کسر جس میں سر کی ہڈی عظام ضرب سے درتوئے +
سلہ کسر پپہ ننگ +

چیر نہیں سکتے تھے، البتہ ادنیٰ قسم کے جانوروں کو چیر پھاڑ کر تشریحی معلومات حاصل کرتے رہے + اعمال ترشیع دشکار زندہ جلد کا پیوند لگا کر صنایع شدہ ناک بنادینا، یا چہرہ، کان، وغیرہ کے عیوب کی اصلاح کرنا وغیرہ جن کے اولین موجد اور مخصوص ماہر قدماے ہندو تھے، یونانیوں کو اس وقت معلوم نہ تھے، نہ یونان میں کیے جاتے تھے +

یونانی آلات جراحی جراحی آلات میں ^{لہ} لفظ ^{مستفہ} مستفہ، ^{مخمس} مخمس، ^{منظار} منظار، ^{استیم} استیم، قاطیہ، اور مختلف اقسام کے کاویات و محرقات تھے +

مجموعی حیثیت سے دیکھا جائے تو بقراط ہی مغربی جراحیات کا اولین اور عالی ترین قائم ہے + یہاں اس بحث کی گنجائش نہیں کہ بقراطی اعمال جراحیہ کا اصلی حقیقی ماخذ کیا تھا + قدیم مغربی مؤرخین فخر ایجاد و اولیت کا سخت بقراط اور یونانیوں کو ہی بتاتے ہیں، مگر بعد از تحقیقات نے ایک ایسا زوردار تاریخی مواد اور ناقابل انکار شواہد کا انبار پیش کر دیا ہے کہ جسے دیکھ کر اب حقیقت میں یورپ والوں کو بھی لاکالہ ہی میخہ اٹھ کر نا پڑتا ہے کہ فخر ایجاد مستقیم ہندو کا ہی حصہ ہے + ہندو کا علم طب و دنی جراحی مختلف ذرائع سے (جن میں ایرانیوں کا حصہ پیش پیش ہے) یونان پہونچا + الغرض ماخذ کچھ ہی ہو مگر اس سے ہی انکار نہیں ہو سکتا کہ ابتدائی یونانی فن طب جو تو ہماقت باطلہ اور عقیدات و اہیہ سے بھرپڑا ہوا اور جسے اصلی معنوں میں علمی و دینی حیثیت حاصل ہی نہ تھی، ایسے ناقص انبار پارینہ کو بقراط ہی کی عالی دماغی اور بلند نظری نے علمی و دینی جامہ پہنایا۔ اور مقرر ذلت و گناہی سے اُنہما کہ آسمان نفیست کے انتہائی عروج پر پہونچا دیا + بقراط کے اعمال جراحیہ ^{مستفہ} بعض کے اصل میں دبی ہیں جو آج زیادہ مہذب و آراستہ ہو کر مہذب دنیا میں آج ہیں اور تہ کی چار دانگ عالم میں دہوم ہے +

(ب) اٹالی اسکندریہ و روما و ہیزنطین کی جراحی

بقراط کے بعد کچھ عرصہ تک ایک ایسا درسیاتی جمود و سکوت رہا جس میں جراحی کی

رقت رشت رہی اور کوئی قابل تذکرہ ترقی وقوع میں نہ آئی، حتیٰ کہ حضرت مسیح علی
ولادت سے تقریباً تین سو سال قبل کے زمانہ میں

اسکندریہ میں طبی مدارس

کی بنیاد رکھی گئی، اسکندریہ کے مدارس اس خصوصیت کے باعث ممتاز ہیں کہ
ان میں انسانی تشريح کی بہت ترقی ہوئی اور بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے
کہ اس زمانہ میں یہاں زندہ انسانوں پر بھی تشريحی تجربات کیے گئے، اسکندریہ
کی فنی ترقی کا زمانہ ایردنیلیوس - ایراسیٹراطوس - فیوگسی نوس - جاپریس
بیرو - اپولونی - اور مشہور ماہر علمہ حسان، انوں میں جیسے نامور فضلا کے باعث
ممتاز و قابل یادگار سمجھا جاتا ہے، اس زمانہ میں تشخیص مرض کے متعلق باقاعدہ
اصول مضبوط ہوئے اور اعمال بالیدہ نہایت بلند نظری اور بے باکی کے ساتھ
اختیار کیے گئے، علم العلاج کے مختلف شعبوں میں منقسم کیا گیا، اور مخصوص
امراض کا علاج صرف اس شعبہ کے مختص ماہرین کے سپرد کیا گیا، یا نہیں دقتیں
نظروں سے پوشیدہ نہیں کہ اس عظیم الشان طبی ترقی کے باوجود فلسفہ امراض
اور علم امحال اعضا کے متعلق بقراط کی معلومات پر کوئی معتد بہ اضافہ نہ ہوا، ہیکل
کے ماہرین جراحی اپنی مرہم پٹی کی ماریکی و پچیدگی کے باعث مشہور ہیں، پٹی باندھنے
کے بنیاد و مختلف طریقے ایجاد ہوئے +

ایردنیلیوس [نہایت بے باکی اور جرأت کے ساتھ نظر جراحت چلاتا، حتیٰ کہ
اعضاء و اشلاء مثلاً کبد و طحال پر بھی با تکلف کانٹ چھانٹتا، اوس کی
راسے مٹی کے طحال جسم انسانی میں کوئی دھنچا اہمیت نہیں رکھتی ہے، اعتبار اس پر
کا علاج وہ ایک خاص مہم کے قائل گیر سے کرتا، جو عصہ تک اوس کے نام سے منسوب
و مشہور رہا +

پتھری نکالنے کا عمل خاص خاص ماہرین ہی کثرت کرتے تھے اور حکیم
امونڈیس نے تو اندرون شانہ پتھری توڑنے (عمل تقییت المخصاة) کے لئے

۱۳۱ لیتھوٹریٹ

۱۳۲ فلسفہ امراض - پتھری لوجی -
۱۳۳ علم امحال اعضا - فزیالوجی -

ایک مخصوص آلہ (منفعت الحماة) ایجاد کے استعمال کیا۔

رومی فن جراحی

کی بنیاد دراصل اون جلا وطن شدہ یونانی فلاسوں کی دسالت سے بڑی جو روم میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ غلام عام طور پر شہر میں حمام اور حمامت کی دوکانیں رکھتے تھے اور وہیں جراحیات کی ادنیٰ سلیفین ہوتی تھیں۔ رومی دستوری سلطنت کے زمانہ میں اہل روم یونانی جراحیات کی ترقی کو نہایت رشک و حسد کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ روایت ہے کہ شاہ قاطو اعظم (سلطان م) سے تاسف لکھ ق۔ م) جو یونانیوں سے بالخصوص جو شخص رقابت رکھتا تھا، اپنی جائیز میں طب و جراحی کی مشق کرتا۔ سب سے پہلا یونانی حکیم جو روم میں جا بسا

حکیم آر کا غیطوس

(مسلک قبل مسیح) اسکا اعمال جراحی اور کادیات کے استعمال کا اسقدر شوق و ذوق تھا کہ جاہل رومی اسے جلا وطن کے نام سے پکارتے تھے اور بالآخر رومیوں کی ناقدری اور جہالت نے اس نامور حکیم کو جلا وطن کر کے روم کی حدود سے باہر نکال دیا۔

حکیم اسقلا بیدوس

نے روم مشہور فلسفی سلسٹرک کا دوست اور ہم عصر تھا یونانی طب و جراحیات کا روم میں مستقل پایہ بنایا۔ یہ نہایت کامیاب طبیب ہی نہ تھا بلکہ جراحی کا نہایت باکمال مشاق تھا قطع الجرح و اوقطع القصبة جیسے مشکل اعمال جراحیہ اسی کی ایجاد ہیں۔ اس کے نئی شوق و جرات کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس نے نہایت جسارت اور بے باکی سے خود اپنے جسم کو فشریحی تجربات کے لئے وقف کر دیا تھا، تاکہ عوام و دیکھیں اور اپنا شوق تجسس پورا کریں۔

۱۔ ییتورائٹ۔	۵۔ اسکے پیا ڈیس۔
۲۔ ری پلک۔	۶۔ لیرنگا ڈی۔
۳۔ کیٹو میجر۔	۷۔ ٹرکیا ڈی۔
۴۔ ارشائے ٹوس۔	

حکیم طہیان نے سب سے پہلے جوکوں کے استعمال رائج دیا۔ درجوں کا رواج ہندوستان میں نہایت قدیم زمانہ سے چلا آتا تھا۔

حکیم سلسوس سب سے پہلا رومی حکیم ہے جو شاہ عیسیٰ کے زمانہ حکومت میں گزرا ہے۔ اس کی حیات کا زمانہ غالباً پہلی صدی مسیحی کا ابتدا

میں ہے۔ اس نے قاریجہ طب پر ایک نہایت جامع اور بسیط کتاب لکھی جو جس سے فن جراحہ کی کئی صدیوں کی تاریخ و حالت پر روشنی پڑتی ہے۔ اس کتاب کا ساقاں اور آٹھواں مقالہ جراحی سے مخصوص ہے، جس میں بیشتر وہی باتیں درج ہیں جو رومی شاستروں اور یونانی جراحات کے قواعد و ضوابط پر مشتمل ہیں۔ اس نے اعمال ترقیہ کے ذریعہ ناک، کان، اور لبوں کے بنانے کی ترکیبیں مشرح طور پر درج کی ہیں، اور فتن کے لیے عمل بالید کے علاوہ سرد الفتن کی ترکیب

ہی بیان کی ہے، جس میں یہ بھی درج ہے کہ رفق کو واپس داخل کرنے کے بعد مجری اُربنی کو کئی بالنار سے داغ دینا چاہئے، سلسوس نے مشہور عملیتہ بالحقا کہ جراحی درج کیا ہے وہ فی الحقیقت اسی عمل کا چرہ ہے جو نہایت قدیم زمانہ سے ہندوستان اور خاص اسکندریہ میں ہی عملاً کیا جاتا تھا۔ اس نے مختلف مقامات کے فاصور کا علاج بھی بتایا ہے اور دیوار سینہ کے فاصور کے علاج پر پہلی کے استیصال جنائی (مکڑے قطع کر کے نکال ڈالنے) کا طریقہ بتایا ہے کھوپری اور سر کے اعمال میں ثقب منشاری کو دہی اہمیت دی ہے، جو اس عمل کو یونانی جراحی میں جاہل تھی۔ اس زمانہ کے فن جراحہ کے علو شان کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جب پتھری مجری البعل میں پھنس کر اسکو مسدود کر دی، اور جلد کے نیچے مجرای بول کو کاٹ کر نکال لی جاتی، اطراف بدن لٹا کر باؤں اور غیرہ کو قطع کرنے کے لیے ایک خاص عمل ہنوسوس نے مشرح و مفصل

۱۔ نئے ی۔ سن۔

۲۔ انگوٹھ کی سیال۔

۳۔ آگش۔

۴۔ ایکچوئل کا ڈری۔

۵۔ ہاسٹک آپریشن۔

۶۔ ٹریفاننگ۔

۷۔ ٹینگس۔

طور پر بیان کیا ہے + اعضا کو اس طور پر قطع کرنے کا طریقہ جو اب تک پہنچنے والی حالات میں رائج ہے) جماعتی ادب میں سب سے پہلی مرتبہ سلسلے نے بیان کیا ہے۔
مندرجہ بالا تفصیل سے ظاہر ہے کہ بقراط کے بعد (اور جالینوس سے پہلے) سلسلے وی ایک ایسا نامور حکیم اور جراح گذرا ہے جس نے قدامت کی میراث فریادہ پارچہ نہ لگائے اور یونانی جراحیات کو مزید ترقی و اعلائیات سے آراستہ کر کے آئندہ آنے والی سلسلوں کے لیے ایک شاہراہ ترقی کی بنیاد ڈالی +
سلسلے کے بعد جو نامور رومی حکماء گذرے ہیں ان میں سے چند تہا بل

تذکرہ ہیں :- مثلاً

جس نے مختلف اقسام کے جراحات اور زخموں کے علاج کی ترکیبیں
طیساٹوس ایسی وضاحت و شرح سے بیان کی ہیں جو آجکل کے ترقی پذیر زمانہ کے معالجات سے متاثر کھاتی ہیں +

جس نے مکعبہ، درزہ، ہیلے حیوانات کے کاٹنے کے علامات و معالجات
دیسقوریڈس کا بیان دیا ہے۔

جو پہلی صدی مسوی میں گذرا ہے اور جس نے سب سے پہلے تیلنی کمی
ارمی طویس کے ذریعہ آبلہ پیدا کرنے کا رواج ڈالا +

نے سلسلے کے ایجاد کردہ ابتدائی طریقہ کی اصلاح
ارکی جینیس اور ورس کے صغیر دواؤں اور رابطہ (بند) کے ذریعہ عروق سے جریان خون کو بند کرنے کی ترکیب ایجاد کی + ارکی جینیس نے سب سے پہلے رابطہ مدد در عروق کے گرد گول بند لگانے کی ترکیب ایجاد و استعمال کی +

نے بڑوں کے ٹوٹے رگسوں کے مختلف اقسام و علامات تشخیص کی خصوصاً
سمرٹوس کے متعلق تفصیل و تشریح بتائی + امراض النساء پر اس نے ایک کتاب لکھی اور آئندہ منتظر الفرج ایجاد کیا +

طیساٹوس۔ ارمی ٹوس۔

ڈیاسکوریدس۔ ارکے جی نیزہ۔

مکعبہ۔ وہ جو اندھے پاگل کشنے کا مہو۔ روموس + سورانوس۔

ہیملی وروس نے اعضا کو بتر شراخی کی ترکیب سے کاٹنے کا طریقہ ایجاد کیا اور بتر شکن ڈرک کو ناقص طریقہ بتایا۔ علیٰ ہذا اس نے عروق سے سیلان خون کو روکنے کے لئے شرائین کو مڑھڑنے کا طریقہ (عمل سٹل وائٹ) ہی ایجاد کیا۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ ابعد میں یہ عمل اور ربط رینڈر لگنے) کا طریقہ متروک ہو گیا اور اسکے بجائے داغنے (کئی بالٹار) کا رواج مقبول ہو گیا۔ ایک محقق ہے مندرنامی کا بیان ہے کہ پہلی دور رس نے فتنہ الصغی کا جراحی عمل برضی تجرائی بولڈ وائیبل اور کاسٹے کا طریقہ ایجاد و استعمال کیا۔ ہے مندر لکھتا ہے کہ یہ سلطنت میں کمان جراحیات کی شہادہت لیں ہیں۔ +

جالیئوس دسپائن سلاطہ۔ وفات مسلمہ اس نامور یونانی انسلیکیم نے اسکندریہ میں تعلیم پائی۔ جالیئوس سلطنت حکم کے زمانہ شباب میں فن طب کا مجدد و زندہ کرنے والا خیال کیا جاتا ہے۔ شہنشاہ ماڈرین کے عہد حکومت میں بمقام پرماس و قلع ایشیاد کو چیک پیدا ہوا۔ لیکن اصل وطن سمیرنا تھا۔ چنانچہ اسی جگہ تعلیم ختم کر کے ادس کے استحکام و مشق کیلئے روم آیا۔ جالیئوس علم طب اور علم الامراض و علم العلاج میں آفتاب بکر چمکا۔ اس کی تحقیقات طبی اور تجربہ طبی نے علوم تشریح، منافع الاعضہ اور اصول علاج میں نہایت اہمیت اور مالیشان رفعت پیدا کر دی، مگر جہاں تک ارتقاء جراحیات کا تعلق ہے، باوجود اس کے کہ جالیئوس خود ایک نہایت جدت پسند تشریح داں اور اول درجہ کا کامیاب جراح تھا، ادس کی تصانیف میں کوئی خاص اور اہم سنئے اصناف جراحی کے متعلق نہیں پائے جاتے، اور وہ زیادہ تر جراحی میں بقرانہ کے شارح و مفسر کی حیثیت سے متاثر ہے۔ +

المبتہ جالیئوس کے جراحی کمالات میں چند باتیں قابل لحاظ ہیں نا، جالیئوس پہلا شخص ہے

۱۔ پہلی ڈرکوں۔	۲۔ سرکرا اپورٹیشن۔
۳۔ فلیپ اپورٹیشن۔	۴۔ ہارٹن۔
۵۔ کا وہ طریقہ جس میں گوشت کے جوار کے	۶۔ اسکرٹل ہرنیا۔
جالتے ہیں۔	۷۔ اسٹریچر آف بریتھرا۔

جس نے صحیح اور کامل تشریح دانی کو جراحیات کے لئے ضروری اور اہم بتایا، اور نہ صرف اصول بلکہ عملاً اوس نے تشریح کے فوائد کا اپنی جراحی میں ثبوت دیا +

(۲) اوس نے جراحی معالجات اور اعمال میں ایسی باقاعدگی، ترتیب و تنظیم کی تدوین کی جو اوس سے پہلے موجود نہ تھی + (۳) زخموں اور جراحات کے پیدا ہونے والے نتائج اور عوارض بعیدہ کے متعلق وہ بوجہ اپنی کامل تشریح دانی کے نہایت صحت اور کامیابی کیسٹا پیشین گوئی کرتا اور اندازی رائے قائم کر سکتا تھا، عوارض و نتائج امراض کے متعلق ایسی صحیح رائے اوس سے پہلے کسی طبیب نے قائم نہیں کی تھی، کیونکہ اس سے پہلے حکماء دقیق و صحیح تشریح سے اس قدر واقف نہ تھے +

(۴) طبیوں کی بندش کے طریقوں اور شریانی سیلان خون کے روک تھام کے وسائل کی بابت اوس کی تحقیقات و معالجات بہ نسبت اوس کے پیش رو ڈماہرن جراحی کے بہت بہتر تھے + (۵) علاوہ ازیں، جراحی کے دواہم کارنامے جالینوس کی ذہانت خاص سے منسوب ہیں۔ یعنی اوس نے خنثی القصد کا جراحی علاج عظیم نقص کے کچھ حصہ کو کاٹ کر (استیصال جزوی کے عمل سے) کیا + دوم یہ کہ اوس نے شریان صمدی کو ”علیٰ ربط شریانی“ کے ذریعہ گرہ لگا کر باندھ دیا +

جالینوس نے سب سے قیمتی اور قابل قدر دریافت کی کہ اس نے تجربہ سے معلوم کیا کہ تمام شریانیں بالخصوص وہ جو قلب سے تمام بدن میں خون پہونچاتی ہیں اور جو اس وقت تک صرف روح سے پر خیال کی جاتی تھیں، صرف خون سے پر ہوتی ہیں +

جالینوس کے بعد یونان کے علوم و فنون میں جو عمدی زوال پیدا ہو گیا، اوس نے جراحیات ہی متاثر ہوئے بغیر نہ رہا + بائیںہہ جو شاذا مہر جراح گذرے میں اچھے حالات بعض کتب تواریخ میں ملتے ہیں + جالینوس سے دو صدی بعد اوری ایپوس اور چھٹی صدی عیسوی میں ”اریطیوس“ نامی دو مؤرخین گذرے ہیں جن کی محفوظ تحریرات سے اس زمانہ کی رومی جراحیات کی حالت ترقی و ترقی کے متعلق روشنی پڑتی ہے + چنانچہ روایت ہے کہ آنتی لوس، لیونی دیو، فلاخن یوس

سہ نخر القصد۔ یعنی کی ڈی کا برسیدہ ہو جائے دیکھ ریافت اسٹرم +

اور پال اول نامی جراحوں میں سے ہیں جو جالینوس کے بعد گزرے ہیں +
انتی لوس (رشتہ دار) کو علامہ ہیز نے دنیا کے قابل ترین جراحوں میں شمار کیا ہے +
 اس نے انورسہما کے لیے یہ جراحی عمل ایجاد کیا کہ شریان ماؤت
 کو کینہ اور ساسے اور پورے نیچے کے مقام پر گرہ لگا کر باندھ دیا اور گیسہ انورسہما کو کاٹ کر
 خالی اور خارج کر دیا + شکرے ہوئے اعضاء کو بذریعہ عمل قطع کا وقتا کر کے درست
 کیا + جیسا آج کل کیا جاتا ہے + انتی لوس (اور لینڈی دیز) نے گردن کے متورم غدود
 کو کاٹ کر خارج کیا + عروق کو کاٹنے سے پہلے اون میں گرہ لگانے کی ترکیب بتائی
 اور شریان سبائی اور ورید و داجی کو بچانے کے لیے متنبہ کیا +

یسی دوروس اور لیونی دیز نے بہتر شراخی کا طریقہ عمل
 ایجاد کیا +

پال ایجینا چھ سو تیسویں صدی عیسوی میں گزرا ہے یونانی درومی جراحات
 کا آخری نامور اور قابل ذکر جراح ہے +

بیزنطینی جراحی سلطنت روم کے زوال کے بعد تین صدیوں میں فن جراحی
 نے جو اتنا چرچاؤ دیکھے، اونکی مختصر تفصیل ایجینا کے نامور

جراح پوٹوس کی کتاب (رشتہ دار) میں محفوظ ہے + پوٹوس کی سات کتابوں میں
 سے چھ کتابیں خالص علی جراحی کا تذکرہ ہے اور چوتھی کتاب میں بیشتر امراض
 جراحہ کا بیان درج ہے + علامہ ایڈمس فرانسی نے پوٹوس کی اس مشہور تصنیف
 کی شرح و تفسیر نہایت قابلیت سے لکھی ہے، جس میں دنیا سے قدیم کی جراحیات کی ایک
 جامع تصویر نظر آتی ہے + چنانچہ وہ لکھتے ہیں +

پوٹوس کی چھ کتابیں عمل جراحی کے متعلق ایک ایسا مکمل نظام پیش کرتی ہے جو
 زمانہ قدیم سے ہم تک منتقل ہوا ہے۔ جیسی عباس اپنی کتاب ”عملیات“ میں تمام مطلق
 پوٹوس سے نقل کر دیتا ہے + ابوالقاسم الزہرا وای، جو تمام دیگر عربی مصنفین
 میں اپنی حدت اور صائب الائی کے لئے ممتاز اور یکتا شخصیت رکھتا ہے، وہ بھی
 سارے کے سارے بابوں میں پوٹوس کا حوالہ دیتی ہے + سادہ کی کتاب ”تقویٰ“

شہ پال آت ایجینا سے یہ اہل یورپ کی خود پسندی ہے کہ دوسرے غیر یورپی کالمین دیکھ لیں کہ جینہ

درجہ علم الامراض کے متعلق حکماءے سلف کے اصول ورائے کا بیش بہا خزانہ ہے۔
 میں جو مطالب درج ہیں، ان میں بعض ایسے مباحث ہیں جو پولوس میں نہیں پائے جاتے
 وہ انٹی لوس اور اس کا جینس سے ماخوذ معلوم ہوتے ہیں۔ یہ دیکر صاحب
 الرائے حکماءے کواگرچہ بعض اوقات ہمیں مخصوص مضامین کے متعلق ادونکی رائوں کی
 تشریح و تفسیر کرنے کی ضرورت پیش آئے گی مگر ان میں سے کسی ایک نے پولوس
 کی طرح جراحیات میں تنظیم نہیں پیدا کی۔ حتیٰ کہ ابن سینا ہی جو طب کے متعلق دور
 ہرچہ کا بیان نہایت تفصیل اور شرح سے کرتا ہے (عملیات جراحیہ کے متعلق اپنے
 بیانات میں نقص و اہام سے معرا نہیں) اور جو کچھ تشریح و تفصیل عملیات کے باب میں
 اس نے دی بھی ہے وہ بی تقریباً ماسٹر پولوس سے ماخوذ ہے۔ کسر و غلج کے متعلق
 جو بیانات بقراط اور اس کے شاگرد جالینوس نے دیے ہیں وہ تقریباً پورے
 پورے ہیں، لیکن جراحی کے دیگر مضامین کے متعلق ان کی معلومات قلیل و
 مختصر ہیں۔

پولوس نے خود بھی بعض اصول و عملیات جراحیہ مضبوط کیے۔ مثلاً استلاء دوسری کے
 علاج کے لئے وہ بچائے "استفراغ عمومی" کے "استفراغ مقامی" کو زیادہ مناسب
 سمجھتا تھا۔ پھر مری نکالنے کے لیے وہ بچائے "عمل شق و سلاخی" کے "شق جانی" کو زیادہ
 پسند کرتا، اور خارجی شکاف کا آزادی سے کرنا اور اندرونی شکاف کا محدود و مکنہ
 خیال کرتا تھا۔ اور سہاکی تشفی وہ "تواصل عروقی" کو دیکھ کر کرتا اور انٹی لوس کے
 طریقہ پر اور سہا کی جراحی عمل کرتا۔ سرطان پستان کے لئے وہ پستان کے اخراج و
 انقطاع کے واسطے عمل بتر پستان کرتا۔ کسر و غلج کا علاج بھی وہ کرتا تھا۔

عربی و اسلامی جراحی

فتح مصر کے بعد سے اہل حبشہ یونانی طب یونانی فن جراحی سے روشناس ہوئے
 اور یونانی و رومی علوم و فنون کے احیاء و ترقی میں کمال دیکھی پسے گئے۔ عربوں
 کی زبردست خصوصیت یہ ہے کہ ادونکی دسالت اور سرپسی کے باعث یونانی و رومی
 فنون کی میراث قدیم جو یورپ کے فردن و سلاخی کی علمی و اخلاقی جہالت سلطنت روٹے

زوال اور اوس زمانہ کے سیاسی تغیرات کی کشمکش سے انتہائی پستی و کس پھر سی کی حالت میں پہونچ کر قریب الفنا ہو چکی تھی نہ صرف تمام آفات سے محفوظ رہی بلکہ نسبتاً بہتر صورت و لباس میں، مزید تہذیب و شائستگی کی جلاء سے آراستہ ہو کر، یورپ تک پہونچ گئی۔ یہ ایک ناقابل انکار تاریخی واقعہ ہے کہ بقرط اور جالینوس کے نام و کمال کو عربوں نے ہی زندہ کیا اور یونانی فن طب کو چار چاند لگا دئے۔ کہتے ہیں کہ وہ علم طب معدوم تھا، بقرط نے اوسکو ایجاد کیا، مردہ ہوا جالینوس نے اوسکو تازہ و صبح بھونک کر زندہ کیا، متفرق و منتشر تھا، رازی نے اوسکو جمع کیا، ناقص تھا، شیخ الرئیس بوعلی ابن سینا نے اوسکو مکمل کیا۔

اسلامی طب کا عروج۔ ابو بکر محمد ابن ذکریا الرازی زناذیات نشہ سے شروع ہوتا ہے۔ رازی کی تصنیفات کئی سو سے زائد ہیں، لیکن علم طب پر اوس کی حاوی بکیر ایک ہنایت ہی عمدہ کتاب ہے، جس کی شہرت آج تک قلم ہے۔ رازی نے چچک و خسرو میں تقریباً کی اور تھخص بتائی۔

ہارون نامی ایک عربی حکم نے سب سے پہلے مرض چچک کو بیان کیا۔ رازی کے بعد شیخ الرئیس بوعلی ابن سینا مشہور میں بخارا میں پیدا ہوئے اور دنیا سے طب کے آسمان پر آفتاب بن کر چمکے۔ مختلف علوم و فنون پر متعدد کتابیں لکھیں۔ اُنکی تصانیف کے سلسلے بقرط اور جالینوس کی شہرت ماند پڑ گئی۔ چنانچہ قاضی شیخ ایک ایسی جامع اور بے نظیر کتاب ہے جسے فرانسیسی علما نے ”کلیہ عقل و فہم“ کا نام دیا اور یورپ والوں نے کمال احترام سر پر رکھا، یہ اہل کتاب پہلی مرتبہ مسلمانوں میں روم میں شائع ہوئی اور پھر مشہور اسکالاطینی ترجمہ و تفسیر میں چھپا اور پھر فرانسیسی مانگر بڑی میں اس کے تراجم ہوئے۔

دسویں صدی مسیح میں ایک بہت بڑا طبیب موسویہ دہشتی گندہار کی کتاب حکم الاولاد ویدہ پر صدیوں تک یورپ میں سند شائع ہوتی رہی اور پندرہویں سوھویں صدی تک چھپیں مرتبہ طبع ہوئی۔ جس میں اول، شاہ انگلستان کے زمانہ میں جو قبادون ادویہ لندن کی شاہی طبی دارالمعلوم کی طرف سے شائع ہوئی وہ درحقیقت ہی کتب علمی

سے باخود و نامور الاطباء ڈاکٹر غلام جیلانی +

”خلیفہ ہارون الرشید اور اس کے جانشینوں کے زمانہ میں مسلمانوں نے علوم طبعیہ میں بہت ترقی اور اضافات کیے۔ چنانچہ اس خلیفہ کے زمانہ میں تین ہندوستانی وید، مہنی کا (منکہ) اہالیہ راما، اور یجن دھن، ہندا میں طلب کیے گئے۔ مہنی کا کی مدد سے دیگر سنسکرت طبی کتب کے علاوہ سنسکرت مسنگھا کا بھی عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ اسی زمانہ میں چرک کا بھی عربی میں ترجمہ ہوا۔ رازی نے اپنی کتاب الکامدی میں چرک اور سسکرت کا ذکر کیا ہے اور بعض مقالات ہونگی عباتی ہی نقل کی ہیں۔“

لیکن درہل علوم طب اور فن جراحیات پر ہسپانیہ راندس کے باقی تھن زیب عربوں اور اندلسی مسلمانوں کا نہایت گراں بہا احسان ہے جس سے مذہب دنیا عموماً اور یورپ والے خصوصاً ہرگز ہرگز عہدہ برآ نہیں سکتے آج یورپ کے مذہب ممالک اپنے عروج و رفعت اور اخلاق سوز تہذیب و ترقی کے نشہ میں ایسے بدست و سرشار ہیں کہ ان میں سے بیشتر اس سرچشمہ تہذیب و ہدایت کو بھول گئے ہیں، جو ہسپانیہ راندس کے اکثر عربوں نے اپنی انتہائی فرائض جتنی شان علم پروری سے یورپ کے قرون وسطیٰ میں جاری کیا، اور جس نے تمام یورپ کی تاریخی اور جہالت کو تہذیب و علوم کی نورانیت سے مبتدل کر کے ادسوقت کی دنیا کو بقیعہ نور بنا دیا۔ اندس کی تاریخ دیکھئے، اور تاریخ بھی نہ مبالغہ پسند، شریفین یا مسلمانوں کی نہیں بلکہ ”انصاف پسند و حق شناس“ میسائیوں کی نکھی ہوئی، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ادسوقت تمام یورپ کس حد تک فقر و پستی و جہالت میں گرا ہوا تھا اور مسلمانان اندس نے باوجود اپنی مسلسل خانہ جنگیوں کے کیونکر سبھی تمام علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کی بنیاد ڈالی، جس سے علم طب زندہ اور محفوظ رہا، جراحیات کے مضبوط اصول اور باقاعدہ علم و عمل سے یورپ روشناس ہوا، اور دنیا کی عام علمی بیداری سے علوم و فنون کی ترقی جاری ہوئی۔“

ملک ملاحظہ ہو فاضل امریکی اسکاٹ کی تاریخ اندس سہی ہسٹری آف مورش اسپانیاں یورپ کا قابل دید ترجمہ از اخبار الاندلس (از مولانا خلیل الرحمن صاحب مترجم فتح اطیب و مولدین و تاسو الخلفاء وغیرہ)۔

اس مختصر تبصرہ میں زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں، لہذا ہم مشرح تاریخی شواہد سے قطع نظر کر کے، محض تشکیلا مشہور یورپی مؤرخ لین پول کی تاریخ اندس سے فریل کے مختصر تمبہاسات پر انکفا کرتے ہیں جس سے خلیفہ اعظم عبدالرحمن ثانی راز اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک عہد کی علمی ترقی و تہذیب کا اندازہ ہو گا +

اس میں شک نہیں کہ غلیظہ غلظہ (عبد الرحمن ثالث) کے مبارک عہد میں مدینۃ الخلفاء و قرطبہ دار الخلافۃ اندلس مسلمانوں کا واقعی مایہ ناز تھا، اور لحاظ اپنی شاندار عمارتوں، پر تکلف اور شائستہ طرز معاشرت، اور عام علوم و فضائل کے تمام یورپ میں باسٹھائے شہر بازنطین کے مدیم انثال تھا + پھر اگر ہم یہ بھی خیال کریں کہ جو حالات عربی مؤرخین نے اس کی شان و شوکت کے متعلق قلمبند کیے ہیں وہ یورپ کی دسویں صدی سے علاوہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے سیکسن بزرگ اور ہمارے اسلاف جب جہیز و بیل میں رہتے تھے، مٹے اور خراب گھاس پھوس کو اپنا فرش بنا لیتے تھے، جبکہ ہماری زبان بالکل شکستہ اور نامکمل و ناقص تھی اور کچھ بڑھنے کا فن صرف چند ناویہ نشین شاہجوں کا علم صدری تھا، تو ہم مسلمانوں کی نادرا موجود تہذیب و شائستگی کو قسماً قسماً ہی کرتے ہیں + یا اس سے بھی بڑھ کر اگر ہم یہ خیال کریں کہ اس وقت تمام یورپ پر وحشیانہ جہالت اور حیوانیت کی گھنگور گھنگھا چھائی ہوئی تھی۔ اور بجز اون مقامات کے جہاں روعن تہذیب کا ٹٹا تھا جو چراغ اپنی وقیفی وضع سے آس پاس کی سرزمینوں پر پریدہ رنگ شعا میں ڈال رہا تھا، بجز اطالیہ کے بعض حصص اور مصطنعینہ کے جہاں علم و شائستگی کے خفیف ذرے اس دامن تیرگی کو برائے نام چاک کر رہے تھے، تمام براعظم یورپ ظلمت لکھ کا اندوہ نہ تھا۔ تو اس وقت مدینۃ الخلفاء کی اس عجیب و غریب حالت کا خوب اندازہ ہو سکتا ہے۔“

آگے چل کر لین پول صاحب فرماتے ہیں: ”اس شہر میں ہر فن کے کالمین موجود تھے،

۱۷ تاریخ اسپین "مورخان اسپین" از لین پول کا دھپسپا ر دو ترجمہ از شیخ حامد علی نقاش
صدر بنی ہار پوری۔ باب آکھواں +

شخصی علم کا جو صحیح علوم سے ماہر تھے، امراء و اکابر جن کے بذل و احسان زبان زد خلق تھے۔ دینا کے دور و دراز حصص سے شوقین طالب علم، عروض، انبیات، قانون، طبعیات، اور ہر شاخ علم تحصیل کرنے بکثرت آتے۔ چنانچہ شہر مذکور ہر قسم کے ناموروں کا مقام انصال، عالموں کا مخزن، طلباء کا سرچشمہ بن گیا۔ وہ ہمیشہ کا مبین فنون کا دھل، اور باب علم کا جولانگاہ،... بتا رہا ہے۔ یہ بیان ایک عربی مؤرخ سے ماخوذ ہے، مشرقی تعریف اکثر مبالغہ کی حد تک پہنچ جاتی ہے مگر قرطبہ کی تعریف جس قدر نکلی گئی ہے زیبہ ہے۔“

دُورِ پارِ سترہ خوشنما محرابوں کا ایک نہایت عالیشان پل بنایا تھا جو مسلمانوں کی تعمیرِ سہزندی کی سراپا صداقت تھی۔ شہر میں فنون صرف وہ حمام تھے جن میں ہر خاص و عام غسل کر سکتے تھے۔ حمام مسلمانوں نے ہر شہر و قصبہ میں ایک ضروری خطہ و خال سمجھ کر بنائے تھے کیونکہ اونکے نزدیک پاکیزگی اور صفائی اگرچہ دینداری سے دوسرے درجہ پر تو نہیں مگر زہد و عبادت کی ہر بات کا مقدمہ تھی، حالانکہ زمانہ و سلی کے یہی غسل سے اس بنا پر مانعت کرتے تھے کہ یہ بیدنیوں کا طریقہ ہے۔ چنانچہ رام بابا ہٹ و نوکور اپنی غفلت اور سنجاست پر اس درجہ نادان تھے کہ ایک متبرک خاتون مغریہ نکلتی ہیں کہ ”ساتھ برس کی عمر تک میں نے کسی عضو جسم کو پانی نہیں لگایا بجز انگلیوں کے سرور کے جبکہ میں گر جاؤں جاتی تھی۔“

عزیزانہ سبھی جب نجاست کو خصوصیت کے ساتھ مذہبی تقدس کا جزو سمجھتے تھے تو مسلمان طہارت کے ذرہ ذرہ برابر ارکان پورا کرنے میں حد درجہ احتیاط کرتے تھے اور جب تک اپنے جسم کو اچھی طرح پاک صاف نہیں کر لیتے ہرگز اپنے حکم الحاکمین کے حضور میں جانے کی جرأت نہ کرتے تھے۔ آخر کار اسپین میں یہی سلطنت دوبارہ قائم ہونے پر فلیپ دوم و ریم جہاں سوز ملکہ انگلستان کے شہرہائے تمام حماموں کو کفارینے مسلمانوں کی ذمہ یادگار بچھڑکھا دیا۔“

قرطبہ کے باغوں کی نصارت اور تروتازگی، اوس کے مکانات کی رشت منوہوئی جس قدر زیادہ تھی، اسی قدر علوم و فنون میں بھی اوس کا خاق بڑھا ہوا تہا گویا اوس کا

حسن صورت میں حسن معنی تھا + اس کے اساتذہ کے علمی کمالات نے اس کو
یورپ بھر کا مرکز علوم و شائستگی بنا رکھا تھا + تشنگانِ علوم ہر طرف سے
اسی علمی کوثر کے دریا دل ساقیوں کے دست نگر بننے آتے تھے +
ہر شاخِ علم کی تعلیم و تدریس پر کما حقہ توجہ کی جاتی تھی + بالخصوص علی طب (فن
جراحی) کو اندس کے ماہرانِ جراحی کے نئے نئے معلومات سے بہ قدر
وسعت اور ترقی ہوئی کہ تمام گذشتہ صدیوں میں راسخاثر عہدِ جالینوس
عَدِیم المِثال تھی + چنانچہ ابوالقاسم الزہراوی جو گیارہویں صدی میں
میں اس فن کا مشہور استاد تھا اس کے بعض عملیات عجیبہ زمانہ حال کے عملیات
سے مطابقت رکھتے ہیں + ابن نہر نے جو اس کے بعد فنِ طب کا دوسرا کامل
گزر رہے دو نو شاخوں یعنی عملی اور نظری طب میں اپنے نئے ایجادات سے اضافہ
کیا + اسی طرح ابن بیطار نے جو علمِ نباتات میں مسلم اور استاد زمانہ تھا تقریباً
تمام مشرقی دنیا میں سفر کر کے نئی نئی جڑی بوٹیاں اور ان کے خاص دریافت کیے
اور اخیر میں ان کو حجم اور جاس کتاب کی شکل میں قلمبند کر کے یادگار زمانہ چھوڑا +
ابو اردوس بھی اسی زمانہ کا ایک مشہور فلسفہ دان اور اون جلیل بہت در اور
محسن زمانہ کالین میں سے تھا جن کے حسن معنی نے قدیم یونانی فلسفہ کو زمانہ حال
کے فلسفہ سے وصل کیا ہے + علمِ ہیئت، جغرافیہ، کیمیا، علمِ طبیعیات،
عز شکہ کوئی شاخِ علم نہ تھی جس کی بطریقِ حسن تعلیم نہ دی جاتی تھی + لہٰذا پول +
اندس کے اسلامی عہد میں اسلامی فنِ طب و جراحی کی جو دھوم مام یورپ
میں مچی اور قریب و جوار کے فرمانروایوں کے دل میں جو عظمت اور عقیدہ اندسی
الہاد کے متعلق تھا، اس کا اندازہ ذیل کے تاریخی واقعہ سے ہو گا جسے ہم
تاریخ اسپین سے نقل کرتے ہیں :-

سلہ لین پول صاحب نے + ابوالقاسم خلف + کا نام لکھا ہے۔ غالباً بلکہ ضرور
یہ زہراوی ہے +

سناگو نے تخت لیون سے معزول ہو کر ملکہ نووار کے پاس جو اس کی اہلی
تھی پناہ لی + ان دونوں نے ملکہ خلیفہ قرطبہ سے استغاثہ اور استدعا کی + اس کی
مغفل کیفیت یہ ہے۔

سناگو مرض فریبی سے اس قدر تنگ عاجز آ گیا تھا کہ بلا سہارے چل ہی نہ سکتا تھا
پس اس نے ارادہ کیا کہ اطباء قرطبہ سے جنگی حفاظت کی اور سوقت یورپ
بہر مین نظیر ذہن تھی رجوع کرے + چنانچہ ملکہ طوطہ نے اس ضرورت کے لئے خلیفہ کی
خدمت میں ایک قاصد بھیجا + اصر سے خلیفہ نے اس کے جواب میں ایک ہنایت
کامل اور مافوق یہودی طیب کو جس کا نام ہند الی یا حصدی تھا بھیجا + سناگو
قرطبہ کا علاج کرے + مگر طیب نے بوجب ایسا سے خلیفہ چند شرائط پیش کیں +
مجلد ان کے ایک یہ بھی شرط تھی کہ سناگو اپنے چند خاص قلعے خلیفہ کو سپرد کرے
اور معہ ملکہ نووار بذات خود قرطبہ آ کر معالجہ کرائے + ہر چند ملکہ کے نزدیک ایسے بے
سفر کی صعوبتیں جھیلنا اور وہاں پہونچ کر خلیفہ کی عظمت تسلیم کرنے سے تاملاتے خلق بننا
سخت مشکل تھا + مگر اھل الغرض مجھوں چار ناچار اپنے بیٹے شاہ نووار اور بچے
(معزول شدہ سناگو) کو لیکر روانہ ہوئی + خلیفہ عبد الرحمن ثالث نے بڑی مالی عسلی
کو کام فرمایا اور پورے مراسم و آداب شانہ کے ساتھ اسے پیش آیا اور مناسب
ہمانداری کی + خلاصہ یہ کہ سناگو نے خلیفہ کی بدولت نہ صرف اپنے ہلکے مرض سے
نجات پائی بلکہ ایک جبری فوج کے ساتھ واپس آ کر سلسلہ میں لیون پر بھی قابض
ہو گیا +

مندرجہ بالا اقتباسات سے بخوبی روشن ہو گا کہ اسلامی اندلس کا پایہ تخت
شہر قرطبہ عربوں کے زیر حکومت، علوم و فنون صنعت و حرفت بلکہ تمام تہذیب و
شان و شوخی میں بلاشبہ دنیا کا نہایت صورا در مایہ فاخر شہر تھا + اور ان گونا گوں
ترقیات کے دور میں جراحیات اور فن جراحی کی ترقی سب سے اعلیٰ اور ارفع تھی +
جس کے صدق میں سارے یورپ نے مسلمانوں کے تحصیل جراحی کی اور امی بنیاد
پختہ پر جدید دنیا نے بتدریج ترقی کر کے ایک ایسی شکاری عمارت قائم کر لی ہے جس کے فیوض
دبرکات کی زمانہ حال میں دہوم بخبری ہے +

الغرض جب سلطنت روم کے مدبر تباہی و بربادی میں یونانی و رومی تہذیب و علوم، جہالت و تاریکی کا شکار ہو گئے تو ان کے ساتھ ساتھ من جراحی کی شمع بھی گل ہونے لگی۔ حاملانِ علوم اور ماہرانِ جراحی کی کساد بازاری کا یہ عالم ہو گیا کہ ابتداً تو مقدس ماہیان کلیسا و دیگر علوم کے ساتھ جراحیات کے بھی شیکہ دار بن گئے اور جراحی کی علمی تعلیم اور عملی مرادست کلیسا کی مقدس چار دیواری میں مقید و محدود ہو گئی۔ مگر بالآخر جبکہ ٹیوشن کی کونسل نے ان تقدس تاب بزرگوں کے لئے ہی خون بہانا منسوخ قرار دیا تو من جراحیات کی رسی ہی تعلیم و تدریس ہی کلیسا کی مدارس و جامع سے خارج کر دی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اعلیٰ قسم کے جراحی اعمال بند سرج مٹروکسٹا پیدا ہو گئے اور نہایت معمولی اور ادنیٰ عملیات، مثلاً معمولی زخموں کی مرہم پٹی کرنا، فصد کھولنا، جوڑوں کو بٹھلانا، پچھنے لگانا، وغیرہ، دیگر ادنیٰ بازاری پیشوں کی طرح مدح و تحام جراحہاں کے گردہ کی سرپرستی میں آگئے اور یہی جراحی اور حجام قدیم من جراحی کے مالک اور وارث بن گئے۔

یورپ کی اس مالگیر جہالت اور علمی تاریکی کے زمانہ میں، فضائے مشرق سے ایک بلند و صلہ علم پرورد جامع عرب فاضلین کی غیب سے معرضِ ظهور میں آئی جس نے مغربی یورپ میں بجلی کی چمک اور بادل کی گرج کے ساتھ علمی ضیاء پاشی کر کے فنِ جراحی کی ڈوبتی ہوئی ناک کو بچا لیا، افقِ مصداق و اقصائے مغرب کے بعد فوراً عربوں نے احیاءِ علوم اور تجدیدِ فنون کی بنا ڈالی۔ یونانی و رومی علوم و فنون عربی تراجم کے ذریعہ عربی لباس میں جلوہ آنا ہوئے۔ بغداد و قرطبہ میں اعلیٰ دارِ علوم و جراح قائم کیے گئے۔ صلیبی جنگوں نے مشرق و مغرب کے اشتراک و اتصال کے مزید موقعے دیئے، جن کے باعث ادو وقت کے جاہل اور نیم وحشی یورپی اقوام نے عربوں جیسی مہذب، مثالثند، تمدن اور ترقی یافتہ قوم سے کتاب کمال کیا۔ شوقین اور آرزومند یورپی طلباء جن جن دمشق، بغداد و قرطبہ کے مراکزِ علوم میں آکر من جراحی کی علمی اور عملی تکمیل کرنے لگے۔ مسلمانوں کے ساتھ یہودی حکماء و اہلکار نے بھی ہمدردی و تعاون حاصل کیا کہ اکثر یورپی ممالک میں قدر و منزلت کے ساتھ اعلیٰ طبی ہونے لگی۔

لے کویش آف ٹورس۔

فارہ علوم سلیمونہ واقع اطالیہ میں جب مسلمانوں کے ہاتھ سے دوبارہ نکل گیا تو یورپی اقوام کے بھی درس کا مرکز بن گیا جہاں سے یونانی علوم اور اسلامی تراجم رفتہ رفتہ تمام یورپ میں پھیل گئے۔

جیسا کہ گذشتہ صفحات میں تذکرہ ہو چکا ہے، احیاء جراحیات کی تاریخ میں سب سے زیادہ شہرت و فضیلت کا مستحق، اسلامی اندس کا مایہ ناز فاضل جراحی

حکیم ابوالقاسم الزہراوی

ہے۔ علامہ موصوف اپنے کمال جراحی، جدت علمی، وجودت طبع کا سکہ تمام دنیا پر بٹھا چکا ہے اور اس کی بہتم بالشان تصنیف ”التصنیف“ بقائے دوام کا نفع حاصل کر چکی ہے۔ اس نادر طبی قلم کا دوسرا حصہ (جو عام طور پر زہراوی کے نام سے مشہور ہے) جو عملیات جراحیہ کی تشریح و تفصیل اور دقیق جراحی نکات پر مشتمل ہے اور جس میں اس زمانہ کے آلات جراحیہ کی تصاویر بھی جا بجا درج ہیں، ایسا کامل علمی اور علمی نظام جراحی پیش کرتا ہے کہ جس کی بنیاد پر صانعان یورپ نے باؤنی تہذیب و ترسیم جدیدین علم و عمل جراحیت کی عظیم الشان عملیات قائم کر لی جس کی عظمت و رفعت پر آج ایک طرف تو متاخرین یورپ کو اس قدر فخر و مباہات ہو کہ وہ بزم خود اوس کی بستیاد و اصلیت تک سے منکر ہیں، اور دوسری طرف ناقابل و ناقص مگر حیرت زدہ اور مہوت مشرقی اطباء میں کہ میراث اسلاف سے قطعی بے بہرہ اور قدامت فن کے کمالات سے کیسر معرآ!

اس کتاب کا کئی یورپی زبانوں میں ترجمہ ہوا، چنانچہ سب سے پہلے کل ترجمہ لاطینی زبان میں ۱۵۱۹ء میں ہوا، پھر دوسرے حصہ کا عبرانی و لاطینی ترجمہ ۱۵۵۸ء میں آگسٹن رائٹلستان میں چھپا۔ حالی میں اس کا عربی نسخہ مطبع نامی بھٹونے ہندوستان میں شائع کیلئے ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکا مؤلف ایک مصائب الراسے، مجتہد فن جراح ہے۔ جو دوسروں کے بعض عملیات پر کھٹے دل سے تنقید کرتا ہے۔ اور مجتہدانہ طور پر اپنی ایجادات جراحیہ کی تفصیل دیتا ہے۔ جس سے اس وہم باطل کی قطعی تردید ہو جاتی ہے کہ یہ کتاب کسی یونانی کتاب کا ترجمہ اور اسکی تصدیق کس قدر غیرت و عبرت کا مقام ہے کہ نہ ہلاوی کے علی خزانہ سے یورپ کے طالبان

من تو سیکڑوں سال پہلے مستفید ہوں اور اُسے راہ طلب میں چراغ ہایت بنائیں اور یہاں فن طب کے حاملین و دارلین سلف کی یہ شانِ جہود و استغناء کو نہرا دی کے تریجے و شرعین لکھنا تو ایک طرف، اصلی عربی نسخہ سے ابے و ثناس ہوتے ہیں! اور روشناس ہونے پر بھی ہماری کم باگی و بد نصیبی کی یہ انتہا کہ ہم میں سے اکثر زہراوی کے مطالبِ علم کو بخوبی سمجھنے تک سے قاصر ہیں!

کتاب زہراوی میں ابتداء کی پانترہینے داغ و دیکر ہم کے مختلف مقامات کے امراض کے علاج کا طریقہ بتایا ہے + پھر، ۹ فصلوں میں سر سے پاؤں تک جہاں جہاں شگافوں کی ضرورت ہے وہاں شگاف دینے، اجڑش لگانے اور جراحت و نصد و غیرہ کا بیان ہے + اس کے بعد اعضاء شکستہ اور ٹکڑے ہوئے جوڑوں کی بندشوں اور ہٹانے کا بیان ہے، مثانہ کی پتھری سالم نکالنے کی ترکیب قریب قریب وہی درج ہے جو اجل کے ڈاکٹر علیات طبعات میں اختیار کرتے ہیں + قلت وقت اور تقاضائے اختصار کے باعث دیگر اعمال کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں، ورنہ ہم بتاتے کہ بیسیوں اعمال جو زہراوی نے بیان کیے ہیں وہ وہی ہیں جو باوقتی تغیر بھی ہرستان طب جدید رات دن کرتے ہیں مگر اُن کے اہل علم و ایجاہ کی اصلیت سے وہ قطعی ناواقف ہیں +

بارہویں صدی مسوی کے آخری حصہ میں اخصا سے مغرب اور اسلامی ممالک افریقہ میں ابن زہر اپنے زمانہ کا نہایت فاضل طبیب اور بے مثل جراح گذرا ہے جو خلیفہ عبد المؤمن مالک اندلس کا شاہی طبیب اور وزیر مقرر ہوا۔ ابن زہر جس کا پورا نام ابو مروان ابی العلاء ابن زہر ہے (مشہور و معروف فیلسوف اور حکیم ابن تھمشد کا اوستاد تھا اور اسی کے لئے اوس نے اپنے شہرہ آفاق کتاب "الکیمیئر" تصنیف کی تھی جو فن طب کی نہایت معتبر کتاب ہے + انگریزی مصنفین ہی اس کتاب کی بہت تعریف لکھتے ہیں + سنہ ۱۱۸۱ میں اس کتاب کا لاطینی ترجمہ ملک اٹالیہ میں چھپ کر شایع ہوا +

سنہ ۱۸۷۱ میں لٹاوی، عمانی، علیہ الحکامات +
سنہ ۱۸۷۱ میں کتب میں اس کتاب کو سینگن ادب سے کہتے ہیں +

ابن زہری قیاسی نظریات ہی کا ماہر نہ تھا بلکہ علیات جراحیہ میں بھی کمال رکھتا تھا۔
ابو القاسم زہراوی اور ابن زہری نہیں۔ بلکہ اسلامی دور کے ہر زمانہ میں ماہرین
جراحیہ کی ایک فہرست ملتی ہے جو اپنے اپنے اعمال میں کمال محنت گاہ اور ہمارے رکھتے
تھے، مثلاً ابو بکر محمد ابن ذکر یانا دلی کے تمام اعمال جراحیہ عموماً اور عمل تریقہ (نزلہ) کا
کامل (خصوصاً عربی مشہور تھے) حکیم علاء الدین ایرانی کا ایک واقعہ (عمل تریقہ) چونکہ
نگنانا مشہور ہے۔ ایک گجے کا علاج اس نے اس طرح کیا کہ پہلے اس کے سر کی اہلی
کھال اوڑھ کر ڈالی۔ اس کے بعد کٹے کی کھال سر پر منڈھ کر ٹکٹے لگا دیے، کچھ عرصہ بعد
کھال جڑ گئی اور بال پیدا ہو گئے۔ آج کل یورپ و امریکہ میں جو اعمال تریقہ کے کر شے
دکھائے جا رہے ہیں۔ وہ انہی اعمال کے کر شے اگر نہیں ہیں تو کیا ہیں۔

یہ تاریخ کی ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اسلامی علوم اور اسلامی ماہرین جراحی
نے تمام یورپ کو رنجیاب کر کے علم و دانش کی سے منور کر دیا، اور بالخصوص یورپ کی
جدید جراحیات کی بنیاد ڈالی۔ عربوں نے نہ صرف یونانی و رومی فن جراحیہ کے منتشر
اور بوسیدہ اوراق کو از سر نو مرتب و مدون کیا، بلکہ اس میں نئی تحقیقات اور اضافات
کے چار چاند لگا دیئے۔ مگر تعصب اور سٹ دھرمی کا بڑا ہوکہ رہا۔ استثنائے چند حق
شناسان (بیشتر منکرین یورپ) اب تک اپنے محسن عربوں کے علمی و فنی احسانات کا تزار
واقعی اعتراض نہیں کرتے، اور جب دینی زبان سے کہہ رہے ہیں تو یہی کہ ”عربوں نے
یونانی علوم و فنون کی تقلید کی اور یہ کہ اسلامی دورِ علم میں جراحیات نے ترقی کی
بجائے تنزل کی طرف قدم بڑھایا“۔

سخن شناس نئی دلبر خطا اینجا ست

ذیل میں ہم پر شکریہ تمام حضرت مسیح الملک، مجتہد العین، امام طب، جناب حکیم
محمد اجل خاں صاحب کے ایک گرانقدر تاریخی و علمی معنی سے چند اقتباسات
درج کرتے ہیں۔ ان اقتباسات سے اسلامی فن جراحیہ کے بعض ضروری اور تاریخی

۱۔ از انہ المعارف المقبولہ دنیو پاور انسا نکلو میدیا (مؤلفہ علامہ ابن ذیل)۔

۲۔ یہ مقالہ کئی ملکی طبی جرائد میں شائع ہو چکا ہے۔

کارناموں پر مزید روشنی پڑے گی۔

مقالہ حضرت مسیح الملک

معترض دوستو! یوں تو اندس۔ بغداد اور ان دونوں سلطنتوں کے تمام بڑے بڑے شہروں میں مختلف امراض کے عملیات ہوتے تھے اور شفاخانوں کے افسر عام طور پر ایسے ہی طبیب مقرر کیے جاتے تھے جو طبیب ہونے کے علاوہ جراح بھی ہوتے تھے۔ لیکن چند طبیبوں نے خاص طور پر جراحی میں شہرت حاصل کی تھی جن میں سے ایک ابوالقاسم بن عباس زہراوی تھا جو ایک نقشب کا رہنے والا تھا جس کا نام زہراوی تھا اور جو قرطبہ و قرطاج میل کے فاصلہ پر آباد تھا۔

یہ وہ زمانہ تھا جب کہ یورپ کے طلبہ قرطبہ طب اور دوسرے علوم یکٹنے کے لئے آتے تھے اور یہاں سے سندیں حاصل کر کے اپنے اپنے ملکوں میں واپس چلے جاتے تھے۔ یہ ابوالقاسم وہ شخص ہے جس نے عرصہ تک یورپ کے طلبہ کو طبی اور عملی تعلیم کے ساتھ جراحی بھی سکھائی تھی۔ اور یہ سلسلہ اس کے انتقال کے بعد بھی عرصہ تک جاری رہا۔

ابوالقاسم نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ”التصریف“ ہے اس کتاب میں اس نے ایک حصہ جراحی کا بھی لکھا ہے۔ جس سے اس بات پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ کہ اس دور ترقی میں یونانی طب کے ساتھ جراحی میں کہاں تک کام کر رہے تھے۔

جہاں تک اس حصہ کے دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی معمولی جراحیوں کے علاوہ باریک عملیات بھی اس وقت کئے جاتے تھے اور انسانی طبی ضرورتوں کو جو جراحی سے متعلق تھیں یہ طب کافی طور پر پورا کرنے والی تھی۔ بچے اس کتاب اور دوسری کتابوں کے دیکھنے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ حسبِ میل امراض کا علاج جراحی کے ساتھ اس وقت کیا جاتا تھا۔

دماغ کی جھیلیوں میں پانی کا جمع ہونا۔

(۱) اجتماع الماء فی الباس

آنسوؤں کا آنکھ سے زیادہ جانا + کان میں کسی چیز کا گر جانا اگر کسی اور تہ پیر سے یہ چیز نہیں نکل سکتی تھی تو کان کی لوس کے نیچے دستکاری کر کے نکالی جاتی تھی +	(۲) سیکلن الدروع (۳) ماسقط فی الاذن
کان کے سوراخ کا بند ہونا + منے خواہ وہ کسی جگہ ہوں + پلوں میں سفید مٹم کی سخت چیز کا پیدا ہونا + چربی کا اوپر کی پلک میں جمع ہونا + جوبال آنکھ کو تکلیف دینے والے ہوں (پڑبال) ان کی جگہ کو کاٹ کر پلک کا سینا یہ عمل کسی صورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا +	(۴) السد فی الاذن (۵) التایل (۶) البرکوفی الجفن (۷) الشرباق (۸) التیمیز
پلک کا چھوٹا ہو جانا اسے شگاف دیکر پھر درست کیا گئے تھے اوپر کی پلک کا آنکھ سے جڑ جانا۔ اسے آلات جراحی سے جدا کر کے درست کیا جاتا تھا + آنکھ پر جو سفید جسم کوئے کی طرف سے شروع ہو کر سیاہی کی طرف جاتا ہے (اسے آنکھ سے جدا کر کے کاٹتے تھے) سرخ گوشت کا آنکھ میں پیدا ہو کر بڑھنا اسے دستکاری کے ذریعہ درست کیا جاتا تھا + سرخ رنگوں کا جان آنکھوں میں اسے منانیر سے اٹھا کر کاٹ دیتے تھے	(۹) الشترہ (۱۰) انصاف الجفن بالغین (۱۱) النظرة (۱۲) وردنج (۱۳) السبل
(۸) آپرین آف ٹری کا یس رائنڈا ڈسٹیکائیڈ (۹) انٹر وین (۱۰) سبلی فران (لائنڈا) انکائی لوبی (زان) (۱۱) ٹری جی ائم (۱۲) اپیڈیک انجینکٹوائی ٹس (۱۳) پے ٹس	(۲) اسپی فور (۳) فارن باڈی ان دی ایئر (۴) آبلرکشن آف اکسٹرنل ایرادینس (۵) دارٹس (۶) کیلازمین (۷) ٹیومر آف دی ایئر

اسے چیر کر درست کرتے تھے اور اگر ہڈی ٹک اسکا اثر ہوتا تھا تو ہڈی کو بھی چھیل کر ٹیک کیا کرتے تھے ۔ آنکھ کا باہر کی طرف ابھرنے سے مختلف تدابیر سے اصلی حالت پر لاتے تھے لہجہ عنیبہ کا پھٹنا اور باہر کی طرف نکلنا۔ اسکا علاج یہی جراحی سے ہوتا تھا پسپ کا آنکھ کے اندرونی پردوں میں جمع ہونا۔ دستکاری کر کے اس پسپ کو باہر نکالتے تھے ۔ یہ آنکھ کا عمل کئی طریقوں سے کیا جاتا تھا۔ ناک کے اندر کے مٹے کاٹ کر نکالے جاتے تھے ۔ مختلف قسم کے ناک کے درم۔ مختلف عملیات کے ذریعہ سے دُر کے جاتے تھے ۔	(۱۱۲) ناسور۔ (۱۵۱) نتو العین۔ (۱۶) خرق العنبیہ قوما (۱۶۱) الکنتہ۔ (۱۸) قدح الماء۔ (۱۹) برابیر الاغف (۲۰) اورام الانقیہ۔
ہونٹ کان اور ناک کی بھی ہوتی جلد کو سینا۔ ہونٹ کی گرہیں (انہیں چیر کر نکالتے تھے) سورٹوں کا زائید گوشت (اسے کاٹتے تھے) دانتوں کا چھیل کر صاف کرنا۔ دانتوں کا اکیرنا اور ان کی جگہ مصنوعی دانت لگانا ۔ دانتوں کا ریتنا۔	(۲۱) خیاطہ الاذن لادرا (۲۲) اعتدنی الشفتین (۲۳) اللحم الزائد فی اللثتہ (۲۴) جرد اللسان بالیجر (۲۵) قلع الاسنان واقعة المصنوعة متھا (۲۶) نشر الاضراس
(۱۹) نزل بالی پس۔ (۲۰) نزل گردقنز۔ (۲۱) سید چنگ آف پس اینڈ ایرہ پلاسک آپریشن آف نوز اینڈ پس۔ (۲۲) سبیل گردقنز۔ ٹیو مرز آف پس۔ (۲۳) گردقنز ان گز۔ (۲۴) ٹیوٹ اسکریپنگ۔ (۲۵) ٹیوٹ اسکریپشن رائیڈ آرئی ٹیشیل تیتھ (۲۶) ساؤنگ دی ٹیوٹھ۔	(۱۳) سائیٹس۔ ٹیولا۔ (۱۵) اس آف ٹیلاس۔ (۱۶) پروپس آف آرس۔ (۱۷) لائی پرو پائی ام۔ (۱۸) کاؤچنگ۔ یہ قدیم عمل ہے۔ جسکے ذریعہ ٹوٹ جلید یہ کو پیچھے کی طرف ہٹا دیا کرتے تھے اب یہ مترکہ جہیدہ عمل طوبت جلید یہ کو خارج کرنیکا دستز اکسٹرکشن ہے ۔

(۲۷) متحرک اڑھوں کو سونے چاندی کے تاروں سے باہر زبان کے نیچے کے رباط کا قطع کرنا۔ زبان کے نیچے کی گلی نکالنا۔ لوزتین کا قطع کرنا اور اورام حلق کا چیرنا۔ حلق کے کتے کا کاٹنا۔ گلے سے کاٹنا نکالنا۔ جلیہ سر کے اورام کا چیرنا۔ گردن کی خنازیر کا عمل۔ حنجرہ کو شق کرنا اور زخم کو کچھ عرصہ تک کھلا رکھنا۔ قیلہ حلقوم کو پھاڑنا۔ رسی نکالنا۔ سرطانی اورام وغیرہ کو قطع کرنا۔ اورام بغل کو پھاڑنا۔ درم شریانی یا درم وری کو شق کرنا۔	(۲۸) تشبیک الاضراب المتحرک بالبرسبغ (۲۹) قطع الرباط الذی تحت اللسان (۳۰) اخراج الصفصع (۳۱) قطع اللوزتین و شق اورام الحلق (۳۲) قطع اللہاء (۳۳) اخراج الشوک و فیروہ (۳۴) الشق علی الاورام الخ فی جلدۃ الراس (۳۵) فی الشق علی الخنازیر الخ فی العنق (۳۶) شق الحنجرۃ و ترک الجرح مفتوحاً (۳۷) شق قیلۃ الحلقوم (۳۸) شق السبع (۳۹) قطع الاضاء السلطانیۃ غیراً (۴۰) بطل الاورام المالطیۃ (۴۱) شق الدرم الشریانی و الدوری
(۴۲) ایرنگ دی تیتہ۔ (۴۳) کننگ دی فریم نگران (۴۴) ریمول آت رسی نیولا۔ (۴۵) ٹائٹلا ٹی + ٹائٹلی ٹکٹلی (۴۶) ریمول آت یو دیولا (۴۷) ریمول آت برنڈ رائیٹ فارن باڈیز فرام تھروٹ۔ (۴۸) ریمول آت اسکلپ گروتھز ایپے ننگ آت اسکلپ ایسنز (۴۹) ریمول آت اسکلپ فرس ہک گھنڈ	(۴۵) ایرنگ ٹی۔ (۴۶) اوپے ننگ آت ایرنگیل ہریتا + ریمول آت ایڈیٹاڈ رائیٹ ڈیٹیل گروتھز (۴۷) اکٹرکیشن آت ٹیڈرز اینڈ گروتھز (۴۸) اکٹرکیشن آت کنیسرس ٹیڈرز (۴۹) ریمول آت اینڈ اوپے ننگ آت اگزری گروتھز (۵۰) اوپے ننگ آت آرٹرافی ش اینڈ سٹاپائی ش۔

(۵۶) غنٹی کی جراحت۔ اندام ہنائی کے زائد گوشت اور نظر کو کاٹنا۔ رحم و اندام ہنائی کے زائد گوشت کو قطع کرنا۔ براسیر کا کاٹنا۔ رحم کے ہیپ دار درم کا شکاف۔ جنین کو آگے نکالنا۔ مردہ جنین کو نکالنا۔ میشہ کو نکالنا۔ غیر مشقوب مقعدہ میں سوراخ کرنا۔ نواصیر کی جراحت شقاق المقعدہ کی جراحت ہماسوں کی جراحت۔ نلکہ کی جراحت۔ داخل کی جراحت۔ کچلے ہوئے ناخن کی جراحت۔ انگشت زائد کا کاٹنا۔	(۵۶) فی الخنثی۔ (۵۷) البظر واللحم اتانی من الفرج (۵۸) علاج الرقاع۔ (۵۹) قطع ابواسیر من اقبل الدبر (۶۰) بطا الخراج الرجمی۔ (۶۱) اخراج الجنین بالکالة (۶۲) اخراج الجنین الیست۔ (۶۳) اخراج المشیمۃ۔ (۶۴) المقعدۃ الغیر المشقوبہ (۶۵) النواصیر (۶۶) شقاق المقعدہ۔ (۶۷) السامیر (۶۸) علاج النلہ (۶۹) الداخل (۷۰) النظفرۃ المرضوض (۷۱) قطع الایصبع الزائدہ
(۶۳) آپریشن آف پے سنٹا۔ (۶۴) پلاسٹک سٹوریشن آف اسپرٹوریل اینڈ (۶۵) سرجیکل ٹریٹمنٹ آف سائنس اینڈ نیچولا (۶۶) آپریشن فار فشر آف اینس۔ (۶۷) مولا اینڈ مارنی گروہنڈ (۶۸) جریپز (۶۹) پیرونیکیا۔ ادنی کیا۔ ڈلوو۔ (۷۰) کرشد نیل۔ (۷۱) پولی ڈیکمی لازم۔ سوپر نیومری ڈیجیٹ۔	(۵۶) غنٹی۔ ہر میفرڈ اسٹ۔ غنٹی کی جراحت۔ سرجیکل ٹریٹمنٹ آف ہر میفرڈ ڈیٹیشن۔ (۵۷) ریبول آف کھے ٹورس (آر) و جانگل گوتھر (۵۸) گردھنڈ آف یوٹرس و جانگل آسٹیکشن۔ (۵۹) آکسیرن آف ہمو رائنز۔ (۶۰) و جانگل آس۔ آس آف یوٹرس۔ (۶۱) آکٹرکیشن آف فیش انسٹرومنٹل ڈیوری (۶۲) آکٹرکیشن آف ڈیڈ فیش۔

ٹی ہونی انگلیوں کا الگ کرنا۔ دوالی کو قطع کرنا۔ زخموں کا علاج کرنا۔ زخموں کو سینا۔ عروق کی فصہ کرنا۔ پچھنے لگانا۔ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو باہر نکالنا۔ ہڈیوں کو چھیلنا۔ اعضا اور ہڈیوں کو کاٹنا۔ (۸۱) البطل علی الادرام النظاہرة والباطنة خاہری اور باطنی ادراہم کا شگاف۔	(۷۲) التیام الاصابح (۷۳) قطع الدوالی (۷۴) علاج الجراحات (۷۵) الخیاطة (۷۶) فصہ العروق۔ (۷۷) الجباجتہ۔ (۷۸) اخراج العظام المكسورة (۷۹) جرد العظام (۸۰) قطع العظام والاعضاء۔ (۸۱) البطل علی الادرام النظاہرة والباطنة خاہری اور باطنی ادراہم کا شگاف۔
آلات جراحیہ فیل میں ان آلات جراحیہ کی فہرست درج کی جاتی ہے۔ جو اندلس اور عراق کے ماہر جراح (سرجن) استعمال کرتے تھے تقریباً ۲۸۰ آلات کا ذکر زہرادی میں موجود ہے۔ المکواة داغنے کا آلہ	
(۸۰) اسپونے مشن۔ (۸۱) کسی زن آف سوئے بنگز اینڈ گرد تھز در اکسٹرئل اینڈ انٹرئل ۷۷ آلات جراحیہ۔ سرچیل انسٹرومنٹس۔ ۷۸ کا ڈرٹی۔ کاٹیرائی زنگ انسٹرومنٹس (۱) اولیو کاٹری۔	(۱) مکواة زیتونیہ۔ (۷۲) ویدٹنگرس۔ سن ڈیکٹی لزم۔ (۷۳) ریوول آف ویری کوز دینیز۔ (۷۴) وڈنڈز۔ (۷۵) سیدرنگ آف وڈنڈز۔ (۷۶) وینی بکشن۔ (۷۷) کپنگ۔ (۷۸) کسی زن آف فریکچر ڈوبوز۔ (۷۹) اسکرپنگ آف بوز۔

اس آلہ کے دو پہل ہوتے ہیں۔ اس آلہ کے تین پہل ہوتے ہیں۔ اس آلہ سے گول دارغ پڑتا ہے عرق انہیں ستھال یہ بھرت ہوتا ہے۔ یہ ٹھوس ہوتا ہے۔ آری کی طرح دھڑانہ دار ہوتا ہے۔ مجھے (پچھنے لگانے کا آلہ) اس سے تو مڑی لگائی جاتی ہے۔	(۲) کواۃ سہار یہ۔ (۳) کواۃ ذات السعدین (۴) کواۃ ذات السفاہیدہ الثلثہ۔ (۵) کواۃ قدحہ۔ (۶) کواۃ مجوفہ (۷) کواۃ مصنوعہ۔ (۸) کواۃ ہلالیہ۔ (۹) کواۃ منشاریہ (۱۰) کواۃ سیلیہ۔ (۱۱) کواۃ شلثہ (۱۲) کواۃ مادیہ (۱۳) مجھے ناریہ۔ (۱۴) مجھے کبیرہ (۱۵) مجھے صغیرہ۔ (۱۶) مجھے متوسطہ
(۱۰) پردوب کاٹری۔ (۱۱) ٹرینگو رک کاٹری۔ (۱۲) ایک کاٹری۔ سہ کپنگ گلاس۔ (۱۳) ڈرائی کپ۔ فائر کپ۔ (۱۴) لاسی کپ۔ (۱۵) اسمال کپ۔ (۱۶) انٹرمیڈی رٹ کپ۔	(۲) پگ شپڈ کاٹری۔ کاٹری فار اٹھیلوا (۳) ہائی اسپڈ کاٹری۔ (۴) ٹوائی اسپڈ کاٹری۔ (۵) جٹن کاٹری۔ (۶) ہالو کاٹری۔ (۷) سولڈ کاٹری۔ (۸) بیسیلیونز کاٹری۔ (۹) سادسٹپڈ کاٹری۔ ڈنٹل کاٹری۔

شفرہ (ہونٹ) یا فروغ (تالو) وغیرہ اعضا کے داغنے کے خاص آلات تھے ان کے نام بھی ان اعضا کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں مثلاً:-

(۱۷) کواۃ موضع الشفرہ۔ اس آلہ سے ہونٹوں پر داغ دیا جاتا تھا۔

(۱۸) کوی الصدقین۔ اس کے کنپٹیوں پر داغ دیتے تھے۔

(۱۹) کوی الیافوخ۔ یہ تالو پر داغ دینے کا آلہ تھا۔

صنیق النفس کے لئے ایک خاص کواۃ تھا۔ اسے کواۃ صنیق النفس کہتے تھے۔

مجرد (بڑی چھیلنے کا آلہ)

اس کی کم و بیش اٹھائیس قسمیں متعلقیں تھیں۔ چند مشہور کے نام درج ذیل ہیں

(۲۰) مجرد مسطوف الطرف۔ اسکا سر خمیدہ ہوتا تھا۔

(۲۱) مجرد البکیز

(۲۲) مجرد ذو تجوین۔ اس میں سوراخ ہوتا تھا۔

(۲۳) مجرد الصغیر

(۲۴) مجرد العریض

(۲۵) مقطع الغضم۔ اسے چڑی کو کاٹ دیتے تھے۔

(۲۶) مجرد بطیف

(۲۷) مجرد سبیری۔ اس کے کئی نام تھے۔

(۲۸) مجرد ساری

(۲۹) مجرد ساری

(۳۰) مجرد ساری

(۳۱) مجرد ساری

(۳۲) مجرد ساری

(۳۳) مجرد ساری

(۳۴) مجرد ساری

(۳۵) مجرد ساری

(۳۶) مجرد ساری

(۳۷) مجرد ساری

(۲۹) خیشم الاراس۔

(۳۰) مشعب۔

۱۰ صور و غیرہ میں بڑی جھیلی جاتی ہے۔
یہ بھی بحرِ دکی ایک قسم ہے۔

مرسوط (سقوط کا آلہ)

دواؤں کو ناک اور حلق میں ڈالنے کے لیے اس آلہ سے کام لیتے تھے کبھی حلق میں بھی اس سے دوا ڈھکاتے تھے۔

میشراخ

متعدد اقسام کے رائج تھے۔ اس سے مردہ جنین کو قطع کر کے نکالتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل یورپ نے مسلمانوں سے لیا ہے۔ اس کام کیے چار پانچ طرح کے مشراخ تھے۔ مشراخ کے علاوہ دس بارہ قسم کے منفع جنین بھی تھے جس سے بچہ کر جنین کو خارج کیا جاتا تھا۔

ان کے علاوہ جنین کے قطع کرنے کے لیے متعدد اقسام کے مقطع جنین بھی تھے ان کو اس وقت استعمال کیا جاتا تھا۔ جب جنین کو کاٹ کر نکالنے کی ضرورت ہوتی تھی

صنارہ

اسکا ترجمہ عام زبان میں خمیدہ غار یا موچند ہے۔ قدیم جراحی میں یہ ایک بہت ضروری آلہ تھا اور اس کا معنوم بھی نسبتاً وسیع تھا۔ اس زمانہ میں اس کی بہت سی قسمیں رائج تھیں۔ پندرہ قسم کی تصویریں ذہراوی میں موجود ہیں۔

سادہ اور بڑا صنارہ۔

سادہ درسیبائی صنارہ۔

سادہ چھوٹا صنارہ

۱) بسیطہ کبیرہ

۲) بسیطہ وسیطہ

۳) بسیطہ صغیرہ

۱۱) لارج سپل ہک۔

۱۲) انٹری ڈی ایٹ سپل ہک۔

۱۳) اسمال سپل ہک۔

۱۴) میڈین ڈسپرس۔

۱۵) آئٹریکٹا ریس۔ امبرالی آئریکٹا۔

۱۶) ہک۔

- (۴) عیمہ کبیرہ۔
 (۵) عیمہ وسیطہ۔
 (۶) عیمہ صغیرہ۔
 (۷) ثلث صناعہ۔
 (۸) ذات الشبعتین۔
 (۹) صناعہ جنین۔
 صناعہ جنین کی کئی قسمیں ہیں۔
- موٹا بڑا صناعہ۔
 موٹا درمیانی صناعہ۔
 موٹا چھوٹا صناعہ۔
 تین خار والا صناعہ۔
 دو خار والا صناعہ۔
 جنین کا صناعہ۔

حضرت یسح الملک کا مضمون اسی حد تک جرائد میں میری نظر سے گزرا ہے۔ زہرا کی
 کے بقیہ آلات کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔

مبضع

مبضع یعنی نشتر کی چودہ پندرہ شکلیں زہرا دی میں دی ہیں۔ اور ہر ایک کا موقع
 استعمال الگ بتایا ہے۔ اس کی ایک قسم مبضع مشعل بھی ہے، جو چاقو کے مانند ہوتی ہے
 اس سے پھوٹے کے چھچھرے وغیرہ کے صاف کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کی
 دوسری قسم مبضع عریض دیکھائی ہے۔ یہ بھی چوڑا ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑی گول
 کو کھولا جاتا ہے۔ مبضع نہایت تیز تنگ ہوتا ہے۔ اور اس سے ہر ایک رگیں کھولی جاتی
 ہیں۔ مبضع شوکی اس سے استسقا وغیرہ میں شکم کے اندر نشتر دیا جاتا ہے۔
 مبضع مرہن۔ گاہے عمل تدح کے وقت کام آتا ہے۔
 محققہ وہ نشتر جس سے نصد کیا جاتا ہے۔ اکی بھی چند قسمیں ہیں۔
 مسئلہ۔ وہ کہ جس سے جلد کو چیرنے کے بعد عروق وغیرہ کافی جاتی ہیں۔ اکی

- (۴) لارج بلائڈ ہک۔
 (۵) انٹر میڈی ایٹ بلائڈ ہک۔
 (۶) اسمال بلائڈ ہک۔
 (۷) ٹریبل ہک۔
- (۸) ڈبل ہک۔
 (۹) ہک فار ٹیش۔
 (۱۰) اسٹیل۔
 (۱۱) اسٹیل۔
 (۱۲) اسٹیل۔

بھی چند نہیں ہیں +
 سبکدین + یعنی چاقو۔ زہرا دی میں چار پانچ قسم کے چاقوں کی شکلیں ہیں +
 مبطلہ + یہ بھی شستر کی ایک قسم ہے۔ اس کی پانچ چھ شکلیں دی ہیں +
 وزوہ + اس آکر کا اگلا حصہ گلاب کی کھلی کی طرح ہوتا ہے +
 نصف وزوہ + اسکا اگلا حصہ وردہ کا نصف ہوتا ہے +
 فاس + اس سے بعض عروق کا فصد کیا جاتا ہے +
 مقطع + فاس کے آکر اس کی دس ہندوہ شکلیں دی ہیں۔ جو مختلف اعمال جراحیہ
 میں کام آتے ہیں + ان میں سے ایک مقطع عدسی ہے جس کے اگلے حصہ میں گول سا
 ایک حصہ بغیر دھار کے ہوتا ہے +
 مشرط + پچھلے لگانے کا آکر۔ زہرا دی نے اس کی تین قسمیں بتائی ہیں۔ ان سے رسولی
 اور اورام کاٹتے جاتے ہیں +
 اسکلپناج + دانت وغیرہ اکھیرٹنے میں کام آتا ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں +
 مفلاخ + اوکھیرٹنے کا آکر۔ دانت اکھیرٹنے کے بہت سے متعلقہ کا تذکرہ
 زہرا دی میں ہے +
 کلایسٹ + کلوب کی بہت سی قسمیں بتائی گئی ہیں مثلاً
 کلوب کرمی۔ جس کے اگلے سرے میں ریتی کے مانند بہت سے دانت جھتے ہیں +
 کلوب آبی + جس کے دونوں پھل کے اگلے سرے اندر کو غیبہ جھتے ہیں دسہم ہندوہ
 کلپتان بھی کلوب کے مانند ہوتے ہیں۔ اور اس کی بھی کئی قسمیں ہیں +
 مفطوح + آکر عمل قدح یعنی نزول الماء (موتیا ہند) کے عمل کا آکر اسکی کئی شکلیں ہیں
 اور یہ تانبہ کے ہوتے تھے +
 منشاہ + آری۔ اس کی بارہ قسمیں زہرا دی نے بتائی ہیں۔ اور سب کی شکلیں
 دی ہیں +

۱۔ ہفت۔	۲۔ بسٹوری۔
۳۔ نشت۔	۴۔ فارپس کی قسمیں ہیں۔
	۵۔ ساوہ۔

مقرض سلم قینچیاں کئی مٹم کی ہیں۔ خمیدہ پھل کی۔ تیز نک کی۔ چھوٹے پھل کی۔
مقصص گول نک کی۔ عرض ان کی نو دس مٹیں اور ٹھیکیں بتائی ہیں مقصص قطب
مجھڑ غنٹہ کرنے کی چینی۔

اچڑہ سوتی۔ جس سے زخم وغیرہ سے جاتے تھے +

موتی { استرہ۔
مخلق

قائم طبر جو خدا سلائی جو پیشاب کی تالی میں وحسل کی جاتی ہے۔ (مربولہ۔
مبنولہ { پیشاب لانے کا آلہ +

مختصم حنہ کرنے کا آلہ۔ اس کی کئی مٹیں ہیں +

زرا قہ مہلبیہ + عورتوں کی اندام ہنائی کی پچکاری۔

مفرقہ پچکاری جس سے کان وغیرہ دھوئے جاتے ہیں +

محققہ مشانیہ مشانہ کی پچکاری۔

مہنت + ایک مٹم کی سلائی ہے جو نزل الما کے عمل میں کام آتی ہے۔ اسکی
بھی کئی مٹیں ہیں۔ مثلاً

مہنت مدورہ گول مہنت +

مہنت حادہ + تیز اور باریک مہنت +

ملقط + چمٹی یا موچنہ۔ اس کی کئی مٹیں ہیں۔ مثلاً ملقط سلجی جو غنٹہ میں کام آتا ہے

ملقاط + اس کے اندر استرہ بھی موجود ہوتا ہے۔ اسے عضو مخصوص پر پہنکار قبضہ کیا
دیا جاتا ہے۔ اور غلفہ کو پکڑ کر ذرا آگے کھینچ لیا جاتا ہے۔ اس سے غلفہ آسانی سے

کٹ جاتا ہے +

۱۵ سیزر۔	۱۵ دجائل سرخ۔
۱۵ نیڈل۔	۱۵ سرخ۔
۱۵ ریزر۔	۱۵ سرخ آت بلیڈر۔
۱۵ کیٹے۔	۱۵ فار۔ پس کی مٹم ہے
۱۵ اینا سرخ۔	

مہرزد + ریتی۔
 مشقبت + سوراخ کرنے کا آلہ۔ اس کی نو شکلیں زہراوی میں موجود ہیں +
 مشقبت + یہ بھی چھید کرنے کا ایک آلہ ہے +
 مسبار + سلائی۔ اس کی کئی قسمیں ہیں +
 مسبار مشقوب + وہ مسبار جس کا اگلا سرا سوراخ دار ہو +
 جفت + ایک قسم کی جٹی ہے۔ اس کی بھی چند قسمیں ہیں +
 جفت لطیف + یہ نازک اور باریک ہوتی ہے +
 انا بیست + مختلف قسم کی نلیاں۔ جو مختلف اعمال میں کام آتی ہیں +
 میل + سلائی۔ جو مختلف کاموں کے لئے مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔
 منقاش + سوجنہ۔ بال اگھڑنے کا آلہ۔
 نوکب + اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ جن سے اندام نہانی کو کھولا جاتا ہے۔
 مفتاح الاف + اس سے مختلف سوراخوں کو کشادہ کر کے دیکھا جاتا ہے مثلاً
 سوراخ بینی۔ سوراخ رحم وغیرہ۔
 بلزم + یہ بھی اندام نہانی کے کھونے کا آلہ ہے۔ جو کئی شکلوں کا ہے۔
 مرفع اجین + اس سے جبین کو پکڑ کر کھینچا جاتا ہے۔
 معراج + زخم کے اندر جتی دھنسل کرنے کا آلہ۔
 محراف + وہ نمیدہ سلائی جس سے زخموں کی گہرائی معلوم کرتے ہیں۔
 محقر + وہ آلہ جس سے اندام نہانی وغیرہ کے اندر دعوئی کی جاتی ہے +
 منجل + صورتہ ایک آلہ ہے جس سے ناصور کو کاٹا جاتا ہے +
 مکشطہ + ایک قسم کا پتہ جس سے مرض ناخونہ اور سبیل وغیرہ میں کام لیا جاتا ہے
 منضخہ + پچکامی کی ایک قسم ہے +
 بیہرم + رغبہ وہ آلہ ہے جو ٹوٹی ہوئی کھلی ہڈیوں کو پکڑ کر کھینچنے میں کام آتا ہے +

۱۵ یوبز۔
 ۱۵ ٹی بی ام۔ ۵۵ پے بس۔

۱۵ پردب۔
 ۱۵ فار سپر کی قسم ہے۔

جہاں یعنی تختیاں جو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں پر باندھی جاتی ہیں۔ انکی بہت سی شکلیں نہراوی نے دی ہیں۔ علاوہ ازیں اعمال جراحیہ کے اور بہت سے سامان اور کٹر و قلع کے درست کرنے کی بہت سی ترکیبیں مع نقشہ جات کے بتائی ہیں + مثلاً مہروں کے خلع میں کس طرح مریض کو سلاک اور اُس کے اعصاب کو باندھ کر ٹولب (پچ) وغیرہ سے کھینچا جاتا ہے +

ان کے علاوہ نہراوی میں بہت سے آلات کے نام ایسے ملتے ہیں کہ استدرازنہ سے اب انکا سمجھنا اور سمجھانا اور ان کے اصلی نقشوں کا بتانا محال ہو گیا ہے +



مندرجہ بالا تفصیل اسلامی دور جراحیات اور اسلامی آلات جراحیہ کی عظمت و رفعت کا ”مشتہ نمونہ از خردارے“ ہے، جس سے عہد اسلامی کے عملیات جراحیہ کی ہمہ گیری اور ادوقت کے ہاکال، بہران جراحت کی بالغ نظری و دقیقہ رسی کا کافی ثبوت ہم پہونچتا ہے + دائرۃ المعارف البرطانیہ میں شعبۂ جراحی کا خصوصی مضمون لگا جو خود جراحیات کا ایک ہاکال و ناقص ہے، ابوالقاسم الزہراوی کے کمال فن و صائب الالی کا اعتراف یوں کرتا ہے: ”کہ اوس نے مریض قبیلۃ الحلتقم (دگیگھ) پر عمل جراحی کرنا مناسب قرار دیا، اور عمل نسخ اقصیہ کو تائل کے ساتھ محض نادر حالات میں جائز سمجھا + مرض سرطان میں جراحی مداخلت کرنے سے قطعی اجتناب کیا، اور بڑے قسم کے فراج کو چیرنے کے لئے ”افراغ تکدلیجی“ کی ترکیب ایجاد کی جس میں پیپ یک تخت خارج نہیں کی جاتی ہے بلکہ یورپ اور امریکہ کے جدید ترین ماہر سیکڑوں سال بعد ان امراض و اعمال کے متعلق بعینہ انہیں نتائج پر اب پہونچے ہیں !!!



ابھی تہذیب عالم آغوش مادر میں تھی کہ چترک و شمشیرت کا دور شروع ہو کر ختم ہو

۱۷ اسپنٹ	۱۷ اسکرپو
۱۷ فریکچر	۱۷ انسانگو پیٹیا بریٹانیکا
۱۷ بڈسلو کے شن	۱۷ ٹکائٹر
	۱۷ ٹریکیٹومی

گر ان بالکلوں کے نقش قدم کو چوم چوم کر دنیا والے گھٹکوں کے بل آگے بڑھنے لگے۔ بقرط، جالینوس اور سلسوس کے سہارے ذرا سنبھل کر کھڑے ہونے کا سامان ہاتھ آگیا۔ ایک عرصہ تک صبار قناری سے منازل ترقی طے کرتے رہے کہ ہوا میں مخالف ہو گئیں اور رومیون کی تباہی کے ساتھ عالمگیر ظلمت و سیاہی پھیل گئی۔ اندھیرے گھپ میں ہاتھ مار رہے تھے کہ اسلادامیوں کا آفتاب عالیاں چمکا۔ مغرب والے جو اندھیرے میں شریقیں کو دیکھ کر حزن و غم مٹا دیتے تھے مگر بتدریج روشنی کے عادی ہوئے تو شیشہ و این مرئید، مرازی و زہاوی کی نورانی صورتیں دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے۔ جب عاںس بجا ہوئے تو حیرت نے عقیدت کو جگہ دی۔ اسے جوش عقیدت کہنے یا اقتضائے وقت و ضرورت، کہ مغرب ساہا سال تک انھیں مشرقی صاحب کمالوں کی راہ ہدایت پر چلنا رہا جس سے بالآخر

جدید فن جراحی

نے جنم لیا۔ یورپ والوں نے جو کچھ کیا، اُس کی تفصیل کی چنداں ضرورت نہیں، جو کچھ ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، ان بازرگروں نے اسلاف کی جراحیات پر کچھ دنوں بعد ترمیم و تنسیخ سے کچھ ایسا جا دو کیا کہ اُس کی پوری کاپیا پلٹ کر دی ہوئی قدیم فن جراحی کو اب نئے لباس زینت، نئے سامان زیبائش سے سناور کر ایک نوخیز حسین، اور دوشیزہ مدجبین کی صورت میں دکھائے ہیں۔ نئی دنیا (امریکہ) مالک نے اسپر اور بھی ہار چاند لگا دیے، عقبہ ریزہ ریزہ کی نالی کے اندر سے معتاد طبی کشش کے فریضہ بھی ہوئی سوئی نکالی گئی۔ پیچھے ٹوں اور غلاب قلب پر اعمال جراحیہ ہوتے جوت سینہ کی سیر کی گئی۔ اندر درن طبقات چشم سے شیشہ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ساہا سال کے بعد نکال کر نایا کو مینا بنایا، انسانی خانہ چشم میں غزالان صحرائی آنکھیں منتقل کی گئیں۔ الغرض ان کرشمہ سازوں نے ان ہوئی اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا، اور جو دیدہ و شنیدہ دن کے آجائے میں کر رہے ہیں، یورپ کی جنگ عظیم نے جراحیات جدید میں ایک دوسرا دور شروع کر دیا، یہ عالمگیر انقلاب المضاعف ہے۔ غرض کہ فن جراحی کی پیرائہ کہن سال اپنی بلی ہوئی صورت میں اس خط و قال کے

ساتھ جلوہ آرا سے انجن ہے کہ پرستارین طب قدیم اُسے پہچان بھی نہیں سکتے، بلکہ اُس غزالِ رحمت کی سیلا جالی کو جبر و دور کو دے باعث اپنے منہائے خیال سے بالاتر سمجھے ہوئے ہیں۔

فَاعْتَبِرْ وَلْيَا أُولَى الْأَبْصَارِ!

اللہ اشرا! ایک وہ زمانہ تھا کہ یہی ملائکہ یورپ سلسلرت و نرھادی کے قدوسا میں کمال عجز و عقیدت، زانوئے تلمذتہ کیے بیٹھے تھے، یا اب یہ حال ہے کہ اُن کمال اسلاف کے ہم خالق، انھیں اپنا استاد سمجھ کر انکا منہ ٹک رہے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف کی سخی سنانی باقی ہیں چھڑ چھڑ کر سنا ہے ہیں، اور ہم ایسے خود فراموش ہیں کہ اُس پرانی داستان سے بھی قطعی بے خبر ہو چکے ہیں۔

غراب تھا جو کچھ کہ دیکھا، جو سنا انسانہ تھا

لیکن مقامِ عبرت اور باعثِ سختِ غیرت ہے کہ اب بھی ہم میٹھی پسندیں سنت ہیں۔ کبھی جانتے بھی ہیں تو فہمی پرانے غراب، ہمیں وقت نازل و انتھار کرتے ہیں۔ صفحاتِ بالا میں ہم نے کسی قدر رخصت سے اسلاف کے کارنامے دہرائے ہیں، اس سے ہمارا مقصود حاشا و کلا، شخصِ رسمی اسلاف پرستی اور بے جا فخر و سبات نہیں۔ فی الحقیقت اس طویل ہرزہ سرائی سے ہمارا مقصد جدید اور حقیقی منہائے خیال صرف یہی رہا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے سبقِ عمل سیکھیں۔ کس قدر مبارک اور اپنی ذہن کے کہتے تھے وہ لوگ کہ زینہٴ مدن کی ابتدائی منزلوں میں اونہوں نے کپے کیے کارہائے نمایاں، کن کن وقتوں اور مشکلوں کے درمیان رہ کر، انجام دینے، وہ سید سے سادے مگر مستقل مزاج اور باعزم لوگ، ہمارے جدید تکلفات، اور موجود مصنوعات و مخترعات سے مستفیض نہ تھے، اُن کے پاس آلہٴ رسانہٴ الصد (سینہ) نہ تھا، گردہ کان رکھتے تھے، اجسادِ دقیقہ اور جراثیم کے دیکھنے کے لیے اوکھو آلہٴ جھڑ (غور و بین) میسر نہ تھا، گردہ چشمِ حقیقت آشنا و نظرِ دور میں سے بہرہ مند تھے اور جراثیمی سمیائے "کوئموافاسدہ" کے نام سے جکارتے تھے، ایسے جراثیم کے علی

سہ سینہ نامکین

سہ مانی کرکوب

سہ ابٹھن کوپ

اثرات کے قائل تھے، اور قائل بھی اوسوقت تھے جبکہ ہماری طرح ادنیٰ مشاہدہ یعنی کاموقعہ حاصل نہ تھا۔ کسر و ضلع، رڈیوں کے ٹوٹنے اور جوڑوں کے اوکھڑنے کے دقیق ترین اقسام کی تشخیص و تفریق کمال لیاقت ابتداء ادہنوں نے ہی کی مگر ہماری طرح نہیں کہ اگر عکس کشی تو درکنار شکل راسخ جینی کی تیز تر شاعروں کی مینک جڑا کر تشخیص ہوئی اور وہ بھی فی صدی نوے حالات میں غلط استحسان قادر وہ کہنے لگے پاس نہ جدید کیبیا دی تکلفات کا گورکھ دھندا تھا، نہ ہنر آثار دقیقہ کی زینبیل اگر وہ امر من مشانہ و قلب کی تہ کو ایک ہی غلط انداز نظر میں پہنچ جاتے تھے یہ سب کیونکر ممکن ہوا؟ اس لئے کہ وہ لوگ دمن کے پتے تھے اور ارادے کے پتے۔ کام کرنا جانتے تھے اور صرف سعی عمل ادیکہ ایمان تھا مشاہدہ ادیکہ یقینی آگ تھا، جو خورد و بین سے زیادہ طاقت رکھتا تھا + اوکے نزدیک اپنے پر اسے کی تفریق و تخصیص نہ تھی + ہمالیہ کا رشی ہویا جو مان داسکندریہ کا فلسفی، اوکے نزدیک اہل علم سب برابر تھے، اور وہ علم کو دنیا کی مشترک میراث سمجھتے تھے، جس میں ذاتیات کی تفریق کی گنجائش اور اس کی ضرورت ہی نہ تھی + چرک و سسکشت ہوں یا بقراط و جائینوس، اکتساب کمال میں مذہبی قوی ادواجی یا ذاتی اختلافات اور رکاوٹوں نے کبھی اوکے ثبات و عزم کو مستززل نہ کیا اوکی کوششیں ساری دنیا پر محیط تھیں اور لائحہ عمل یہ تھا۔

”مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا“

چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا“ (اقبال)

— (۱۱۱) —

ہجینہ پی نال دافایان فرهنگ کی مساعی جدیدہ کا ہے + ہندوؤں اور یونانیوں رومیوں، اور اسلامیوں، ہر قوم ادھر ملک و ملت کے علوم شریفہ و فنون لطیفہ سے یہ زمانہ شناس مستفیض ہو رہے ہیں، گویا ہمارے بزرگوں کی سنت مؤکدہ اور اسوہ حسنہ پر بجا ہے ہمارے یہ لوگ عالم ہیں + چہ چہ پر انکی دقیقہ شناسی ان کے حامن کو مال مال کر رہی ہے۔ اور جو جہاں ہر ریزے جہاں سے لے یہ ادیکو

مسلم اکس ہے۔

نہ نوڈرانی۔

شوق کی آنکھوں سے اٹھا کر سر پر چڑھاتے ہیں، جو کام کی بات ملی اُسے اختیار کرتے ہیں اور غیر مفید حشو و زوائد کو بلا تامل مسترد کر دیتے ہیں۔ الغرض انکی فضیلت حاضرہ کا دار و مدار انکی سعی و عمل پر ہے۔ اور

ہماری پستی و ذلت

کا طشت از بام شدہ راز ہماری غفلت اور جمود میں ہے + اسلاف پرستی ہم سے ایسے دجر اختیار ہے + مگر بزرگوں کے کارنامے ہمارے لیے اسی وقت باعث فخر ہو سکتے ہیں جبکہ ہم انہیں شیعہ ہدایت بنا کر شامہ راہ ترقی پر گامزن ہوں، ورنہ یہ لان و گزاف بلانیت عمل انھیں استخوان فردشی ہے + طب قدیم کے پرستار و اسٹشرت و زہراوی کے جانشینو ! ایک وہ زمانہ تھا کہ اسلامی خواتین اپنے فضل و کمال کے باعث خطرناک اور دقتی اعمال جراحیہ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دے سکتی تھیں اور آج ہماری پستی و جہالت کا یہ حال ہے کہ تم معمولی نشتر کے استعمال سے بھی ناداقت ہوا اور ایک پھوڑے کو چیرتے ہوئے ڈرتے ہو + الزہراوی کی تصنیف کے بعد آٹھ سو سال گزر گئے۔ اغیار نے اوس کے ترجمے اور شرحیں لکھیں اور تم اوس کے ادھورے نسخے آج روکشناس ہوتے ہو + یورپ والوں نے زہراوی کے نقش قدم پر چل کر سیکڑوں نئی کتابیں جراحی کے موضوع پر لکھ ڈالیں اور تم ہو کہ زہراوی کے قدیم نسخہ تک بخوبی سمجھنے سے قاصر ہو اور اب تک نیکر کے فقیر بنو میزان الطب، رسالۃ فتویہ، اور رسالۃ فاروقہ کی تقویم پارینہ میں ستغنی و مستغرق +

پیام عمل

دوستو جاگو اور اٹھو! دیکھو کہ زمانہ کس رخ پر چل رہا ہے، اغیار بازی سے جا رہے ہیں، تم بھی کچھ سعی و عمل میں کر شان ہو، ذرا ترجمان حقیقت اقبال کی آواز پر کان دھو۔

ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ

پہلے اپنے پسیر فانی میں جاں پیدا کرے

پھر ہو خاکِ آسمان و زمین و آسمان مستعار

اور خاکِ تر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے

زندگی کی قوت پنهان کو کر دے آشکار
 تا یہ چنگاری نہ فروغ جاوداں پیدا کرے
 خاک مشرق پر چمک جائے مشال آفتاب
 تا بدخشاں پھر وہی نعل گراں پیدا کرے
 سوئے گروں نالہ شبگیر کا بیجے سفیر
 رات کے تاروں میں اپنے راز داں پیدا کرے
 یہ گھڑی عشر کی ہے، تو عرصہ عشر میں ہے
 بیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے

(راقبال)

مطلعِ مہینہ

الحمد للہ کہ اس عام جمود و سکوت کے عالم میں یکایک فضاۓ دہلی سے شعاع
 امید کا طلوع ہوا، اور حضرت مسیح الملک حکیم حافظ محمد اجل خان صاحب کی مساعی
 جمیلہ سے ”آیور ویدک دیوفانی طبئی کا پلہ دھلی“ معرض وجود میں آیا، جس کے
 باعث نہ صرف اطراف ملک میں تعلیم یافتہ اور قابل اطباء کی ایک بڑھتی جاوے
 ملک کی طبئی ضروریات اور ایجاد طب قدیم کے لیے جینا ہو گئی، بلکہ قدیم طبقہ طباء میں
 بھی ایک جان بخش حرکت معکوس پیدا ہو گئی، جدید نصاب تعلیم ملک کے سربراہوں
 اور نامور حکماء کی رائے سے مقرر کیا گیا، جس میں زمانہ کی ضروریات کے لحاظ سے تنویر
 اور وظائف الاعضاء وغیرہ کی تعلیم و تدریس لازمی گروائی گئی، تنظیم و تدوین
 نصاب کے لیے ضروری تھا کہ قدیم کتب طبیہ میں مناسب اضافات و ترمیم کے بعد
 جدید تالیفات بھی شامل کی جائیں، تاکہ طلباء کو قدامت فن کے اصول و تحقیقات کے
 علاوہ، انکشافات جدیدہ و اختراعات حاضرہ سے متبع ہونے کا موقع ملے۔

اس مہتمم الشان مقصد کی فرار و امتی تکمیل پر طبیہ کا چلچکی کا میسائی کا دار و مدار
 بلکہ یوں کہنا صحیح ہو گا کہ بحیثیت مجموعی یونانی طب کی سلامتی و آئندہ زندگی کا انحصار
 تھا۔ ہزار شکر ہے کہ طبیہ کا چلچکی کے حکمہ تالیفات نے اس ضروری اور اہم مقصد
 میں ایک امید سے زیادہ کامیابی حاصل کی + مبادی و اصول طب، علم العلاج،

جربات، تشوہجہ الاجسام، وظلقت الاعضاء، ماہیت امراض، ودیگر مضامین پر تالیفات و تراجم لیا رہا کہ باعث منفعت کثیر ہوئے۔ ان تالیفات کی قدر و قیمت کا اندازہ نہ صرف اس لحاظ سے کرنا چاہئے کہ ان کی مدد سے ایک تعلیمی نصاب مضبوط و مدون ہو گیا، جس سے طلباء استفادہ ہوئے، بلکہ اس حقیقت کا خیال و اعتراف ہی ضروری ہے کہ انہیں قدیم طبقہ اطباء میں ایک سنی خیز حرکت، تحقّق و ترقی من کے تعلق پیدا ہو گئی، اور ان درجہ اول میں بھی، جو مدنی کے دارالعلوم طبی سے فارغ ہو کر نکلے اور ملک کے طول و عرض میں بسرعت پھیل گئے، مزید تحقیق و تالیفات کا شوق پیدا ہو گیا اور ان میں سے اکثر اب تراجم و تالیفات میں منہمک ہیں۔ یا طبی جراند و مسائل میں حصّہ لے رہے ہیں۔ طبیہ کالج کی زرتیں مثال سے متاثر ہو کر لکھنؤ، بھوپال، مدد اس الاہود، حیدرآباد دکن، وغیرہ میں بھی قیمتی مساعی جاری ہیں۔ مددنی طور پر ان مساعی میں خاص مدنی کے طبی ارباب سب وعدہ کا حصّہ پیش پیش ہے، جو بالخصوص حضرت مسیح الملک کے فیضِ محبت سے مستفیض ہو چکے ہیں یا ان کے ”چشم و چراغ“ طبیہ کالج مدنی سے تعلق رکھتے ہیں۔

حالم ان طب یونانی پر جدید اطباء کا اتیک بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہ تشوہجہ و افعال اعضاء جیسے ضروری مضامین سے کیسر غافل و نا بلدی ہیں۔ مقام شکر ہے کہ اس کی کوپڑا کرنے کے لیے حضرت مسیح الملک اور ارکان کالج نے سب سے پہلے توجہ فرمائی اور اب چند سال سے تشوہجہ و منافع الاعضاء کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ نصاب کے ان معرکہ الارامضین کی تدوین و تکمیل، مسیح الملک کے ارشد تلامذہ، اور طبیہ کالج کے ایڈناز فرزند موجودہ پروفیسر تشریح و منافع الاعضاء زبدۃ الحکماء مولانا حکیم کبیر الدین صاحب کا ایک قابل یادگار علمی کارنامہ ہے جو کالج کی تاریخ میں ہمیشہ جلی رہے گا۔ علامہ موصوف اب طبی دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ طبی نصاب کی تکمیل و تنظیم کا اہم فریضہ آپ نے جس حُسنِ خدمت، دلچسپی، اور قابلیت و انتہاک سے ادا کیا ہے، وہ اباز فن کی سخن شناس نگاہوں سے ہوشیاد نہیں۔ ایک خاص قابل تذکرہ

بات یہ ہے کہ تشریح و منافع الا عظام کے متعلق جو ہزار ہا لاطینی و انگریزی اصطلاحات ہیں اور جن کی تعریف پر یا ان کے مرادفات کی تماش میں اکثر علماء مصر تک مجبور ہوئے، علامہ مدوح نے، کمال یاقوت و جدت و ہزار کاوش و تتبع ان کے قدیم مترادفات ڈھونڈ نکالے، یا ان کے لئے خالص عربی مصطلحات وضع کئے، اور وہ بھی ایسے کہ جو قدیم اور مردوجہ یونانی اصطلاحات و الفاظ کے ساتھ بے جوڑ اور بدوضع پیوند معلوم نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ساتھ شیر و شکر کی طرح مل گئے یہ ادبیات آرو واد و خصوصاً طبی ادب کی نہایت گراں بہا و نادر تاریخی خدمت ہے۔

ایک تشریح کی تعلیم کے متعلق طبیہ کالج میں لاشوں کے چیرنے کا انتظام نہ ہونا ایک بڑی کمی تھی۔ مگر یہ خبر نہایت طمانیت بخش ہے کہ اب ارکان کالج نے نہایت کوشش سے طبیہ کالج کے طلباء کے لیے لاشوں کے چیرنے کا انتظام فرما دیا ہے اور عملی نصاب کی یہ نہایت شدید و اہم ضرورت پوری ہو گئی ہے۔

علم طب اور علاج الامراض کے دو اہم شعبے ہیں: علاجل بالذیاء اور علاجل بالعلیاء۔ علم طب قدیم ان ہر دو صیغوں میں قدیم الایام سے ممتاز رہی ہے، جیسا کہ گذشتہ صفحہ میں، ریح جراحی شہادت دے رہی ہے۔ یہ ہماری بدبختی تھی کہ ہم نے اسلامی علوم کے زوال کے بعد اپنی پستی و غفلت سے مجبور ہو کر اپنے مہذب و دانشمند فن جراحی کو سہو و گناہی کے فقر ذلت میں ڈال دیا، اور جمہوریات سے ایسے غافل و نا آشنا ہو گئے کہ گویا کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ بعض ضروری اور ناقابلِ گریز اعمال، مثلاً کسر و خلع کا علاج، فصد، جامت وغیرہ، ادنیٰ پیشہ دروں، اور "جماموں" کے سپرد کر دیے اور نامور اطباء کے مطبوں میں صرف علاج بالذیاء کی مشق و مزاوت جاری رہی۔ ہندوستان کی طبی تاریخ کی یہ سہل انگاری ہی دراصل اس بات کی ذمہ داری ہے کہ آج نقشب سے اطباء مغرب طب یونانی کو، مہذب، ناقص اور علمی حیثیت سے گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ اور انگریزی ماہرین جراحی اس کی کمر پائی اور بے بضاعتی پر طعنہ زن ہیں، یہ جو کہہ رہے، فی الحقیقت ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔

من اذینکا نکال ہرگز نہ تالم

کہ با من آنچہ کرداں آستنا کرد

کس قدر عبرت و حسرت کا مقام ہے کہ من جراحی کی مستند مشرقی تصانیف و سسٹم
نگفتا اور الزہراوی (کو اہل یورپ اپنا دستور العمل بنائیں اور اسے اکتب کمال
کریں، اور ہم اب تک اس نے قطعی بے خبر رہے ہوا ہیں، سنا گیا ہے کہ لاہور کے
کسی مطبع نے اب سسٹم کا اردو ترجمہ شائع کیا ہے، حالانکہ ہمارے اطباء اگر چاہتے
تو ساہاساں پہلے اسکا اردو ترجمہ رخصتائے بغداد کے عہد کے عربی ترجمہ سے یا
اسلی سنکرت کتاب سے کر کے اس سے مستفید ہوتے، نہ ہرادی کا عربی نسخہ
بھی اب مطبع تاجی مکھنوی کوشش سے ہندوستان میں شائع ہوا ہے، غالباً اس سے
پہلے پٹنہ کے کتب خانہ خدا بخش خان میں ایک نسخہ موجود تھا، اور قیاس ہے کہ
ہندوستان کے بعض علم دوست حضرات اور نامور اطباء کے کتب خانے بھی اس سے
غالی نہ ہو گئے، مگر عام طور پر ہندوستانی اطباء کی جماعت، سسٹم کی طرح زہراوی
سے ہی غافل و مستغنی رہی، ورنہ ضرور تھا کہ دیگر یونانی طبی کتب کے ساتھ اسکا بھی
اردو ترجمہ ساہاساں پیشتر ہی شائع ہو کر رائج ہو جاتا، سسٹم اور زہراوی تو غیر
قدیم کتب ہیں اور انکی کیانی کا عند شاید قابل سماعت بھی ہو، لیکن جدید من جراحی کی
جو سیکڑوں انگریزی کتابیں برطانوی حکومت کے دور دورے کے ساتھ عرصہ دراز
سے ہندوستان میں داخل ہوئیں اور جنگی مدد سے ہندوستانی ڈاکٹر صاحبان اپنی
نشر زنی کا کمال حاصل کر چکے ہیں، انکی طرف بھی جماعت اطباء نے توجہ نہیں فرمائی
اس میں شک نہیں کہ ترقی علوم و ترویج فنون کے لئے حکومت وقت کی سرپرستی
ضروری چیز ہے اور ہماری سیاسی غلامی ہماری علمی ترقیات میں بہت کچھ حاصل رہی،
مگر ایک بوری طبی جماعت کا جراحی جیسے مفید اور اہم طریقہ علاج سے قطعی غفلت
و متغیر ہو جانا، حتیٰ کہ اکتب من کی انفساد و مسماعی کا بھی معدوم ہو جانا، ایک
ایسا جانکاح قومی حادثہ اور فنی بدعنوانی و پستی کا دلخراش نظارہ ہے، جس کی
ترجہ دہ ویل کے یے خالصتہ خارجی و سیاسی اسباب مشکل کافی ہو سکے ہیں
بلکہ حق تو یہ ہے کہ اس سے قوائے قومی کے عوارض باطنی اور امحلال داخلی

کا پتہ چلتا ہے۔ سچ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

کتاب ”علم الجراحات“ کی تدوین

احیاء طب کی قدیم کی تیرہویں ایک

اہم اور زریں واقعہ ہے

جس پر اراکانِ طبیتہ کالج اور خصوصاً کالج کے سرگرم پرنسپل، ڈاکٹر محمد حبیب الرحمن صاحب مدتی صد آفرین و مبارکباد ہیں۔ فن جراحیات کی اس پھلی اُردو کتاب کی تدوین و تکمیل میں ہمارے کرم دوست مولانا حکیم محمد کبیر الدین صاحب نے جس عز و فزنی جانفشانی اور تبحر علمی کا ثبوت دیا ہے وہ آپ ہی جیسی باکمال شخصیت کا حصہ ہے۔

جناب مؤلف کو اس مجموعہ کمال کی تالیف و ترمیم میں، قدم قدم پر جن صعوبات و مشکلات کا سامنا ہوا ہے، اُن کا اندازہ کچھ ہی صاحبانِ فرما سکتے ہیں جو تفصیلی حالت سے واقف ہیں۔ بہر حال نہایت سست و افتخار کا مودعہ ہے کہ اراکانِ کالج کی متفقہ مساعی جمیلہ کا میاب ہو میں اور حکیم صاحب مد فیوضہ نے کمال محنت و تہجد ”علم الجراحات“ کا یہ پہلا حصہ اربابِ فن کے سامنے پیش کر کے طب ہونانی کے سلسلہ ارتقا میں ایک اہم اور تازہ اضافہ فرما دیا، جس سے نہ صرف ہنئی جماعتوں کے لیے علم و عمل جراحی کا نصاب مکمل ہو گیا بلکہ بحیثیت مجموعی ہندوستان کی جماعتِ اطباء کے سامنے اصول و ضوابط جراحیہ کا ایک سر بستہ باب کھل گیا۔

کتاب الجراحات مبادی و اصول جراحی کے علمی و عملی بیانات کا ایک جامع

مجموعہ ہے، جس میں زمانہ حاضر کے ترقی یافتہ فن جراحی کا سادہ ترین ابتدائی خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ جہاں تک ہمارا قیاس ہے، اس موضوع پر اُردو زبان کی پہلی کتاب ہے، جو اصول و ضوابط فن جراحی کو مضبوط و باقاعدہ طور پر پیش کرتی ہے۔ فی الحقیقت اس ترقی یافتہ زمانہ میں فن جراحات نے نہایت عجیب و غریب اہمیت و وسعت حاصل کر لی ہے، جس کا کسی قدر اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ یورپ و

امریکہ میں سیکڑوں ہزاروں تابخات و تصنیفات، رنگارنگ تصاویر و تشریحات سے آراستہ ہو کر، نہایت قلیل عرصہ میں جراحی کے موضوع پر شائع ہو چکی ہیں اور روز بروز انکی تعداد میں ترقی جاری ہے۔ خاص خاص ماہرین فن نے تمام امراض و اعمال جراحیہ میں سے صرف ایک مرض یا ایک عمل کو منتخب کر کے درجہ کمال پر پہنچا دیا اور پھر صرف اسی ایک بیان میں مستقل ضخیم کتابیں شائع کی ہیں۔ مبیوں اعمال جراحیہ ایسے ہیں جو مختلف ماہرین مختلف طریقوں پر کرتے ہیں، اور ہر ماہر اپنے مخصوص ایجا کردہ طریقہ عمل کی تائید و تحمید اور دوسرے اقدام عمل کی تردید و تنقید میں، مشرح اعداد و شمار اور ضخیم شواہد مستقل کتابی صورت میں پیش کرتا ہے۔ مزید برآں علم الجراحۃ اس قدر شائستگی اور وسعت کو پہنچ گیا ہے کہ اس کے اصول و اعمال کے بیسیوں جداگانہ اور مخصوص صیغے قائم ہو گئے ہیں، مثلاً:-

(۱) تشریح جراحی (۲) جراحۃ تعلیمی (۳) رمبضوں کے مبتدوں پر جراحی کا درس (۴) جراحۃ عملی (۵) علم الامراض الجراحیہ (۶) جراحۃ صغیرہ یعنی تعصیب ترمیمہ اساوہ وغیرہ پٹی وغیرہ باندھنا (۷) جراحۃ دافع عفونت (۸) جراحۃ غیر عفونی (۹) مجروحین کی پہلی مدد (۱۰) فوجی جراحۃ (۱۱) مخدرات یعنی داروئے بیہوشی (۱۲) مخدرات نگاہیہ (۱۳) جراحۃ چشم (۱۴) جراحۃ بطن (۱۵) جراحۃ صدر (۱۶) جراحۃ کانہ (۱۷) آلات جراحیہ (۱۸) کئی بائالربیعہ آگ سے داغنا۔

۱۔ سرجیکل انٹرنی۔	۱۱۔ اسپلینٹس۔
۲۔ کلی نیکل سرجری۔	۱۲۔ انجینی مسپلک سرجری۔
۳۔ اسپے ریٹو سرجری۔	۱۳۔ اسپلک سرجری۔
۴۔ سرجیکل پھیلا جی۔	۱۴۔ فرسٹ ایڈ ٹو انجیڈو
۵۔ مائٹرس سرجری، مینڈیجنگ رائیڈ	
۶۔ اسپلینٹس۔	
۷۔ انجینی مسپلک سرجری۔	
۸۔ اسپلک سرجری۔	
۹۔ فرسٹ ایڈ ٹو انجیڈو	
۱۰۔ سرجیکل انٹرنیشنل اینڈ اپیلی اینسینر	
۱۱۔ سرجیکل انٹرنیشنل اینڈ اپیلی اینسینر	
۱۲۔ سرجیکل انٹرنیشنل اینڈ اپیلی اینسینر	
۱۳۔ سرجیکل انٹرنیشنل اینڈ اپیلی اینسینر	
۱۴۔ سرجیکل انٹرنیشنل اینڈ اپیلی اینسینر	
۱۵۔ سرجیکل انٹرنیشنل اینڈ اپیلی اینسینر	
۱۶۔ سرجیکل انٹرنیشنل اینڈ اپیلی اینسینر	
۱۷۔ سرجیکل انٹرنیشنل اینڈ اپیلی اینسینر	
۱۸۔ سرجیکل انٹرنیشنل اینڈ اپیلی اینسینر	

(۱۸) کئی باہرین یعنی بجلی سے داغدار (۱۹) سوئیہ اطفال جس میں بچوں کی بدہیئتی کو دور کیا جاتا ہے (۲۰) جراحات شعا عیدہ یعنی مختلف قسم کی شعا عوں سے امراض کا علاج کرنا +

اسی طرح اور بھی اس کے شعبے ہیں پھر ان میں سے ہر صیغہ کی تیس صد اجداد منضبط کی گئی ہیں اور اس طرح یہ ایک سلسلہ مولائی بن گیا ہے +

الغرض ان عمومی و خصوصی سماعی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج جدید علم الجراحات نے ایک عظیم الشان فقر کی صورت اختیار کر لی ہے جس کی آرائش و زینت میں انتہائی ایجادات و اختراعات سے اضافہ ہوتا رہتا ہے +

”کتاب الجراحات“ میں علم جراحات کے انہی مسائل و اعمال کا محض ابتدائی اور سادہ ترین بیان ہے اور چونکہ یہ کتاب اس فن کے عام اصول و مبادی کا مجموعہ ہے، جو مبتدی فن کو جراحات کے وسیع و پُر بہار میدان سے روشناس کر کے اس کے سامنے فقر جراحات کا عظیم الشان باب داکرتی ہے، اس سے زیادہ تشریح و تفصیل کی اس میں گنجائش بھی نہیں ہو سکتی تھی + پہلی جلد میں جوئی الحال اہل نظر کے سامنے پیش ہے، نہایت ابتدائی اور بنیادی مطالب درج ہیں، جن پر ہر گے چلکر فن جراحی کی فلک مرتبت عمارت کے بلند درجے کھڑے ہوں گے + اس لحاظ سے ان ابتدائی اصول کا بخوبی جاننا اور سمجھ لینا نہایت ضروری امر ہے + مبتدی فن اکثر مقامات پر ان جامع اصول کی وقت اور روکھن کو صبر آزما پائے گا، مگر جراحی کے دقیق و قیمتی اعمال کو قبضہ انتہا میں لانے کے لیے صبر و استقامت کے ساتھ اسی پُر پیچ راہ سے گزرنا مقدم و ضروری ہے + اس سنگلاخ و ناہموار سر زمین کو عبور کیے بغیر جراحی کی شاہراہ عمل پر پہنچنا ناممکن ہے + کہنے کو یہ مبادی ہیں اور شائق فن مبتدی کے لیے ابتدائی زینے، مگر ان کے جامع اختصار میں وہ راز ہائے سر بستہ پوشیدہ ہیں، جن کی روشنائی کے لیے ایک مغربی دارِ علوم کا منتہی بھی انھیں سے وابستہ کار ہونے پر مجبور ہوتا ہے اور بالآخر انے فیضیاب ہوتا ہے +

۱۔ اس سے دشعلہ راستہ یعنی (فن لاسٹ رشعلہ)
۲۔ (فن لاسٹ رشعلہ) یعنی برتر

۱۔ اکثر دکا ٹری۔

۲۔ آرتھروپے ڈیز

مثال کے طور پر باب اول ہی کو لیجئے جس میں علم الجراثیم کے مبادی سے بحث کی گئی ہے۔ اور جو تفہیم و تبیل امراض و افعال جراحیہ کے لیے نہایت ضروری ہے، سلف سے اب تک کی جراثیمی تحقیقات کا کتب باب اس میں موجود ہے۔ بظاہر علم الجراثیم ایک جداگانہ حیثیت رکھتا ہے، مگر اسکا عمل و دخل جراحات و امراض جراحیہ پر اس شدت سے ہے کہ گویا جراثیم ہی تمام کون و فساد کی جڑیں اور یہ نہوتے تو نہ جراحی کی چنداں ضرورت ہوتی اور نہ ماہرین جراحی کی پرسش۔ آگے چلکر باب التهاب و درم حارہ پر نظر غائر ڈالئے تو ظاہر ہوگا کہ جس طرح جراثیم بیشتر امراض جراحیہ کے مخفی اسباب میں سے ہیں، اسی طرح "التهاب" بیشتر امراض جراحیہ کا نمایاں مظاہرہ ہے۔ فرق اتا ہے کہ ایک پس پردہ کار فرما ہے تو دوسرا صریحاً اور کھلے میدان میں۔ ذرا اور آگے بڑھئے تو "عدوی" بکھیاں گراتا ہوا نظر آئیگا اور اس کی فریب کاریوں کا راز ہویدا ہوگا۔ الغرض اسی طرح جراحیات کے سرسبزہ راز مبتدی پر زینہ بہ زینہ منکشف ہونگے۔ مبتدی انکی گوناگوں عجولکاری سے دم بخود اور حواس باختہ ہوکر بعض اوقات گھبرا اٹھے گا، تو سہتی انہی میں قوانین قدرت کے لاست نہای اسباب و علل کا سلسلہ دریافت کر کے عش عش بچار اُٹھے گا، اور اب علی طور پر محسوس کرے گا کہ

تہر درختے دفتر معرفت کردگار

اس پوری کتاب میں ایک اہم و ممتاز حصہ وہ ہے جس میں مؤلف علامہ نے امراض جراحیہ کی ماہیت و حقیقت و فلسفہ مظاہرہ مضمتہ سے مبتدی کو روشناس کیا ہے؛ فی الحقیقت یہ خاص موضوع تحقیقات جدیدہ کا عجیب ترین کارنامہ ہے، جو بیشتر خوردبینی مشاہدات کا نتیجہ ہے اور جہر مغربی محققین کو بچہ ناز ہے۔ خوردبین کی ایجاد و طب جدید میں وہی اہمیت رکھتی ہے جو ہندوؤں کی ایجاد جدیدہ طریقہ جنگ میں۔ مگر جس طرح ٹی کی آر میں چمک بندوق کی گولی سے غنیم کی جان لینا چنداں شان ہنور نہیں، اسی طرح طبیعات کی اس دبر دست

۱۔ انگلشن۔

۲۔ سر جیکل پٹیماوری۔

۱۔ بیکٹر یا لوجی۔

۲۔ انفلا میشن۔

ترین کامیابی (خوردین) سے زندہ جراثیم کا مشاہدہ کر لیا کوئی نمایاں دماغی نمونہ
 نہیں۔ حقیقی تعریف کے مستحق وہ دانشمند و دور بین دماغ تھے جنہوں نے بلا
 خوردین کی مژد کے جراثیمی معیبات کی موجودگی و کار فرمائی کا اندازہ فرمایا اور سب
 سیکڑوں سال پیشتر مواد فاسد اور سطوبات مضرہ کے متعلق ذہنی و قیاسی
 نظریات قائم کیے۔ بایں ہمہ ہم خوردین کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے، اور
 اب مقتضائے وقت یہی ہے کہ ہم بھی اس جدید حربہ سے جراثیمی افواج کی نقل و
 حرکت کا معائنہ کریں، اور صحت انسانی کے ان مژدہ ذل دشمنوں کے قلع و قمع
 کرنے کا سامان جدید اسلوب پر کرنے کی ہمارت پیدا کریں۔ اہمیت دقت کا لگان
 کتاب علم الجراثیم میں موجود ہے وہ اگرچہ اس شکل و دقیق بحث کا سادہ ترین
 بیان ہے، مگر مبتدی ابتداء اس میں ضرور غلطیاں دیکھاں ہو گا۔ اس کی جدت و غیر
 انویست اس کی متقاضی ہے، تاہم یہ ایک ایسا اہم اور بنیادی حصہ ہے جس پر نئے
 جراثیمی مسائل کا دار و مدار ہے، لہذا اس پر عبور حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ جراثیم
 کا تمام بیان اسی زمرہ میں سمجھنا چاہئے۔ حضرت مولف نے اس سنگلاخ مرحلہ کو
 نہایت سلاست سے طے کیا ہے، جو ادنیٰ قدرت زبان اور علمی تجربہ وال ہے۔
 ایک زمانہ تھا کہ اسی قسم کے مسائل کے متعلق، قدار غن انتہائے ذہانت اور
 بالغ نظری سے، قیاسی و ذہنی نظریات قائم کر کے، ان کے نشانات کتب یہ
 میں محفوظ کر گئے۔ متاخرین بھی اگر انہیں کے نقش قدم پر چلتے، اور ان کے اشارات
 کے تحت تحقیق و تفتیش جاری رکھ کر ہیئت و نظریات کی تلاش کرتے رہتے، تو آج
 اغیار خوردین کی عینک لگا کر اپنے ”صنی شہادت“ کا خوان نیما بایں تفاخر ہمارے
 سامنے پیش نہ کر سکتے۔ بہر حال چونکہ ہم ہنسی و امان میں اور تحقیقات جدیدہ کے امنی
 بانی و محرک خود ہمارے اسلاف کے اصول قدیم ہیں، لہذا یہی مناسب ہے کہ ہم
 جدید مغربی علوم کی خوشہ چینی اور جائز تقلید میں دریغ نہ کریں، اور استفادہ کمال کے
 بعد بدلت خود اس قوت و استحکام کو پہونچیں کہ دنیا کے سامنے پھر سلسلہ قدرت و
 زہل دی کی تازہ مثالیں پیدا کر دیں۔

دنیائی تاریخ تمدن سے ثابت ہے کہ ترجمہ دور ترقی کی ابتدائی کڑی ہے جس کے ذریعہ ہر ملک و قوم نے شاہراہ ترقی کی طرف قدم بڑایا۔ کچھ جب خود اپنے پیروں کھڑا نہیں ہو سکتا تو پہلے دوسروں کا سہارا ڈھونڈتا ہے اور پھر ترقی قوت و استحکام حاصل کر کے اپنے بل چلنے کے قابل ہو جاتا ہے + یہ خود داری و خود اعتمادی ترقی کی آخری منزل ہے + تاریخ جراحیات کے متعلق آپ گزشتہ صفحہ میں دیکھ چکے ہیں، کس طرح اہل یورپ نے تراجم کے ذریعے دوسرے ملکوں اور اجنبی قوموں سے ابتداء اکتساب کمال کیا، یونانی علوم میں ماقبل تاریخ ہند و علم و فلسفہ کی صاف جہلک موجود تھی۔ خلفائے بغداد و اندلس نے بھی یونانی و ایرانی ذرائع سے مستفید ہو کر اسی طرح اسلامی دور علم کی پنا ڈالی + پھر جب تراجم و تقاسیم کی مدد سے افراد قوم میں ترقی کا مادہ سرایت لگتا تو انہیں اقوام نے، جو ابتداءً جنس مستعار کے خدشہ میں تھے، اپنے خود ساختہ ترقیات اور ذاتی کمالات کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ بعینہ ہی تاریخی اصول موجودہ زمانہ میں طب یونانی کے احیاء و ارتقاء میں کار فرما ہے + جو قوم اپنا دامن نقد علم سے یکسر خالی کر چکی ہو اوس کے لیے تقاضائے فطرت اور مصلحت وقت یہی ہے کہ پہلے دیگر ترقی یافتہ اقوام کے علمی ذخائر سے اکتساب کمال کرے + اور نظر غائر سے دیکھا جائے تو علم و کمال، فضل و ہنر کسی ایک قوم کی واحد ملکیت نہیں، بلکہ جیسا بنی آدم کی مشترک میراث ہے، بھٹسے

”بنی آدم اعضاء یک دیگر اند“

اس نقطہ خیال سے دیکھا جائے تو تراجم و تالیفات کے ذریعہ علوم قدیمہ کے احیاء و تجدید کی سعی ناجائز و نامناسب نہیں، بلکہ ایک مستحسن و ضروری قومی فرض ہے۔ اگر ساتھ ہی اسکا بخوبی احساس ہونا چاہیے کہ ہم ان ابتدائی مرحلوں پر ہی مطمئن و قانع ہو کر نہ بیٹھیں۔ بلکہ ہماری قومی حیات کا صحیح منتہا سے خیال یہ ہونا چاہیے کہ ہماری ذاتی تصنیفات بالآخر اس پایہ کمال کو پہنچ جائیں کہ اقوام عالم اُنکے ذریعہ سے ہمارے علوم و فنون سے مستفید ہو سکیں + میں امید ہے کہ کتاب الجراحۃ کے صلائے عام سے مستفید ہو کر انہیں من اسی منتہا سے خیال کی طرف بڑھیں گے +

ترجمہ اجنبی زبان کی عکسی تصویر ہے جس کے ذریعہ سے ہم غیر انڈس اجنبی خیالات کا اثر معکوس اپنے دماغ پر قائم کر سکتے ہیں۔ پس ضروری ہے کہ ہم اجنبی الفاظ کے مقابلہ و موازنہ صحیح الفاظ اپنی زبان میں پیش کر سکیں، اور اگر اس قسم کے مترادفات موجود نہ ہوں تو نئے نئے الفاظ ایجاد و وضع کر کے اونے تہیل مطلب کا سامان پیدا کریں۔ مگر ہر قسمی سے زبان اردو جدید علمی و تکنیکی مضامین و الفاظ سے بہت کم آشنا ہے۔ ہر زبان کا ادب اپنے مخصوص ملک تمدن کا بوجہ ہے، اسی لحاظ سے اردو بھی ہمارے گزشتہ اور موجودہ خیالات اور طرز معاشرت و مشاغل کا چرہ ہے جو خیالات ہمارے دل و دماغ پر حاوی و جاری ہے وہی الفاظ کی صورت میں ہماری زبان پر آگئے اور کثرت استعمال سے داخل زبان ہو گئے۔ اس نظر سے دیکھتے ہوئے اردو کی کم یاگی چنداں تعجب خیز اور غیر معمولی نہیں، بلکہ اس فزائید و فضل نے نہایت قلیل عرصہ میں حیرت انگیز ترقی حاصل کر لی۔ فطرتاً اس کی ترکیب و ساخت میں ایسی چمک اور لوح ہے کہ آئندہ اس کے علمی کارناموں کا میدان بہت وسیع اور حوصلہ افزا نظر آ رہا ہے، جیسا کہ آجکل کی نئی اردو تالیفات سے بخوبی ظاہر ہے۔

ترقی اردو میں جدید علمی اصطلاحات کی ترکیب نوعیت کا مسئلہ زبردست اہمیت رکھتا ہے۔ ملک کی ایک بااثر علمی جماعت اس بات پر متفق ہے کہ اس قسم کی اصطلاحات رجن میں طبی اور جراحی اصطلاحات بھی شامل ہیں کے اخذ و وضع کے لیے ہیں زیادہ تر عربی و فارسی رسا و رواۃ سے جنہیں ترکیب اشتقاق کی بہت آسانیاں ہیں، مستفیض ہونا چاہئے، کیونکہ ان کے وسیع ذخائر ہمارے لیے نہایت سہل الحصول ہیں اور خود ہماری زبان کی ترکیب و ساخت اس کی متقاضی ہے، نیز اس اسلوب عمل کے باعث ہم کو یہ و اجنبی الفاظ کی غیر مستحسن تعریب سے بچ سکتے ہیں۔ یہی طریقہ جمہور سلف نے طب و فلسفہ کے یونانی الفاظ کے لیے اختیار کیا تھا، اگرچہ شاید مثالوں میں تعریب کو وہ بھی ضرورتاً جائز سمجھتے تھے، مگر ہندوستان کے اہل علم کی ایک دوسری فاضل جماعت اس پر مصر ہے کہ اب عربی و فارسی کے مزید الفاظ سے اردو کو گراں بار و ثقیل کرنا مناسب نہیں بلکہ جس طرح یورپ کے مختلف ملک نے یونانی، رومی، لاطینی الفاظ کو، اہلی صورت میں یا بہ ادنیٰ تغیر لہنی اپنی زبانوں میں داخل کر لیا اور سیر طرح بہرہی آسانی انگریزی

وڈاکٹری الفاظ کے تلفظ کو بگاڑ کر اردو میں داخل کر لیں + عصر جدید کے اکثر مصری علماء نے یہی آخری طریقہ اختیار کیا ہے + ان دونوں گروہوں کے دلائل کے تشریح و محاکمہ کی یہاں گنجائش نہیں۔ قبولیت عام کی ٹکسال پر دونوں قسم کے الفاظ کی پرکھ ہو کر پسندیدہ اور غیر پسندیدہ کی تیسرے بالآخر ضرور ہو جائے گی، اور سچ پوچھتے تو یہی صحیح معیار زبان ہے، بمصدق غلطاً لغام فصیحاً +

معرب الفاظ اور عربی مأخذ کے جدید اصطلاحات دونوں دنیا کے اردو کے سامنے ہیں، اب رواج و کثرت استعمال مقبولیت کا سہرا ان میں سے جس کے سر باندھے وہی فصیح ہے + اسی بنا پر ہم یہ کہنے کی جرأت کرتے ہیں کہ اصطلاحات کے معاملہ میں سخت قواعد اور اپنی حدود کی پابندی عامہ نہیں کی جاسکتی، نہ کوئی ایک سلسلہ دستور العمل یا واحد مشرب، زبان آفرینی کا ٹھیکہ دار ہو سکتا ہے +

لہذا یہاں ہم کتاب الجراحت کی علمی اصطلاحات پر محض ایک سرسری نظر ڈالنے پر اکتفا کرتے ہیں + علامہ بہاری نے رجاس سے پہلے نشر شدہ و منافع الاعضاء کی مصطلحات کے متعلق اپنی علمی قابلیت، جدت و ذہانت کا کافی ثبوت دیکھ لیا + مصطلحات جراحہ کا درجہ ڈاکٹر بہاری نے نہایت خوبی و خوش اسلوبی سے طے کیا ہے + غیر مانوس لاطینی و کردہ یونانی الفاظ کے لئے بھی آپ نے نہایت سادہ اور شیریں مترادفات ایجاد و وضع کیے ہیں، جو عمداً اُشْرَکاً لَکْسِیْمَہ عربی مصادر سے مشتق و ماخوذ ہیں + ذیل میں کتاب الجراحت کی چند اصطلاحات نمونہ درج کی جاتی ہیں جنکے ساتھ ان کے مقابل ڈاکٹری الفاظ اور وہ معرب مصطلحات بھی مندرج ہیں جن کی تعریف علامہ مصری و داعی کاوش کا نتیجہ ہے + نکتہ شناس نظریہ انھیں غور و دہن کے ساتھ ملاحظہ فرما کر خود فیصلہ کریں گی کہ اردو زبان میں مصری معربات بہتر ہیں یا علامہ بہاری کے فرزند ان معنوی۔

ڈاکٹری الفاظ	مصری مترادفات	کتاب الجراحت کے اصطلاحات
بیکٹیریا لوجی	بکٹیریا لوجیا	علم الجراثیم
مائی گرووز	سکروبات	اجساد و قسیتہ - جراثیم
بیکٹیریا	بکٹیریا	جراثیم

کتاب البحر احسن کے اصطلاحات	مصری مترادفات	ڈاکٹری الفاظ
حضرت نبائی	کلورفیل	کلوروفیل
نشائیہ اخیل	سیلونوز	سیلونوز
مادہ ہلامیہ	مادہ جیلاتینہ	جیلاتین سبسٹنس
کتلہ زجہ	زوجلہ	زوجلہ
کرویہ ذات الریہ	نیوکوک	نیوکوکس
عصی	باشنس	بیبی نس
کراڑ کمر قدیم طب	تیناوس	ٹے ٹے نس
محلول قطراتی	محلول فینک	کاربوک لوشن
خناق کبی	دفتریہ	ڈفٹیریہ
حمی مہویہ	تیفود	ٹامسے فائڈ
انفٹ العنقرہ	انفلونزا	انفلونزا
حرکت طفریہ	حرکت برونیہ	برائوین مومنٹ
جراثیم کرویہ	بکٹیریا کویہ	کاکائی
کرویات دقیقہ	میکروکوک	مائی کروکوکس
کرویات عقیقہ	اسٹیفلوکوک	اسٹیفلوکوکس
کرویات فنیسیہ	دیبلوکوک	ڈیپلوکوکس
کرویات رابعیہ	تتراکوک	ٹٹراکاکائی
عقیدیہ	اسٹریٹوکوک	اسٹریٹوکاکائی
مواد اولیہ	مواد نتر و جینیہ	پروٹید
شورجین	نتر و جین	ناٹروجن
نتر و جین	سائرونیٹ	سیپر و فائٹ
جراثیم عقیقہ	جوڈوکوک	گائوکاکس
کرویہ سوزاک	اکسجین	آکسیجن
حمضین	افزانات متابولیکیہ	مٹابولک پروڈکٹس
افزانات استیالیہ		

ڈاکٹری اصطلاح	مصری مترادفات	کتاب البحر احسن کے اصطلاحات
انڈول	اندول	نیل بو
ٹاروسین	تیروسین	جینین
ڈایاسٹیز	دایاستیز	فصلین
انورٹیز	انقرتیز	عکسین
رے نین	رین	کلوین
رٹپ سین	ترپ سین	بانقراسین
جیلٹین	جلائین	بلائین
ٹومین	تومین	جیفین
ہاکسین	توکسین	سمین
لٹف	لٹف	ماثیت و مویہ
فیکوسائی ٹوسس	فاجوسیتوسس	ہجوم مینا ہات
کنڈنسر	کونڈنسر	ہجوم جراحی
اسٹانڈ	صفیحہ میکروسکوپ	جامع النور
آپوڈین	یود	صفیحہ مجریہ
اگلوٹینین	اجلوٹینین	بنشین
پروٹوزوا	بروٹوزوا	التصاقین
ٹری پانوزم	تربیانوم	حویات
مندرجہ بالا مثالیں صرف کتاب کے محض ابتدائی حصہ سے بلا نظر انتخاب لے لی گئی ہیں۔ جن میں مولف کی قربت بیان اور سلاست زبان کا قدرے اندازہ ہوگا۔ ساری کتابی قسم کی موضوعات سے بھری پڑی ہے، جنہر نہایت معمولی لیاقت کا طالب علم نہایت آسانی سے عبور حاصل کر سکتا ہے۔ غور سے دیکھئے تو علمی اصطلاحات ہر زبان میں اس کے معمولی آدمی کی نسبت غیر مانوس اور ابتداءً اجنبی ہی لگتی ہیں، اور نہ صرف غیر اقوام کو بلکہ اسی زبان کے معمولی تعلیم یافتہ طبقہ کو بھی۔ مثال کے طور پر ڈاکٹری کے تشریحی الفاظ کو لیجئے، ایک مغربی نژاد انگریز بی۔ اے یا ایم۔ اے جو ڈاکٹری سے واقف ہے، ان الفاظ کو مثیل صحیح تلفظ		

کے ساتھ اذکر لیکھا، پھر اذکر کے معنی سمجھنا تو دُور کی بات ہے + اور معمولی بی سلفے کو بھی جانے دیجئے، خود سندا یافتہ ڈاکٹروں کو لیجئے، یونانی و رومی الفاظ کو جو ڈاکٹری میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ یہ لوگ بھی بشکل صحیح ادا کر سکتے ہیں، اور ایسے تو شاہی لینے جو ہر اصطلاح کے لغوی معنی اور اذکر کے ماخذ سے واقف ہوں +

مگر بائیمہ کثرت استعمال سے یہ اصطلاحات اب عام طور پر زبانوں پر جاری ہیں اور اذکر کے اصطلاحی معنی سے ہر ڈاکٹر واقف ہے + اسی طرح جب کتاب الجراحت کی اصطلاحات تعلیم طبی کے بعد کثرت استعمال در دراج عام کے ذریعہ سے قطعاً قبولیت حاصل کر لیں گی تو یہی الفاظ جو آج اذکر معلوم ہوتے ہیں، عام فہم اور آسان ہو چکے ہوں گے اور اذکر کے اصطلاحی معنوں سے ہر طبیب واقف ہوگا + ملک اور خاصکر طبقہ اطباء کو کتاب الجراحت کے فاضل مؤلف کا نہایت ممنون ہونا چاہئے کہ اذکر کی دماغی کاوش سے ضروری اصطلاحات جراحیہ کا نہایت اہم اور شکل مرحلہ یوں حسن خستام کو پہنچا اور علم الجراحت پر ایک مستند کتاب طیار ہو گئی + یہ موضوع متاخرین طب کے لیے ایک طلسم ہو شراب تھا، جس کی عقدہ کشائی کے لئے اطباء کو علامہ کبیر الدین کی کوشش سے یہ لوح طلسم باقہ آگئی + جناب مؤلف اور اذکر کے ساتھ طبیبہ کا بلج دھلی کے ارکان اور خصوصاً صاحب پرنسپل اس حسن کارگزاری پر جس قدر ناز کریں بجا ہے، مگر قوم دانائے فن کے ذمہ جو ایک بڑی ذمہ داری ہے وہی نہیں کہ اس قابل قدر مجبوعہ سے دل کھو کر مستفید ہوں، بلکہ سب سے اہم فرض یہ ہے کہ اس نثر میں مثال کی تقلید میں افن جراحہ کے وسیع و خصوصاً مضامین پر جلد مسلسل مستعملات و تصانیف پیش کریں اور استفادہ کمال کی انتہائی سرحد پر پہنچکر ایسی نمایاں فنی ترقی حاصل کریں جس سے ساری دسراہلوی کی یاد تازہ ہو جائے +

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْاَلْبَانُ

خادم فن

محمد عثمان خاں

بڑوانی - ۱۹ جولائی ۱۹۲۳ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

فَنِّ جَرَّاحَتُ

بَابُ أَوَّلُ

عِلْمُ الْجَرَّائِمِ - عَدْوِيَّ - مَنَاعَةٍ

جراثیم کے معلومات حاصل کرنے سے جراح کو دو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔
 ۱۱۔ اکثر امراض جراحیہ رعلی الخصوص وہ امراض جو درم و الہتساب سے تعلق رکھتے
 ہیں (جراثیم کے اثر سے پیدا ہوتے ہیں) (۱۲) چونکہ یہ جراثیم ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں
 اس لئے اگر مناسب احتیاط نہ کی جائے۔ تو بیرونی زخموں میں لازمی طور پر
 داخل ہو جاتے ہیں۔ خواہ یہ زخم خود پیدا ہوئے ہوں۔ یا کسی عمل جراحی کے
 لیے پیدا کیے گئے ہوں۔ اور ان جراثیم کے داخل ہو جانے سے زخم کے بھراؤ
 اور اس کے انتہام میں رکاوٹ واقع ہو جاتی ہے۔ یا خطرناک عوارض پیدا
 ہو جاتے ہیں۔ اس لئے جراح کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ جراثیم کے
 مہتمم بالشان انتہام سے آگاہ ہو۔ ان کے عادات۔ ان کے طور زندگی اور ان کے
 طرق توزیع و انقسام کے عام معلومات رکھتا ہو۔ وہ جانتا ہو کہ جسم انسانی میں

۳۵ مَنَاعَةٍ - امیدی فی۔

۳۶ انتہام - بیلنگ۔

۳۷ علم الجراثیم - بیکٹریالوجی

۳۸ عَدْوِيَّ - انفکاش

یہ کس طرح مرض کے آثار پیدا کرتے ہیں۔ اور ان کے نقص و تماش اور تحقیق ثبوت کے وسائل و ذرائع کیا ہیں۔ جن سے ان کا وجود ثابت ہو۔

ضرب زخم کے موجودہ طرق علاج کی ہنسیا و علم جراثیم ہی بڑائی گئی ہے۔ اس لئے علم جراثیم کے بغیر ان طرق کا صحیح طور پر استعمال کرنا نہایت دشوار ہے علاوہ ازیں بعض اوقات تشخیص امراض میں جراثیم کے امتحان سے نہایت مدد ملتی ہے اور نہایت اہم معلومات اس سے حاصل ہو جاتے ہیں۔

جراثیم (فطر مشقوق) ادنیٰ رتبہ کے نباتات کی ایک صنف ہیں۔ جن کی متیں اگرچہ ہزاروں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن طبی طور پر یا جراحی کے لحاظ سے چند ہی اہم نباتات اور ضروری ہیں۔ جراثیم کی تعریف بعض لوگوں نے اس طور پر کی ہے۔ کہ وہ نہایت باریک اور چھوٹے نباتات ہیں۔ جو محض ایک خانہ (خلیہ) سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جن کی افزائش نسل معمولی انقسام (انقسام بیض) سے بعض قسموں میں تا کوئین بذریعہ اندرون خلیہ (یعنی خانہ کے اندر تخم اور بیج کے بننے سے حاصل ہوتی ہے یہ تخم ایک خانہ میں ایک سے زیادہ نہیں بنتے ہیں۔ ان جسمانی کیسوں میں سوائے اہانت درو میں دار بند یوں کے اور کسی قسم کا کوئی عضو نہیں ہوتا۔ نیز ان میں کسی قسم کا نباتی رنگ (خضرت نباتیہ) نہیں پایا جاتا جراثیم کی ساخت نہایت ہی بیض اور سادہ ہوتی ہے۔ یہ ایک نہایت رقیق اور نازک ہوا دار مادہ نقاشیہ شکل یا اس کے مانند کسی دوسرے مادہ سے مرکب ہوتی ہے (کئی جراثیم

۱۔ جراثیم۔ بیکٹریا

۲۔ فطر مشقوق۔ شیر و مانی شیر۔

۳۔ انقسام بیض۔ سپیل فطر۔

۴۔ تکوین بذریعہ اندرون خلیہ۔

۵۔ اجاب۔ فلاکلا۔

۶۔ خضرت نباتیہ۔ کلہ و ذیل

۷۔ جدار خلیہ

۸۔ دیمارغانہ

۹۔ سل

۱۰۔ سلور



(۱) کرویات عقودیہ پیپ کے اندر




(۲) کرویات عقودیہ پیپ کے اندر




(۳) کرویات سوزاک (کرویات نہریہ)



(۴) کرویات اتاریتھوک میں



(۵) حزمہ جرثومیہ ایک کاشت سے



(۶) طزونیات ذہجہ رشتہ سے مع چند عصبیکے

جس کے اندر مادہ حیات پایا جاتا ہے۔ مادہ حیات کے اندر ایک دو بٹلے اور چند بھولہ حقیقت حیاتیات (روانے) ہوتے ہیں۔ ویلدار کیسے سے باہر کبھی ہلائی مادہ کا غلاف ہوتا ہے جو کیسہ ہائے جراثیم کو باہم سادہ طور پر جوڑ دیتا ہے جب اس قسم کے غلاف نمایاں طور پر نمودار ہوتے ہیں۔ تو گاہے بہت سے جراثیم مادہ ہلائیہ کے ایک ٹکڑے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جسکو کتلا لہجہ کہتے ہیں اس ہلائی غلاف کی پیدائش تخفیف امراض میں نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ چنانچہ ذائقہ کے جراثیم کو یہ جب خون یا مرض کے رطوبات و اخراجات میں پائے جاتے ہیں۔ تو ان میں یہ غلاف نہایت نمایاں ہوتے ہیں۔ اور اسی ذریعہ سے یہ اپنے مشاؤنگ جراثیم سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔

اہاب۔ جراثیم کے اہاب یا مٹھی روئی حقیقت میں مادہ حیات کے باریک باریک بے بے بڑا فزین۔ جو ان جراثیم میں پائے جاتے ہیں۔ جن میں ذاتی حرکت ہوتی ہے۔ یہ گاہے طول میں بہت بڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ نہایت باریک ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ اُس وقت تک نظر نہیں آسکتے۔ جب تک جراثیم کو چند طریقوں سے رنگ نہیں دیا جاتا ہے۔ ان اہاب کی تعداد تخفیف امراض میں نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ چنانچہ حمی مطبقہ کے جراثیم عسویہ علی العموم بارہ سے میں اہاب رکھتے ہیں۔ برعکس اس کے عسویہ قولونیہ میں جو حمی مذکورہ کے جراثیم سے مشابہ ہوتے ہیں

۱۵ مادہ حیات۔ ہر ڈیپلازم۔	۱۵ اخراجات۔ اگروڈیٹس۔
۱۶ بیکٹریا۔ ویکورن۔	۱۶ اہاب۔ فٹاکلا۔
۱۷ حیاتیات۔ گرے نیولز۔	۱۷ حرکت ذاتیہ۔ اپان شے خنثی بی بی۔
۱۸ غلاف ہلائی۔ جیلٹین کیپ ٹول	۱۸ عسویہ حمی مطبقہ۔ ٹائیفائیڈ میس
۱۹ کتلا لہجہ۔ ڈوگلیا۔	۱۹ عسویہ قولونیہ۔ جیسی کالانی۔
۲۰ کروہ ذات الریہ۔ نیوکاس۔	

اہد اب تین سے چھ تک ہوتے ہیں۔ جو جراثیم اہد اب سے خالی ہوتے ہیں۔ ان میں گاہے ایک خاص قسم کی حرکت (طفروہ یا قفرہ) پائی جاتی ہے۔ جسکو غسلی سے ذاتی حرکت خیال کر لیا جاتا ہے۔

طفروہ یا حرکت طفریہ وہ حرکت ہے۔ جو کسی شے کے سفوف کو کسی رقیق سیال کے اندر گھاسنے کے بعد اس کے ذرات کے اوپر نیچے آنے اور لڑھکے میں نقل و حرکت کرنے کی صورت میں مشاہدہ کی جاتی ہے۔ اس حرکت میں صرف ذرات کی حرکت دکھائی جاتی ہے مگر جسم سیال مجموعی طور پر غیر متحرک رہتا ہے۔ اور اپنی جگہ نہیں بدلتا۔ اندرون سیال ذرات کی نقل و حرکت ایک لہر یا زلزلہ کی صورت پیدا کر دیتی ہے۔

حرکت ذاتیہ وہ حرکت ہے۔ جو کسی جسم میں خود و خود پیداوار اور بلا واسطہ غیر سے ظاہر ہو۔ اور جس سے وہ جسم ایک مقام سے دوسرے مقام تک انتقال کرے یا جسم کے کسی حصے کو گھاسنے۔

پہلی صورت میں صرف ذرات کی حرکت ہوتی ہے۔ اور نقل مکان نہیں ہوتا نہ وضع جسم میں تبدیلی ہوتی ہے۔ صورت ثانی میں پورے جسم یا حصہ جسم (عضو) کی حرکت مجموعی طور پر ہو کر نقل مکان ہوتا ہے۔ اور وضع جسمی بدل سکتی ہے افزائش نسل۔ جراثیم کی افزائش نسل کے طرق نہایت بسیط اور سادہ ہیں۔ آلات تولید و تناسل کی کوئی ملامت ان میں نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ

۱۱) انقسام بسیط پیدائش جراثیم کی پہلی صورت ہے۔ جس میں جراثیم کا ایک خانہ ایک باریک بھلی کے ذریعہ دو خانوں میں منقسم ہو جاتا ہے۔ اور یہ دونوں خانے بڑھ کر اور ترقی پا کر نچتہ جراثیم بن جاتے ہیں۔ یہ دونوں نئے جراثیم

۱۲) انقسام پیچیدہ پیدائش

۱۳) حرکت طفریہ۔ براؤن مووٹ

علی العموم ایک دوسرے سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ لیکن گاہے دووں ایک ہی غلاف میں جکھا اور ذکر آچکا ہے بند رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جراثیم کے مختلف گروہ ہیں۔ اور ہر نوع اپنی خصوصیت سے ممتاز ہے۔ اور یہ فعل نفیہ گاہے اس قدر تیز ہوتا ہے کہ اگر کسی مناسب مادہ میں ایک یا دو جراثیم موجود ہوں تو چند گھنٹوں میں اس کے اندر بے شمار جراثیم بن سکتے ہیں۔

(۲) کمون بذر جو جراثیم کی پیدائش کا دوسرا طریقہ ہے۔ یہ پہلے طریقہ کی نسبت کسی قدر پیچیدہ ہے۔ اور یہ ان جراثیم کی پیدائش میں ہوتا ہے جو ڈیڑھے (۱۵) منٹ (۱۵) منٹ) ہوتے ہیں۔ اور جنکو عصی کہا جاتا ہے۔ جراثیم کے بذر (تخم) گول یا بیضوی شکل کے ہوتے ہیں۔ اور خانہ جرثومیہ کی دیوار کے اندر اس طرح پیدا ہوتے ہیں کہ ایک جرثومہ کا مادہ حیات اپنے غلاف کے اندر ایک یا زیادہ حصوں میں منقسم ہو کر سکڑ جاتا ہے۔ اور ہر ایک حصہ ایک علیحدہ غلاف میں محفوظ ہوتا ہے۔ اسی کو بذر کہتے ہیں۔ بذر کے گرد ایک موٹی دیوار ہوتی ہے جس کے اندر مادہ حیات بھرا رہتا ہے۔ یہ مادہ حیات جراثیم نامیہ یا خیمہ بذر جراثیم کے مادہ حیات سے اس قدر مختلف رکھتا ہے کہ اس کے اندر پانی کی مقدار تھوڑی پائی جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے یہ مادہ ششوں کو زیادہ صحت کرتا ہے۔ جیسا کہ آنہ پھر نہیں دیکھنے سے نظر آتا ہے۔ ان داہناٹے جراثیم جن کو ہم نے ان کے تخم سے تعبیر کیا ہے ان کی شکل اور ان کے حجم سے تشخیص میں بڑی مدد ملتی ہے۔ مثلاً کزاز کے عصی میں ان کی شکل تقریباً گول ہوتی ہے۔ اور ان کا

شکل بذر - اسپور

شکل ہمبر - مانی کرہ سکرپ

شکل کزاز - ٹیٹس

شکل کمون بذر - اسپیکو فارے شش

شکل ڈیڑھے - اندر راڈس پیڈ

شکل عصی - بیسی لانی

قطر اس عصی سے بڑا ہوتا ہے جس میں یہ پیدا ہوتے ہیں۔ برعکس اس کے
 جمرہ خبیثہ کے عصی کے بذر تقریباً بیضوی ہوتے ہیں اور ان کا قطر جراثیم کے۔
 قطر کے مساوی یا ان سے کسی قدر بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان بذار کی وضع اور محل
 قیام بھی اس بائے میں کم اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ چنانچہ عصی کرازی کے بذر بالکل
 ان کے کٹاؤں میں رہتے ہیں۔ جس سے ذصول کے چوب (مقرعۃ الجبل)
 کی شکل معلوم ہوتی ہے۔ برعکس اس کے جمرہ خبیثہ کے عصی میں یہ درسیان میں
 رہتے ہیں۔ ان بذار کے متعلق یہ خیال کیا گیا ہے کہ جن طرح اعلیٰ رتبہ کے نباتات
 کے تخم اپنی نوع کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بذر بھی ایسی شکل رکھتے ہیں کہ
 غیر مناسب حالات میں جبکہ جراثیم فنا ہو جاتے ہیں۔ یہ قائم رہتے ہیں۔ اور اس
 طرح ان کی نوع قائم رہتی ہے چنانچہ یہ بمقابلہ جراثیم کے خشکی کو بہت زیادہ
 برداشت کرتے ہیں۔ اور تباہ و برباد نہیں ہوتے۔ جمرہ خبیثہ کے بذر معادل
 (تجربہ گاہوں) میں بیس سال تک رکھے گئے۔ مگر باوجود اس طول مدت کے
 نہ ان بذار سے قابلیت حیات مفقود ہوئی۔ اور نہ ان سے مدت سیمت دور
 ہوئی۔ حالانکہ جمرہ خبیثہ کے وہ جراثیم جو بذار سے غالی (جراثیم البذر) ہوتے ہیں
 اگر وہ خشکی میں رہیں تو چند ہفتے میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بذار حرارت
 کو بھی بہت زیادہ برداشت کر سکتے ہیں۔ اکثر جراثیم (جبکہ وہ تر ہوں) میں اگر
 ۹۰ درجہ سینٹی گریڈ کی حرارت پہنچائی جائے تو یہ نصف گھنٹے میں ہلاک ہو جاتے ہیں
 حالانکہ اگر ان کے پیاز کو دیر تک بخشن بھی دیا جائے تو یہ ہلاک نہیں ہوتے ہیں۔

۱۔ مدت سیمت۔ ویرولنس۔
 ۲۔ عایم البذر۔ میں پرور نہیں۔

۳۔ جمرہ خبیثہ۔ این قہ کیس۔
 ۴۔ مقرعۃ الجبل۔ دارم اسک۔
 ۵۔ شکل۔ لیووریری۔


علیٰ ہذا بذرا تان عفونت طبعی بھی شکل تمام مرتے ہیں۔ چنانچہ جبرہ خبیثہ کے بذرا
اس وقت ہلاک ہوتے ہیں جبکہ انھیں محلول قطرائی میں چند روز تک ڈال کر
چھوڑ دیا جائے جراثیم کے لئے مندرجہ ذیل عصی نامی جراثیم زیادہ اہمیت رکھتے
ہیں۔ عصی کرازی۔ عصی جبرہ خبیثہ۔ عصی اوفیما خبیثہ۔ یہ تینوں قسم کے جراثیم بذرا
پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے صرف عصی کرازیہ بدن کے اندر بذرا کی تکوین کرتا ہے
برعکس اس کے سر آجہ۔ درن۔ خناق کبھی۔ حمی متطبقہ متناقضہ۔ جذام۔ الف العنبر
رزکام وہائی (قرحہ رخوہ کے عصی نامی جراثیم بذرا سے خالی (عديم البذرا)
ہوتے ہیں۔

اقسام جراثیم۔ جراثیم کی تقسیم کی بنیاد اگرچہ ان کی اشکال و صورت پر رکھی گئی
ہے۔ لیکن ان کی بابت شکل اور سادگی کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے مختلف
اقسام کو بیان کرتے وقت ان کے اشکال کے ساتھ ان کے وہ خواص بھی
شامل کیے جاسکتے ہیں۔ جو ان کے افعال اور ان کی کاشت سے تعلق رکھتے
ہیں۔ یعنی بعض اقسام ترخض بوجہ خصوصیات شکل کے دوسرے اقسام سے
متماز ہو گئے ہیں۔ مگر بعض اقسام اگرچہ شکل میں ایک دوسرے سے متحد ہیں
مگر اپنے خصائص افعال جدار رکھتے ہیں۔ اسی طرح بعض اقسام اپنے طریقہ کاشت
کے لحاظ سے دوسروں سے الگ ہیں۔ اس وجہ سے شکل کے علاوہ تقسیم کے

۱۷۔ درن۔ ٹیوبرکل	۱۷۔ مانع عفونت۔ اینٹی سپٹک۔
۱۸۔ خناق کبھی۔ ڈیفیریٹا۔	۱۸۔ محلول قطرائی۔ کاربوہک۔ روشن۔
۱۹۔ متطبقہ متناقضہ۔ مائیفاڈ	۱۹۔ عصی کرازیہ۔ بیسیس ٹے ٹائی۔
۲۰۔ جذام۔ لپروسی۔	۲۰۔ جبرہ خبیثہ۔ این تھرس۔
۲۱۔ الف العنبر۔ انفلا انزاد۔	۲۱۔ اوفیما خبیثہ۔ بوڈی سیس سے لگائی۔
۲۲۔ قرحہ رخوہ۔ سافٹ سور۔	۲۲۔ سراج۔ گلیٹنڈرس۔

وقت ان دونوں ہاتھوں کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے۔ جراثیم کی تین بڑی قسمیں کی جاتی ہیں (۱) جراثیم کروبیہ (۲) جراثیم عصبویہ (۳) جراثیم حلدونیہ +

(افل) جراثیم کروبیہ (کروبیہ گول) یہ جراثیم بالکل یا قریب قریب گول ہوتے ہیں۔ اور یہ تمام اقسام میں زیادہ سادہ ہیں۔ ان میں سے بہت سی کم میں جن میں ادراب روئیں) پائے جاتے ہوں۔ میزان میں بدرجہہ بنتے ہیں یہ قسم اپنی اپنی خصوصیات کی وجہ سے مندرجہ ذیل اقسام میں منقسم ہے +

(۱) کرویات دقیقہ جن میں جراثیم کے گروہ کی کوئی خاص ترتیب نہ ہو۔ اسی قسم سے ایک خاص قسم رہ ہے۔ جس میں بہت سے جراثیم کروبیہ ملکر خوشہ انگور کی شکل میں جمع ہو جاتے ہیں۔ انکو کرویہ یات عنقودیدہ سدیدہ کہتے ہیں (عنقودہ خوشہ انگور + سدیدہ پیپ) 

(۲) اقسام کے بعد دو حسراٹیم ملکر دو دو کے جوڑے بنالیں۔ انھیں کرویہ یات زوجیہ کہتے ہیں (زوجہ جڑا) (۸ ۸ ۸ ۸)

(۳) باہم ملکر زنجیر کی شکل اختیار کر لیں۔ انھیں بعض لوگ کرویہ یات عقدیدہ کہتے ہیں (عقدیدہ) یہ صورت اس طرح واقع ہوتی ہے کہ جراثیم کا انقسام برابر برابر سلسلہ وار ایک دوسرے کے متوازی ہوتا چلا جاتا ہے +

(۴) گسے ایسا ہوتا ہے۔ کہ ایک جراثیم متوازی طور پر دو حصوں میں

۱۰ کرویات عنقودیدہ۔ اسے فیلوکا کہتی۔

۱۰ کرویات عنقودیدہ۔ اسے فیلوکا کہتی۔

۱۰ کرویات زوجیہ۔ اسے ڈیوکا کہتی۔

۱۰ کرویات عقدیدہ۔ اسے سٹریٹوکا کہتی۔

۱۰ جراثیم کروبیہ۔ کا کائی۔

۱۰ جراثیم عصبویہ۔ جیسی لانی۔

۱۰ جراثیم حلدونیہ۔ اسپلا۔

۱۰ کرویات دقیقہ۔ مانی کروکا کائی

منقسم ہو جاتا ہے پھر یہ دونوں اس طور پر منقسم ہوتے ہیں کہ پہلی متوازی سطح سے خط مستقیم کی جانب تقسیم ہوتی ہے۔ اور ایک مربع اس طرح بن جاتا ہے کہ چاروں جراثیم مربع کے چاروں کونوں پر رہتے ہیں۔ ان کو کسٹیلیات مربعہ اعیہ کہتے ہیں (درباعیہ چاروالے) (۳۸)

(۵) جراثیم تین مرتبہ تین جگہ برابر برابر اس طرح منقسم ہوں کہ یہ آٹھ جراثیم اس مکعب کے گرد محیط ہوں۔ یہ نئے جراثیم چونکہ ایک دوسرے سے پورے طور پر الگ الگ نہیں ہوتے ہیں۔ اس لئے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ گویا ردنی کی گانٹھیں ہیں جو تین جگہ باندھی گئی ہیں ان کو حزمۃ کہا جاتا ہے۔ یہ جراثیم علی العموم دوبارہ منقسم ہو کر مکعب مکوٹے بنا لیتے ہیں۔

(۳۵) جراثیم عصبویہ (عصبی) ان جراثیم کی شکلیں عصبی یعنی ڈنڈوں کے مانند ہوتی ہے۔ ان کا قطر طولی قطر عرضی سے بڑا ہوتا ہے۔ اور یہ علی العموم سیدے سیدے ہوتے ہیں۔ لیکن گاہے کسی قدر خفیدہ بھی ہوتے ہیں۔ اس وقت ان کو عصا دادیہ کہتے ہیں۔ اس قسم کے جراثیم میں علی العموم ہڈ بننے ہیں۔ اور علی العموم ان میں اہراب بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان میں ذاتی حرکت بھی ہوتی ہے۔ جراثیم کرویہ کی طرح اس کی بہت سی قسمیں نہیں ہیں۔ لیکن چند اچھلائی نام بعض خصوصیات کی وجہ سے ضرور بولے جاتے ہیں۔ مثلاً اگر یہ زنجیروں کی شکل میں ہوں تو ان کو عصبی عقلیہ کہتے ہیں۔ اور جب یہ چھوٹے چھوٹے عصبی میں منقسم ہونے سے پہلے بے تاگوں کے مانند ہوتے ہیں۔ تو ان کو عصبی خفطیہ کہتے ہیں۔

عصبی عصبیہ۔ اسٹرپٹومیسیس

عصبی خفطیہ۔ لپٹوٹرکس۔

عصبی کرویات رباعیہ۔ فٹراکاکائی۔

عصبی حزمہ۔ سارسین۔

عصبی عصا دادیہ۔ کابجے سی لائی۔

(سوم) جراثیم حلزونیه (حلزون گھونگھ) وہ جراثیم ہیں جو ہل میں بے بسے بے ہدار عصی (ڈنڈے) کی شکل رکھتے ہیں۔ اور تین جانب پہنچ کھاتے ہیں انہی میں سے بعض بڑے بڑے اور بے بسے جراثیم کئی بل کھا کر چیکپشن (پریم) کی طرح ہر دار و بدار ہو جاتے ہیں۔ ان کی بعض قسمیں چھوٹی اور کم لمبی بھی ہوتی ہیں جو کم کھاتی ہیں۔ ان کو مشر ٹیلیہ کہتے ہیں۔ اور جراثیم حلزونیه سے علی العموم بے بسے جراثیم مراد ہوتے ہیں۔ جراثیم حلزونیه کی اکثر قسمیں فن جراثیم کے لئے کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ لیکن اس قسم میں امراض پیدا کرنے والے جراثیم صرف دو زیادہ مشہور ہیں شرابیہ ہیضہ اسپیڈر اسیویہ۔ ایشیائی اور حلزونیه سختی راجعہ۔ ان میں سے آخری قسم کو اب ایک قسم کا ادنیٰ تہہ کا جو ان خیال کیا جاتا ہے۔ یعنی ان کو جراثیم سے الگ خیال کرتے ہیں۔

احوال زندگی اگر جراثیم بحفاظت افعال حیات کے دیکھے جائیں۔ تو یہ ان بنات سے مشابہت رکھتے ہیں۔ جو نباتی رنگ سے خالی ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کی طرح جراثیم بھی اس امر پر قادر نہیں ہوتے ہیں کہ آفتاب کی روشنی میں بسیط مواد سے مواد اولیہ (مواد شورجینیہ) پیدا کریں۔ اس لئے ان کی پرورش کے لئے اس امر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہ انھیں شورجین عضوی (شورجین مرکب) نباتی یا حیوانی مادوں سے حاصل ہوں۔ اس جہت سے جراثیم کی دو قسمیں کی جاتی ہیں (۱) جراثیم طفیلیہ (۲) جراثیم عفونہ۔

۱۔ شرابیہ۔ ویریو۔	۵۔ مواد اولیہ { پر وٹید
۲۔ شرابیہ ہیضہ۔ اسپیدیو۔ ویریو۔ کارائی۔ ایشیائی	۶۔ مواد لحمہ {
۳۔ جی راجہ۔ ری لپ۔ سنگ۔ ہند۔	۷۔ مواد شورجینیہ۔ تانیٹر و جینس۔ میٹرل۔
۴۔ جو ان ادنیٰ { پر وٹوزون۔	۸۔ شورجین۔ تانیٹر و جین۔ آرگینک۔

جراثیم طفیلیہ وہ کہلاتے ہیں جو صرف زندہ حیوان یا زندہ نبات سے تغذیہ حاصل کرتے ہیں۔ اور

جراثیم عفونہ (بَنَتُ الْعَفْوَنت) وہ کہلاتے ہیں جو اس کی قدرت نہیں رکھتے

اور صرف مردہ مواد پر اپنی زندگی رکھتے ہیں۔ پہلے کی مثال جذام کے جراثیم حصویہ ہیں۔ جو اس وقت تک معلومات کی بنا پر طفیلی محض ہیں۔ بایں معنی کہ یہ صرف زندہ ساختوں پر زندہ رہتے ہیں اور ان کی کاشت جسم سے باہر ناممکن ہے۔ مگر جراثیم

سفند اختیار شدہ کی اصطلاح ان جراثیم کے لئے بولی جاتی ہے۔ جن میں نفیٰ مذکورہ اقسام کی صفتیں جمع ہوں۔ وہ زندہ ساختوں سے بھی تغذیہ حاصل کرتے ہوں اور مردہ مواد سے بھی مناسب حالات میں غذا لیکر نمونہ ہو سکتے ہوں۔ انکی

مثال سوزاک کے جراثیم کو یہ ہیں۔ جو زندہ غشاء مخاطی میں تو سرعیت سے پھیلتے ہیں۔ اور مردہ مواد میں بھی شستی کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ برعکس اس کے

جراثیم طفیلیہ اختیار شدہ کی اصطلاح ان جراثیم پر بولی جاتی ہے جو مردہ مواد میں اچھی طرح بڑھ سکتے ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی جراثیم طفیلیہ

کی طرح زندہ ساختوں میں زندگی بسر کر سکتے ہوں۔ یہ بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہئے۔ کہ جراثیم طفیلیہ اور جراثیم مرضیہ کی دونوں اصطلاحیں ایک دوسرے

کی مراد نہیں ہیں۔ چنانچہ جراثیم مرضیہ وہ کہلاتے ہیں۔ جو امراض پیدا کر سکیں۔ اور احداث مرض کہی اس طرح بھی ہو جائے کہ جراثیم زندہ ساختوں کے

۱۔ جراثیم طفیلیہ۔ پیراسائٹز۔	۲۔ جراثیم عفونہ { سپرو فائٹز
۳۔ جراثیم طفیلیہ اختیاریہ۔ نکلے ٹوپیر سائٹز	بَنَتُ الْعَفْوَنت
۴۔ طفیلیہ۔ پیراسائٹک۔	۵۔ عصا جذام۔ لپروسی تریکس۔
۶۔ مرضیہ۔ پیتھوجینک۔	۷۔ جراثیم عفونہ اختیاریہ۔ نکلے ٹوپیر فائٹز

اندر قطعاً داخل نہ ہوں۔ چنانچہ جب تعفن پیدا کرنے والے جراثیم رجڑاٹیم غفیفہ خون کے لوتھڑے میں رحم کے اندر بڑھ جاتے ہیں۔ تو تسنم دم پیدا کر دیتے ہیں برعکس اس کے جراثیم طفیلیہ کے لئے بھی یہ ضروری نہیں ہے۔ کہ وہ مرضی ہی ہوں اور ان سے کوئی مرض ضرور پیدا ہو۔ علی الخصوص ادنیٰ درجہ کے حیوانات میں کیونکہ علیٰ اعمام ان کے خون کے اندر جراثیم طفیلی زندگی بسر کرتے ہیں۔ مگر ان میں کسی قسم کے عوارض ظاہر نہیں ہوتے۔

جراثیم کے احوال زندگی۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ تمام جراثیم قیام حیات کے لئے جوانی اور بنائی مرکبات سے عنصر شورین اخذ کرتے ہیں۔ یعنی ان کی زندگی اور تغذیہ جسم کے لئے بطور جزو لا ینفک کے ہے۔ مگر یہ شورین کو بحالت بطات جذب نہیں کرتے۔ بلکہ عنصر شورین کے مرکبات سے تغذیہ حاصل کرتے ہیں۔ شورین کے علاوہ پانی اور چند نیکیات بھی جراثیم کی زندگی کے لئے ضروری ہیں۔ اور ان سب کے ساتھ مناسب درجہ کی حرارت جراثیم کے نشو و نما کے لئے لازمی ہے۔

حیات جراثیم کے لئے پانی کتنی ضروری چیز ہے۔ اس کا اندازہ اس امر سے ہو گا۔ کہ اگر عملیات جراحیہ کے بعد جراح سہل انگاری اور عجلت کی وجہ سے عمل کردہ حصہ جسم سے پانی اور رطوبت کے اخراج اور نکاس کا انتظام برہر کی نلیکیوں کے ذریعہ بخوبی نہ کرے اور اگر اجزاء بدن کو بخوبی جوڑ کر تمام گڑبے وغیرہ کو بند نہ کرے۔ اور اس کی اس غفلت سے معمول کے بدن میں تھوڑا سا پانی یا رطوبت باقی رہ جائے۔ تو اس حالت میں مریض کے جسم میں جراثیم بآسانی ترقی

۳ شورین { شورین جن

۱۔ جراثیم معقنہ۔ پٹری فیکٹور آرگے نرم
۲۔ تسنم دم۔ ہامی میا

پاتے رہیں گے۔ اور عمل کردہ حصے میں جتنے ٹکڑے یا خلا میں باقی ہوں گی انہیں دوبارہ سپ وریم بنتا رہیگا۔ اسی وجہ سے ناصور وغیرہ میں جی رکھ کر اخراج رطوبت کا انتظام کرنا ضروری ہے)

جوف شکم کی اندرونی جھلی صفائق (باریطون) کے عملیات میں مندرجہ بالا حقیقت بخوبی روشن ہو جاتی ہے۔ باریطون یا صفائق کی قوت جذب امتصاص رطوبات مسلم ہے۔ اور یہی قوت امتصاص بسا اوقات پردہ صفائق کو درم التہاب سے قدرتی طور پر محفوظ دما من رکھتی ہے +

عملی طور سے معادل (تجربہ گاہ) میں بار یا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ حیوانات کے جوف صفائق میں جراثیم مہینے کے محلول مواد زریعہ مقدار کثیر میں داخل کیے گئے مگر ان سے ان حیوانات میں کوئی مضر اثر نمایاں نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سیال مذکور کی مقدار کثیر کو صفائق کی قوت مصاصہ نے فوراً جذب کر لیا۔ اور جوف شکم میں کوئی رفیق آبی رطوبت باقی ہی نہیں رہی۔ جس میں جراثیم نشو و نما پا سکیں مگر رچو کہ صفائق کی قوت جذب اس کے زخمی اور کھردرے ہونے کی حالت میں تقویاً نازل ہو جاتی ہے۔ لہذا جب کبھی مندرجہ بالا عمل زخمی صفائق پر کیا جاتا ہے (تو قوت امتصاص کے معدوم ہونے کی وجہ سے) جراثیم کی افزائش و نشو و نما برابر جاری رہتی ہے۔ اور صفائق میں ہلکے قسم کا درم پیدا ہو جاتا ہے +

قیام حیات کے لئے مختلف جراثیم کے لئے مختلف درجات حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جراثیم جو اکثر امراض انسانی پیدا کرتے ہیں۔ یا جو عنانجم انسانی میں موجود رہتے ہیں بالعموم حرارت بدن (۳۷° درجہ کی حرارت) میں

علم صفائق (پری ٹیم
باریطون) پر مبنی
علم قوت امتصاص۔ انبار پر ٹپا دور۔

علم محلول مواد زریعہ۔ قلو ٹو کچھ زر
علم درم صفائق۔ پری ٹیم ٹپا دور۔

بخوبی نشو و نما پا سکتے ہیں۔ مگر جراثیم کے بہتر سے انواع مثلاً جراثیم عفونہ جو اکثر خارج از بدن انسان پائے جاتے ہیں مثلاً کرویات عفونیہ مدیدہ اور عصا قولونی (بیل) یا اس سے بھی کم درجہ کی حرارت میں بخوبی زندہ رہتے اور بڑھتے رہتے ہیں۔ بعض دیگر اقسام جو اس درجہ سے کم یا زیادہ حرارت میں قائم رہ سکتے ہیں۔ امراض انسانی میں اہمیت نہیں رکھتے ہیں کی حرارت یا سردی کے اثر سے راکھ زیادہ عرصہ تک نہ ہو تو) جراثیم بالکل ہلاک تو نہیں ہوتے مگر ان کی افزائش و نشو و نما عارضی طور پر محدود ہو جاتی ہے جراثیم اور ان کے بذریعہ ہلاکت زیادتی حرارت سے کیونکر واقع ہوتی ہے اس کا تذکرہ اوپر ہو چکا ہے۔

روشنی تقریباً تمام اقسام کے لئے مضر ہے۔ خصوصاً عصی درنی تو روشنی سے فی الفور ضائع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ شیشہ کے اندر بھی انعکاس شعاع اسکو ذرا دیر میں ہلاک کر دیتی ہے۔ لہٰذا پھیلی ہوئی روشنی ریمیں کہ دن میں ہوتی ہے قدرے دیر میں اُس پر اثر کرتی ہے۔ یہ ہلکے اثر ان جراثیم کی زراعت و خلاصت میں مائن حصّہ امیز اعلیٰ (اندر بدن شیشہ زراعت) بن جانے کی وجہ سے نمودار ہوتا ہے۔

بیشتر جراثیم کو افزائش و نشو و نما کے لئے جزئیہ یعنی حمضین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے جراثیم کو جراثیم حنّیہ کہتے ہیں نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مگر چند جراثیم جو شاذ و نادر در کیا ب ہیں۔ مثلاً عصا کزازی ایسے بھی ہیں۔ جو صرف حمضین کی غیر موجودگی ہی میں بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے حمضین کی موجودگی میں زندہ

۴۔ حمضین۔ آکسیجن۔

۵۔ ہمانیہ۔ اور مدبیز۔

۶۔ عصی کزازی۔ ٹیٹس پیس۔

۷۔ کرویات عفونیہ مدیدہ۔ اسٹیفٹوکوکس پونیس۔

۸۔ عصی درنی۔ بیسیس ٹیٹریکوسس۔

۹۔ مائن حصّہ امیز اعلیٰ۔ پراکٹو آف ہائیڈروجن۔

رہ سکتے ہیں۔ اس قسم کے جراثیم کو جراثیم لاہوائیہ کہا جاتا ہے۔ علیٰ ہذا ان جراثیم کو جو ہوا کی موجودگی میں تو نہایت اچھی طرح بڑھتے ہیں، مگر جو ہوا کی غیر موجودگی میں بھی طوفاً و کرناً زندہ رہ سکتے ہیں جراثیم غیر مٹھوائیہ اختیاریہ کے نام سے پکائے جاتے ہیں برخلاف ان کے بعض جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو ہوا کی غیر موجودگی میں تو ہشاش بشاش زندگی بسر کرتے ہیں اور نشوونما پاتے ہیں، مگر ہوا اور حصین کی موجودگی میں بدقت زندگی قائم رکھ سکتے ہیں۔ ان کو جراثیم ہوائیہ اختیاریہ کہا جاتا ہے۔

یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ جسم انسان کی خصوصیات و حالات ناوہ میں یہ عجیب مناسبت ہے کہ خالص ہوائی اور غیر ہوائی ہر دو قسم کے جراثیم ان میں بیکھر نشوونما پا سکتے ہیں۔ مزید برآں یہ کہ کھیتی غیر ہوائیہ جراثیم کو اگر ہوا کے زیر اثر رکھا جائے۔ اور ساتھ ہی ان کے قرب میں ایسے دیگر جراثیم مہیا کر دیے جائیں۔ جو ہوائیہ ہیں۔ یا حصین کے لئے کشش انجذابی کی شدید خاصیت رکھتے ہیں تو یہ غیر ہوائیہ جراثیم ان حالات میں بھی بڑھ کر نشوونما پا سکتے ہیں اسی طریق سے عصی کرازی دوسرے جراثیم کی موجودگی میں سطحی زخموں میں بھی بخوبی نشوونما پا سکتے ہیں۔

دوران افزائش میں تغیر و استحالیہ کے بعد جراثیم بعض نہایت اہم رطوبت و افزائش خارج کرتے ہیں۔ جن میں چند ضروری درج ذیل ہیں۔

(۱) تخامض و تیزاب (مثلاً لبنی تخامض و تیزاب شیر غلیظ و تخامض و تیزاب کرم)

۱۔ اخراجات استحالہ۔ مثلاً بول و منی و عرق

۲۔ حامض۔ ایسڈ

۳۔ مبنی حامض۔ ایک ملک ایسڈ۔

۴۔ غلیظ حامض۔ ایسی ملک ایسڈ

۵۔ لاہوائیہ۔ ان ایریڈیز

۶۔ غیر ہوائیہ اختیاریہ۔ نکلے ٹران ایریڈیز

۷۔ ہوائیہ اختیاریہ۔ نکلے ٹران ایریڈیز

۸۔ کشش انجذابی۔ افنی فی ٹو اہزار

زہری ماض (تیزاب مسک)

(۲) قلیات دکھاری چیزیں

(۳) ریاح و بخارات (غذات) مثلاً مائیں گبریت آمیختہ ہوا، بطلخ۔

(۴) ملوثات یعنی رنگین مواد یا رنگنے والے مواد مثلاً (۱) عطی قحیہ زر قادمیث

ہیپ کے جراثیم، ایک قسم کے سبز رنگ کی ریش کرتا ہے (۲) بعض اوقات نیلی ہیپ زخموں میں دیکھی جاتی ہے۔ وہ بھی جراثیم کے اثر سے بنتی ہے۔

(۵) مواد عطریہ (معطرات) یعنی بودار مواد۔ مثلاً نیل بو (انڈول) قطران

مصعدہ (فیئال) جبینین (ٹارڈین)

(۶) الکھول اور الکھول سے مشابہ مرکبات۔

(۷) مواد اختمار (خیرات) مثلاً فضلیں (ڈایا سٹینر) (۲) عکسین (ان وریٹر)

(۳) کلورین (رے نین) جو رطوبت معدیہ کے جوہر سے مشابہ ہوتا ہے (۴)

ایک مخصوص اور اہم خیر جو رطوبت بانقراس کے جوہر "بانقراسٹین" سے مشابہ

ہوتا ہے۔ اور محلی اور نشاستہ دار اجزاء کو مکمل اور نہض بنادیتا ہے معمولی

کرویات عنقود یہ صدیر یہ کے افزانات میں پایا جاتا ہے اور ایک حد تک متورم

و ملتبہ ساختوں کے تحلیل و جذب کرنے میں معاون ہوتا ہے اس مادہ اختمار (خیر)

۱۔ زہری ماض۔ پروٹک ایڈ

۲۔ قلیات۔ الکلیز۔

۳۔ ریاح { بخارات

۴۔ مائیں گبریت آمیختہ بلفیوٹیشڈ فائڈوجن

۵۔ ہوا۔ بطلخ۔ مارش گیس

۶۔ عطی قحیہ زر قادمیث۔ بیسیس یا یوسانس

۷۔ نیل بو۔ انڈول

۸۔ قطران مصعدہ فیئال

۹۔ جبینین۔ ٹارڈین۔

۱۰۔ الکھول۔ الکھل۔

۱۱۔ فضلیں۔ ڈایا سٹینر

۱۲۔ عکسین۔ انوریز

۱۳۔ کلورین۔ رے نین۔

۱۴۔ بانقراسٹین۔ ٹرپ سین۔

۱۵۔ کرویات عنقود یہ صدیر یہ اسٹیلو کرس

جراثیم

کی موجودگی اس طرح دریافت کی جاسکتی ہے کہ مادہ ہلما میہ (ہلماٹین) یا پنجرامیٹ
دم میں زخم سے خارج شدہ پسپ کی رطوبت کا قطرہ ڈال کر مصنوعی درجہ حرارت
کی جائے اگر اس میں یہ مخصوص خیر ہوگا تو مادہ ہلما میہ یا پنجرامیٹ منہض ہو کر
محلول ہو جائے گی +

(۸) قلوئیات حیوانیہ (جیفین) جسکو قلوئیات عفونیہ ہی کہا جاتا ہے۔
چند مخصوص اور مستقل کیمیائی ترکیب کے پنجر مرکبات سمیت ہیں جو نباتات کے
جو اہر قلوئیات سے مشابہ ہوتے ہیں) یہ زہریلے ہوتے ہیں۔ اور حدوث مرض میں
غایاں طور پر عامل ہوتے ہیں +

(۹) سمیات حقیقیہ (حقیقی سمین) یہ حالت باطنت میں حاصل نہیں ہو سکتے
ہیں۔ مگر غالباً ان کی کیمیائی ساخت بیاضلین (ایسوموز) اور مادہ پنجران (پنجران)
سے بعض خصوصیات میں مشابہ ہوتی ہے۔ یہ مواد سمیتہ اگر پککاری سے بدن کے
اندراخون میں داخل کیے جائیں۔ تو شدید سمیت پیدا کرتے ہیں۔ اور اگر یہ منہ
کی راہ کھلائے جائیں۔ تو اکثر بے ضرر ثابت ہوئے ہیں۔ ان کی کیمیائی نوعیت
و ترکیب نہایت پائیدار و غیر مستقل ہوتی ہے اور حرارت کے اثر سے یا مہضم
معدی سے فی الفور تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی اصلی ترکیب بدل جاتی
ہے۔ اسی طرح اگر انہیں محلول صورت میں رکھا جائے۔ تو بھی یہ بتدریج کبے بے ضرر

۱. سمین۔ ٹاکسین۔

۲. بیاضلین {
۳. الیوموز
۴. ڈالکین

۵. مادہ خیر۔ اعراض

۶. بے ضرر۔ انوکس

۷. ناپائدار۔ ان اسٹیل۔

۱. ہلماٹین۔ جیلاٹین۔

۲. مانیٹ۔ دم۔ ہڈیہرم

۳. جیفین۔ ٹوینس۔

۴. قلوئیات عفونیہ۔ پٹری میکروکلاٹ

۵. قلوئیات حیوانیہ۔ امیل۔ الکلاٹ۔

۶. قلوئیات کی رکھناؤ۔
۷. اہر قلوئیات

دوبلے اثر ہو جاتے ہیں +

ایک دوسرے کی بددلتا زمینیں ہیں۔ سمین خارج خلیہ۔ سمین داخل خلیہ۔
سمین خارج خلیہ دسمیت بیرون جراثیم (یعنی وہ رطوبات سمیت جو جراثیم
کے خلیہ سے باہر پیدا ہوں۔ جیسا کہ عصا کزازیہ اور عصا خناق دہانی بناتے ہیں
اس قسم کی سمیت اس رطوبت زمین جراثیم میں جمع ہو جاتی ہے جس میں یہ جراثیم
پیدا ہوتے اور بڑھتے ہیں +

سمین داخل خلیہ دسمیت درون جراثیم اس قسم کی سمیت جراثیم کے
جسم سے باہر نہیں آتی ہے۔ بلکہ پیدا ہو کر جراثیم کے اندر ہی بند رہتی ہے یعنی
طور پر اس داخلی سمیت کا خارج کرنا اگرچہ غیر ممکن ہے۔ مگر قدرتی طور پر بعض
حالات میں یہ خود بخود خارج ہو ا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر عصویات تمدن
کو لیجئے۔ اس کے افزائش و رطوبات رجحان کے جسم سے باہر آپکے ہوں)۔
تقریباً بے ضرر رہتے ہیں۔ برعکس اس کے جراثیم مذکور کے دھلے ہوئے جسم پر
رطوبت سے الگ، نہایت زہریلے ہوتے ہیں +

سمین کی تاثیر ان مواد سمیہ کا اثر حالات داخل کے اعتبار سے مختلف
اور متضاد ہوتا ہے۔ مگر علی العموم یہ بچار کا باعث ہوتے ہیں۔ بعض کا مقدم اثر
مخصوص ساخت اور مخصوص ذرات پر ہوتا ہے۔ مثلاً کزاز کے عصی نامی جراثیم
بالخصوص مرکزی نظام عصی مثلاً دماغ و نخاع کے خلیات پر اثر رکھتے ہیں۔ اسی
طرح پیپ کے جراثیم بلا تخصیص بدن کی ان تمام ساختوں پر اثر کرتے ہیں جن سے
دوستصل ہوتے ہیں +

مثلاً اثرات مرضیہ پیتھاجینل نکش۔

۱۔ سمین خارج خلیہ۔ اکثر اسیلویڈا سمین

۲۔ سمین داخل خلیہ۔ اکثر اسیلویڈا سمین۔

معمولی حالات میں سین کے نتائج و عوارض اس کی مقدار رجوع بدن میں موجود ہے۔
 پر اور حیوان اور اس کے اعضا کے احساس کی کمی و بیشی پر منحصر ہوتے ہیں۔ یعنی
 اگر سین کی مقدار زیادہ ہو یا اگر مریض اور اس کے بدن کی ساخت زیادہ نرمی اور
 ہوتو سین کا اثر بھی زیادہ شدید ہوگا۔ اسی طرح اس کے برعکس بھی قیاس کن چاہیے
 اس کی تفصیل یہ ہے کہ اولاً مثلاً اگر سین نہایت شدید ہے تو اس کی حدت سینہ
 کسی حصہ بدن کی قابلیت حیات و قوت حیوانیہ کو کلیتہً فی الفور زائل کر دے گی
 یہ پہلی صورت ہے (ثانیاً) برخلاف ازیں اگر سین کی حدت سینہ نسبتاً خفیف ہے
 تو اس حصہ بدن میں ورم حاد (التهاب حاد) پیدا کرنے کے بعد اس عضو کی
 قابلیت حیات کو منقطع کر دے گا یہ دوسری صورت ہے (ثالثاً) اگر سین کی
 حدت سینہ اس سے بھی خفیف ہے تو ساخت میں استحکام و تیز رفتاری کا باعث
 ہو کہ لمبی النجہ کو شمی النجہ میں تبدیل کر دے گا رفتاً و ترقی واقع ہو گا اور بالآخر عضو
 کی قوت حیات بھی زائل ہو جائے گی یہ تیسری صورت ہے (رابعاً) سین کے
 بعض دیگر انواع میں التهاب واقع ہونے کے بعد بتدریج النجہ میں ذرہ ذرہ
 ہلاکت نمودار ہوتی ہے۔ اور بالآخر پیپ پیدا ہو جاتی ہے (تقیقہ) یہ چوتھی
 صورت ہے (خامساً) اگر نہایت ہلکے درجہ کی سین عرصہ دراز تک مسلسل پیدا
 ہوتی ہے۔ تو اس کی تنبیہ و تحریک سے عضو کی ساخت میں بیج نشینی کی زیادتی
 ہو جاتی ہے۔ مگر یہ تحریک و تنبیہ اس درجہ خفیف اور بتدریج ہوگی کہ التهاب کی
 نسبت نہ آئے گی اور نہ اس کے علامات ظاہر ہوں گے۔

وسعت جراثیم۔ جراثیم کہاں کہاں پائے جاتے ہیں؟

۱۔ ذرہ۔ المی کیول۔
 ۲۔ بیج ایسی۔ فائبرین ٹشو۔
 ۳۔ دست۔ ڈسٹری بریٹن۔

۱۔ قوت حیات۔ وی ٹی بیٹی۔
 ۲۔ مناد شمی۔ فیٹی ڈی جنبریشن۔

فضاء ہوا میں جراثیم کی موجودگی حالات کے تغیر و تبدل کے ساتھ متغیر ہوا کرتی ہے۔ مرتفع مقامات، قلعہ کوہ اور مند کی درمیانی سطح پر جراثیم نہیں جوتے مگر گنجان آبادی اور شہروں میں بہ کثرت موجود ہوتے ہیں۔ کسی رقیق سیال میں اگر جراثیم موجود ہوں تو یہ اس کی سطح سے خارج نہیں ہوتے ہوا میں یہ اُسی وقت تک آویزاں رہتے ہیں۔ جبکہ گرد و غبار یا رطوبت کے قطرات میں یہ چپکے ہوئے ہوں۔ بہ نسبت سرد کے خشک ہوا میں زیادتی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نیز آباد مکانات میں بہ نسبت کھلی ہوا کے زیادہ ہوتے ہیں۔ محدود مقام یا بند کمرے میں جب ہوا کا زور نہ ہو۔ اور ہوا بخوبی قلم جائے تو دہاں کا گرد و غبار اور خاک دھول راود اس کے ساتھ لگے ہوئے جراثیم (بند رنج زیریں سطح پر بیٹھا اس مقام کی ہوا جراثیم سے قطعی پاک ہو جائے گی۔ تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ مار اس کے کسی کمرے میں اگر طلباء خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں اور زیادہ بات چیت اور نقل و حرکت نہ کریں۔ تو دہاں کی ہوا میں نسبتاً بہت کم جراثیم پائے جائیں گے۔ عملیات جراحی کے دوران میں سکون و خاموشی کس قدر ضروری ہے۔ اس کا اندازہ مندرجہ بالا صداقت سے کرنا چاہیے اور جراح اور اس کے معاون اسٹاٹاں کو غیر ضروری نقل و حرکت اور کثرت گفتگو سے پرہیز لازم ہے۔ اگرچہ تنفس سے خارج کردہ ہوا (ہوا شہیق) اصولاً جراثیم سے پاک ہوتی ہے۔ مگر بولنے اور کھانسنے کے افعال میں رطوبت کے خفیف ترین ذرات خارج ہوتے ہیں۔ جن میں عموماً کثیر التعداد جراثیم کی آمیزش موجود ہوتی ہے چونکہ یہ جراثیم علی العدم مولد امراض ہوتے ہیں۔ اس لیے عملیات جراحی میں مضر ثابت ہو سکتے ہیں۔

پانی میں بھی جراثیم کی موجودگی مختلف حالات میں مختلف ہوتی ہے۔

نل کے پانی میں جو عام طور پر پینے کے لئے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس میں جراثیم عام طور پر قلیل تعداد میں ہوتے ہیں۔ خصوصاً مولد امراض جراثیم کی مثال تو غالباً اس میں نہیں ہوتی ہیں۔ اس قسم کا صاف پانی سخت ضرورت کے وقت یا حادثات کے موقعوں پر زخموں کے دھونے میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مگر بہتر یہ ہے کہ ایسے پانی کو مہر آدمیہ سے یا اُبال کر جراثیم سے پاک کر لیا جائے۔

عموماً قدرتی چشموں یا دیگر ذرائع سے حاصل کردہ پانی میں مضرت رسالہ چریم کی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے۔ لہذا انسب ہے کہ زخموں یا اعمال جراثیم میں استعمال کرنے سے پہلے اسکو اتبناؤ بخوبی مطہر کر لیا جائے۔

متنی کے اندر جراثیم کی تعداد میں موجود رہتے ہیں۔ اور یہ عموماً منفرد مقامات کے اقسام کے ہوتے ہیں۔

جلد آسانی چھ گرو غبار اور کثافت و غلاطت سے آلودہ رہتی ہے اس لئے یہ دوسری سیلی چیزوں کے مانند جراثیم سے لبریز ہوتی ہے۔ ان میں سے بیشتر جراثیم جو محض اتفاقیہ طور پر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ دھونے سے دور رکھتے ہیں مگر چند ایسے بھی ہوتے ہیں۔ جو فطر تا جلد اور چمڑے میں بسیرا رکھتے ہیں اور چونکہ اندرون جلد میں زیادہ گہرائی تک جا پہنچتے ہیں۔ اس لئے ان کا علاج اور ہلاک ہونا دقت طلب ہوتا ہے +

جراثیم غذا کی نالی میں رمنہ سے لیکر مبرز تک ۱ کان کی نالی۔ جوٹ الف کے زیریں حصے۔ آنکھ کے طبقہ طحمتہ مردوں میں مچھری البول کے ابتدائی حصے میں اور عورتوں میں فرج کے اندر موجود رہتے ہیں۔ عموماً جوٹ الف کا بالائی حصہ مرد میں

مجری البول کا اندرونی حصہ اور کنواری عورتوں میں شرمگاہ کا بالائی حصہ یہ مقامات قدرتی طور سے جراثیم سے متبرار ہوتے ہیں۔ اسی طرح تندرست حالت میں مرارہ۔ مجری مرارہ اور مجری بالقرآن میں بھی جراثیم موجود نہیں ہوتے۔ تندرستی کی حالت میں حیوانات کا خون اور جسم کی اندرونی اور گہری ساختیں عموماً جراثیم سے پاک ہوتی ہیں مگر باریک تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قلیل التعداد جراثیم مجری غذا سے نقل نکل کر سیلان خون اور عروق ہاڈبہ کی مائیت میں آئے دن پہنچتے رہتے ہیں حالت صحت میں یہ جراثیم اپنی افزائش و نشوونما کے لئے جسم میں مناسب سلمان نہیں پاتے اور جلد خون میں مکر ملاک ہو جاتے ہیں۔ مگر جب کبھی صحت مریضہ متدل سے گری ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ داخل شدہ جراثیم زندہ اور قائم رہتے ہیں۔ اور جس حصہ جسم میں کمزوری پاتے ہیں۔ وہیں اپنی جڑ مضبوط جا کر تعداد میں بڑھ جاتے ہیں۔ اور مولد امراض ہوتے ہیں۔ بعض اوقات گہری ضربات میں رشتا جلد کے نیچے کسی عضلہ یا رباط کے کٹ پھٹ جانے میں) از خود سپیش پیدا ہو جاتی ہے جسے اصطلاح میں عدوئی ذاتیہ کہتے ہیں) وہ غالباً اسی نوع سے واقع ہوتی ہے +

جراثیم کی شناخت کے طریقے

(۱) خوردبینی امتحان راکھ مجری کی وساطت سے (جسم مریض سے مواد موزید لیکر اسے خوردبین سے دیکھا جاتا ہے۔ یا پہلے مریض کا مواد لیکر اس کی مصنوعی کاشت کسی مناسب غذا میں اوگائی جاتی ہے۔ اور جب اس میں جراثیم متعلقہ

مثلاً مرارہ۔ گال بیبلہ۔

مثلاً مجری۔ ڈاکٹ۔

مثلاً قحط۔ سپرے شن۔

مثلاً بالقرآن۔ پنکریاس۔

مثلاً عدوی ذاتیہ۔ اڈوٹو انفلشن۔

کی افزائش و نشوونما ہو جاتی ہے۔ تو انھیں خرد بین میں دیکھ کر شاخت کی کرشش کی جاتی ہے۔

جراثیم کو خرد بین میں دیکھنے کے واسطے یہ چیزیں ضروری ہیں

(۱) قیراط طاقت کا عدسہ (محب الطرفین شیشہ) جسے ایک قسم کے غلیظ مگر شفاف روغن دروغن و تودار کی وساطت سے استعمال کرتے ہیں یعنی پہلے شفاف کانچ پر جراثیم کو مخصوص طریقے سے رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کانچ پر روغن کا ایک قطرہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عدسہ (کلاں مناشیشہ) سے جراثیم کا مشاہدہ آسان ہوتا ہے۔ روغن کی وساطت سے روشنی کی پھیلی ہوئی شعاعیں کھینچی طور پر مجتمع ہو جاتی ہیں۔ اور جراثیم کی شکل صاف نظر آنے لگتی ہے۔

افتبکا۔ اس مضمون کے لئے علی طور سے پہلے خرد بین کے مختلف حصص اجزاء کا جاننا ضروری ہے۔ اس کا مفصل بیان آئندہ مناسب موقع پر آئے گا۔

۲۔ خرد بین کے اس سطح تختہ کو جس پر کانچ کا ٹکڑا رجہر جراثیم کی ایک تہ پھیلا دی جاتی ہے رکھا جاتا ہے۔ درجہ کہتے ہیں۔ اس کے وسط میں ایک گول چٹا سوراخ ہوتا ہے۔ جس کے اندر روشنی نیچے سے آتی ہے اور کانچ کو روشن رکھتی ہے مگر چونکہ روشنی کی شعاعیں اکثر بکھری اور پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اسلئے نہایت باریک اجسام جراثیم کے مشاہدہ کے لئے پھیلی ہوئی روشنی کو اکٹھا کر ضروری ہوتا ہے ورنہ اشکال جراثیم کمزور روشنی کی وجہ سے نظر نہیں آئیں اور ان کے اجسام پھیلے ہوئے نظر آئیں گے لہذا

سطح روغن و تودار سیدر آئل۔
سطح درجہ۔ آسٹج۔

سطح قوت مغنطہ۔ مگنی فائنگ پاور
سطح عدسہ۔ لنز۔

درجہ (مختصہ نظر) کی نیچے کی طرف ایک خود بخود کھٹنے بند ہونے والا
 پردہ سالگایا جاتا ہے۔ جبکہ درجہ تختائی کہا جاتا ہے اور روشنی
 کو اکٹھا کرتا ہے۔ دماغ النور اس پردہ کے درمیانی حصہ کو ایک پچ
 کے ذریعہ چھوٹا بڑا کر کے کانچ پر آنے والی روشنی کو حسب ضرورت
 گھٹایا بڑھایا جاتا ہے تاکہ بخوبی نظر آ سکے۔

مواد مرض یا رطوبت کو امتحان جراثیم کے لئے اکثر مخصوص ترکیبوں اور مخصوص
 رنگوں سے رنگ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ جراثیم بغیر رنگ
 ہونے بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔ مگر مؤخر الذکر حالت میں رطوبت کو نقطہ معلوم
 قطرہ آویزاں کی صورت میں ایک خاص ترکیب سے کانچ پر رکھا جاتا ہے اور پھر
 مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ قطرہ آویزاں کی وساطت سے دوران مشاہدہ میں جراثیم
 موجودہ کی شکل و شباهت۔ جثہ۔ من کی نظم و ترتیب۔ بزرگی موجودگی یا غیر موجودگی
 نقل و حرکت وغیرہ خصوصیات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ جراثیمی کاشت کے دیکھنے
 کے لئے قطرہ آویزاں کی ترکیب سے مشاہدہ کرنا نہایت ضروری اور اہم ہے اور
 اس ترکیب کو ہمیشہ کام میں لانا چاہئے۔

جراثیم کو مخصوص رنگوں سے رنگ کر دیکھنے کی ترکیب۔ یہ پھوٹنا
 رطوبات و افرازات موزیہ پیپ وغیرہ کے دیکھنے کے لئے قابل استمداد و فوق
 ذریعہ ہے (قطرہ آویزاں و لاطریقہ امتحان ایسی رطوبات کے لئے چند اہل نزل
 اور قابل استمداد نہیں)

ترکیب عمل۔ پہلے رطوبت یا مواد کی ایک قیق سی تہ شفاف کانچ کے

۱۔ درجہ تختائی۔ سب کیلش۔

۲۔ قطرہ آویزاں { ہیگنگ ڈراپ۔
 نقطہ معلوم

۳۔ مجیز { مانی کوہسکپ
 خردبین

ایک ٹکڑے پر یا مہر باریک کانچ پر پھیلائی جائے (۲) اس سے کو خشک ہو جائے
دو اور پھر کانچ کو چراغ بے دود کے شعلہ میں دو تین مرتبہ گزار کر رطوبت خشک
کی پھڑی کو شیشہ پر قائم ہو جانے دو (۳) اب اس سے کو مخصوص ترکیب سے
رنگ دو۔

انتباہ۔ مختلف اقسام کے جراثیم خاص خاص رنگ قبول کرتے ہیں۔ اور
ان کے رنگنے کی مخصوص ترکیبیں ہیں۔ (جو علیات علم الجراثیم سے تعلق رکھتی ہیں)
جو ایک قسم کو دوسری نوع سے متاثر کرنے میں کام میں لائی جاتی ہیں۔
جراثیم رنگنے کی ترکیبیں متعدد ہیں۔ جن میں سے تین مخصوص ہیں جو
درج ذیل ہیں۔

(۱) ساوہ اقسام کے رنگ۔ مثلاً نیلین سرخ جس میں حامض قطرائی ملایا
گیا ہو کارباں فلکس (سرخ) اکبریتین قطرائی (کارباں تہایون) (رزو) زرق
خرن (سیتی لین بکو) (نیل) وغیرہ۔

یہ رنگ تمام قسم کے جراثیم پر اثر رکھتے ہیں۔ اور جراثیم کے علاوہ رطوبات
مرضیہ کے اندر کے کزیات اور ان کے نوات وغیرہ کو بھی رنگ دیتے ہیں۔ ان
رنگوں کی وساطت سے جراثیم کی موجودگی عیاں ہو کر ان کی شکل و شباهت وغیرہ
کی تمیز بخوبی ہو سکتی ہے۔

(۲) دوسرا طریقہ جراثیم رنگنے کا۔ شیشہ دھیرے دھیرے جس پر رطوبت یا

۱۔ نیلین سرخ { فلکس
۲۔ کارباں فلکس { نیلین سرخ قطرائی
۳۔ کارباں تہایون { اکبریتین قطرائی
۴۔ سیتی لین بکو { زرق خرن
۵۔ نوات { نیلین
۶۔ صفیرہ بھرہ { نیلین

۱۔ یہ طریقہ طریقہ جراثیم کے نام سے مشہور ہے
۲۔ صفیرہ بھرہ { اسلام
۳۔ نوات { اسلام
۴۔ سیتی لین بکو { اسلام
۵۔ نیلین سرخ { اسلام
۶۔ کارباں فلکس { اسلام

مواد کی ترکیب مندرجہ بالا سے جالی گئی ہے (کو مرکب ذیل میں تین سے پانچ دقیقہ تک ڈبو کر رکھا جائے)۔

بنفج الجلیٹینا کا محلول الکولی۔ ۱۰ حصہ

حامض قطراتی کا سیال آبی جو حامض مذکور
۱۔ حصہ پانی ۲۰ حصہ سے تیار کیا گیا ہو۔ ۹۰ حصہ

پھر شیشہ کی تہ پر دو تین دستیقہ تک مرکب ذیل ڈال کر رکھا جائے +

بنفشین ۱ حصہ

ریبہ بنفش آمیز ۲ حصہ

آب مقطر مطہر ۳۰۰ حصہ

بالآخر شیشہ کی ٹیڑھی لکڑی سے دھویا جائے حتیٰ کہ اس کے آشوب میں کوئی رنگت کا اثر باقی نہ رہے +

اس ترکیب کی دلچسپ اہمیت کو بخوبی سمجھنا چاہئے۔ وہ یہ ہے کہ اس عمل کے بعد بعض قسم کے جراثیم پر تو رنگ قائم نہیں ہوتا، مگر بعض مخصوص قسم کے جراثیم پر رنگت قائم رہتی ہے اور ان کا رنگ نہیں اڑتا۔ پس اس نوع سے فوراً ان احتیاط کے مابین تفریق ہو سکتی ہے۔ اور یہ تحقیق ہو سکتا ہے کہ یہ فلاں قسم کے جراثیم ہیں۔ اور فلاں کے نہیں +

جو جراثیم اس خاص ترکیب سے رنگت کو قبول کر لیتے ہیں (جراثیم مثبت)

۱۔ دقیقہ منٹ۔

۲۔ ریبہ بنفش آمیز پوٹاش آیوڈائیڈ۔

۳۔ بنفج الجلیٹینا۔ جنشین ایریٹ۔

۴۔ آب مقطر۔ ڈسٹیلڈ واٹر۔

۵۔ حامض قطراتی۔ کاربوئیک ایسڈ۔

۶۔ الکحل۔ الکہال۔

۷۔ بنفشین۔ آیوڈین۔

۸۔ جراثیم مثبت۔ گرام پوزیٹو۔

وہ مندرجہ ذیل ہیں:-

کرویات عقودیہ۔ کرویات عقدیہ صدیہ۔ کرویات ذات الریہ۔ کرویات
دقیقہ باعیہ۔ عصبی کزاز۔ عصبی جرہ خبیثہ۔ عصبی درن۔ عصبی جذام۔ عصبی خناق دبانی۔
شعر مفتول یا شحرات مفتولہ جن سے مرض منظریت شاعیہ ہوتا ہے +

اور جو اس ترکیب سے رنگت کو قبول نہیں کرتے ہیں (جرام منفی) وہ یہ ہیں:-
کروئید سوزاک۔ کروئید سرشام عثمانی۔ کرویات دقیقہ حیاطا۔ عصبی تولونی۔ عصبی
سراجہ۔ عصبی حلی مطبقہ (معدیہ) عصبی الف عنفرہ۔ عصبی قرعہ رخہ۔ عصبی قچی ازرق۔
شریطیہ ہیضہ۔ حلزونہ حی راجہ۔ شعرہ حلزونہ آبلہ (رنگ لہا شیم آتشک)
(۱۳) تیسرے طریقہ جراثیم رنگنے کا۔ شیشہ کی تہ پر پہلے کسی تیز سادہ رنگ (مثلاً
نیلین سرخ قطرائی۔ کاربال ٹکسن) کا عمل کئی گھنٹوں تک مسلسل جاری رکھا جائے یا

۱۱۔ جراثیم ذیل لیکن:-	۱۱۔ جراثیم منفی۔ گرام نیگے نو
۱۲۔ کرویات عقودیہ۔ اسٹے فیلوکا کافی۔	۱۲۔ کروئید سوزاک۔ گائوکس۔
۱۳۔ کرویات ذات الریہ۔ نیوکوکس۔	۱۳۔ کروئید سرشام عثمانی۔ مے ننگو کس۔
۱۴۔ کرویات دقیقہ باعیہ۔ مائی کروکس شراجہ من	۱۴۔ کرویات دقیقہ حیاطا۔ ایکروکس کس کس
۱۵۔ عصبی کزاز۔ بیس س لے ٹے سن۔	۱۵۔ عصبی تولونی۔ بیس کالانی۔
۱۶۔ عصبی جرہ خبیثہ۔ بیس انسٹرکس۔	۱۶۔ عصبی سراجہ۔ بیس لگینڈرس۔
۱۷۔ عصبی مدان۔ بیس سٹیوکل۔	۱۷۔ عصبی الف عنفرہ۔ بیس سٹیلوٹنز۔
۱۸۔ عصبی جذام۔ بیس لپروسی۔	۱۸۔ عصبی قرعہ رخہ۔ بیس س سافٹ سور۔
۱۹۔ عصبی خناق دبانی۔ بیس ڈیفٹرک۔	۱۹۔ عصبی قچی ازرق۔ بیس ہایوجیش۔
۲۰۔ شعر مفتول۔ اسٹریٹوٹھرکس۔	۲۰۔ شریطیہ ہیضہ۔ وبریوکارا۔
۲۱۔ شحرات مفتولہ۔ اسٹریٹوٹھرکس۔	۲۱۔ حلزونہ حی راجہ۔ اسپازیم لیمپ سنگ فیر۔
۲۲۔ منظریت شاعیہ۔ ایکٹی نوامی کوکس	۲۲۔ شعرہ حلزونہ آتشک۔ اسپازوکی میٹکس

اُس رنگ کو گرم کر کے شیشہ کی تہ پر ڈالا جائے تو تہ جلد رنگ کو جذب و قبول کرے گی۔ پھر شیشہ کو ۲۰ یا ۲۵ فیصدی طاقت کے محلول تیزاب گندہک میں ڈبو کر ۱۰ منٹ تک رکھا جائے۔ اس تیزاب کے اثر سے تمام کیمیاویات رطوبت اور بیشتر جراثیم سے رنگ نخل ہو کر زائل ہو جائے گا۔ مگر چند مخصوص جراثیم رنگ کو برقرار قائم رکھیں گے۔ اور ان کی رنگت تیزاب گندہک کے عمل پر حادی رہ کر زائل نہ ہوگی۔ ان جراثیم کو متمسکہ بالکحول کہہ سکتے ہیں۔

بعض اوقات بجائے محلول تیزاب گندہک میں ڈوبنے کے شیشہ کی تہ کو الکحول میں ڈبو کر رکھا جاتا ہے۔ اس طرح الکحول میں ڈوبنے کے بعد بھی جن جراثیم کا رنگ قائم ہے ان کو متمسکہ بالکحول کہتے ہیں۔

امراض انسانیہ میں جو جراثیم متمسکہ بالکحول پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض اہم اقسام یہ ہیں۔ عصی درن۔ عصی جذام۔ عصی ریشات قلفہ۔ بعض شجرات مفتولہ۔ ان میں سے دو پہلی قسم کے جراثیم متمسکہ بالکحول بھی ہیں۔



یہاں تک جراثیم کی شناخت کا پہلا طریقہ بیان ہوا ہے۔ جو خرد بینی امتحان کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ باقی دو طریقے اب بیان کیے جاتے ہیں۔

طریق زرعیہ یعنی شناخت کے وہ طریقے جن میں جراثیم اگائے جاتے ہیں۔ وغیرہ یعنی مشاہدہ کے ساتھ ساتھ جراثیمی کاشت لگا کر مزید تحقیق کرنا مناسب ہے۔ ترکیب کاشت۔ جس طرح انسان کو بعض غذائیں ضروری اور مرغوب ہوتی

عصی جذام۔ بیسیس لپروسی۔
شجرات مفتولہ۔ ہشتر پٹوٹرس۔
عصی ریشات قلفہ۔ اس لگ ایسیس
عصی مرکب درجہ۔ کپورل جے ٹیڈ۔

عصی متمسکہ بالکحول۔ ایڈ فاسٹ۔
عصی متمسکہ بالکحول۔ الکھل فاسٹ۔
عصی درن۔ بیسیس ٹیڈ برکوس۔

ہیں یا نباتات اپنی مناسب مزاج غذاؤں میں پھلتے پھوٹتے ہیں۔ اسی طرح جراثیم بھی مخصوص و منتخب قسم کی غذاؤں کو پسند کرتے ہیں۔ اور ان میں بہت جلد نشو و نما پانے کی خاصیت رکھتے ہیں۔ اس قسم کے اعلیٰ کو وسط زرعی یا زمین ہکتے ہیں۔ اور یہ انواع انوار اور اقسام اقسام کے ہوتے ہیں۔ چند مثالیں یہ ہیں۔
 شوربا۔ بخنی۔ ہلام۔ بستہ یا منجمد مصل دم۔ اجار اجار جو گوند کے مانند ایک شے ہے۔

شوربا یا بخنی کا استعمال بالخصوص مادہ تلخ بنانے کے لئے یا جراثیم کے کیمیائی افزائش و درجات مرض کے اعمال وغیرہ کی تحقیق میں کیا جاتا ہے۔ بعض زمین کاشت بستہ اور خشک قسم کے ہوتی ہیں اور ان کا استعمال عام طور پر اس وجہ سے کیا جاتا ہے۔ کہ اکثر جراثیمی کاشت مختلف قسم کے جراثیم کی مختلف و مخصوص طرز پر ان اعلیٰ منجمدہ کی سطح پر یا ان کے اندر لگتی ہیں۔ اور ان کے اگنے کی حالت سے جراثیم کی تخفیف یا سانی ہو جاتی ہے۔ ہلام منجمد خاص طور پر اہمیت رکھتا ہے۔ یہ یہ کہ بعض مخصوص قسم کے جراثیم اس کے منجمد بستہ مادہ کو حل کر کے، تین سیال میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ چند دیگر جراثیم ایسے ہیں جو اس عمل ترقیق پر قابو نہیں رکھتے۔ مگر ہلام میں ایک یہ نقص ہے کہ اس درجہ حرارت میں گھل جاتا ہے۔ جو اکثر جراثیم کی افزائش کے لئے طبعاً ضروری ہے اس وقت پر غالب آنے کے لئے دوسری ترکیبیں ایجاد کی گئی ہیں۔ مثلاً منجمد مصل دم کو حرارت کے اثر سے جا کر پھر جراثیمی کشتیں لگا کر ان میں اختار پیدا

۱۔ ہلام۔ بیٹلین۔
 ۲۔ مصل دم۔ بیٹلین۔
 ۳۔ اجار اجار۔ لگا لگا۔
 ۴۔ تلخ۔ وکیمین۔

۱۔ وسط زرعی
 ۲۔ زمین کاشت
 ۳۔ شوربا
 ۴۔ بخنی

کرنے والے اجسام (غیر) کے عمل تخیر جس کے ذریعے مادہ لحمی منہضم محلول ہو جاتا ہے) کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ علاوہ انہیں ایک دوسری چیز یعنی اجار اجار (اگاراگارا) ایک ایسا وسیلہ کاشت ہے جو حرارت جسمی کی حد تک یا کسی مہم کے جراثیم کے اثر سے رفیق و محلول نہیں ہوتا۔ اور کام میں لایا جاسکتا ہے۔

مندرجہ بالا تفصیل سے زمین کاشت یا سانہ نقدیہ جراثیم کی نوعیت و اہمیت روشن ہو چکی ہے۔ یہ وسائل اس وقت اختیار کیے جاتے ہیں جب تحقیق و تشخیص کے لئے مصنوعی طور سے جراثیم کی کاشتیں اور کھانسی ہو رہے ہیں۔ مگر جسم انسان میں جراثیم کی سن بھاتی غذا خون۔ رطوبات اور فضلات جسم میں مل جاتے ہیں۔ اور یہ انہی میں سامان غتداء و نمو پکڑتے ہیں۔ اور اپنی بحیرۃ العقل کرشمہ سازیاں حالت صحت و مرض و دونوں میں نمایاں کرتے ہیں۔

مصنوعی کاشت کا یہ طریقہ ہے کہ ابتداءً ایک صاف و مطہر شیشہ کی تلی میں مسدود جڑ والا شیشہ سے کوئی مخصوص چیز بطور سامان غتداء یا جراثیم کی غذا کے (مثلاً منجمد کھام) اجار اجار بھر کر پہلے سے صاف و مطہر کر لیا گیا پھر فلاطینینہ کے تار کو جس کے سرے پر ایک حلقہ سا بنا ہوا چراغ بٹے دو میں سرخ و گرم کر لیا جائے اور تار کے اس حلقہ کو مریض کے مواد یا رکھو جس کا امتحان منظور ہو) میں ڈبو کر اس کا ایک قطرہ تار پر اٹھایا جائے اور شیشہ کی تلی کے اندر کے مادہ کی سطح پر آہستہ سے چھو کر قطرہ رکھو گو اس میں بخوبی مل کر دیا جائے یا ملا دیا جائے۔ پس اب مواد کے اندر

علم شیشہ کی تلی (شیشہ ٹیوب)۔

علم منجمد کھام۔ سولی ٹی فائبریل جیلٹین۔

علم فلاطینینہ۔ جراثیم۔

علم چراغ بٹے دو۔ اسپرٹ لیپ۔

جراثیم ہیں گریبان کی کاشت کے لئے مناسب زمین میں تخم بودیا گیا اس تخم بڑی کو اصطلاح میں تلقیح کہتے ہیں۔

اب جراثیم کبج تو مناسب زمین میں بودیا گیا۔ مگر ضروری ہے کبج کے اگنے کے لئے مناسب درجہ کی حرارت بھی حاصل ہو لہذا شیشہ کی ٹی کو آئہ حضانت درجہ میں حسب خواہش معینہ درجہ کی حرارت دی جاسکتی ہے اور کھدیا جائے اور جراثیمی کشت کو اگنے دیا جائے۔ اکثر دوسرے روز کشت اگ کر تیار ہوگی۔ اس کا امتحان طریقہ مقررہ پر کیا جائے اور جراثیمی نوعیت ماہریت کی تحقیق اب کی جائے (۱) آحضانت سیدنی

رمز تفصیل اس باب میں علم الجراثیم کی مخصوص علی کتب میں لکھنا چاہئے مترجم جاندار حیوانات کی تلقیح شست شناخت جراثیم کا قیمرانہ یہ ہے۔ جراثیم کو پہلے رطوبات و مواد سے جدا کر کے بذریعہ پککاری جانوروں کے جسم میں داخل کر کے دیکھا جاتا ہے۔ کہ اس عمل سے ان جانوروں میں بعینہ مری امراض و عوارض پیدا ہوئے کہ نہیں جو کہ مریض میں موجود پائے گئے تھے۔

تاریخ علم الجراثیم کے ابتدائی درجہ ارتقا میں جبکہ جراثیم کا مولد امراض ہونا یقینی طور پر مسلم نہ تھا علامہ کلخ (جرمنی کے ماہر علم الجراثیم) نے حسب ذیل اصول تصانیف قائم کئے۔ جب یہ تمام شرائط کسی خاص قسم جراثیم کے متعلق بلا کم و کاست پورے ہو جائیں تو اسی کو مرض مخصوص کا مسبب قاطعی سمجھا درست ہوگا۔

(۱) جرثومہ جس کی نوعیت اور شکل شبہ است غیر مشتبہ اور دیگر جراثیم سے ممتاز ہونی چاہئے (۲) مرض مخصوص کے ہر مریض میں بلا استثناء موجود ہو۔

ما تلقیح۔ انا کو لے شن۔

ما تلقیح۔ انا کو لے شن۔

ما آحضانت۔ انا کو لے شن۔

ما آحضانت۔ انا کو لے شن۔

(۲) یہ جرثومہ جسم مریض سے خارج کئے جانے کے بعد بھی مصنوعی کشت کے ذریعہ متعدد بار نشا بعد نسل پیدا کیا جاسکے تاکہ اس کو اترو دینے کی سے اہلی مورث اہلی کا اثر نسل، بعد سے خارج ہو جائے (مگر پھر بھی اولاد اسی مرض کو پیدا کرے گا۔)

(۳) اس جرثومہ کو اگر تجربہ تامل تلقیح کے ذریعہ کسی دوسرے تندرست حیوان کے جسم میں داخل کیا جائے تو موخر الذکر میں بھی بعینہ وہی مرض دعواریں پیدا ہو جائیں۔

(۴) جس حیوان پر اس طرح عمل تلقیح کیا جائے اس کے جسم کے اندر سے ہی جرثومہ حاصل ہو سکے۔

ابتداءً ان تمام شرائط کا ہر حالت میں پورا ہونا لازمی تصور کیا جاتا تھا۔ مگر ان کی پابندی بلا کم و کاست چنداں ضروری نہیں خیال کی جاتی۔ مثلاً عضلی جذامیہ جسے اب سلم طور پر جذام کا باعث تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اب تک مصنوعی کشت میں نہیں پیدا ہو سکا ہے۔ اگرچہ کاغذ کی پہلی شرط کے مطابق وہ جذام کے ہر مریض میں پایا جاتا ہے مگر اب بعض دیگر فرائض ثبوت ایجاد ہو گئے ہیں۔ مثلاً مخصوص جراثیم مریض کے خون کے اندر ایسے مخصوص مادے پیدا کر دیتے ہیں جن سے جراثیم کے گردہ اکٹھا کئے جاسکتے ہیں (القصاقین) ان کا یہ طریق جستار مخصوص و منقص اشکال میں ہوتا ہے جن سے جراثیم کی نوعیت مخصوصہ کا ثبوت مل جاتا ہے۔

عملیات تلقیح کے تجربات اب عموماً امراض معوارض کی تشخیص کی غرض سے کئے جاتے ہیں۔ مثلاً امراض متعلقہ تدرن کے مریضوں کے مواد و رطوبات دہیپ۔ پیشاب وغیرہ میں چونکہ عصی مدنیہ نہایت خفیف مقدار میں حاصل ہوتے ہیں اور آبسانی ان کی کشت مصنوعی طور پر آگاہ اور ان کا رنگنا محال ہوتا ہے۔ لہذا ان

مواد کو تلیق کے ذریعہ دیگر حیوانات میں تحت الجلد یا اندرون بخار داخل کیا جاتا ہے
خزگوں (ارنب مصری) وغیرہ میں جب مادہ مذکور اس طرح داخل کیا جاتا ہے تو
اگر مواد میں عصی درنید زندہ موجود ہوتے ہیں۔ تو ان حیوانات میں مرض مدرن کے
علامات و عوارض یقینی طور پر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس تجربہ میں ایک خاص نقص یہ ہے
کہ عمل تلیق کے بعد علامات مرض جلد نہیں پیدا ہوتے ہیں اور کم از کم دو یا تین ہفتہ
کا وقفہ لگتا ہے +

اکثر اوقات عمل تلیق کے ذریعہ جراثیم کی خالص کشتیں ہی پیکاری سے اُبل
جسم حیوانات کی جاتی ہیں۔ ایسا اس وقت کیا جاتا ہے۔ جب جراثیم مرض شکل و شبہ
میں بے ضرر جراثیم سے مشابہ نظر آتے ہیں۔ اور ان کے اور بے ضرر جراثیم کے درمیان
اس اتحاد کی وجہ سے تمیز و تفریق مشکل ہوتی ہے۔ اس کی مثال عصی جبرہ خبیثہ جو
جو شکل و شبہ است میں دیگر بے ضرر جراثیم کی اقسام سے بہت مشابہ ہے۔ ان بے
ضرر جراثیم اور جبرہ خبیثہ کے عصی کے درمیان تفریق کی غرض سے عمل تلیق کرنا
پڑتا ہے اگر تلیق کے بعد ادنیٰ حیوانات میں جبرہ خبیثہ کے علامات ظاہر ہو جائیں
تو پھر یقینی طور پر معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ یہ جراثیم اسی مرض کے تھے۔ (اس ترکیب
میں ایک لطیف و نفیس اصلاح باریک فرق کے لئے بعض مناسب حالتیں ہیں
یوں ہی کی جاتی ہے۔ کہ مشتبہ جراثیم کی کشت دو حیوانات (ایک تو ایسا ہے
قاویہ جراثیمی حفظ مائع کے لئے لگا کر اس کے اثر سے محفوظ بنا دیا گیا ہو۔ اور
دوسرا ایسا جو معمولی حالت میں ہو اور اس سے متاثر ہونے کی قابلیت رکھتا ہو)
ایک محفوظ (سینج) اور دوسرا غیر محفوظ (غیر سینج) میں تلیق کے ذریعہ لگائی جاتی ہے

مسک فادر جراثیمی اینٹی ٹاکسین۔

مسک سینج۔ اینٹی ٹاکسین۔

مسک ارنب مصری۔ گونی پگ۔

مسک عصی جبرہ خبیثہ۔ جیسی اس انفرکس۔

نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محفوظ میں تو مرض مشتبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور غیر محفوظ حیوان میں مرض کے علامات نمایاں ہو جاتے ہیں اور اس طرح مخصوص مولد امراض جراثیم کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ اسی ترکیب سے مرض کزاز کی تشخیص بھی کی جاتی ہے۔ چونکہ عصی کزاز مرینس کے رطوبات اور پیپ وغیرہ میں تنہا موجود نہیں ہوتے بلکہ اُن کے ساتھ دوسرے بہت سے جراثیم بھی ملے جئے رہتے ہیں۔ اس لئے اُن کو محفوظ مواد میں سے جدا کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ اس اختلاط کی وجہ سے تلویں کے ذریعہ عصی کزاز یہ اور دیگر جراثیم میں تفریق مشکل ہوتی ہے۔ کیونکہ ان سب پر ایک جیسی رنگت چڑھ کر شکل و شبہا بہت میں سب مشابہ نظر آتے ہیں۔ اسی حالت میں عمل تلخج کے ذریعہ مندرجہ ذیل طریقہ سے تفریق آسانی کی جاسکتی ہے۔

- ۱۔ شور بایا بخنی کی زمین میں پہلے مواد مشتبہ کی تلخج کی جائے یعنی شور بے کی ٹی میں مواد کا ایک قطرہ ملا کر گشت آگائی جائے۔
- ۲۔ پھر اس ٹی کو مناسب حرارت پہنچانے کے لئے آلا حضانہ میں ہوا کی غیر موجودگی میں رکھا جائے (کیونکہ کزاز کے جراثیم "غیر ہوائی" ہوتے ہیں)۔
- ۳۔ جب گشت تیار ہو جائے۔ تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔
- ۴۔ ایک حصے کو مولیٰ غیر محفوظ (غیر منجمد) حیوان میں بچکاری کر دیا جائے۔
- ۵۔ دوسرے حصے کو محفوظ حیوان (جس میں ممکنہ طور پر کزاز کے ذریعہ پہلے سے قوت ممانعت پیدا کر دی گئی ہو) میں لگا دیا جائے۔
- ۶۔ اگر پہلا حیوان مر جائے اور دوسرا بچہ نہ رہے تو تحقیق ہو گیا کہ مواد مشتبہ میں جراثیم کزاز عصی کزازیم موجود تھے۔

۱۔ غیر ہوائی، ان اید، ہیز۔
۲۔ مصل ضد کزاز، اینٹی ٹی ٹی ٹی کیم۔

۱۔ عصی کزاز، بیس ٹی ٹی ٹی
۲۔ آلا حضانہ، انکوبیٹر۔

ان اقسام جراثیم کے علاوہ اجساد و قیتہ کے چند دیگر انواع کا اجمالی تذکرہ بھی ضروری ہے۔ اگرچہ یہ جراثیمات میں چنداں اہمیت نہیں رکھتے۔

(۱) اجساد و تخمیر یہ یا جراثیم فطریہ۔ یہ نوع نباتی رنگ (حضرت نباتیہ) نہیں رکھتی۔ اس کی افزائش نسل صرت خمچہ کی شکل یعنی اُبھار نکلا رنگ ہو جاتا ہے۔ یا کمونین بذر اندرون غلیہ کے ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ جراثیم کئی اقسام کے امالِ اختار میں حادث ہوتے ہیں۔ مثلاً محلول شکر انگوری میں اختار الکوحلی پیدا کر دیتے ہیں۔ یا بعض اوقات مریض ذیابیطس شکر میں یہ مجری البول کی راہ سے نشانہ میں داخل ہو کر وہاں اختار پیدا کر کے بھیج مرکبات بنا دیتے ہیں جسکے اثر سے "التهاب ثانی" پیدا ہو جاتا ہے۔

اجسامِ اختار و کمونین درجنِ امراض میں حادث ہوتے ہیں۔ ان میں ایک مرض جو خصوصیت کے ساتھ قبل تذکرہ ہے وہ التهاب جلدی خمیری ہے جس میں متعدد قرون اور گانٹھیں پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۲) فطر خیطی (فطر لینی) یہ بوجہ اپنے ریشے دار جال اور ویاگوں کے ممتاز ہیں۔ ان میں کمونین بذر بہ نسبت معمولی جراثیم اختار کے زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے۔ اس نوع کے اثر سے جو عوارض پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں مندرجہ ذیل اہم ہیں۔

۱۔ شکر انگوری۔ گریب توگر۔	۱۔ اجساد و قیتہ۔ مانگرو آس کے نرم۔
۲۔ التهاب ثانی۔ سستانی ش۔	۲۔ اجساد و تخمیر۔ ایسٹ۔
۳۔ التهاب جلدی خمیری۔ باسٹوئی سے	۳۔ جراثیم فطریہ۔ بلاستوئی سی خمیر
۴۔ ایک ٹی ٹی ٹی ش۔	۴۔ خضت نباتیہ۔ کلرڈ فیل۔
۵۔ فطر خیط۔ بائی فوئی سیٹینز۔	۵۔ کمونین بذر۔ سپور فارے شن۔
۶۔ فطر لینی۔ فلاسٹا ش فنجائی۔	۶۔ اندرون غلیہ۔ انڈر جے نس۔
	۷۔ اختار الکوحلی۔ الکہا لک فرمن ٹی شن۔

دائف) قلائع دمنہ آتا یہ بیض بیض نامی جراثیم سے پیدا ہوتا ہے جبکہ دوسرا نام فطر سکرٹی ابیض یا عقد ابیض ہے +

(ب) قوبار (داد) اجساد فطریہ کے کئی اقسام سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے ان جراثیم کی دو قسمیں عام ہیں +

(۱) فطر صغیر البذر (۲) فطر کبیر البذر (نسبت شعری)

پہلی قسم کے اجساد لندن اور پیرس میں کثرت سے پائے جاتے ہیں مگر برطانیہ کے بیشتر ممالک میں معدوم ہیں +

(ج) سعفہ رنج اننگالی ٹون لینی نام کے جراثیم سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔

(د) اننگالیہ حمراء یا بہت احمر چھب پنخ، اننگالی صغیر البذر نام کے جراثیم سے پیدا ہوتا ہے +

(ه) فطریٹ قرنیہ یا قرنیہ کا قرعہ طفیلیہ (معدی مٹم کا زخم قرنیہ) بھی ایک مٹم کے فطر سے پیدا ہوتا ہے +

(و) فطریٹ رتویہ { بھی مخصوص مٹم کے فطر سے پیدا ہو جاتے ہیں +
(ز) فطریٹ اذنیہ

۱۔ اننگالی ٹون لینی - کورین شان لینائی۔

۲۔ اننگالی حمراء یا بہت احمر - پی ریارس برجا۔

۳۔ اننگالی صغیر البذر - مانی گرسپورون فرفر

۴۔ فطریٹ قرنیہ - کیراٹومی کوسس۔

۵۔ قرعہ طفیلیہ قرنیہ - پیراسائیکل لیر آف
(کارینا)۔

۶۔ فطریٹ رتویہ - نیوما کی کوسس

۷۔ فطریٹ اذنیہ - آٹومی کوسس

۱۔ بیض بیض - آئی ڈوم ای کیس۔

۲۔ قلاع - قشر۔

۳۔ فطر سکرٹی ابیض - سیکر وائی سیز

۴۔ عقد ابیض - موئی یا ابی کیس

۵۔ فطر صغیر البذر - مانی گرسپورون
(آؤٹائی ویا) اسمال سپور وٹنگس

۶۔ فطر کبیر البذر - مارچ اسپور وٹنگس

۷۔ نسبت شعری - ٹائی کو کافی ٹون۔

شعر مفتولہ۔ یہ قطر خلی کے اہل ترین نوع میں سے ہیں۔ اور معمولی جراثیم سے کئی خصوصیات میں مشابہ ہیں۔

اس نوع کے بعض افراد اس وجہ سے اہم خیال کیے جاتے ہیں کہ ان امراض و عوارض کا ایک سلسلہ پیدا ہوتا ہے۔ جسے مجموعی طور پر قطریت شعاہیہ کہتے ہیں۔ دراصل یہ مرض موشیوں میں ہوتا ہے مگر کبھی انسان بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے۔

شعر یہ مفتولہ کی یہ خصوصیت قابل ذکر ہے کہ ان کے اجسام سے بے بیٹے یا تار باہر نکلتے ہیں۔ یہ بیٹے قطر کے اعلیٰ تر افراد کی نسبت کسی قدر ٹکڑے ہوتے ہیں اور جراثیم کے اہاب سے یوں متفرق ہو سکتے ہیں کہ ان میں نمایاں طور پر شاخیں بھی اکثر دیکھی جاتی ہیں۔ جو جراثیمی اہاب میں نہیں ہوتیں۔ ان کے بزرگ بننے بناتے ہیں۔ ان کے ریشہ و آڑوں کا مادہ حیات اکثر چھوٹے چھوٹے حصص میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اس لئے ریشوں کا خول اکثر جگہ خالی نظر آتا ہے۔ دراصل ریشوں کے مادہ حیات کے یہی ٹکڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تخم دبزر بن جاتے ہیں۔ اور اس قدر شدید درجہ کی حرارت برداشت کر سکتے ہیں کہ جس کے متحمل خود ریشے نہیں ہو سکتے۔ شعر یہ مفتولہ بہت عالمگیر وسعت رکھتے ہیں۔ ان کے بہت سے اقسام ہیں۔ مگر صرف چند ہی مولد امراض ہیں۔

یہ بات قابل غور ہے کہ عصی درنید اور جراثیم کے چند دیگر اقسام بھی اکثر شاخدار

۱۔ شعر یہ مستور۔ اکثر پتھر کس۔	۲۔ بذر۔ اسپور۔
۳۔ قطر خلی۔ ہائی توانی سیٹیز۔	۴۔ مادہ حیات۔ پروٹوپلازم۔
۵۔ قطریت شعاہیہ۔ ایکٹینوفاکی کوسس	۶۔ عصی درنید۔ میسلس ٹیوبریکولوسس
۷۔ اہاب۔ فلاکلا۔	

اور بے ریشوں کی صورت میں بڑھتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض محققین کی رائے ہے کہ یہ بھی ”شعریہ مقتولہ“ کے نوع سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور چونکہ ان کے اثر سے کانٹھیں سی بن پر بن جاتی ہیں (اور غدد متورم ہوتے ہیں) اس لئے ان کو اکثر فطرورنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

(۳) حُویّات زحیوانات دنیۃ (یہ منفرد اعلیٰ درجہ کا جاندار) اجسام حیوانی ایک اہم نوع سے متعلق ہیں۔ جو آتشک اور دیگر ممالک حائلہ کے بہت سے امراض کا باعث ہوتے ہیں۔ اس نوع کے افراد کے احوال زندگی بے تفصیل معلوم نہیں ہوئے ہیں مگر چند کی سیرت حیات کے کچھ آثار تحقیق کیے گئے ہیں۔ موسمی بخار (ملیریا) زحیر حُرّیتی (رجو حُویّین قولونی سے پیدا ہوتی ہے) اور گرم ممالک کے جگر کا پھوٹا (رجو حُویّین مذکور سے پیدا ہوتا ہے) اور دیگر امراض حُویّات ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔

مرض النّوم اور گرم ممالک کے دورے بہت سے انسان حیوان کے امراض حُویّات کی ایک مخصوص نوع ثابِتۃ الجسم سے پیدا ہوتے ہیں۔

عدوی۔ چھوت

تعریف۔ ”عدوی نہریلے، زندہ اور مولد امراض جراثیم کے ایسے مقام میں پہنچنے کو کہتے ہیں۔ جہاں سے ان جراثیم کے تیار کردہ سمیات موزیہ

۱۔ مرض النّوم۔ لیپٹک کنس۔

۲۔ ثابِتۃ الجسم۔ شری پائوزم۔

۳۔ عدوی۔ انفکشن۔

۴۔ جراثیم۔ آرگے نزم۔

۱۔ فطرورنی۔ ٹیوبریکلوسا۔

۲۔ حُویّات۔ پیدوژوا۔

۳۔ ممالک حارہ۔ ٹراپک

۴۔ زحیر حُرّیتی۔ اے بکٹسنسٹری۔

دسین انہی جسم پر عمل کر سکیں۔

اس تعریف کے چند اہمات نکات تشریح طلب ہیں۔ مثلاً، ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ مردہ جراثیم بھی مثلاً عصی ثدنیہ زندہ جراثیم کی طرح مولد امراض ہو سکتے ہیں مگر اسکو حقیقی مدوی نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ عمل مدوی کا اصولی و ثبوتی مہمدم ہے کہ وہ ایک مریض سے دوسرے تک منتقل ہو سکے۔

(۲) دوسرا اہم سوال حدت سمیتہ اور درجہ سمیت کا ہے۔ کیونکہ ایک ہی جراثیم کی مختلف افزائش یا نسلیں مختلف درجہ کی سمیت رکھتی ہیں۔ اسی طرح یہ افزائش یا مثل جراثیم کا ایک واحد نمونہ مختلف حالات میں جدا گانہ اثر سمیت پیدا کر سکتا ہے اس کی مثال جراثیم عقدیہ صدیریہ میں پائی جاتی ہے۔ اگر جراثیم عقدیہ صدیریہ کی خالص کشتیں کثیر مقدار میں خرگوش کے جسم میں داخل کر دی جائیں۔ تو شاید ہی کوئی مضر اثر نمایاں ہوتا ہے۔ مگر ایک خاص ترکیب سے انہی جراثیم کی سمیت میں شہر دہلک زیادتی اور افزائش حاصل ہو سکتی ہے۔ جس کے اثر سے ایک خفیف مقدار غالباً ایک منفرد جراثیم ہی باعث ہلاکت ہو جاتی ہے۔ اس ازدیاد و افزائش سمیت کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ جراثیم کو بہ سلسلہ ایک حیوان سے دوسرے حیوان میں اور دوسرے سے تیسرے حیوان میں اور اسی طرح آخر تک کئی حیوانات میں گزار کر منتقل کیا جائے۔ پہلے حیوان کے جسم سے جراثیم لیکر دوسرے تک منتقل کیے جائیں اور اسی طرح آخر تک۔ انتقال جراثیم کے اس عمل کے بعد ہر حیوان میں مرض کے علامات نمودار ہونگے۔ مگر ہر تازہ حیوان میں اگلے حیوان کے مقابلہ میں مرض زیادہ شدید و مستعجل پایا جائے گا۔ حتیٰ کہ سمیت کی آخری شدت

۱۔ سین ٹائکسین۔

عصی ثدنیہ۔ ٹیوبرکولوزی اس

۲۔ حدت سمیتہ۔ دیرومن۔

عصی جراثیم عقدیہ صدیریہ۔ اسٹریپٹوکوکس لائیوینس

حاصل ہو جائے گی۔ جس کے بعد متواتر حیوانات میں اُسی آخری درجہ کی شدت تواتر کے ساتھ حاصل ہوتی رہے گی۔ اور یہ سمیت اُسی درجہ پر قائم رہے بغیر تبدیل رہے گی۔

غالباً معمولی حالات میں بھی ایسا ہی ہو کرتا ہے۔ کیونکہ جو جراثیم براہِ راست مریض کے جسم سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ وہ اپنی شدت و سمیت میں تجربہ گاہ (مختل) کی بنائی مصنوعی کشتوں کی نسبت بہت زیادہ تیز ثابت ہوتے ہیں۔ مثلاً کرویات عقدیہ کے انتہائی صفاق کے مریض کے مرنے کے بعد لاش چرنے میں اگر کبھی کوئی اتفاقیہ ہلکا سا زخم بھی جراثیم کو لگ جاتا ہے تو وہ نہایت سخت ہوتا ہے جس سے جراثیم متعلقہ کی شدت سمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

الغرض عام طور سے یہ کہنا صحیح ہو گا کہ طبعی حالات میں از ویاد و افزائش سمیت کے اسباب کے متعلق اور خصوصاً امراض متعدیہ کی دباؤں کے حلوں کے متعلق ابھی ہماری واقفیت بہت کم یا مبہم و نفی کے ہے۔

جراثیم کو مصنوعی کشتوں کے ذریعہ کمزور کرنے کو عمل تخفیف کہتے ہیں مثلاً امراض جراثیم کی مصنوعی تخفیف "اکتساب مناعت" کے متعلق نہایت اہمیت رکھتا ہے۔

عمل تخفیف کا عام اصول یہ ہے کہ جراثیم کو قدرے ناموافق حالات میں اگایا جاوے تاکہ ان کی حدت سمیت میں کمی آجائے۔ برخلاف ازیں تخفیف کے متضاد عمل یعنی افزائش سمیت (تقریت) کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جراثیم کو موافق حالات میں اگایا جائے۔ مثلاً عضوی جراثیم جو ۳۳ درجہ کی حرارت میں بہترین

مثلاً تخفیف۔ اگلے نیولے غن۔

مثلاً مناعت۔ ایسوفی ٹی۔

مثلاً عضوی جراثیم خبیثہ میس انٹرکس۔

مثلاً تجربہ گاہ۔ محل۔ پیورے ٹی۔

مثلاً کرویات عقدیہ۔ اسٹریٹو کا کانی۔

مثلاً انتہائی صفاق۔ پری ڈائانی ٹس۔

منو پاتا ہے اور اس حرارت میں اپنی سمیت عرصہ دراز تک قائم رکھ سکتا ہے اگر اسکو ۱۴ درجہ کی حرارت میں آگایا جائے تو اس کی مدت سمیت میں نمایاں کمزوری ہو جائے گی۔ محقق پاچھرنے اسی اصول تخفیف پر کشیش کے تریاق جراثیم جمرہ خبیثہ (تلخ جمرہ خبیثہ) ایجاد کیا ہے جسے حیوانات میں لگانے سے صرف عارضی و خفیف علامات مرض پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد اس مرض کے مقابلہ کے لیے تحصیل مناعت کی وجہ سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں +

(۳۳) حمل عدوی کے لئے ضروری ہے کہ جراثیم مولد امراض ہوں یعنی جس حیوان سے ان کا قرب انقال ہو اُس میں اُن کی سرایت کا مرض پیدا ہو جائے حیوانات کے مجری البول میں کرویات سوزاک داخل کرنے سے کوئی عارضہ نتیجہ نہیں پیدا ہوتا اور چھت (عدوی) واقع نہیں ہوتی۔ لہذا ثابت ہوا کہ تحصیل عدوی کے لئے دو صورتیں ضروری ہیں یعنی (۱) جراثیم شدید سمیت کے ہوں اور (۲) جس شخص میں وہ جراثیم داخل ہوں وہ اس میں مستحکم ہونے کی استعداد رکھتا ہو۔

(۳۴) عدوی کا آخری اور ضروری خاصہ یہ ہے کہ جراثیم کے سمیات موزیہ (سمین) اُس شخص کی ساخت پر اپنا اثر کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اور ہونا ممکن بھی ہے کہ جراثیم (کرویات) عقدیہ جلد کے بیرونی طبقات میں۔ یا جراثیم خناق دبائی (رگی) دمن وغیرہ میں موجود رہتے ہیں۔ مگر ان جراثیم کی موجودگی سے کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو یہ جراثیم سمیات (سمین) نہیں بناتے یا اگر بناتے ہیں۔ تو وہ ساخت ہائے جسم تک نہیں پہنچتے۔ پس محض جراثیم کی موجودگی

۱۔ کرویات عقدیہ۔ سسٹر ٹوکس

۲۔ خناق دبائی۔ ڈفٹیریا۔

۳۔ تلخ۔ میکسین۔

۴۔ کرویات۔ سوزاک۔ گانوکاکس۔

۵۔ مستحکم۔ سب ٹی بل۔

کا نام عددی نہیں ہے۔ اگرچہ ایسے حالات میں ذرا سا تشقّق یا ضرب یا اور کوئی نامناسب حالت رجوع مقامی یا عمومی قوت مدافعت کی کمی کا باعث ہو، فوراً عددی پیدا کر سکتی ہے۔

(۱) مرض نوعی { یہ دونوں اصطلاحات جو متعدی امراض کے لئے اکثر مستعمل

(۲) مرض غیر نوعی { ہیں تشریح طلب ہیں۔

مرض نوعی کی تعریف۔ جو ایک ہی سبب سے۔ یعنی ایک واحد و مخصوص نوع کے جراثیم سے پیدا ہونے والے دوسرے نوع سے نہ پیدا ہونے والے مثلاً مرض کولرا جو علم الامراض کے لحاظ سے ایک مشہور مرض ہے۔ صرف جراثیم کولرا ہی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ عددی نوعی کی ایک مین مثال ہے۔ مگر برخلاف انہیں تفصیل پر پناہ کا عمل جس جراثیم عددیہ کے بہت سے مختلف انواع کے اثر سے ہو سکتا ہے لہذا اسے عددی نوعی غیر نوعیہ کہتے ہیں۔ عددی نوعیہ اور غیر نوعیہ کے درمیان کوئی مستقل حد نہیں ہے۔ اور علم الامراض اور اسباب الامراض کے نئے انکشافات کے ساتھ ساتھ آئے دن بدلتے رہتے ہیں۔ عموماً مدرج ارتقاء کا عمل اس طرح ہوتا ہے کہ وہ امراض جو ابتدائاً بہ ظاہر متشابہ معلوم ہوتے تھے بالآخر انواع مخصوصہ میں منتقل کیے جا رہے ہیں کیونکہ ان میں سے ہر نوع کا باعث ایک خاص نوع کے جراثیم ثابت ہوتے ہیں۔ مثلاً اب ثابت ہوا ہے کہ قوبا (رواد) فطر کے مختلف اقسام سے پیدا ہو سکتا ہے۔ مگر علم الامراض کی جدید جدوجہد سے

مثلاً تشقّق۔ بڑھ۔

مثلاً۔ مرض نوعی۔ آپس سے فلک ڈیزیز۔

مثلاً۔ مرض غیر نوعی۔ ان آپس سے فلک ڈیزیز۔

مثلاً کولرا۔ نئے نئے۔

مثلاً عددی نوعیہ۔ آپس سے فلک تشقّق۔

مثلاً تشقّق۔ سپورے شن۔

مثلاً۔ عددی غیر نوعیہ۔ ان آپس سے فلک تشقّق۔

مثلاً علم الامراض۔ پیتا لوجی۔

مثلاً فطر۔ فلک تشقّق۔

سے ثابت ہوا ہے کہ تقریباً ایک مخصوص نوع سے پیدا شدہ داد کی علامات دوسری اقسام جراثیم کے داد سے باریک باتوں میں امتیاز خصوصی رکھتی ہیں اسی طرح مرض فطرت شعا عید پہلے ایک مرض نوعی سمجھا جاتا تھا اور ایک ہی قسم کے جراثیم اس کا باعث سمجھے جاتے تھے۔ مگر اب انکشاف ہو گیا ہے کہ مختلف انواع کے جراثیم یہ مرض پیدا کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات مندرجہ بالا صورت سے برعکس بھی ظہور میں آتا ہے۔ یعنی کئی امراض جو بہ ظاہر مختلف معلوم ہوتے تھے۔ بالآخر ایک ہی قسم کے جراثیم کا نتیجہ ثابت ہونے لگی ہیں۔ لہذا یہ سب امراض ایک ہی قسم کے تغذیہ کے مظاہر ہیں مثلاً جمرہ خبیثہ اور مرض داغ الجلد بہ ظاہر دو مختلف دوائیوں سے علاج میں ہیں۔ مگر چونکہ اب معلوم ہو چکا ہے کہ عصی جمرہ خبیثہ ہی ان دونوں کا باعث ہے۔ لہذا ان دونوں مظاہرات کو ایک ہی تعدوی نوعی کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔

عدوی موضعیت یعنی مقامی تغذیہ کے عوارض

مقامی تغذیہ۔ مقام نتیجہ پر جراثیم کی تولید و نمو سے پیدا ہوا ہے۔ جراثیم ایک مخصوص مقام تغذیہ یا مدت حضانت درج مختلف جراثیم میں مختلف ہوتی ہے (کے بعد) جس میں گویا وہ ساختہ جسم کی قوت مدافعت کے ساتھ مقابلہ و نبرد آزما فی کرتے رہتے ہیں اور اپنی جڑ جسم میں جاتے رہتے ہیں (منویا) کہ افزائش حاصل کرتے ہیں۔ اور اپنے پیدا کردہ سمیات موفیہ کے اثر سے ساختہ جسم میں نتیجہ و خراش

۵۔ عدوی موضعیت۔ دل انگلیشن۔

۶۔ مدت تغذیہ { پیریاڈ انکوبیشن
۷۔ مدت حضانت

۱۔ فطرت شعا عید۔ ایکٹیوٹی کوکس۔

۲۔ جمرہ خبیثہ۔ مگنٹا سپیڈول

۳۔ داغ الجلد۔ دل سارٹس ڈیزیز

۴۔ عصی۔ پیس۔

پیدا کر کے التهاب کے مختلف مارج نمودار کر دیتے ہیں۔ التهاب کے یہ مراکز یا تو محدود رہ سکتے ہیں یا جراثیم انسجہ کے سلسلہ ارتباط کے ذریعہ یا عروق جاذبہ کی راہ سے پھیل کر انھیں یعنی مراکز کو ہوسعت دیدیتے ہیں۔ یا جراثیم ابتدائی مرکز التهاب سے علحدہ ہو کر شدہ کی صورت عروق دمویہ کے ذریعہ بدن میں درودراز مقامات پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ ان مظاہر کے ساتھ اکثر عمومی امراض ہی بوجہ انجذاب سمیت مقامی کے کم و بیش نمودار ہوتے ہیں بعض امراض مثلاً کزاز، خناق و بانی امین مقامی تکلیف کے ساتھ عام سمیت کے علامات شدید شمشوہ الدام بھی نمودار ہو جاتے ہیں۔ لہذا مقامی عدوی کے مظاہر دو اقسام میں تقسیم ہو سکتے ہیں +

(۱) انطواہر مقامی جس میں نظام جسم کی عام سمیت مفقود یا نفی کے قریب ہوتی ہے جیسا کہ قرعہ رزخہ۔ خراج درفی اور خفیف سوزاک وغیرہ میں دیکھا جا رہا ہے +

(۲) وہ انطواہر جن میں مقامی علامات (التهاب غیرہ) کے ساتھ عام علامات سمیت شدید نمایاں ہوں۔ جیسے حمزہ رشرخادہ (کزاز۔ خناق کچی فیروہ) علامات سمیت مختلف سمیات موزویہ کی حالت میں لازماً مختلف ہوتے ہیں۔ بہت سے جراثیم جو مقامی امراض کا باعث ہوتے ہیں۔ عام نظام جسم میں پہونچکر اور افزائش حاصل کر کے ہلکے امراض عام نظام جسم میں پیدا کر سکتے ہیں +

۱۔ التهاب۔ انفلاشن	۱۔ خناق و بانی۔ ڈنقیہ۔
۲۔ مراکز۔ فوکانی۔	۲۔ شمشوہ دم۔ شامسہ میا۔
۳۔ عروق جاذبہ۔ لیفٹک و سلز۔	۳۔ قرعہ رزخہ۔ سافٹ سٹنک۔
۴۔ سدہ۔ جلیطہ دمویہ۔ ایہولس۔	۴۔ خراج درفی۔ ٹیوبوکرلرہس۔
۵۔ امراض عمومی۔ کانٹری ٹینٹل ٹوٹر جنس۔	۵۔ حمزہ۔ اری سپلس۔
۶۔ کزاز۔ ٹے ٹے انس۔	

عدوی عمومیہ کے عوارض

عام جسمانی عدوی میں جراثیم دوران خون میں نمودار ہو کر افزائش حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر اس قسم کے خون کو بذریعہ عمل تلیق کسی دوسرے تندرست شخص کے جسم میں داخل کیا جائے تو اگر مقدار تلیق کافی دی گئی ہے (مرض مخصوص اس کے جسم میں ضرور منتقل ہو جائے گا۔ مقامی عدوی پیدا کرنے والے بہت سے جراثیم عام عدوی کے عوارض پیدا کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ من جراثیم میں ہیں شاید ہی عام عدوی کبھی ایسا نہ کرے۔ جس میں کسی نہ کسی قسم کا مقامی عدوی عمومی عدوی کی پہلی بنیاد نہ ہو۔

تقریباً دوم۔ تلیق الدم۔ درجہ عاد۔ زہری شافی (آتشک درجہ دوم) قسم بہ حمزہ خبیثہ۔ حیات طغیہ مثلاً چپک زخرو وغیرہ عدوی عمومیہ کی مثالیں ہیں۔

عدوی جراثیم یا عفونت جراثیم

عفونت جراثیم ایک عام اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زخم زخما عمل جراحی کا ہو یا اتفاقاً ہو (جراثیمی سمیت کا عدوی متنبول کرے یا جراثیم ضمیمہ کے تقدیر سے آلودہ ہو جائے۔

جراثیم عفونیہ صرف مردہ ساختوں میں پیدا ہو کر بڑھ سکتے ہیں۔ مگر ان کے پیدا کردہ سمیات اس قدر پہنچ جاتے ہیں کہ اس پاس کے حصوں اور ساختوں کو بھی آلودہ عفونت کر کے نکال سکتے ہیں جیسا کہ قروح آتشک کے اثر سے عضو تناسل کی جلد و حشفہ مژ جاتے ہیں۔ اگر ٹری ہوئی ساختیں خون میں جذب ہو جائیں تو شدید بخار پیدا ہو جاتا ہے

۱۔ عام عمومیہ جنرل انفکشن۔	۲۔ انتہائی سمیہ۔
۳۔ حیات طغیہ۔ سبھی سمیہ۔	۴۔ حیات طغیہ۔ اگر تھقی مثلاً۔
۵۔ تلیق دم۔ ہائی سمیہ۔	۶۔ عفونت۔ سپس۔
۷۔ من عاد۔ ایکوٹ ٹیڈر کیروس۔	۸۔ گلاٹا۔ اسٹنٹک۔
۹۔ زہری شافی۔ سکندری سفلس۔	۱۰۔ حشفہ۔ گلاش۔ پے من۔

مثلاً اگر متعفن آنزل رحم کے اندر رہ جاوے تو مواد عفونہ کے جذب ہونے سے بخار ہو جاتا ہے۔

جراثیم صدمہ زیدہ ساختوں میں پیدا ہو کر نشوونما پا سکتے ہیں۔ اور وہاں کیلانی سمیات ہی بنا دیتے ہیں۔ یہ جراثیم آس پاس کے انجھ پر حملہ آور ہو کر حمہ رسر خباہہ اور التهاب خلوی (فغونی) پیدا کر سکتے ہیں۔ یا سیلان غلن میں داخل ہو کر تفع الدم اور عفونتہ الدم کا باعث ہو سکتے ہیں۔ سمیات غلن میں داخل ہو کر اپنی مقدار و غلوت کے تناسب سے مختلف درجہ کا بخار پیدا کر سکتے ہیں۔ مثلاً حنی و قح یا حنی عفنیہ تہم غلن مگر ان سب قسم کے حیات میں صرف مقدار سمیات کی وجہ سے فرق ہے۔ ورنہ ان کا طریق عمل یکساں نوعیت کا ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر زخم اور انجھ متصلہ کے درمیان باہمی عمل نہ امنعت کے ذریعہ انگور کے بننے سے ایک دیوار یا آرٹ قائم ہو جائے۔ یا اگر رطوبات عفنیہ و باؤ کی وجہ سے جذب نہ ہوں بلکہ زخم سے باہر خارج ہوتی رہیں۔ تو یہ بخار بھی جاتا رہتا ہے۔ علامات عفونت جذب شدہ مادہ عفنیہ کی مقدار کی مناسبت سے کم یا زیادہ پیدا ہوں گی۔

علامات عفونت۔ اکثر مدوی ہونے کے دور و ز بعد ابتداء میں جاترا چڑھتا ہو پھر مسلسل بخار تیز درجہ کا ہو جاتا ہے۔ قلت اشتہا۔ زبان کی خشکی۔ قبض۔ اور آفری و جتا میں اسہال۔ دوسرے نبض تیز۔ یہ علامات نمودار ہوتی ہیں۔ اگر مرض جاری رہا تو پھر نبض

مثلاً آنزل بمشیمہ پلاسٹا۔	مثلاً حنی عفنیہ سپنگ ٹیرل۔
مثلاً حمہ رری سپلس۔	مثلاً قسم غلن سپہر ویا۔
مثلاً التهاب خلوی مسیلیو لانی ش۔	مثلاً زخم کے انگور گسے نو لہ ش۔
مثلاً تفع الدم۔ ہانی نیا۔	مثلاً رطوبات عفنیہ۔ سپنگ ٹیرل۔
مثلاً عفونت م۔ سپٹی نیا۔	مثلاً مادہ عفنیہ۔ سپنگ ٹیرل۔
مثلاً حنی و قح۔ یک ایک جہور۔	

کمزور ہو جاتی ہے۔ سرسام ہو جاتا ہے۔ اور مریض انتہائی ضعف کی وجہ سے لمبی
عدم ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر سیات پیدا ہونے کے اسباب ملل کا قلع وقع مناسب
وقت پر کر دیا جائے تو مریض بہت جلد شفا یاب ہو جاتا ہے۔

معالجہ عفونت۔ متعفن حصے کو فوراً خارج کرنا چاہئے۔ اگر خراج ہے تو
اُس کو جلد چیر کر پیپ وغیرہ باہر نکالنا چاہئے۔ اور اس کا انتظام کرنا چاہئے کہ پیپ پھر
بہتی رہے۔ مقوی اور محرک ادویہ کا استعمال کرنا چاہئے۔ اور غذا کافی مقدار میں
دینی چاہئے۔

اگر مریض انتہائی ضعف و اغما کی حالت میں ہو تو سیال نکلیں انک طعام
تین رتی آب مقطر مطہر ۱۶۔ اوقیہ کے ۳۲۔ اوقیہ وریہ کے ذریعہ متواتر داخل جسم
کئے جائیں۔ اس کے اثر سے پیشاب زیادہ آوے گا اور اسہال بھی ہوگا۔ اور مینا
بول بران کے ذریعہ خارج ہو جائیں گے۔ مہل ادویہ کا استعمال بھی ہی اثر رکھتا ہے۔

مناعت

معمولی حالات میں ہر زندہ حیوان ہمیشہ مختلف اسباب ذرائع سے نشاء عذی
ہو سکتا ہے۔ جراثیم ہوائیں موجود ہیں۔ جس میں ہم سانس لیتے ہیں۔ ہمارے ناکل و
مشارب جراثیم سے لبریز ہیں۔ ہماری جلد اور مجری غذا میں بھی جراثیم موجود ہیں مگر
باوجود اس عالمگیر کثرت کے ہم عموماً جراثیم کے جلد سے محفوظ رہتے ہیں۔ لہذا کمال
یہ انا پڑتا ہے کہ ان جراثیم کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لئے بعض کارگر اور

۱۔ مناعت۔ اہمیتی۔

۲۔ عدوی انگلشن۔

۳۔ مجری غذا۔ ایلی منٹری کینال۔

۱۔ خراج۔ ایس۔

۲۔ سیال نکلیں۔ سیلان سویلوشن۔

۳۔ اوقیہ۔ ادنس۔

ہنایت یقینی قدرتی وسائل امن اور فطری اسباب ممانعت ہمارے جسم میں موجود ہیں۔ اور یہ کہ جب یہ وسائل کمزور یا ناکافی ہوتے ہیں تب تب عدوی واقع ہوتا ہے۔ جراثیمی حملوں کی اس قوت ممانعت اور مقابلہ کو ممانعت کہتے ہیں۔ اور ممانعت کے متضاد و مخالف خاصیت عمل کو استعداد مرض کہتے ہیں۔ علامہ ازہرین جب کوئی متعدی مرض قدرتی طور سے شفا (بغیر دوا) حاصل کرتا ہے۔ یا بالفاظ دیگر ایسے مرض میں بلا علاج صورت شفا ہو جاتی ہے تب بھی ایک مخصوص و مناسب درجہ کی "ممانعت" (مقامی یا عمومی) عامل ہو کر جراثیم کا قلع قمع کر دیتی ہے۔

مندرجہ بالا بیان سے ظاہر ہو گا کہ ممانعت کی بحث حفظ ماتقدم (حفظ الامراض) اور علاج الامراض دونوں لحاظ سے ہنایت اہمیت رکھتی ہے۔ خصوصاً بدین وجہ کہ یہ دونوں باتیں (حفظ ماتقدم اور علاج) حاصل کرنے کے لئے ہنایت تیر بہدف اور یقینی مصنوعی طریقے اور ذرائع دراصل اس قدرتی عملیات کو ترکیب دیکر یا اس کی نقل کر کے ارتقائے قدم پر چلے گئے یا اس کا آزادانہ عمل زیادہ کر کے حاصل کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس کی مثال خناق و بانی کا نیا طریقہ علاج ہے جو فادسمین رتیراق جراثیمی سے کیا جاتا ہے جس کے مصنوعی طریقے اس مرض کے طبعی طرق علاج سے مشابہ ہوتے ہیں۔ مگر امنوس یہ ہے کہ باوجود کثرت بحث و تجارب کے اب تک ممانعت کی مخصوص قوتیں معلوم نہیں ہوئی ہیں۔

ممانعت طبعی - وہ قوت ممانعت ہے۔ جو ہر حیوان کے جسم اور ترکیب

علم استعداد مرض - سبب فی فی لیٹی۔

علم فادسمین - امنوس امکین۔

علم حفظ ماتقدم - پری ویشن۔

علم ممانعت طبعی - نیچرل امیونٹی۔

علم خناق و بانی - ڈیفنسیو۔

وساخت میں ابتدائے آفرینش سے مضمر ہوتی ہے۔ اور جو اس کے عوارض زندگی کے کسی واقعہ کے اثر سے مترتب نہیں ہوتی۔ مثلاً تمام حیوانات ذیہ طبعاً مرض سوزاک کے تاثر سے محفوظ (منسوع) ہیں۔ اور بعض دیگر امراض بھی جو عموماً انسان کو متاثر کر دیتے ہیں حیوانات ادنیٰ کے لئے بے اثر ہیں۔ اسی طرح حضرت انسان بھی بہت سے ایسے امراض سے طبعاً غیر متاثر و محفوظ ہیں جو حیوان پر حادث ہونے ہیں۔ یہ طبی مناعت عموماً ایک جنس کے تمام انواع و افراد میں یکساں طور پر موجود ہوتی ہے۔ مگر اکثر اس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ مثلاً بعض بچے چھپک سے قدرتا بے اثر رہتے ہیں در انحالیکہ بیشتر بچے اس مرض سے ضرور متاثر ہوتے ہیں۔ بعض اقوام مخصوص امراض سے بہ شدت متاثر ہونے کی استعداد رکھتی ہیں۔ لہذا بخوبی سمجھ لینا چاہئے کہ ”ذومی مناعت“ اور ”طبعی مناعت“ ہیں۔ اور ایک دوسرے کے مترادف نہیں +

یہ بات بھی بخوبی ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ مناعت کا کوئی خاص صبح و غیر مبتدل معیار نہیں قرار دیا جاسکتا۔ کیونکہ نظام جسم کی ساختوں کا باہمی عمل متغیر و متغیر افہامی استعداد اور انتہائی مناعت کے مابین تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے ذیل کی مثال سے یہ بات روشن ہوگی +

اگر متعدد حیوانات میں عمل تلخ کے ذریعہ کسی جراثیمی کاشت کی مادی مقدار داخل کی جاوے تو نتیجہ مختلف ہوگا۔ یعنی ایک حیوان میں تو مرض کے آثار بالکل نمودار ہی نہ ہونگے۔ دوسرے حیوان میں مقام تلخ پر خفیف التهاب کے علامات نمودار ہونگے تیسرے حیوان میں التهاب پھیلا ہوا ہوگا۔ اور بالآخر پیٹ بھی

۱۔ محفوظ۔ امیون۔	۲۔ تلخ۔ نا کوئے ش۔
۳۔ ذومی مناعت۔ رسے ٹیل امیونیٹی۔	۴۔ پیلے مارا التهاب۔ اسپرڈ ٹیگ انفلامیشن۔
۵۔ معیار۔ اسٹنڈرڈ۔	۶۔ پیٹ بٹا۔ تلخ۔ سپورٹین۔

پیدا ہو جائے گی۔ یا غائقرایا کی ذہبت پہنچ جائے گی۔ جو تھیں میں ہلک
 حد وئی عمومی ہوگا۔ الغرض ہر حیوان اپنے مخصوص درجہ مناعت کے مطابق
 محفوظ رہے گا۔ یہ اپنی استعداد ذاتی کے تناسب سے متاثر ہوگا۔ مزید برآں یہ کہ
 بعض حیوان معمولی درجہ کی سمیت واسے جراثیم دیا نسبتاً بے ضرر جراثیم کے
 مقابلہ میں توانہائی مناعت کا اظہار کر سکتا ہے مگر جب یہی جراثیم زیادہ سمیت
 حاصل کر کے (افزائش سمیت کے بعد) حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ ہی حیوان انتہائی
 استعداد و قابلیت ظاہر کرتا ہے۔ اور ان سے سخت متاثر ہو جاتا ہے۔ علامہ ہیں
 کسی خاص جرثومہ کے متعلق ہر حیوان کی مناعت یا اس کی استعداد و داخلی
 اور خارجی حالات کا نمایاں اثر ہوتا ہے۔ امراض کے خطرات و نقصان کے لئے ان
 حالات و اسباب کا علم نہایت سخت اہمیت رکھتا ہے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے
 کہ انسان تقریباً ہر قسم کے جراثیم کے مقابلہ و ممانعت کے لئے نہایت اعلیٰ درجہ
 کی مناعت فطر تار رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ عصی ورن سے طبعاً محفوظ رہ سکتا ہے
 البتہ جب انسان کی یہ مناعت مقامی یا عمومی اسباب کی وجہ سے گھٹ جاتی
 ہے۔ اور اس کی قابلیت حیات (قوت) کمتر ہو جاتی ہے۔ تب عکس ملتی ہے۔
 ہو جاتا ہے۔

اسباب مبعوثہ۔ جن سے قوت مناعت گھٹ کر عدوی کی استعداد پیدا

ہو جاتی ہے حسب ذیل ہیں۔

(۱) خنکی اور رطوبت (دہری)

۱۔ غائقرایا، انگین۔	۲۔ عصی ورن۔ ٹیوبرکولوز، میسلس۔
۳۔ عدوی عمومی۔ جنرل انفکشن۔	۴۔ قابلیت حیات۔ وی لے لیٹی۔
۵۔ مناعت۔ امیونٹی۔	۶۔ عدوی انفکشن۔
۷۔ استعداد و سہولت فی بی لینی۔	۸۔ اسباب مبعوثہ۔ پیری و سپوزنگ کازز۔

خصوصاً جب یہ دونوں متحد ہو جاتے ہیں تو شدید قابلیت جراثیم پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر ان کا نوع عمل اب تک غیر متحقق ہے کہ یہ کس طرح قوت مناعت کو کم کرتے ہیں۔

(۲) فاقہ اور سوء تغذیہ خفیف درجہ میں بھی یہ مناعت کی قوت میں نمایاں کمی کر دیتے ہیں۔ مثلاً لاش چیرتے وقت اگر حالت فاقہ میں جراح کو زخم لگ جائے تو یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ مگر جب پیٹ بھرا ہوا ہو اور ماضیہ کا عمل جاری ہو اس وقت اس قسم کا زخم لگے تو چنداں خطرناک نہیں ہوتا۔ چونکہ دوران ماضیہ میں خون کے مصفیٰ دانوں کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ لہذا قرین قیاس ہے کہ ان کی موجودگی تقویت مناعت کا باعث ہو گی۔ مگر یہ امر ابھی محقق نہیں ہے کہ سفید دانوں کی زیادتی ہر حالت میں مناعت بڑھا دیتی ہے۔ اور اس کے برعکس انکی کمی مناعت میں کمی پیدا کر دیتی ہے۔

(۳) عمر کا اثر بھی اہم ہوتا ہے۔ کم سن بچے بہ نسبت بالغ افراد کے قبول مرض کے لئے زیادہ مستعد ہوتے ہیں۔

(۴) انزف یعنی سیلان خون { مناعت کو بہت کم کر دیتے ہیں۔
(۵) بعض زہر رسیات خصوصاً کھول

(۶) خراب اور متعفن ہوا مناعت کو کم کرتی ہے اور تسبیل مرض خصوصاً جراثیم خدنگ کی استعداد بڑھا دیتی ہے۔

(۷) ویرپا بیکسی (خدرت) قوت مناعت کو
(۸) بعض امراض کی موجودگی خصوصاً درم گرد اور بایلیس کم کر دیتے ہیں۔

مثلاً انزف۔ سیلان خون۔ ہمو راج۔
مثلاً جراثیم خدنگ۔ ٹوبرکولوسس۔

مثلاً سوء تغذیہ۔ مال نیو ٹریشن۔
مثلاً خون کے سفید دانے۔ یا کرات۔ ہینڈلکریٹس۔

مقامی اسباب جو سبب کو کم کر دیتے ہیں حسب ذیل ہیں:-

(۱) زخم و ضرب۔ خصوصاً جلد پر خون کا جھرجھار دیکھتے دم (جلد کا چھل جانا)
(سج) جلد کا آگ سے جلنا +

(۲) کیمیائی مواد کی خراش۔ اکثر تجربہ گاہ میں جراثیم کی سمیت کے اثر کو شدید کرنے کے لئے عمل تلیق کرنے سے پہلے حیوانات یا مریض پر کیمیائی مہتجات کا مقامی اثر پیدا کر دیا جاتا ہے تاکہ مقام زخم و ضرب کی قوت مدافعت کم ہو کر دماں جراثیم کا اثر شدید ہو سکے۔ مثلاً اگر معمولی حالت میں خرگوش پر کربوئیاٹ صمدیہ کی تلیق کی جاوے اور زیادہ مقدار بھی دی جاوے۔ تو کوئی علامت مرض اکثر پیدا نہیں ہوتی۔ مگر یہی جراثیم کے ساتھ تلیق سے پہلے اگر تیزاب شیر مخفٹ یا دیگر جراثیم کے سمیات یا اور کوئی محلول بیچ لاکر پھر خرگوش میں لگائی جاوے تو علامات مرض نمودار ہو جاتے ہیں +

جراثیمات میں مہتجات کا یہ اثر یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کیونکہ تقریباً تمام ملہر ادویہ و دافع تعفن مرکبات بیج اثر رکھتے ہیں۔ خصوصاً جبکہ ان کا سلسل یا تیز مقلد میں استعمال کیا جاوے تو یہ مقامی مناعت کو بہت گھٹا دیتے ہیں۔ اور اس طرح ان کے اثر سے مقام زخم پر عدوی جراثیمی کا اثر زیادہ قوی ہو جاتا ہے +

(۳) بہت سرد یا بہت گرم سیالات کا مقامی استعمال ہی مناعت کو

مثلاً تیزاب شیریک ٹک ایڈ۔

مثلاً مخفٹ۔ ڈائی لیوٹڈ۔

مثلاً دافع تعفن۔ اینٹی سپٹک۔

مثلاً کبھت دم۔ بروزر۔

مثلاً سج۔ کن ٹیوژن۔

مثلاً تلیق۔ انا کولیشن۔

مثلاً کربوئیاٹ صمدیہ۔ ڈائی گرو کوس باو جے نس۔

کم کر دیتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ زخم کو دھونے کے لئے جن عنولات کا استعمال کیا جاوے وہ حرارت بدنی سے زیادہ کم یا بیش نہ ہوں +

(۴) تازہ خون کی کمی بوجہ امراض عروق کے یا زخم پر چٹی زیادہ تنگ بندی ہونے کی وجہ سے وریدی خون کا کثرت کے ساتھ ایک جگہ اکٹھا ہوجانا رکاوٹ) یہ دونوں باتیں اگر کسی حصہ جسم میں جمع ہوجائیں تو مافعت میں کمی ہوجاتی ہے +

اکتابی مناعت - دو قسم کی ہوتی ہے (۱) ذاتی اور (۲) قہری۔

مناعت ذاتی - اکثر مرض ماسبق کا حملہ رخا وہ قدرتی طور سے ہرچکھڑ یا عمل تلخ کے ذریعہ ناراضی طور سے پیدا کر دیا جو اس مرض کے دوبارہ حملہ کو روک رہا ہے۔ اور ایسا شخص اس مخصوص مرض کے خطرہ سے آئندہ محفوظ ہوجاتا ہے اس قسم کی مناعت کو ذاتی کہتے ہیں +

آتشک چچک جیسے امراض طفیہ اس قسم کی مناعت اکثر پیدا کر دیتے ہیں مگر یہ مناعت ہر حالت اور ہر شخص میں قطعی اور کفایت نہیں ہوتی۔ کیونکہ بعض اوقات فیکہا گیس ہے کہ یہ امراض ایک دفعہ ہو چکنے کے بعد دوبارہ بھی ہو جاتے ہیں۔ برعکس اس کے چند امراض مثلاً امراض درنیہ اور امراض صدیہ یہ ایسے بھی ہیں جن کے ایک مرتبہ ہونے سے کسی قسم کی مناعت حاصل ہوتی ہے یا نہیں یہ اب تک مشکوک ہے +

کسب مناعت ذاتی کے چند اہم طریقے (۱) قدرتی طور سے پیدا شدہ

۱۔ عنول - روشن۔

۲۔ رکود - اس سے گولے شن۔

۳۔ اکتابی مناعت - اکوارڈ - ایویٹی۔

۴۔ مناعت ذاتی - ایکٹو ایویٹی۔

۵۔ مناعت قہری - پے سوا یونیٹی۔

۶۔ تلخ - انکولے شن۔

۷۔ امراض طفیہ - انکولے شن۔

۸۔ امراض درنیہ - ٹوبرکولوسس۔

مرض سے مواد یا رطوبت موزیہ یکر تند رست افراد میں عمل تلیق کیا جاوے۔
یہ طریقہ گزشتہ زمانہ میں چیچک کے ٹیکہ (تطعیتم) کی ایجاد سے پہلے رائج تھا۔
اور ایک مریض چیچک کا لیس (صدید) اُس کے زخموں سے یکر دوسرے سندرت
شخص کے جسم میں لگا دیا جاتا تھا اور اب اُسے ہلکا کر کے لگا دیا جاتا ہے۔ یہ
طریقہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس میں مرض اُسی قدر شدید ہوتا ہے جس قدر طبی
طور پر پیدا ہونے سے ہو سکتا ہے۔

(۲) عمل تلیق کے ذریعہ مرض کی سمیت یا خود اُس کے جراثیم (بشرطیکہ ان کی
سمیت کو ہلکا بنایا گیا ہو) کو بدن کے اندر پہنچایا جائے۔ چیچک کے ٹیکہ کا عمل تطعیتم
اس کی بہترین مثال ہے۔ اس میں جو اشیاء استعمال کی جاتی ہے۔ وہ حقیقت میں
چیچک کے جراثیم کی مصنوعی کاشت ہوتی ہے (ان جراثیم کی پوری طبیعت باہر
اُن تک بھل ہے) جس کی سمیت ہلکی کر دی جاتی ہے۔ ماہر علم الجراثیم دپا سچر مرض
فزع المادہ (کلب) اور جمرہ خبیثہ سے تحفظ کے لئے چوہا یوں میں یہی طریقہ برتنا ہے
جرہ خبیثہ کے ٹیکہ میں اس کے جراثیم عصویہ کی زندہ کاشت ہوتی ہے۔ جسے تیز جزا
۴۴ میں آگا کر ہلکا کر لیا جاتا ہے۔

(۳) جراثیم کی مردہ کاشت کا ٹیکہ (تطعیتم) اور خفی معویہ سے بچنے کے
لئے کیا جاتا ہے۔ اس میں جراثیم کو زیادہ حرارت پہنچا کر ہلاک کر دیا جاتا ہے
اور جلد کے نیچے تھوڑی تھوڑی معتداریں ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ جس سے بطور تجربہ
کے مقامی التهاب مختلف شدت کا ہوتا ہے۔ اور عام بنی عوارض مثلاً بخار

۱۔ جمرہ خبیثہ۔ اتھر کس۔

۲۔ عصویہ۔ بیسی لائی۔

۳۔ حی معویہ۔ ٹانی ناڈ فور۔

۱۔ تطعیتم۔ ویکسین نے شن۔

۲۔ تلیق۔ اناکولیشن۔

۳۔ فزع المادہ (کلب) یا ڈرو فوبیا۔

اور تکان بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جب یہ مراحل طے ہو جاتے ہیں۔ تو مریض اس مرض خاص کے مقابلہ کی کچھ قوت (مناعت) حاصل کر لیتا ہے۔ اور اب یہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس ٹیکہ کی بڑی مقدار یا خود زندہ حراثیم کی کاشت برداشت کر لے۔ جس سے قوت مناعت بھی ترقی پذیر ہو جاتی ہے۔ درمیان کائنات بھی اسی قسم کا ہے رکاوٹ کا مادہ درنیہ یا سلیہ اس میں عمومی درنیہ کے باریک ذرات کا شیرہ ہوتا ہے جس کو ہیکر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ اب دوسرے متعدی امراض کے علاج میں پہنچتا جا رہا ہے۔

(۴) جراثیم کے وہ سینات (سینٹ) جو ان کے خانوں سے باہر پیدا ہوتے ہیں۔ جگنو، نینچ، چیر، غلو،ی کہا جاتا ہے۔ اس کی پکپکاری انسان میں نہیں کی جاتی ہے بلکہ دیگر حیوانات کے اندر قوتِ مدافعت (ممانعت) پیدا کرنے کے لئے مفید ملتی تیار کرتے وقت رملی الحفوص مثلاً ضد خناق و ضد کزاز ان کی پکپکاری کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لئے گھوڑے کا انتخاب کیا جاتا ہے کیونکہ اقول تو گھوڑے میں اس کی پکپکاری کرنی آسان ہے۔ دویم اس کے خون سے مصل بکثرت تیار ہو جاتا ہے۔ اس طریق کے اصول سادہ ہیں۔ سین کی تھوڑی مقدار رجبے پہلے منقطع کر لیا جاتا ہے تاکہ زندہ جراثیم اس سے دور ہو جائیں (جلد کے نیچے پکپکاری کی جاتی ہے، جس سے مقامی التهاب ہو جاتا ہے۔ بخار آتا اور بدن میں شستی دکھائی دے گی) ماذگی انودار ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ عوارض دور ہو جاتے ہیں۔ تو سین کو

علاء الدین علی بن علی بن ابی طالب

ۛڪ مصلح مسيرم

۱۵۔ مصل ضد خاق۔ اینٹی ڈیفیکسیرم۔

۹۔ مصل ضد کرناز انتہی ٹے ٹے تک میرم

۱۰۰ مقطر کرنا: غلظت ریشہ۔

ملے شاعرت۔ امیر علی بی۔

۱۱۰ دین کا رخ - کاغذ - ٹیپر کوٹین۔

۳۲ عصی در نیہ - ٹیوہر کورہی لائی۔

۱۴- شیر- ایلشن-

۱۵- سمین- ماکین۔

کی کسی قدر زیادہ مقدار برداشت ہو سکتی ہے۔ اس طریقہ سے بتدریج مقدار بڑھائی جائے یہاں تک کہ حیوان میں اس قدر قوت مقابلہ پیدا ہو جائے کہ بہت بڑی مقدار میں ہنایت تیز اور قوی سمین کی بھی اگر پچکاری دی جائے۔ تو اس سے خفیف اور ناپائیدار عوارض پیدا ہوں اس عمل میں اس قدر ترمیم کی جاسکتی ہے کہ اطفال میں سمین اور فادسمین دونوں کو ملا کر پچکاری کی جائے۔ اور یا ایسے سمین استعمال کیے جائیں۔ جن کی شدت و حدت خاص طور پر کم کر دی گئی ہو۔ تاکہ دقت زیادہ صرف نہ ہو ورنہ اطفال میں مقدار سمین کو بڑھاتے بڑھاتے بہت دقت صرف ہو جاتا ہے۔

یہ واضح ہے کہ مذکورہ بالا طرق سے حیوان کے اندر قوت مناعت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ جراثیم یا ان کے سمیات سے مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور علی السموں سے کوئی ہلکا مرض (جو بعض اوقات ہنایت خفیف ہوتا ہے) لاحق ہو جاتا ہے اسی وجہ سے اس کا نام مناعت ذاتیہ رکھا گیا ہے۔ کیونکہ مقابلہ کی قوت خود اس کی ذات میں پیدا ہو جاتی ہے۔

(۲) مناعت قہریہ۔ جبکہ استحصال مناعت کے لئے خود کسی حیوان کے نظام جسم پر تو کوئی بار عمل تلخ کے ذریعہ نہ ڈالا جائے۔ بلکہ کسی دوسرے پہلے سے تلخ شدہ حیوان محفوظ کی مائیت یا مصل (دافع جراثیم) کو حاصل کر کے اس کے جسم میں داخل کر دیا جائے تو اس عمل کے ذریعہ بھی اسے مناعت حاصل ہو جائیگی۔ چونکہ اس عمل میں اس حیوان پر خود کوئی بار نہیں پڑتا بلکہ دوسرے حیوان کے

۱۔ سمین۔ ٹاکسین۔

۲۔ فادسمین۔ اینٹی ٹاکسین۔

۳۔ مناعت ذاتیہ۔ ایکٹیو ایوونیٹی۔

۴۔ مناعت قہریہ۔ پے سو ایوونیٹی۔

۵۔ محفوظ۔ ایوونائزڈ۔

۶۔ مصل دافع جراثیم۔ اینٹی کلیریل سیرم۔

جسم سے نکالا ہوا مصلِ افح جراثیم بنانا یا اُسے بل جاتا ہے۔ اور مرض کے مقابلہ کی قوت بخشتی ہے۔ لہذا اس طرح حاصل شدہ مناعت کو عموماً قہریہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی گھوڑے کے جسم میں پہلے جراثیم کو آڑ تلیق کے ذریعہ داخل کر کے اُسے مرض کو آڑ سے محفوظ بنا دیا جائے اور پھر اس طرح محفوظ کیے ہوئے گھوڑے کا مصل خارج کر کے کسی دوسرے گھوڑے کے جسم میں پکڑاری کے ذریعہ داخل کر دیا جائے تو دوسرا گھوڑا بھی کو آڑ سے معت بلکہ کی طاقت حاصل کر لے گا۔ یعنی وہ مناعت قہریہ حاصل کر لے گا۔ مگر اس عمل میں دوسرے گھوڑے پر مصل کی پکڑاری کے بعد کوئی مضرا اثر ظاہر نہ ہوگا۔ اور وہ مرض سے حفاظت بخشنے والی رطوبت کو (جو پہلے ہی دوسرے جانور کے جسم میں طیار ہو چکی ہے) محض انفعالی طور پر قبول کرے گا۔ اس قسم کے تریاق جراثیمی یا فادسمین کی پکڑاری اگر انسان میں کی جاوے تو اکثر اوقات بعض عارضی خفیف اثرات (مثلاً حرارت، اعضا شکنی، انخمال، جلد پر خارش و مہنیاں وغیرہ) ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مگر باوجود ان خفیف علامات کے ایسی پکڑاری سے جو مناعت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ فی الحقیقت انفعالی ہی ہے۔ یہ عارضی علامات ہمیشہ اور ہر حالت میں نہیں پیدا ہوتے۔ اور ممکن ہے کہ ان کا ظہور دیگر خارجی اسباب پر مبنی ہو، مناعت قہریہ ایسے جانور کے مصل سے نہیں حاصل ہو سکتی جو طبعاً مناعت رکھتا ہو۔ یعنی طبعی طور پر محفوظ ہو، مثلاً ادنی حیوانات بیشتر مرض آتشک کی مناعت طبعی رکھتے ہیں۔ اور آتشک ان پر اثر نہیں رکھتی۔ پس اگر اس قسم کے حیوانات کی مائیت نکال کر انسان کے جسم میں داخل کر دی جائے تو انسان مرض آتشک سے نہ تو محفوظ ہو سکتا

مصلِ مناعت طبعی نیچپل ایسوفی ٹی۔

مصلِ جراثیم کو آڑ۔ میس ٹے ٹے مس۔

مصلِ فادسمین۔ اینٹی ٹاکسین۔

اور نہ آتشک موجودہ سے شفا حاصل کتا ہے ۔

مصل کے ذریعہ شفا یا حفظاً تقدم خصوصاً ایسے نوعی جراثیم سے حاصل ہو سکتی ہے۔ جو خارج غلیہ سین بنانے پر قادر ہوں۔ مثلاً جراثیم خناق و بانی یا کزاز کا مصل ۔

مناعت ذاتی اور مناعت قہری کے درمیان تفریق کے اور بھی چند ممتاز وجوہ ہیں مثلاً (۱) مناعت قہری مصل دافع جراثیم لگانے کے بعد فوراً ہی حاصل ہو جاتی ہے۔ مگر مناعت ذاتی حاصل کرنے کے لئے سمیات جراثیم یا زندہ یا مردہ جراثیم کی کشتیں پککاری کے ذریعہ بڑھتی ہوئی مقدار میں بتدریج مناسب وقفہ کے بعد لگائی جاتی ہیں۔ جن کے اثر سے مناعت تدریجاً حاصل ہوتی ہے و عموماً یہی مناعت پککاری لگانے کے کم از کم ایک ہفتہ کے بعد حاصل ہوتی ہے (۲)۔

(۲) مناعت قہری نسبتاً کم عرصہ تک قائم رہتی ہے۔ ابستہ اگر مصل دافع جراثیم کی پکاریاں بار بار دی جائیں تو اس قسم کی مناعت قدر تا زیادہ دیر پا ہو سکتی ہے ۔

مصل دافع کزاز کی ایک خوراک پککاری کرنے کے بعد حاصل شدہ مناعت تقریباً دو ماہ تک قائم رہتی ہے ۔

برخلاف ان میں مناعت ذاتی عموماً بہت زیادہ دیر پا ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کی مدت بھی مختلف حالات و امراض میں مختلف ہو سکتی ہے۔ مثلاً آتشک یا چیچک کے بیشتر مریضوں میں حاصل شدہ مناعت ذاتی مستقل اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہوتی ہے۔ مگر فائز الریہ و درم شش (۱) اور حمزہ دسر خاوند (۲) کے بعد حاصل شدہ

۱۔ نوعی خصوصی۔ اپنے سے ٹک۔
۲۔ حمزہ دسر خاوند۔ اری سپلس۔

۱۔ سین خارج غلیہ۔ اکثر ایلیوں کا کین۔
۲۔ خناق و بانی۔ دفعہ تیریا۔

مناعت ہووے عرصہ کے بعد ہی جاتی رہتی ہے +

عملیات مناعت کے نظریات :-

پہلے یہ بخوبی سمجھ لینا چاہئے کہ عمل مناعت کے دو مخصوص خاصائص ^۱ تشریح طلب ہیں۔ یعنی ایک تودہ مناعت جو خود جراثیم کے حلوں سے محفوظ رکھتی ہے (مناعت ضدہ جراثیم) اور دوسری وہ جو حراثشی سمیات درطوبات موزیہ کے خلاف اثر رکھتی ہے (مناعت ضدہ سمین) مثلاً اگر خناق وہائی کے زندہ جراثیم کی کشت معہ اونکے پیدا کر وہ سمیات کے کسی ذی استعداد جانور میں پککاری سے لگائی جائے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جراثیم خناق تو حیوان معمول کے جسم کی ساختوں میں افزائش و نمو حاصل کرتے رہیں گے۔ مگر اونکے سمیات کا موزی اثر نہ صرف مقامی رہے گا بلکہ سمیات دور دراز مقامات پر بھی مضر اثر پیدا کر دینگے۔ لیکن اگر یہی جراثیم کی کشت سمیات کی (پککاری کسی ایسے حیوان میں لگائی جائے جو پیشتر ہی سے تلقیح حاصل کے ذریعہ یا فطرتی طور پر مناعت حاصل کر چکا ہو، تو جراثیم فوراً ہلاک ہو جائینگے۔ اور اونکے سمیات کا بھی کوئی اثر حیوان معمول میں پیدا نہ ہوگا۔ اس جراثشی مناعت کی بحث پہلے درج کی جاتی ہے +

(۱) نظریہ درطوبہ :-

اس نظریہ کی رو سے یہ مانا جاتا ہے کہ خون اور اسیت عروق جاذبہ و غیر وہیں بعض مواد ایسے ہیں جن میں سے چند جراثیم کو ہلاک کر دینے کی خاصیت رکھتے

۱۔ نظریات۔ تھمپریز۔

۲۔ خاصائص۔ پروپریٹیز۔

۳۔ مناعت جراثشی۔ میکٹیریل ایسوفنی

۴۔ مناعت سمین۔ ایسوفنی ٹی ٹوٹاکسین

۵۔ جراثشی میکٹیریل۔ مناعت ایسوفنی ٹی۔

۶۔ نظریہ درطوبہ۔ ہیڈمرل تھمپریز

ہیں۔ جنکو موادِ محافظہ یا تکملہ کہا جاتا ہے۔ اس نظریہ کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ تازہ خون اور خصوصاً تازہ مائیتِ خن (مصل دموی) میں جراثیم کو ہلاک کرنے کی خاصیت تجربہ مشاہدہ کی گئی ہے۔ لیکن اگر کیم درجہ کی حرارت نصف گھنٹہ تک دی جائے۔ یا یوں ہی خن اور مائیت کو ایک آدھ روز کے لئے چھوڑ دیا جائے تو قتلِ جراثیم کی یہ قوت مفقود ہو جاتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مدافعتِ جراثیم کی یہ قوت ان رطوبات کے اندر چند مخصوص مواد (موادِ محافظہ) سے ہوتی ہے جو حرارت کے اثر سے ضائع ہو جاتی ہے۔ خن اور مائیت میں اکثر جراثیم کی مصنوعی کشت اگائی جاتی ہے مگر یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ حرارت کے ذریعہ ان کی قوتِ ممانعت کو مار کر ان کو جراثیم کے لئے بے ضرر کر دیا جائے (یعنی ان کے موادِ محافظہ ضائع کر دیے جائیں) +

(۲) نظریہ خلویہ :-

ملک روس کے مشہور آفاق محقق "زمیٹنی کاف" نے قوتِ قتلِ جراثیم کا ایک نظریہ پیش کیا ہے۔ یہ نظریہ ابتدائے نظریہ رطوبیہ سے مخالف سمجھا جاتا تھا۔ مگر بعد کی تحقیقات سے ہر دو نظریات میں بچانے اختلاف کے قرب و مشابہت ثابت ہو گئی ہے +

اس نظریہ کی بنیاد علامہ موصوف کے مشاہدات سے ابتدائیوں ہوتی کہ اُس نے حیواناتِ دنیہ (حیوانات) کے بعض یک خانہ اجسام مثلاً حُرنیہ مستحکمہ

۱۔ بیضاوات
خون کے سفید دانے { فانی گوسائیٹس

۲۔ حُرن
حیواناتِ دنیہ { پر دوزوا۔

۳۔ برغوث۔ پود۔ کلی۔

۴۔ یک خانہ۔ یعنی سیلیولر۔

۱۔ مصل دموی۔ بڈیرم۔


۲۔ موادِ محافظہ۔ الکیمین۔

۳۔ نظریہ خلویہ۔ سیلیولر تھیوری

۴۔ انجم بیضاوات { فانی گوسائیٹس
قوتِ قتلِ جراثیم

۵۔ کلی۔ یا الکیمین۔

(۷) ہجوم بیضادات یا نسل قتل جراثیم



(۷) اس شکل میں یہ دکھلایا گیا ہے کہ خون کے سفید دانے (بیضادات) جراثیم ورنیہ (سلیہ) کو کس طرح اپنے اندر یکہ مضہم کر رہے ہیں۔

دایمی بائیں یہ مشاہدہ کیا کہ یہ پانی کے اندر کے جراثیم کو کھینچ کر عمل انہضام کے ذریعہ اپنے جسم میں داخل کر کے انہیں تحلیل کرنے کے بعد اپنی غذا بنالیتے ہیں۔ اس مشاہدہ کی بنا پر محقق موصوف کا خیال اعلیٰ حیوانات کے خون کے ان سفید دانوں کی طرف منتقل ہوا جو شکل و صورت اور قوت نقل و حرکت میں اس سے بہت کچھ مشابہت رکھتے ہیں۔ تجربہ نے ثابت کر دیا کہ یہ سفید دانے جراثیم کو گھیر کر جذب و مضغ اور تحلیل کرنے کی طاقت مری ہی رکھتے ہیں جیسی کہ حیدرہ متشکلہ دایمی (یا) اور دیگر حیوانات دنیہ میں ہوتی ہے +

خون کے سفید دانوں کی اس قوت جذب و مضغ کا نام ہجوم بیضادات ہے۔ ہجوم بیضادات کے عمل کا ایک بین نمونہ تازہ پانی کے ایک قسم کے پتھر برغوث اللام میں دیکھا جاتا ہے۔ اس چھوٹے سے جانور کا جسم اس قدر شفاف ہے کہ اس عمل کا تمام و کمال مظاہرہ اس میں جیتے جی، غور و بین کی مدد سے، بخوبی مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ اس پتھر میں نظر کی ایک قسم منفرد و ابتر کے اثر سے ایک خاص قسم کا مرض پیدا ہو جاتا ہے جراثیم فطریہ اس کے جسم کی ساختوں میں داخل ہونے کے بعد بڑھ کر نشو و نما پانے لگتے ہیں۔ ابتداءً فطر کے بذر غذا کے ساتھ ساتھ ہی پتھر کے مجری غلغلی میں داخل ہوتے ہیں، اور وہاں سے اندر گھس کر جسم کی فضائوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب اگر ان کی مداخلت نہ کی جائے تو وہ نشو و نما پا کر اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ پتھر کا پورا جسم ان ابتداء سے برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر جراثیم فطریہ کے ابتداء محض محدود و چند ہی پتھر کے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے نظام مداخلت

مٹ برغوث اللام - دائرہ فلی -

مٹ فطر فنگس -

مٹ منفرد البذر - مونوسپورا

ہجوم بیضادات - فانی گوسائی

مٹ دوسس -

مٹ محض بینغ - امیٹون -

اور قوت مقابلہ میں تحریک پیدا ہوتی ہے، اور سفید دانوں کی فوج مجتمع ہو کر ان چند اذکار کو گھیر لیتی ہے اور بالآخر اذکار کو جذب و تحلیل کر کے نیست و نابود کر دیتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ”ڈیفینہ“ پتو جراثیم فطریہ کے منفرد البذر کے مقابلہ میں ایک حد تک طبعی مناعت رکھتا ہے اور یہ مناعت صرف سفید دانوں کی قوت نیست پر انحصار رکھتی ہے۔

مندرجہ بالا مظاہر عجیبہ کی کیفیت سے علامہ موصوف متاثر ہوا کہ اس نے هجوم بیضانات کی بہت سی مثالیں اعلیٰ حیوانات اور خود حضرت انسان میں ڈھونڈ نکالیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی قسم کے جراثیم غیر مرضیہ کی کاشتیں بیکاری سے کسی حیوان کے کینہ صفاق کے اندر داخل کر دی جائیں، اور مختلف وقتوں کے بعد بار بار ان کا امتحان کیا جائے تو ابتداً تو جوف صفاق کے اندر جراثیم آزادانہ پڑے ہوئے پائے جائیں گے، بعد ازاں یہ جراثیم سفید دانوں کے مادہ حیات کے اندر گھرے اور پھنسنے ہوئے نظر آئیں گے مگر اس درجہ تک ان کے اشکال و خصائص قبول رنگ طبعی طور پر پائے جائیں گے بالآخر کچھ عرصہ کے بعد ان جراثیم کی شکلیں بوجہ اعمال جذب و تحلیل کے تبدیل ہو کر دھندلی اور کثیف نظر آئیں گی۔ اور گیائی رنگ سے بھی یہ صاف نمایاں نہ ہوں گے۔

بعینہ اسی قسم کا مشاہدہ سل کے جراثیم سے متاثر شدہ ساختوں میں بھی ہوتا ہے۔ خصوصاً ایسی ساختوں میں جان سے متاثر ہونے کے بعد منسل و شفیاب جو رہے ہوں۔ یہاں بھی جراثیم سل خلیات اگلے جراثیم کے کھانے والے دانے سے گھرے ہوئے پائے جائیں گے۔ مگر خلیات سفید دانے نہیں ہوں گے۔ بلکہ جھلی کے خلیات مبطنہ ہونگے یعنی یہ جھلی کے اندر مٹی طبقہ کے ذرات ہوں گے۔

۱۔ جراثیم غیر مرضیہ۔ ۲۔ پے تاجہ تک کر کے نزر۔ ۳۔ خلیات بڑھنے۔ ۴۔ انڈو مٹی میل سبز۔

و اعلم ان
مفصل

اب یہ جاننا چاہئے کہ جب جراثیم داخل جسم ہوتے ہیں تو سفید دانے کی طرح
اون تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ یککشتش ہے جو انکو مقام ماؤت پر کھینچ ملائی
ہے۔ فی الحقیقت خود جراثیم چند ایسے محلول مرکبات خارج کرتے ہیں جو سفید
دانوں کے لئے ایک خاص کشش رکھتے ہیں اور انکو اپنی جانب متوجہ کر کے
کھینچ لیتے ہیں۔

پس دیگر مواد کی طرح سفید دانے اس کشش سے متاثر ہو کر اوس مقام پر
مجمع ہو جاتے ہیں جہاں ان لیزیم مرکبات کا ذخیرہ کثیر موجود ہے اور ایسا ذخیرہ
وہیں دستیاب ہوتا ہے جہاں جراثیم زیادہ مقدار میں موجود ہوتے اور افزائت
بناتے ہیں اس کشش کو اصطلاح میں "نظم کیما دی" کہتے ہیں یعنی مرکبات
کیما فی کی وہ کشش جو زندہ غلیات کو اپنی طرف متقل کر لیتی ہے۔ بعینہ ہی کشش
حیوانات اور نباتات کے افراد میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ مثلاً اگر ایک شیٹ کی
باریک نکی راغوبہ شمریہ میں گوشت کا خلاصہ یا شور بار کھا جاوے اور پھر اس کا
منہ جراثیم حمی معویہ کی آبی کشت میں رکھ دیا جائے تو جراثیم حمی معویہ فوراً شیٹ
کی نکی کے اندر داخل ہو جائیں گے اور شوربہ کی کشش اور انکو اپنی طرف متقل کر لیں گی۔
نظم کیما دی کی ایسی ہی صورت پہوڑے (خراج کی حالت میں نمایاں ہوتی ہے۔

جراثیم صدیدیہ کی خاصیت ہے کہ وہ چند لیزیم کیما فی مرکبات بناتے ہیں جن کی
کشش سے سفید دانے کھینچ کر مقام التهاب پر چلے آتے ہیں اور وہاں ان مرکبات
کے ارد گرد حلقہ ڈال لیتے ہیں۔ ان مرکبات میں سے قدرے خون میں ہی جذب
ہو جاتے ہیں اور ہڈیوں کے مغز کے اندر سے سفید دانے ان کی طرف کھینچے چلے

۱۲۰ حمی معویہ۔ مائی فائبروز

۱۲۱ نفی۔ ع۔ انعام۔ بوں سیر۔

۱۲۲ نظم کیما فی۔ کیوٹا کسن۔

۱۲۳ الفت کیما دی۔ کیکیل ائی ٹی۔

۱۲۴ انڈو پٹھر۔ بکری ٹیوب۔

آتے ہیں۔ اس طرح سفید دانوں کا نہ صرف ایک مقامی محج خراج میں ہو جاتا ہے، بلکہ نکلنا جسم میں بھی عموماً سفید دانوں کی تولید میں افزائش ہو جاتی ہے۔ سفید دانوں کی یہ افزائش مقدار متنازعہ بنایاں ہوتی ہے کہ جب کبھی یہ جاننا ہو کہ بدن کے کسی حصہ میں سپ موجود ہے یا نہیں۔ تو خون کا ایک قطرہ لیکر غردین میں دیکھتے ہیں۔ اگر اس قطرہ میں سفید دانے معمول سے زیادہ نظر آتے ہیں تو گمان غالب ہوتا ہے کہ سپ یا خراج موجود ہے۔ (ترجمہ)

محقق روسی نے تحقیقات سے معلوم کیا کہ آن مرضی میں جن میں بجم بیضاؤں کا عمل تیز و نمایاں تھا، اکثر ہشٹا ہو گئی، مگر جب کبھی یہ عمل خفیف و کمزور رہا تو جراثیم کی افزائش مسلسل جاری رہی اور بالآخر مریض نفاذ اجل ہو گیا۔ اس سے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ ممانعت کا دار و مدار اور متاثر انحصار سفید دانوں کی موجودگی و کثرت پر ہے۔ علاوہ ازیں اس نے یہ بھی دریافت کیا کہ ادن حیوانات میں، جن میں ممانعت اکتسابی پیدا ہو گئی تھی، سفید دانے جراثیم کو جذب و مضہم کرنے کی قوت رکھتے تھے۔ دراصل ایک اکتساب ممانعت سے پہلے ادنیں حیوانات کے سفید دانوں میں یہ طاقت نہ تھی، ان تجربات و مشاہدات کی بنا پر علامہ موصوف نے یہ ترجیح پیش کی کہ عمل تلقیح یا مرض سابق کے اثر سے سفید دانوں کو جو ایک گونہ تجربہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس تجربہ و تربیت سے آخر کار ممانعت اکتسابی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس پر معترضین نے اعتراض کیا کہ سفید دانے محض مردہ جراثیم یا کم از کم محض غیر سخی جراثیم کو کھایا کرتے ہیں +

لیکن فاضل روسی نے اپنی فنی مہارت سے چند عسی نامی جراثیم کو الگ کر کے دکھلایا۔ جن کو سفید دانوں نے کھایا تھا۔ اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ جراثیم زندہ اور زہریلے تھے +

بایںہ نہ ہجوم میضانات کا نظریہ اہلی صورت میں ہر جگہ تسلیم نہیں کیا گیا، اور بعض حالتوں سے اس کی تطبیق اصولاً نہیں ہو سکی۔ مثلاً سائل لاصقون رکودیون امیں اگر زندہ جراثیم کو بند کر کے کسی محفوظ جانور کے جوف صفاق میں رکھ دیا جاوے، تو اگرچہ لاصقون مذکور کے خلاف کے اندر محلول رطوبات بدن تو گزر سکتی ہیں مگر سفید دانے اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، پھر ہی جراثیم سفید دانوں کی موجودگی کے بغیر مردہ پائے جاتے ہیں۔ مزید تفتیش نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ جو جراثیم بالآخر سفید دانوں کے اندر اونگے اثر سے مردہ پائے گئے، وہ ان دانوں کے اندر مقید ہونے سے پہلے ہی ایک حد تک اپنے خط و خال، شکل و مشابہت، قوت عکس انوار و دیگر خصوصیات بدل لیتے ہیں، جس سے یہ یقین ہوتا ہے کہ سفید دانوں میں داخل ہونے سے پہلے ہی کسی دوسری خارجی شے کے مخالف اثر سے متاثر ہو چکے ہوتے ہیں، اگرچہ بالآخر سفید دانے ہی اودھ کا قلع فتح کرتے ہیں۔

مگر یہ عجیب بات ہے کہ جراثیم سفید دانوں سے باہر اسی وقت تباہ ہوتے ہیں جبکہ جراثیم کے گرداگرد سفید دانے محاصرہ کیے ہوئے پائے گئے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مواد حافظہ سفید دانوں سے بنتے ہیں۔

اس انکشاف کے بعد محققین نے مندرجہ بالا ہر دو نظریات و نظریہ رطوبیہ و نظریہ خلویہ کے درمیان باہمی رفع اختلاف کر کے ایک درمیانی نظریہ قائم کیا، جس کا نام (۳) نظریہ خلویہ رطوبیہ رکھا گیا، جو دونوں کے درمیان ایک مشترک نظریہ ہے۔

یہ نظریہ، نظریہ رطوبیہ سے اس امر میں متفق ہے کہ جراثیم کی طاقت جزئی

عکس انوار۔ ریفلیکٹیوٹیٹی۔

نظریہ خلویہ رطوبیہ۔ سینولوجیومرل تھیوری۔

کالوڈین۔
سائل لاصقون

یا کئی طور سے رطوبات جسم کے اثر سے واقع ہوتی ہے، اور نظریہ خلل سے یوں ہم راسے ہے کہ نظام جسم کی حفاظت اور دفع مرض کے فعل میں سفید دانے ہی متاثر صحت دیتے ہیں، مگر نظریہ غلویہ سے اسے اختلاف اس امر میں ہے کہ اس آخری نظریہ کی دوسرے سفید دانوں کا فعل دو گونہ مانا جاتا ہے، اول تو کیمیائی اثر جس کی وجہ سے جراثیم کی شدت و سمیت میں خفت ہوتی ہے (اور دوسرا ہجوم بیضانات جس کی وجہ سے جراثیم ہضم و تحلیل ہو جاتے ہیں)

بہت سی باتوں سے اس آخری نظریہ کی صداقت پائی جاتی ہے، مگر پھر بھی یہ نظریہ عمل مناعت کی پوری پوری توجیہ و تحلیل میں قاصر ہے۔ مثلاً علامہ بھنگ نے جو تحقیقات و تجربات مناعت قہریہ اور خصوصاً خناق و بائی کے متعلق کئے ہیں۔ اور اس سے ثابت ہوا ہے کہ مصل فادسین (یا تریاق جراثیم) جو خود نفس جراثیم پر تو مہلک اثر نہیں رکھتا، مگر مرض خناق کو اچھا کر دیتا ہے۔ لہذا یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس مصل کا اثر مواد حافظہ یا مواد قائل جراثیم کی وجہ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر ان کی وجہ سے ہوتا تو جراثیم پر بھی مصل کا مہلک اثر ہو جانا چاہئے تھا) اس اعراض کا جواب روسی نعتن نے یوں دیا کہ ”مصل فادسین (تریاق جراثیمی) کے اثر سے اگرچہ جراثیم پر براہ راست کوئی اثر نہیں ہوتا، مگر سفید دانوں میں اس کے اثر سے انتشار واقع ہو کر ان کا خلل جذب و ہضم تیز تر ہو جاتا ہے نہ یہ جواب اگرچہ نام و کمال تو صداقت پر مبنی نہیں ہے مگر اس کی تہ میں صداقت کا ایک پہلو ضرور پوشیدہ ہے۔ جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے۔ تحقیقات مابعدہ سے بخوبی متکشف ہو گیا کہ تریاقات جراثیمی کا اثر نہایت سادہ ہے۔ ہر تریاق اپنی مخصوص سمیت (سمین) کے ساتھ متحد ہو کر ایک ایسا مخلوط مرکب بنا دیتا ہے

جو علانے ضرر ہوتا ہے۔ اس قول کی تمام شہادتیں تو یہاں درج کرنے کی
چنداں ضرورت نہیں مگر اثبات دعویٰ کے لئے صرف ایک ثبوت کافی ہوگا
جو درج ذیل کیا جاتا ہے۔

”بعض جراثیم، مثلاً عصی کزازیہ، ایسے مواد سمیہ پیدا کر دیتے ہیں۔ جن کے
اثر سے خون کے سرخ دانے محلول ہو جاتے ہیں (یعنی یہ سمیات تھن و پیچ خون
کا باعث ہیں)۔ بدینہ وجہ ان مرکبات کو مدن یب دم جراثیمی (جراثیمی محلول خون)
کہتے ہیں۔ چونکہ تحلیل خون کے یہ تجربات بدن سے باہر سفیشہ کی ٹنکی کے اندر کیئے
جاسکتے ہیں، اس لئے زندہ سا ختمائے جسم کے فعل یا عجم ہیضانات کا عمل ان
تجربات میں عامل نہیں ہو سکتا۔ (کیونکہ یہ تجربات خارج از جسم کیے جاسکتے ہیں)۔
اب یہ بخوبی ثابت ہو گیا ہے کہ مصل ضد کزاز (فادسمین کزازی) اگر ایک ایسی شے
کی ٹنکی میں داخل کر دیا جائے جس میں عصی کزازیہ کی کاشت کے ساتھ خون بھی شامل
ہو تو عصی کزازیہ کا عمل تحلیل خون (جو مصل مذکور کی غیر موجودگی میں برابر ظاہر کرتے
ہیں) ہرگز نمودار نہ ہوگا۔ بعینہ یہی عمل مصل ضد کزاز کے اثر سے زندہ حیوانات
کے جسم میں ہی واقع ہو جاتا ہے۔ اس تجربہ سے ثابت ہو گیا کہ مصل ضد کزاز کے
اثر سے محض ایک گونہ کیمیکائی تعادل ہو گیا جیسا کہ تیزاب میں شوریت کے اثر سے
ہو جاتا ہے۔“

کزاز اور خناق وہابی کے فادسمین دریافت ہو جانے کے بعد بے شمار
امراض کے سمین (زہر) کے اندفاع کے لئے تریاقات دریافت کرنے کا دواؤ

مصل مزیدیم جراثیمی، بیکٹیریل ہیملو لائی سین۔

مصل تعادل۔ نیز ٹیسٹ لائی ٹیسٹ۔

مصل تعادل کی یاد کی بیکٹیریل ٹیسٹ لائی ٹیسٹ۔

مصل تذبذب خون۔ ہیملو لائی سین

مصل مزیدیم { ہیملو لائی سین
مصل محلول خون

کھل گیا۔ جو اہر قلوبہ (زہانتیہ) اور معدنی سمیات کے لئے تو فادسین بنانا ممکن نہیں
 مگر بعض حیوانی و نباتی سمیات مثلاً سانپ کے زہر، بام پھلی کے مصل، آئیرش کے
 سہی جوہر جبکہ آئیب رن کہتے ہیں (روغن ارڈل کے سہی جوہر وغیرہ اور چند دیگر
 جراثیمی سمیات) دفع کرنے کے لئے مصل یا جراثیمی تریاقات تیار کیے گئے۔ مسند جراثیم
 تمام سمیات میں یہ ایک عام اصول پایا گیا ہے کہ اول تو وہ مقام زندہ اجسام کے
 اندر ہنگرتیا ہوئے ہیں، خواہ یہ زندہ اجسام نرہ حیوانی میں سے ہوں یا نرہ نباتی
 سے تعلق رکھتے ہوں، دویم یہ کہ یہ سب سمیات یا تو مواد لحمہ (مواد شورجینیہ)
 کے قسم کے یا ان کے مشابہ ہوتے ہیں۔

فادسین کا اسلوب عمل

(جو اوپر بیان ہو چکا ہے) ممانعت کے بعض اقسام کے طریقہ عمل پر کچھ روشنی
 ڈالتا ہے۔ مگر ممانعت طبعی سے فادسین کا کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ
 وہ حیوان جو کسی مرض مثلاً کزاز سے فطرۃً محفوظ ہے اور کاغون فادسین کزاز
 کا کوئی جزو نہیں رکھتا، لیکن اگر کوئی حیوان مرض کزاز سے بیمار ہو کر شفا یاب ہو گیا
 ہو دینے اور سے کزاز کے لئے ممانعت الکسائی "حاصل ہو گئی ہو" تو اس حالت
 میں فادسین کی آمیزش اس کے خون میں برابر پانی جلے گی اور جب یہ مصل وجود
 ہے تو جراثیم کزاز اس لئے مواد سمیہ ایسے جانور میں بنائیں گے تو وہ فوراً بے اثر و

۱۔ جو اہر قلوبہ۔ اکلانڈ۔

۲۔ جوہر ہیدہ انجیر۔ سی سین۔

۳۔ معدنی سمیات۔ مسٹرل پوائز۔

۴۔ مصل جنگلیں۔ ایل سیرم۔

۵۔ جوہر آئیرس۔ آئیرین۔

۶۔ مواد لحمہ۔ پروٹینڈ۔

۷۔ مواد شورجینیہ۔ ناشٹرو جے من۔

بے ضرر (متعاول) بنا دیے جائیں گے اور جب سمیات بے ضرر بن گئے تو اس نے اوس حیوان کے جسم کی ساختوں کو کچھ مضرت نہیں پہنچ سکتی اور وہ هجوم بیضیات یا دوسرے عمل سے بالآخر خارج ہو جائیں گے۔ بعینہ یہی اسلوب عمل مناعتِ فقویہ کی صورت میں رونما ہوتا ہے، یعنی جو تریاق سین مصنوعی طور سے خون میں تلخ کیا جاتا ہے، وہ ذرا سمیات موجودہ کے ساتھ متحد ہو کر انکو بے ضرر بنا دیتا ہے اور پھر ان سے ساختہائے جسم کی خلیات کو مرض کے اثر سے پناہ مل جاتی ہے +

فادسمین کا بننا

فادسمین کس نفع سے بنتے ہیں؟ یہ جاننا بھی باقی ہے۔ اس کے متعلق پیشا نظریات و قیاسات پیش کیے گئے ہیں، مگر ان سب میں علامہ اہرلک کا نظریہ ”سلسلہ جانبیہ“ زیادہ اہم اور وقع معلوم ہوتا ہے۔ یہ نظریہ اگرچہ نہایت دقیق و پیچیدہ ہے، مگر حقائقِ اصلہ کی تجویہ و تحلیل اس سے خوب ہوتی ہے۔ اور اس کا اثر موجودہ علم الامراض کے خیالات پر نہایت شدید ہے۔ اس لئے اس مسئلہ کی اہم اور نمایاں خصوصیات درج فریل ہیں۔

نظریہ سلسلہ جانبیہ

سمین کے اندر دو مخصوص خواص ہوتے ہیں۔ پہلی خاصیت تو بدن کے کریٹ (ذرات) کو زہر پہنچانے (ہلاک کرنے) کی۔ اور دوسری خاصیت فادسمین کے

۱۔ متعاول۔ نیوٹرے لائڈ۔	۲۔ سین۔ ٹاکسین۔
۳۔ هجوم بیضیات۔ فیکوسائی ٹوسیس	۴۔ فادسمین۔ اینٹی ٹاکسین۔
۵۔ فادسمین۔ اینٹی ٹاکسین	۶۔ ذرہ۔ مالی کیولم
۷۔ نظریہ سلسلہ جانبیہ۔ سامٹ چین تھیوری۔	۸۔ کریات۔ رسیلز

کے ساتھ متحد ہونے اور جڑ جانے کی ہے۔ علامہ اہرلک نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ دونوں خواص سین کے ذرات کے دو مختلف اور جدا گانہ حصوں میں رہتے ہیں۔ یعنی ہر ایک ذرہ کا ایک خاص حصہ تو ایسا ہے جو فاسمین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور دوسرا خاص مقام ایسا ہے جو طلیات جسم کو مضرت پہنچاتا ہے پہلے قسم کے حصہ جزو کو اہرلک نے حامل لمسٹ (چھوٹے والا حصہ) کے نام سے نام زد کیا ہے، اور دوسرے حصہ کو حامل سسر (سی حصہ) کے نام سے پکارا ہے +


اس کے بعد اہرلک یہ فرض کرتا ہے کہ زندہ مادہ حیات کا ہر ذرہ دو حصوں سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ متاثرہ حصہ جو نفس خلیہ کا رجن کا کردہ مادہ حیات ہے (نفل مخصوص اذاکر تہے، اور دوسرا حصہ وہ جو پہلے حصہ کے تغذیہ کا کام سر انجام دیتا ہے۔ اس دوسرے حصہ میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ خون یا مائیت وغیرہ میں جو مواد لحمہ محلول ملین اونکے ذرات کے ساتھ متحد ہو کر جڑ جائے اور پھر اونکو اپنے زندہ مادہ حیات کے تبدیل کر لے۔ یہ نفل تغذیہ خلیہ کے سلسلہ جانبیہ یا مخصوص اجزاء کا حصہ ہے۔ جن کی مدد سے خلیہ ریا اوسکا مادہ حیات (غذا کے مواد لحمہ کے ذرات سے جڑ کر متحد ہو جاتا ہے۔ غذا کا ہر ذرہ بھی سین کے ذرات کی طرح ایک مخصوص حصہ حامل لس کا رکھتا ہے۔ مگر حامل سم غذا کے ذرات میں نہیں پایا جاتا۔ چنانچہ تغذیہ خلیہ کے عمل میں ابتدائی مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ خلیہ کے سلسلہ جانبیہ میں سے ایک زائدہ یا کڑی مواد لحمہ کے ذرہ

مسٹ مائیت - لطف
مسٹ مادہ لحمہ - پروٹینڈ

مسٹ حامل لس -
" مس -
مسٹ حامل سم -
ہیپٹوفور
ٹاکسوفور

کے حامل اس سے متحد ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو فاضل موصوف شقیق البحر نامی پرودہ کے عمل سے تشبیہ دیتا ہے۔ جس میں وہ اپنے مشابک نامی زوائد سے غذاء کے ذرات کو پکڑتا ہے۔ یہ بھی جانا چاہئے کہ خون میں بہت سے اقسام کے مواد ملجہ ہوتے ہیں، اور ہر قسم کے ذرات کا ایک مخصوص ممتاز حامل اس ہوتا ہے تکمیل تغذیہ کے لئے ضروری ہے کہ خلیہ جسم کے سلسلہ جانیہ کی ہر کڑی کے ساتھ غذا کا یہ مخصوص حامل اس ہٹیک ہٹیک جڑ کر مل جائے اور جس طرح کچی قفل میں پیٹھ جاتی ہے اسی طرح ہٹیک نصب ہو جائے، ورنہ اگر غذا کا حامل اس ہٹیک طور پر نہ جڑے گا تو وہ تغذیہ خلیہ کے لئے لامحل ہو گا۔

اب اس اصول کی تطبیق سین کے فعل کے ساتھ کرنے کے لئے یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ سین کی ساخت بھی مواد ملجہ جیسی یا اد کے مشابہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی محمول سیال مثلاً سین کرازی کسی جانور کے جسم میں تلیق کیا جاوے، تو ممکن ہے کہ اس جانور کے خلیات کے سلسلہ جانیہ کا حامل اس ہٹیک اس پیمانہ کا نہ ہو جو سین کے حامل اس سے بخوبی متحد ہو سکے۔ پس ایسی حالت میں سین اس جانور کے خلیات کے ساتھ نہیں جڑ سکے گا اور سمیات کا مضر اثر پیدا نہ ہو گا۔ لیکن اگر خلیات کے سلسلہ جانیہ مناسب پیمانہ کے ہیں۔ تو وہ سین کے حامل اس کے



ساتھ ملکر اسی طرح متحد ہو جائینگے جیسے کہ وہ غذائے کسی مناسب حامل سی کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ چونکہ سین کے ذرہ میں حامل سی کے ساتھ حامل سم ہی سلسلہ جانیہ کے توسط سے جڑا ہوا ہے، اس لئے یہ حامل سی اب اس قابل ہو جائے گا کہ غلیظہ پر مضر اثر ڈال سکے۔ پس نتیجہ یہ ہوگا کہ غلیظہ کے مادہ حیات کا مخصوص حصہ جو اذخاں و اعمال غلیظہ سے متعلق رکھتا ہے خیر کی تاثیر کی طرح بیکار ہو جائے گا۔ یہ الفاظ دیگر کتب خلیئہ کے عمل میں (جو سین حقیقی سے ہوتا ہے) ابتدائی مرحلہ ٹیک اسی طور پر ہوگا جیسا کہ تغذیہ خلیئہ کے عمل میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔

اب فرض کرو کہ غلیظہ کے چند سلسلے جانیہ سین کے ذرات کے ساتھ ملکر جڑا چکے ہیں جس کی وجہ سے زمرہ غلیظہ (کا ذرہ) مازوف ہو گیا ہے۔ مگر قطعاً ہلاک نہیں ہوا۔ جسم غلیظہ کے تغذیہ کے لئے سلسلے جانیہ ضروری ہیں اور جو کرائش سموم و بیکار ہو گئی ہیں ان کی دوبارہ درستی اور اصلاح ضروری ہے۔ جیسا کہ پانی کے کیرٹے ریڈرائامی میں آنگلی کٹ جانے کے بعد دوبارہ بن جاتی ہے۔ اب اگر سین کی ایک اور خوراک (جو باطل مہلک نہ ہو) داخل کر دی جاوے تو وہی پہلا عامل پھر نمودار ہوگا، چند زنجیریں قد سے سموم ہو گئی۔ مگر قوت اصلاح اذکو دوبارہ تازہ کر لے گی یا نئی زنجیریں پھوٹ آئیں گی۔ اگر سین کی سمیع اسی طرح خفیف مقدار میں ہماری رکھی جائے تو بہت رنج غلیظہ میں ہم نئی زنجیریں بنانے کی مناسب تربیت و مشق پیدا کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ زنجیریں بہت۔۔۔ جلد بلبل بنانے پر قادر ہو جائے۔ لیکن اگر ایسا پہلے کہ تحریک سمیت کے بعد زمرہ ساختوں کا تفاعل یعنی جانی عمل مصلح، مقدار سمیت سے کئی گونہ زیادہ ہوتا ہے (جیسے کہ ٹوٹی ہڈی میں

۱۔ ہیدرا۔ ہائڈرا۔

۲۔ تفاعل۔ ری کمیشن۔

۳۔ خیر کیا دی۔ انٹائم۔

۴۔ شمر۔ اشاک کے شن۔

بڑی کینا مادہ دوشبہند (پہلے سے زیادہ نچا تا ہے) بعینہ یہی صورت
 فادسمین کے بنتے میں بدن کے اندر واقع ہوتی ہے۔ غلیات بدن نئی
 زنجیریں پیکہٹائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بالآخر ان کی ایسی کثیر تعداد پیدا ہو جاتی
 ہے کہ بہت سی زنجیریں بے ضرورت اور فاضلہ جاتی ہیں اور سمین کے ذرات
 کے ساتھ متحد ہونے کے بعد بھی ایک بڑی تعداد ان زنجیروں کی باقی رہ جاتی
 ہے۔ پس یہی باقی ماندہ اور فاضل زنجیریں جسم خلیہ سے جدا ہو کر سیلان
 خون میں بہتی پھرتی ہیں۔ جن میں اب بھی سمین کے ذرات کے حامل لسی کے
 ساتھ متحد ہونے کی طاقت باقی رہتی ہے۔ پس یہ زنجیریں بھی سمین کے ساتھ
 ملکر اوٹگو بے ضرر بنا دیتی ہیں اور اس طرح یہ تریاق جراثیمی یا فادسمین
 بنتا ہے +

اس مختصر مضمون میں مسئلہ سندر جہ بالا کے متعلق تمام شواہد و اسناد
 کی تفصیل پیش کرنا غیر ممکن ہے، اگر ایک عجیب غریب نکتہ اس موقع پر قابل التوجہ
 ہے۔ تبسم خلیہ کے لئے ضروری ہے کہ خلیہ میں ایسی مناسب زنجیریں موجود ہوں
 جو ان سمین کے حامل لسی کے اندر بخوبی کہپ کر جڑ سکیں۔ لیکن فادسمین میں
 ایسی مناسب پیمانہ کی زنجیریں اسے جاذبہ موجود رہتی ہیں، لہذا یہ ماننا لازم آیا
 کہ ہر خلیہ جو کسی سمین سے مسموم ہو سکتا ہے وہ اس خاص سمیت کا تریاق بھی
 تیار کرنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔ اس بات کا کافی ثبوت موجود ہے کہ مرض
 کزاز میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ کزاز کی سمیت رماۃ مشیم کا اثر خاص صرف مرکزی
 نظام عصبی پر ہوتا ہے۔ علامتہ دامن ذہن کے تجربات سے معلوم ہوا کہ دماغ
 کے خاکستری مادہ کے مخلول دشیر (میں کزاز کے سمیت کو نسبت نہا ہو کرنے کی

دماغ کا خاکستری مادہ کے مرکزے دشیر و دماغ

دشیر و دماغ۔ گیلن۔

قوت (تعذیل) اسی طرح ہوتی ہے جس طرح تریاق کزاز یہ کو یہ طاقت حاصل ہے مگر جسم کی دوسری ساختوں کے محمولات میں یہ قوت موجود نہیں ہوتی۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ مرث مرکزی نظام اعصاب ہی کے خلیات میں ایسی زنجیر ہائے جانبیہ ہوتی ہیں جو کزاز کے سمیات سے متحد و وابستہ ہو سکتی ہیں۔ ان زنجیروں میں سے چند جسم خلیات سے جدا ہو کر سیلانِ خون کے ساتھ دیگر حصص بدن میں بھی پہنچ جاتی ہیں اور طبعی حالات میں ان کی وجہ سے ”تریاق کزاز“ اور دیگر اجسام ترقیہ اکثر معمولی خون میں پائے گئے ہیں۔

معمولی کیساوی سمیات میں فادسمین کے پیدا کرنے کی قابلیت نہیں ہوتی ہر کیونکہ یہ سمیات موادِ لحمہ کی طرح خاص طور پر زنجیر ہائے جانبیہ سے نہیں جڑتے بلکہ یہ خلیات کے ذرات کے تمام حصص کے ساتھ بلا قید تخصیص کیساوی مرکبات بنا سکتے ہیں۔

اکتشافات مابعد سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زندہ حیوانات میں بعض مواد لحمہ (جود اصل سمین نہیں ہوتے) کے داخل کرنے سے بھی چند ایسے اجسام مرکبات بن جاتے ہیں۔ جو فادسمین سے مشابہ ہوتے ہیں۔ ایسے مرکبات کو اجسام ترقیہ (فاد اجسام) کہا جاتا ہے۔ ان کے تحت میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ تریسٹین، ایتھین، ذیب خلیات۔ ذیب جراثیم۔ ذیب نم وغیرہ۔

(۱) تریسمپین (تریسب۔ رسوب بنانا۔ تہ میں بٹھا دینا) یہ وہ اجسام ہیں۔

۱۔ ایتھین۔ اگلوٹین۔	۱۔ تعذیل۔ نیوٹرے لائر۔
۲۔ ذیب خلیات۔ کافی ٹولائی سمین۔	۲۔ اجسام ترقیہ۔ ائیٹی باؤیز۔
۳۔ ذیب جراثیم۔ بکٹیریولائی سمین۔	۳۔ کیساوی سمیات۔ کیسکل پوائرز۔
۴۔ ذیب دم۔ ہیملوئی سمین۔	۴۔ تریسمپین۔ پری سی پیٹین۔

جو محلولات لحمہ کی تخلیق کرنے کے بعد خون میں بن جاتے ہیں۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ اگر انھیں اُنھیں تخلیق کردہ مرکبات کے محلول کے ساتھ آمیز کیا جائے تو تھ میں ایک رسوب بنا دیں۔ مثلاً اگر انڈے کی سپیدی (ماح) کے محلول کو ایک خرگوش کے جسم میں تخلیق سے داخل کیا جاوے تو ایک ہفتہ کے بعد اسی خرگوش کے مصل میں یہ خاصیت پیدا ہو جائے گی۔ کہ اگر اس مصل کو انڈے کی سپیدی کے ساتھ ملایا جاوے تو روئی کے گائے جیسا رسوب تھ میں جم جائیگا۔ مگر انڈے کی سپیدی کے علاوہ کسی دوسرے مادہ لحمہ میں اس کے ملانے سے رسوب نہ جے گا۔ ترسیب کا تعلق عمل مناعت سے کسی مٹم کا نہیں ہے۔ اگرچہ وہ اس عام کلیہ کی ایک تھیل پیش کرتے ہیں۔ کہ اگر کوئی خارجی مادہ لحمہ کسی جانور میں تخلیق کیا جاوے تو اس کے اثر سے اجسام تریاقیہ بن جاتے ہیں +

(۲) الصاقین (الصاق) چکا دینا جراثیم خون کے شخ دانے فلیٹس وغیرہ کے بھکاری کرنے سے خون کی مائیت میں چند مرکبات ایسے بن جاتے ہیں۔ کہ اگر اس مائیت کو اُنھیں چیزوں کے ساتھ جن کا احتقان کیا گیا تھا۔ خارج از بدن کسی نلکی میں آمیز کیا جائے تو یہ چیزیں ان کے گرد گرد ایک جھنڈا بناتی ہیں۔ اس کی ایک نہایت دلچسپ اور اہم مثال خنجر مطبقہ متناقضہ معویہ میں پائی جاتی ہے۔ اور اس کی بنا پر اس مرض کی شناخت کا ایک نہایت معتبر ذریعہ ماخذ آگیا ہے (تفاعل و دال) (اس کی تفصیل یوں ہے کہ اگر مریض حمی معویہ کے خون کی مائیت کا ایک قطرہ حامل کر کے اُس میں عصا خنجر معویہ کے مردہ جراثیم کی کاشت جس میں جراثیمی سمیات و دیگر مواد فاسدہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ آمیز کر دیا جائے اور پھر اس مرکب محلول کا ایک قطرہ غور و بین کی مدد سے دیکھا جائے تو

حمی معویہ کے بہت سے جراثیم جگہ جگہ جھنڈ میں پائے جاتے ہیں۔ اس سے حمی معویہ کے ابتدائی درجات کی تشخیص میں بھی آسانی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر مائیت میں حمی کے الصاقین موجود نہیں ہیں۔ تو ایسے جھنڈ نظر نہیں آسکتے۔ اور معلوم ہو جائے گا کہ مرض مخصوص حمی معویہ نہیں ہے۔ مترجم

اس قسم کے مواد بشیتر اقسام کے عددی میں نہیں پائے جاتے۔ مثلاً ذات الریہ کی مائیت میں شفا ہونے کے بعد تک ایسے الصاقات نہیں نظر آتے۔ بائیمہ الصاقین کی دس طاقت سے، ماہر علم المجراحت اکثر مرض اور مرض پیدا کرنے والے جراثیم کے درمیان تعلق دریافت کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر مریض پچپن کے برازی میں بہت قسم کے جراثیم پائے گئے ہوں اور ان سب جراثیم میں سے صرف ایک قسم کے جراثیم مریض کی مائیت میں جھنڈ بنا سکتے ہوں۔ تو ایک زبردست شہادت اس بات کی مل جائے گی کہ پچپن کا سبب خاص یہی جرثومہ ہے۔ بعض اوقات مصنوعی کاشتوں میں پیدا کردہ جراثیم کی شکل و مشابہت یقینی طور سے متعین نہیں کی جاسکتی۔ ایسے موقع پر بھی الصاقین کے بنائے ہوئے جھنڈوں کی مدد سے جراثیم کی نوعیت متعین ہو سکتی ہے۔ مثلاً اگر حمی معویہ کے کسی مشتبہ مریض کے براز سے ایسے جراثیم بذریعہ مصنوعی کاشت کے جدا کیے گئے ہوں۔ جو عصا حمی معویہ سے قریبی مشابہت رکھتے ہوں۔ تو یقینی طور پر تشخیص کرنے کی غرض سے سب سے پہلے جو شناخت کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ وہ یہ ہوگا کہ کسی ایسے جانور کی مائیت حاصل کی جائے۔ جس کے بدن میں ابتداء عصا حمی معویہ کی ایک کاشت تلقیح کے ذریعہ عمداً داخل کر دی گئی ہو۔ اگر اسی جانور کی مائیت میں مشتبہ قسم کے جراثیم کی کاشت ملا دے جانے کے بعد جھنڈ نظر آنے لگیں تو یقینی طور پر محقق ہو جائے گا کہ مریض مشتبہ میں عصا حمی معویہ ہی باعث مرض ہے۔

۱۰. الصاقین مناعت کے عمل میں کوئی حصہ نہیں لیتے۔ اور خون میں ان کی موجودگی حفاظت مرض کا یقینی نشان نہیں ہے۔ نہ ان کے ہونے سے مرض کو لازمی طور پر محفوظ سمجھا جاسکتا ہے۔ اگرچہ ان کی موجودگی میں مریض محفوظ ہی رہتا ہے +

(۳) اجسام تریا قیہ کی سب سے آخری اور نہایت اہم قسم مذیب خلیات ہے۔ یہ اجسام خلیہ کے مادہ حیات کو تحلیل کر سکتے ہیں۔ اس زمرہ میں نریب جراثیم اور مذیب دم وغیرہ شامل ہیں +

یہ قسم مسئلہ مناعت میں نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ اور لحاظ اپنی ترکیب و ساخت اور اعمال کے اجسام تریا قیہ سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ سب سے پہلے ان اجسام کی نوعیت اور وجود کا اندازہ محقق فیض کو ہوا۔ اس نے پہلے قلعج کے ذریعہ ارنب مصری میں جراثیم ہیضہ داخل کر کے ہیضہ کی مناعت الکتابی طور پر پیدا کر دی۔ اور جب یہ ہائید پوری طور پر محفوظ ہو گیا۔ تو پھر اس کے جوف صفاق میں جراثیم ہیضہ کی ایک کاشت داخل کر دی اب جوف صفاق کی رطوبت کو قدرے قدرے ٹھہر ٹھہر کر نکالا اور متعدد بار اندر کر کے جراثیم رجب داخل کیے گئے تھے) کا امتحان خوردین سے کیا تو ان جراثیم کی شکل و صورت وغیرہ میں نہایت نمایاں تغیرات پائے گئے۔ پہلے تو ان کی صورت میں قدرے تبدیلی پائی گئی۔ پھر وہ مدور شکل کے ہو گئے اور بالآخر آدہ گھنٹے کے اندر یکجہ تحلیل ہو گئے۔ مندرجہ بالا عمل جراثیم ہیضہ کے لئے مخصوص و نوعی ہے اور علاوہ فیض کے نام سے منسوب ہے (تفاعل فیضی) اس کی نوعی خصوصیت یہ ہے کہ جراثیم ہیضہ سے قلعج کیے ہوئے

ملک ارنب مصری۔ گیوفی پگ۔

ملک تفاعل فیضی۔ فیضی ایشن۔

ملک اجسام تریا قیہ۔ اینٹی باڈیز۔

ملک مذیب دم۔ ہیملو لائی سین۔

حیوان کی رطوبت صفائیہ صرف جراثیم ہیضہ (یا اس کے ہم جنس) پر ہی عمل تحلیل کر سکے گی۔ اور دیگر قسم کے جراثیم مثلاً جراثیم حمی معویہ وغیرہ اس سے ہرگز متاثر نہ ہونگے۔

مزید تحقیقات سے یہ بھی روشن ہوا کہ یہ عمل تحلیل شدہ مادہ کے اندر بھی کیا جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ رطوبت صفائیہ بالکل تازہ ہو۔ اگر رطوبت صفائیہ کو جسم سے نکال کر ایک یا دو روز رکھا رہنے دیا جائے تو پھر اس کی یہ طاقت تحلیل و مصلع ہو جاتی ہے لیکن اگر اس میں بالکل تازہ مصل رسی معمولی جانور کے خون سے یا محفوظ کیے ہوئے رشح (جانور کے خون سے نکالا ہوا) ملا دیا جائے تو ضائع شدہ طاقت دوبارہ عود کر آتی ہے اور قوت تحلیل پھر نمایاں ہو جاتی ہے۔ سہولت کے لئے اس تجربہ کو حسب ذیل نقشہ میں صاف دیکھ سکے ہیں:-

- ۱۔ معمولی یعنی غیر محفوظ جانور کا تازہ مصل جراثیم ہیضہ کوئی تفاعل نہیں۔
- ۲۔ محفوظ جانور کا تازہ مصل یا رطوبت صفائیہ جراثیم ہیضہ تحلیل و ذوبان
- ۳۔ محفوظ جانور کا باسی مصل جراثیم ہیضہ کوئی تفاعل نہیں۔
- ۴۔ محفوظ جانور کا باسی مصل { جراثیم ہیضہ تحلیل و ذوبان
غیر محفوظ جانور کا تازہ مصل

مندرجہ بالا تشریح سے بخوبی ظاہر ہوگا کہ محفوظ کردہ جانور کے جسم میں جراثیم کے ذوبان و تحلیل کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان دو میں سے ایک تو ایسی ہے جو صرف محفوظ کردہ جانور ہی کے خون یا رطوبات میں موجود ہو سکتی ہے اور جو دراصل اجسام تریاقیہ کے اقسام میں سے ہے اور تریسمین سے بہت

جراثیم ہیضہ { کالڈا بریو
مصل صفائیہ
تخمین۔ ایہوناثر

رطوبت صفائیہ { پرسی ٹنیل فلڈ
ایریٹرون کی رطوبت

کچھ مشابہ ہے اگرچہ زیادہ پیچیدہ ساخت کی ہے) اور جسے مادہ حسیہ کہتے ہیں۔ دوسری چیز ایسی ہے جو معمولی غیر محفوظ جانور اور محفوظ شدہ جانور دونوں کے خون میں یکساں طور پر پائی جاتی ہے، اور یہ بہت نازک، عارضی اور سریع الحس شے ہے جو زیادہ دیر قائم نہیں رہتی اور (بسی رطوبات سے) جلد غائب ہو جاتی ہے حرارت کے اثر سے بھی یہ جلد ضائع ہو جاتی ہے (غالبا یہ وہی ہے جسے اوپر منعیت کے نظریات کے بیان میں نظریہ رطوبید کے تحت میں "مواد حفاظت" کے نام سے یاد کیا گیا ہے) جن میں مصنفین نے اس کا نام "کلیکٹل" رکھا ہے +

اجسام تریاقیہ کے اس گروہ کے متعلق تحقیقات مزید میں خصوصاً بوٹریٹس کے انکشافات نے بہت آسانیاں پیدا کر دیں، جن کی وساطت سے مذیب دم مرکبات، کسی ایک نوع کے جانور کے خون کو دوسرے مختلف النوع جانور میں پھکاری کرنے سے، پیدا کیے گئے، مثلاً خرگوش کا مصل گھوڑے کے خون کے سُرخ دانوں پر کوئی اثر نہیں کرتا، لیکن اگر خرگوش کے جسم میں گھوڑے کے خون کے سُرخ دانوں کی پھکاری پہلے کر دی جائے، تو اس خرگوش کے مصل میں یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ گھوڑے کے سُرخ دانوں کو گھلا دے +

ان مختل خون و مذیب دم مرکبات کا طریق عمل بظاہر ادن مختل جراثیم (مذیب جراثیم) کے مائل ہے جن کا تذکرہ تفاعل فیفری میں اور کیا گیا ہے اور یہ تجربات کے لئے بہت مناسب سہل الحصول میں مزید برآں ان نچلات عملی وسیع اور عمومی ہے اور اب مذیبات خلیات بہ آسانی اجسام منویہ، خلیات جگر، خلیات

مذیب دم۔ ہیموفائی سین۔
مذیب جراثیم۔ بیکٹیریائی سین۔
مذیب خلیات۔ کائی ٹولائی سین۔
مذیب اجسام منویہ۔ اسپرے ٹوزدا

مذیب حسیہ۔ امیوپیٹر
بیس ٹینس من ای بی ٹینس
مذیب مواد حفاظت۔ ایک سین۔
مذیب کلیکٹل۔ کپلی منٹ

گردہ، غلیظت عصبیہ مرکزیہ وغیرہ کے لئے بنائے جاسکتے ہیں۔ یہ محال خواہ کسی قسم کی ساخت کے لئے ہو، اس کا اثر تحلیل ذوبان ہر حالت میں دو مخصوص چیزوں پر منحصر ہے۔ اول تو ایک دیرپا، مستقل ساخت کا جسم تریاقتی جسے مادہ حسیہ کہتے ہیں اور دوم معمولی خون کا ایک غیر مستقل اور ناپائے دار جزو جسے مکملہ یا مادہ حافظہ کہتے ہیں +

مناعت کیونکر حاصل ہوتی ہے

مندرجہ بالا حقائق کا تطبیق عمل مناعت اکتسابی درشمال کسی جانور کو جراثیم ہیضہ کی خفیف خفیف مقدار میں تلقیح کر کے ہیضہ سے محفوظ بنانا اور مناعت اکتسابی طور سے پیدا کرنا اسے کرنے میں تجربی ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ تلقیح کے وہ جراثیم پہلے تو اپنی افزائش ساخت خباثت جسم میں جاری رکھتے ہیں اور اس درجہ میں ادن کی دریافت کا داعہ ذریعہ صرف سفید دافوں کا عمل مضہم ہی کہا جاسکتا ہے، کیونکہ اس درجہ میں مکملہ یا مواد حافظہ اپنا مخصوص عمل کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ کیونکہ وہ جراثیم کے ساتھ براہ راست دہلا توسط ان درپا اجسام تریاقتیہ کے جنکو مادۂ حسیہ کہتے ہیں مخلوط نہیں ہو سکتے۔ کچھ عرصہ کے بعد حیوان کے جسم کے غلیظت اجسام تریاقتیہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو جراثیم کے مادہ حیات کے مواد غمہ کے متفاو اثر کرتے ہیں۔ ان اجسام تریاقتیہ میں سے اول تو چند دسمین ہو سکتے ہیں جو حیوان معمول کو مزید تسم سے محفوظ رکھنے میں کوشاں ہوتے ہیں۔ دوم بعض ترسیبین کے قسم سے ہوتے ہیں۔ رجن کی منفعت کے متعلق اب تک کوئی علم حاصل

مٹسوا دھمہ۔ پدوشیڈ۔

مٹسوا دھمہ۔ پدوشیڈ۔

مٹسوا دھمہ۔ پدوشیڈ۔

مٹسوا دھمہ۔ پدوشیڈ۔

مٹسوا دھمہ۔ پدوشیڈ۔

مٹسوا دھمہ۔ پدوشیڈ۔

مٹسوا دھمہ۔ پدوشیڈ۔

نہیں ہوا) سویم وہ مستقل اور دیر پا اجسام تریاقیہ رجسکو مادہ حیہ کہتے ہیں (جو فن کے جزو تکملہ یا مواد حافظہ کو جراثیم کے ساتھ متحد کر دیتے ہیں۔ اور جراثیم کی تحلیل میں عامل ہوتے ہیں)۔

پس اب حیوان معمول کو ممانعت حاصل ہو گئی۔ اور وہ محفوظ و مطمئن ہو گیا۔ اور آئندہ جب کبھی جراثیم موجودہ مثال کے مطابق جراثیم بیضہ کا حملہ اس پر ہوگا تو اس کی ممانعت کے لئے مادہ حیہ اور تکملہ سے بنا ہوا آلہ حفاظت تیار لے گا۔

علاوہ ازیں اس طرح ممانعت حاصل کئے ہوئے محفوظ جانور کے مصل دم میں بھی مادہ حیہ موجود رہتے ہیں اور جب یہ مصل کسی دوسرے جانور میں تلقیح کیا جاتا ہے تو اسکو بھی ممانعت قہری حاصل ہو جاتی ہے بشرطیکہ اس میں مواد حافظہ موجود ہوں۔ مواد حافظہ کی موجودگی حصول ممانعت کے لئے لازمی ہے اسی وجہ سے علاج امراض میں مصل مذیب جراثیم کے علاج سے عام طور پر فائدہ حاصل کرنے میں دقت پیش آتی ہے۔ محفوظ کردہ جانور کے مصل دم میں "مواد حافظہ" زیادہ عرصہ تک نہیں بڑھتے بلکہ جلد غائب ہو جاتے ہیں اور مادہ حیہ جو ایسے جانور کے خون میں موجود رہتا ہے اگرچہ اسی جانور کے تکملہ سے متحرک ہو جاتا ہے مگر دوسرے جانوروں سے حاصل کیے ہوئے تکملہ سے اسکا متحرک ہونا ہمیشہ ضروری نہیں ہے۔ یہ مسئلہ نہایت دقیق اور پیچیدہ اور ابھی تک ایک راز سر بستہ ہے جب تک اس کا قرار واقعی حل نہ ہو ہم علاج بالمصل کے متعلق مزید ترقی کی امید نہیں رکھ سکتے۔

مصل علاج بالنفل۔ سیرم تھریپی۔

مصل محسن۔ اینٹی
مصل تکملہ۔ کپلی منٹ۔

خون کے سفید دانوں کا طریق عمل بھی دلچسپی اور اہمیت سے خالی نہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ تکملہ انہیں سفید دانوں سے پیدا ہوتا ہے اور بعض محققین کا خیال ہے کہ مادہ لاسیبہ اور دیگر اجسام تریاقیہ بھی انہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان اجسام تریاقیہ کے غور و مطالعہ نے عمل ہجوم بیضادات کے بارہ میں مزید انکشافات پیش کر دیے ہیں۔ مثلاً یہ دریافت کہ ایک معمولی اور غیر محفوظ کردہ جانور کے خون سے حامل کیے ہوئے سفید دانے ذات الریہ کے لئے ہرے جراثیم کو دیکھ کر مضمہ نہیں کر سکتے، دراصل لیکٹوگن کے ساتھ اس حیوان کا مصل ملا دیا جائے جسے ذات الریہ کے کرویات کی تلیق سے محفوظ کر لیا گیا ہو تو یہ واسلے جراثیم ذات الریہ کے مضمہ کرنے کی قوت حامل کر لیں گے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ تلیق کے ذریعہ حامل کردہ مصل سفید دانوں کے عمل میں مدد و معاون ہوتے ہیں۔ اور یہ اعانت خصوصاً ان اجسام تریاقیہ کی وجہ سے حامل ہوتی ہے جو جراثیم کے ساتھ متحد ہو کر انکو قابل مضمہ بنا دیتے ہیں۔ اجسام تریاقیہ جو اس مصل میں شامل ہوتے ہیں ممکن ہے کہ مادہ حسیہ یا فادسین ہوں یا ان ہر دو کے باہل مختلف ساخت کے ہوں۔ ضلّی المرسۃ رابٹ راگیزی ماہر علم الجراثیم جو اس میدان میں مشہور محقق ہے، ان اجسام کو اجسام مُلکذذ کے نام سے منسوب کرتا ہے۔ اور اس کا اعتقاد ہے کہ جس قدر یہ اجسام زیادہ ہوں گے اسی قدر عدوی کے خلاف قوت مناعت زیادہ حامل ہوگی۔ ان اجسام کا اثر براہ راست جراثیم ہی پر ہوتا ہے، اس بات کا ثبوت حسب ذیل طریقہ سے مل سکتا ہے۔

برائیم کو پہلے تازہ مصل دم میں آمیز کر دیا جائے، پھر اس محلول کو آلہ

مصل ہجوم بیضادات۔ فیکوساتی ٹوسٹ

مصل اجسام ملذذہ۔ آپ سونین۔

مبعدہ عن المركز میں خوب گھٹا کر جراثیم کو تہ لشین کر دیا جائے اور مصل کو جدا کر دیا جائے۔ جدا کردہ جراثیم کو سیال نکالیں میں بار بار خوب دھویا جائے۔ اس طرح کے جدا کردہ دھوئے ہوئے جراثیم کو سفید دانے اس سرعت کے ساتھ جذب و تحلیل کر لیتے ہیں گویا کہ مصل ان میں ابھی موجود ہے۔ اس تجربہ سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جراثیم کو ابتداء مصل میں ماسے سے اوں میں مصل نے کچھ ایسا مزہ بخشدیا کہ جس سے وہ عمل بجوم بیضاوات کے لئے مستعد ہو گئے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مصل کے اثر سے خود سفید دانے مستعد ہو کر جراثیم کے غلبہ پر قادر ہو جاتے ہوں، اگر اس خیال کی تائید میں کوئی سند حاصل نہیں ہے۔

اجسام ملذذہ کے متعلق طبی و علمی نقطہ نظر سے آجکل بہت تفتیش جاری ہے۔ مصل کے اندر ان اجسام کی حقیقی مقدار کیا ہے اسکو جاننے اور ناپنے کا حال کوئی طریقہ ایسا نہیں ہو سکا، مگر لاپٹ نے ایک ترکیب دریافت کی ہے جس کی وساطت سے مصل کے دو مختلف نمونوں میں ان کی مقدار کا تناسب معلوم ہو سکتا ہے مثلاً تندرست ڈھلے ہوئے سفید دانے کسی مریض کے مصل میں ماسے کے بعد کتنے جراثیم کو جذب و تحلیل کر سکتے ہیں اس کا شمار کرنا ممکن ہے اسی طرح اُسی قسم کے سفید دانے جب ایک تندرست معلوم شخص کے مصل کے ساتھ ملائے جائیں تو وہ کتنے جراثیم جذب و تحلیل کر سکتے ہیں اس کا شمار بھی ممکن ہے۔ ان دونوں قسم کے محلولات کو جدا جدا ایک ہی مدت کے لئے حرارت برقی میں رکھ کر یہ دیکھا جاسکتا ہے۔ حاصل شدہ دونوں مقدار کے درمیانی تناسب کو معیار ملذذات کہتے ہیں اس تجربہ کو عمل کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ

۱۔ مصل بجوم بیضاوات، فیکو سائی ٹوئی سس
۲۔ مصل ملذذات۔ آپ سوکھا اور کھائیں

۱۔ مصل بعد عن المركز سنٹری ڈیوگل مشین
۲۔ مصل تبید عن المركز سنٹری ڈیوگل مشین۔

بسی شیشہ کی دو باریک نلیوں (انہوہ شعریہ) میں دو مٹم کے سیال بنائے جائیں پہلے نلی میں دھلے ہوئے سفید دانے، شیرہ جراثیمی، اور مریض کا مصل ہمزون رکھا جائے۔ دوسری نلی میں دھلے ہوئے سفید دانے شیرہ جراثیم، اور ایک تندرست شخص کا مصل، ان سب کو ہمزون یکر رکھا جائے۔ دونوں نلیوں کو خوب ہلکا کر اونس کے اجزا کو خوب آمیز کر لیا جائے۔ پھر دونوں نلیوں کو پندرہ دقیقہ کے لئے حرارت بدنی میں آلودہ صاف راکھ تفریح کے اندر رکھ دیا جائے (مختلف درجوں کی حرارت پہنچانے کا ایک آلہ ہوتا ہے جسکو آلہ حصانت کہتے ہیں) پھر ہر دو نلیوں میں سے ایک ایک قطرہ یکر چھٹے شیشہ کے ٹکڑے پر پھیلا لیا جائے (مستطاب خرد بینی تیار کر لے جائیں) اور دونوں کو مناسب رنگوں کے ذریعہ رنگ دیکر خرد بین کے اندر باری باری دیکھا جائے۔ سفید دانوں کے اندر بنگلے ہوئے جراثیم دکھائی دینگے۔ اب دونوں شیشوں کے سویا پچاس سفید دانوں کے بنگلے ہوئے جراثیم کو ہوشیاری سے شمار کر کے دونوں کی میزان کے درمیان تناسب دیکھا جائے۔ مثلاً اگر تندرست مصل والے نمونہ میں شدہ دانے میں ۲۴۰ جراثیم (مرض خفان کے) نکلیں اور دوسرے نمونہ میں صرف ۱۲۰ جراثیم سودا نے میں پائے جائیں تو معیار (ملن ذات) ۲:۱ = ہوگا جسکا یہ مطلب ہوگا کہ مریض کے مصل میں بہ نسبت تندرست شخص کے بہت کم اجسام ملن ذہ ہیں۔ اس تجربہ کو دہا کرنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں کئی وجوہ سے غلطی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے،

اجسام ملن ذہ نہایت نازک ساخت کے ہوتے ہیں، زیادہ دیر رکھنے

ملن حصانت { ان کی بیٹ
تفریح {
ملن صلیبہ { رقم

شیرہ طیب { المشن
ملن مستطاب {

سے ذہ غائب ہو جاتے ہیں، اور متوسط درجہ کی حرارت ۱۰۱° فہرٹ اس سے بھی کم ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں، اس خاصیت میں اور دیگر چند خصائص میں مواد حافظہ سے مشابہ ہیں۔ مواد حافظہ بلحاظ صفات "توسعی" حیثیت کے معلوم ہوتے ہیں اگرچہ بعض حضرات اس امر میں متفق نہیں ایک مریض میں معیار ملن ذات ایک مہم کے جراثیم کے لئے تو اعلیٰ درجہ کا ہو سکتا ہے اور دوسرے جراثیم کے لیے کم درجہ کا۔ تندرست اشخاص معیار ملن ذات کے لحاظ سے تقریباً ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں۔ جراثیم خنازیر و سل (عصویات درنیہ) کے متعلق یہ خصوصیت ہے کہ ایسے اشخاص میں جنہیں خنازیر و سل کا اثر نہیں ہے، یہ معیار ۱۰ سے زائد یا ۱۰ سے کم شاذ ہی مل سکتا ہے، اور مشتبہ حالتوں میں جب معیار مذکور اس درجہ سے مرعنا زائما کم ہو تو احتمال غالب ہے کہ مریض خنازیر و سل کا اثر رکھتا ہے۔ مگر بہت سے سل خنازیر کے مرضی میں معمولی درجہ کا تندرست آدمی (میان) معیار اکثر پایا جاتا ہے، اس وجہ سے اس طریقہ سے شناخت یقینی نہیں ہو سکتی۔ عام کلیہ ہے کہ امراض حارہ میں یہ معیار طبیعی حالت سے کم پایا جاتا ہے، اور جوں جوں صحت ہوتی جاتی ہے یہ معیار بڑھ کر معمولی درجہ کے برابر یا اس سے زائد ہو جاتا ہے۔ معیار کا اس طرح بڑھنا بعض اوقات یکایک ظہور میں آ جاتا ہے جیسا کہ ذات اللہ کے بہت سے مریضوں میں، یا بعض اوقات تدریج ہوتا ہے جیسا کہ ڈائسین مینگی حالت میں ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ مرض بڑھ رہا ہے مگر معیار مذکور بہت زائد پایا جاتا ہے خصوصاً مرض سل میں مناعت کے متعلق اجسام ملذذہ کی اہمیت کے بارہ میں بردست یقینی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ اجسام مناعت میں کمی نہ کمی

سے یعنی ہر مرض میں یہ الگ الگ تباہ ہوتے ہیں

ملذذہ و فزخل

مترم کا حصہ تو ضرور دیتے ہیں مگر کتاب مناعت میں یہ خاص اور ضروری سائل نہیں ہیں۔ بعض تحقیقین نے ان کی اہمیت کے باب میں بہت مبالغہ سے کام لیا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو ان اجسام کے انگشاف نے عمل مناعت کی توجیہ کو اور بھی پیچیدگی بخشدی ہے۔

علامہ رائٹ نے معیار ملن ذات سے ایک مفید کام لیا ہے، یعنی اکی وساطت سے تلیخ کی مقدار پکاری کا تعین کرتا ہے، ہر پکاری کے بعد معیار مذکور اپنی سطح سے تیزی کے ساتھ نیچے اتر آتا ہے (زمن تسلی) اس کے بعد پھر معیار میں زیادتی ہوتی ہے اور وہ عموماً طبعی حالت سے زائد بلند ہو جاتا ہے (زمن ایجابی) مریض کی حالت میں درستی و اصلاح خون کے اجسام ملذوہ کی زیادتی کی وجہ سے نمایاں ہوتی ہے اور جب یہ زیادتی کمی سے برتنے لگتی ہے تو تلیخ کی دوسری خوراک دی جاتی ہے۔ دوسری پکاری زمن سلی میں نہیں کرنا چاہئے ورنہ معیار اور بھی زیادہ پست ہو جائے گا۔ اور جسم مریض میں جراثیم کی زیادتی سے خطرہ کی حالت پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اسی وجہ سے علامہ رائٹ پکاری لگانے سے پہلے معیار ملن ذات کا امتحان کر کے پکاری کا تعین کر لیتا ہے اور وہی مقدار دیتا ہے جس سے معیار بلند نہ ہو جائے مگر جل ہی پکاری کا اثر گھٹنے لگتا ہے اور معیار کی بندی ہتی سے برتنے لگتی ہے کہ وہ دوسری پکاری لگا دیتا ہے۔

مگر گذشتہ چند سال کے تجربہ نے اب بخوبی ثابت کر دیا ہے کہ ایسا وقت طلب امتحان چنداں ضروری نہیں ہے اب بیشتر اہلہاء یہ امتحان معمولی امراض میں نہیں کرتے بلکہ دیگر کچھ نتیجہ نکال سیتے ہیں کہ پکاری کا اثر علامات مرض پر کیا

را چھایا بُرا ہوا ہے۔ مثلاً مریض کا بخار کم ہوا یا نہیں، اس کے زخم کے مواد یا درد کم ہوا یا نہیں، زخم اچھا ہونے لگا یا نہیں وغیرہ +

مگر جب ان علامات سے نتیجہ نکالنا ممکن نہ ہو، یا جب اندرونی عدوئے (امراض معدیہ) خصوصاً حادہ اور خصوصاً خطرناک قسم کے ہوں جیسے عفونت الدم یا التهاب غشیہ قاعدہ دماغ وغیرہ ہو تو مچھارہ من کو دکا دیا منت کر لینا ضروری ہے +

مناعت کی تحقیقات و نظریات کا عملی فائدہ۔ دو قسم کا ہے۔ (۱)

تشخیص امراض میں مدد، علاج امراض میں۔

(۱) افاف تشخیص کی مثالیں یہ ہیں +

الصاق جراثیم کا عمل صبا کہ علامتہ و دال کے طریقہ سے حمی معویہ کے جراثیم اکثر اور بعض دیگر امراض کے جراثیم کثر شناخت کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح دازن کا طریقہ آشک کے جراثیم میں متعل ہے اور میہار ملذذات دیکھنے کا عمل مختلف امراض میں برتا جاتا ہے +

(۲) علم علاج میں اس کا فائدہ نہایت اہم ہے اگرچہ اس میں ابھی بہت

کچھ تحقیق کرنا باقی ہے +

اکتاب مناعت یا علاج امراض میں جن مواد مرکبات جراثیمی سے کام لیا جاتا ہے وہ تین بڑے عنوانات میں منقسم ہیں۔ مادہ تلیق (مصل فاؤٹین)۔ دوسرے مصل +

(الف) مادہ تلیق (مصل) مردہ جراثیم کے شیرہ کہلاتے ہیں۔ علاج امراض کے لئے اس کے بنانے کی ترکیب حسب ذیل ہے۔

پہلے مرئی کے جسم سے خالص جراثیم حاصل کیے جائیں اور ان کی کاشت مصنوعی

طور سے آگائی جائے۔ اس کی تازہ ابتدائی کاشت کو مہر معمولی سیال نگیں میں ملا کر شیر بنایا جائے۔ اس شیر کو شیشہ کی ٹنگی میں بند کر کے مناسب حرارت (مثلاً ۳۷ درجہ کی نصف گھنٹہ تک پہنچائی جائے۔ تاکہ یہ مہر ہو جائے۔ پھر اس کے ایک مکتب سینٹی میٹر (تقریباً، ابوند) میں جراثیم کتنے ہیں (مخصوص طریقہ بتائے شمار کے ذریعہ) شمار کیا جائے۔ پھر جراثیم کے شیر میں ۱۰ طاقت کا مہر لیزول یا حامض قطرائی کا محلول (سیال نگیں میں حل کیا ہوا) ملا کر اُسے ہلکا کر دیا جائے۔ جراثیمی شیر میں محلول قطرائی یا لیزول کتنی مقدار میں ملایا جائے اس کا تعین تو اصلی شیر میں جراثیم کی تعداد کو دیکھ کر اور اس تعداد میں سے کتنے جراثیم ہر خوراک میں رکھنا مقصود ہے اس کے اندازہ سے ہو سکتا ہے۔ مختلف جراثیم کی مقدار خوراک مختلف رکھی جاتی ہے۔ مثلاً کربات عنقود یہ اور کربات سوزاک کی برداشت اکثر بڑی مقدار میں ہوتی ہے (۱۰ کروڑ کی تعداد میں عموماً) برخلاف ازیں عصی قولونی بڑی مقدار میں شدید مسمی اور عمومی عوارض پیدا کر دیتا ہے لہذا اسے نسبتاً بہت کم مقدار میں دینا چاہئے۔ علاوہ ازیں چند روز کے استعمال کے بعد مریض خود زیادہ مقدار کی پککاری برداشت کر سکتا ہے لہذا دوران علاج میں بتدریج مقدار پککاری بڑھانا چاہئے۔

جہاں تک ممکن ہو مناسب قویہ ہے کہ مادہ تلقیح یا شیرہ جراثیمی ہر مریض کے ذاتی جراثیم حاصل کر کے اودھنے بنایا جائے کیونکہ مختلف مریضوں کے ایک ہی قسم کے جراثیم کے درمیان باریک اور خصوصی فرق ہوا کرتا ہے۔ اور دوسرے مریض کیلئے کوہ تلقیح (تلقیح ذخیرہ) ہو جو اس باریک فرق کے ممکن ہے کہ اوس قدر مفید نہ ثابت ہو جس قدر کہ مریض کے اپنے جراثیم سے بنا ہوا شیرہ اس طرح خود مریض کے جراثیم سے بنے ہوئے مادہ تلقیح کو تلقیح ذاتی کہتے ہیں۔ لیکن اگر جراثیم از قلم کربات

۱۔ تلقیح ذاتی۔ آؤ ٹوبے نش و کیمین۔
۲۔ اسٹاک و لیزول

۱۔ شیرہ بنانا۔ ٹنگی کی گھٹائی۔
۲۔ لیزول۔ ٹائی سال

عنقودیہ۔ عقویہ یا عصبی قولونیم ہوں تو یہ امر کچھ زیادہ ضروری نہیں بلکہ اعلیٰ الخصوص قولونیم
مترم اخیر میں اگرچہ ذاتی مادہ تلیق کے بنانے اور یکھنے اور مٹر کرنے میں چند دنوں
کا وقفہ لگاتا ہے اس لئے ابتداء علاج پہلے سے بنے ہوئے مادہ تلیق رتلیق ذیلی
کی ضیف مقداروں سے شروع کر دیا جائے ۔

موجودہ حالات میں مادہ تلیق کے استعمال کو جراحی علاج کا قائم مقام نہیں
سمجھا جاسکتا۔ بلکہ وہ جراحی کے ساتھ ساتھ بطور امداد اضافی کے متعل بے جراحی
کو نشتر سے قطع کر کے گرم پانی سے خوب صاف کرنا چاہئے۔ اور اندر سے پیپ
خارج ہونے کے لئے راستہ چھوڑنا چاہئے۔ اگر گہرا سوراخ یا ناسور ہو گیا ہو۔ تو
اُس کی تر میں سے سٹری ہوتی مردہ مٹری نکالنا چاہئے ان اعمال جراحی کے بعد مادہ
تلیق کا استعمال زخموں کے پر اور سڈل ہونے میں بہت کچھ مدد ہو سکتا ہے۔ اور
اس سے بیماری کا خاتمہ جلد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جن مریضوں میں اعمال براہیہ یا
جراحی علاج سے صحت کی صورت نہیں ہوتی ہو۔ یا جب عمل کسٹکاری سے
پہلے کچھ انتظار کرنا ہو۔ تو وہ اس بھی عمل تلیق کے ذریعہ علاج کی کوشش مناسب
ہوتی ہے۔ مگر دنیل (رومیل) جراثیم عنقودیہ کے مادہ تلیق کی ایک پککاری سے
رجس میں ہاروڑ سے۔ ہاروڑ تک جراثیم کی مقدار جو ہنایت حیرت انگیز طریقے
سے اچھے ہو جاتے ہیں اور ان میں عمل جراحی کی ضرورت پیش نہیں آتی ۔

(۲) مصل فادسمین۔ اس زمرہ میں خصوصاً فادسمین لازماً خالق دہانی آپریشن
قابل تذکرہ ہیں۔ جیسا کہ پہلے تشریح کی گئی ہے مصل فادسمین میں ایسے اجزاء ہوتے

۱۔ وایل۔ بوائلز۔

۲۔ جراثیم عنقودیہ۔ اسٹے فیلوکافی۔

۳۔ مصل فادسمین۔ اینٹی ٹاکسک سیرم

۱۔ خراج۔ بس

۲۔ ناسور۔ سائیٹس۔

۳۔ مادہ تلیق۔ دسمین۔

ہیں۔ جو جراثیم کے سمیات پیرڈون خلیہ کو بے اثر بنا دیتے ہیں۔ مگر ایسے یقینی مصل ابھی تک تیار نہیں ہو سکے ہیں۔ جو سمیات اندرون خلیہ کو بے ضرر کرنے میں کارگر ہو سکیں۔ مصل کے متعلق قابلِ غور یہ امر ہے۔ کہ اس کے استعمال میں سین کو بے ضرر کر دینے کی غاصیت ہے۔ بشرطیکہ مصل کو سین سے نفل مچنے کا موقعہ اس سے قبل ہٹا کر سین خلیات جسم سے قرب اتصال پاکر ان کو زخمی کرنے کا موقعہ حاصل ہو۔

بہی وجہ ہے جس کی بنا پر مصل کو جلد سے جلد لگانا نہایت اہم اور ضروری ہے۔ تقلیلِ وقت کیلئے بجائے احتقانِ جلدی کے احتقانِ وریدی دینا ہی ممکن ہے کیونکہ اس سے ہی جلد اثر ہوتا ہے اور خصوصاً خناقِ دہائی کا فاسمین توجہ میں گہشتہ تک جلد سے پورا پورا جذب بھی نہیں ہوتا۔ احتقانِ وریدی کی ترکیب نہایت سادہ ہے پہلے مصل کو حرارتِ بدنہ کے درجہ تک گرم کر لیا جائے، پھر ایک شیشہ کی پچکاری (محققہ جلدیہ) کو مسطر کر کے اس میں بھر لیا جائے۔ پھر کپڑی کے سانسے کی بڑی وید کے مقام پر جلد کو دافعِ عفونت عنولات سے مصفیٰ و مسطر کر کے ورید کے بالائی حصہ کو ماتہ کے انگوٹھے یا پٹی سے دبا کر اس میں خون جمع ہونے دیا جائے۔ اس ترکیب سے ورید خون سے پُر ہو کر خوب اوبھڑ جائے گی۔ پھر پچکاری کی ڈنڈی کو دبا کر اندر سے سب ہوا بخوبی نکال لی جائے اور پھر سوتی اوبھڑی ہوئی ورید میں ترجھی داخل کی جائے۔ تقریباً $\frac{1}{2}$ قیراط کے سوتی ورید کے اندر آہستہ سے داخل کرنی چاہئے اور جب وہ ورید کے اندر پہنچ جائے گی تو پچکاری کے اندر خون کا داخل ہونا نظر

۵۔ احتقانِ وریدی۔ وٹس انجکشن۔

۶۔ محققہ جلدیہ۔ ہائپوڈرمک سرنج

۷۔ دافعِ عفونت عنولات۔ اینٹی سپٹک وٹن

۸۔ قیراط۔ انچ۔

۱۔ پیرڈون خلیہ۔ اکثر سیلور۔

۲۔ بے اثر متبادل۔ نیوٹرل لائٹو۔

۳۔ اندرون خلیہ۔ انٹر سیلور

۴۔ احتقانِ جلدی۔ ہائپوڈرمک انجکشن۔

آئے گا۔ جو ہی خون نظر آوے، ورید کو دبائے والا انگوٹھا یا پٹی ہٹائی جائے تاکہ سیلانِ خون میں رکاوٹ نہ رہے اور آہستہ آہستہ پچکاری کی ڈنڈی دبا کر مصل کو دخل ورید کیا جائے۔ مرض کزاز میں ورید پچکاری دینے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ سرعتِ تاثیر کے لئے پہلی پچکاری اس طریقہ سے کی جاسکتی ہے۔

(۳) دیگر اقسامِ مصل۔ یہ دافعِ جراثیم قاتل جراثیم اثر رکھتے ہیں کیونکہ اس مادہ حبیبہ ہوتا ہے یا ان کی وجہ سے ہجومِ بیضانات کا عمل طاری ہوتا ہے۔ شفا سے مرض کے لئے عموماً یہ مصل مصلِ فادسین کی طرح سفید نہیں ہیں۔ مگر جہاں فادسین یا مادہِ تلقیح (شیرہ جراثیمی) موجود نہ ہوں ان کا لگانا خالی از فائدہ نہیں ہے۔

جراحیات میں اس زمرہ کے حسبِ ذیل مصل اہم ہیں۔

۱۔ رالف (مصل ضدِ کرباتِ عقدیہ) (مقدار پچکاری ۰.۰۱) (ہفت روزہ ۳۴۴ بزننگ) گھوڑوں کے جسم میں جراثیمِ عقدیہ تصدیق یہ داخل کر کے اوکو محفوظ (منج) بنا کر یہ مصل لیا کر کیا جاتا ہے۔ چونکہ جراثیمِ عقدیہ صدیدیہ کے بہت سے اقسام ہوتے ہیں اور مختلف ذرائع سے حامل کردہ نمونہ جات میں جراثیم کے درمیان باریک باریک فرق ہوتا ہے اور ایک قسم کے جراثیم سے بنا ہوا مصل دیگر اقسام کے خلاف اثر نہیں رکھ سکتا۔ اس لئے مصل کثیر الاقسام و جو مختلف ذرائع سے حامل کردہ جراثیم کی کاشتیں بیکہ گھوڑوں میں تلقیح کر کے بنایا جاتا ہے) کا استعمال جہاں تک ممکن ہو کرنا اولیٰ ہے۔ اگر ایک دفعہ کی پچکاری کے بعد کوئی متاثرہ

۱۔ جراثیمِ عقدیہ صدیدیہ۔ ہسٹر ٹوکس اپریٹ
۲۔ منج (ایموناٹوڈ)۔

۳۔ سماعت پیدا کرنا۔ تحصین۔ ایموناٹوگ

۴۔ مصل کثیر الاقسام۔ پولی ولسٹیرم

۱۔ مادہ حبیبہ۔ ایبو سپٹر۔

۲۔ ہجومِ بیضانات۔ فیکوسائی ٹوسس

۳۔ مادہ تلقیح۔ وکسین۔

۴۔ مصل ضدِ کرباتِ عقدیہ اینٹی اسٹر ٹوکسیرم

نظر نہ آئے تو دوسری خوراک کسی دوسری تجربہ گاہ (مصل) میں بنے ہوئے مصل کی لیکر لگانا چاہئے، کیونکہ ایک مصل ایک مخصوص مریض میں مفید ہو سکتا ہے اور دوسرا کسی دوسرے مخصوص مریض میں۔ اگر مصل کی پہلی پککاری کے بعد نمایاں فرق معلوم ہو خصوصاً حرارت کم ہو جائے تو پھر اسی مصل کو جاری رکھنا بہتر ہے اور دوسری قسم کا نہیں دینا چاہئے۔ بعض اوقات جبکہ پککاری کے بعد عارضی حرارت غالباً جراثیم عقدیہ کے گھل جانے اور اون کی سمین کی مٹھگی کے باعث (جو بقی ہے تو ایسی حرارت لازماً کوئی خراب علامت نہیں ہے۔ بلکہ اکثر اس کے بعد مریض کو نمایاں افادہ معلوم ہوتا ہے)۔

(ب) مصل ضد جمرہ خبیثہ۔ اس ملک میں "اسقلاوہ" کا بنایا ہوا مصل عام طور پر مشہور ہے، اور جمرہ مقامی (شجرہ خبیثہ) میں نہایت کامیاب نتائج پیدا کرتا ہے۔ پککاری دینے سے ۲۴ گھنٹے کے اندر قائمہ معلوم ہونے لگتا ہے۔ (ج) مصل ضد کربیات ذات الریہ (ساختہ پین یا رور) جراثیم فریج کے شدید مدوی میں اسکو آزمانا چاہئے خصوصاً عفونت اللہام اور التهابات صفقان، بے بعض امراض میں جو ان جراثیم سے پیدا ہوئے ہوں۔ اس کا استعمال مفید پایا گیا ہے۔ بعض اوقات جبکہ جراثیم ذات الریہ کے اثر سے قریباً میں قرحہ دانتہ بن جاتا ہے تو اس مصل کے استعمال سے نہایت مفید اثر ہوتا ہے۔

اور بھی بے شمار مصل ہیں۔ جن کا بیان یہاں ضروری نہیں۔

۱۔ مصل ضد کربیات ذات الریہ۔ اینٹی نیوکلوکسیمر
۲۔ عفونۃ الدم۔ سپیٹیمیا۔
۳۔ التهاب صفقان۔ پری وٹانیٹس۔
۴۔ قریبہ۔ کارینا۔
۵۔ قرحہ دانتہ۔ اسر سریش دیا اسر پچے نسلی

۱۔ تجربہ گاہ۔ مصل۔ بیروٹی۔
۲۔ مصل ضد جمرہ خبیثہ۔ اینٹی انتھراکسیمر
۳۔ اسقلاوہ۔ اسکے دور۔
۴۔ شجرہ خبیثہ۔ گلنٹ پچمبول۔

عوارض مصل

بعض اوقات مصل کی مقدار کثیر دینے کے بعد آٹھ یا بارہ روز بعد مصل ^{مصل} کے اندر یا اس کے بعد مریض میں بعض عجیب و غریب علامات نمودار ہو جاتی ہیں۔
منجملہ ان کے خاص علامات یہ ہیں۔ بخار۔ جلد بدن پر دوڑے۔ رشری یعنی پٹی۔
خسرہ۔ یا سرخ بخار کے دانوں کے مانند اکثر شدید عارض کے ساتھ غذا و جاذبہ
کا پھول جانا (مقام عدویٰ کی متعلقہ گلیوں میں) جوڑوں میں درد و خصوصاً مشط
اور انگلیوں کے جوڑے۔ پہونچے اور گھٹنے کے جوڑے میں خون کے سفید دانوں
کی کثرت +

یہ علامات گولپچے نہیں ہیں۔ مگر خطرناک نہیں ہوتے اور چند روز میں عموماً شفا
کلی ہو جاتی ہے +

برائے حفظ و تقدم پچکاری کے وقت اور ایک دو روز بعد تک کلبہ بن آگین
۵ آمٹھی مقدار میں استعمال کریں۔ جس سے علامات ترک جاتی ہیں۔ یا کم ہو جاتی ہیں
یہ ایک کامیاب علاج ہے +

فقد الحمايت

یہ حالت شدید اور انتہائی استعداد و تاثیر کی ہے جو مواد لمحہ مثلاً مصل خون

۱ عوارض مصل۔ سیرم ڈیزیز۔	۱۰ غذا و جاذبہ۔ لطف تک گھینڈز۔
۲ مدت حنات۔ پیریز آف اگامبے شن۔	۱۱ خسرہ۔ مارلانی۔
۳ آواز تفریح سیونی۔ اگوبے ڈ۔	۱۲ ایکو سائی ٹرسس۔
۴ دوڑے۔ طبع۔ ریش۔	۱۳ کلبہ بن آگین کیشیم ایک ٹیسٹ۔
۵ رشری۔ پٹی۔ ارنی۔ کیریا۔	۱۴ تھو گرین۔
۶ سرخ بخار۔ اسکارے ٹینا۔	۱۵ فقد الحمايت۔ انا فانی ایک سبس
	۱۶ مواد لمحہ۔ پروڈیٹ سبس ٹینس۔

سفیدی بیضہ جراثیمی سین لحمی وجودانی اشیاء کے لئے، ان کی پکپکاری لینے کے بعد مریض میں پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ان اجزاء میں سے کسی کی پکپکاری لینے کے بعد پھر مریض میں ان کی قوت برداشت نہیں رہتی اور ان کی خفیف مقدار مقدار غیر سم ابھی مریض میں غیر طبعی تاثر پیدا کر دیتی ہے۔ یہ حالت ایک ہی پکپکاری یا بہت سی پکپکاریوں کے بعد نمودار ہو سکتی ہے۔ مثلاً اگر گھوڑے کا مصل کسی جانور میں ایسی کم مقدار میں لگایا جائے جو زہر کے درجہ تک نہ ہو، اور پھر مناسب وقفہ کے بعد دوسری پکپکاری بھی اسی طرح کم مقدار میں دی جائے، تو حالت ذکاوت جس میں دوسری مقدار لینے کے بعد علامات سمیت پیدا ہوتی ہیں۔ جو بعض اوقات ہلک بھی ہو سکتی ہیں۔ ایسی ذکی الحمی پکپکاری کے بعد آٹھ سے بارہ روز میں پیدا ہو کر نامعلوم مدت تک قائم رہ سکتی ہے۔ مثلاً کوئلے کی ہڈی کے سلعہ لحمیہ میں سیٹیاں کوئی روکی کا بنایا ہوا کے متواتر استعمال نے نہایت فائدہ بخشا تھا۔ اس دوا کی پکپکاریاں لگائے جانے کے ایک عرصہ دراز کے بعد پھر اسی دوا کا صرف نصف قطرہ اسی مریض کو لگایا گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مریض کو نہایت شدید بخار (۱۰۰ درجہ کا) ایک مہنتہ سے زائد تک آتا رہا جو بتدریج معمولی حرارت بنیہ کے درجہ تک اترتا۔

۱۔ سبب۔ اس قسم کے مظاہرات کے اسباب معلوم کیا ہیں اب تک اس کی تحقیق نہیں ہو سکی ہے۔

۲۔ علاج۔ محض عوارض و علامات کو کم کرنے کی غرض سے کیا جاتا ہے۔



۱۔ مقدار غیر مہتم۔ سب ٹاکک ڈوز	۱۔ سلعہ لحمیہ۔ سار کوہا۔
۲۔ مقدار مہتم۔ ٹاکک ڈوز	۲۔ سیال کوئی۔ کوئیز فلوڈ۔
۳۔ علامات ہلاکت۔ فیشل سپشس۔	۳۔ علاج عوارض بمطوئے ملک ٹریٹ منٹ

باب دوم التهاب ورم حار

التهاب اُس سلسلہ تغیرات کو کہتے ہیں جو زندہ ساخت میں کسی عارضہ یا صدمہ سے واقع ہو جاتا ہے۔ بشرطیکہ (التهاب پیدا کرنے والی) جراحت یا ضرب ایسے شدید درجہ کی نہ ہو کہ ساخت ماذون کی بناوٹ اور قوت حیات کو فی الفور بطل کر دے۔ یہ تعریف ایک محقق نے سنہ ۱۸۷۵ء میں کی تھی۔ اور کافی طور پر صحیح ہے۔ بشرطیکہ اس میں اس بات کو بھی بخوبی بطور حقیقت سلسلہ کے تصور کر لیا جائے کہ اس جراحت کے ساتھ ساتھ عموماً کوئی قابل انحلال کیمیادی مہیجہ در سوزش پیدا کرنے والا اور بیشتر اوقات کوئی سمیت جراثیمی بھی مخلوط ہو کر داخل ہو جاتی ہے۔ علاوہ انیس مجروح ساخت میں جو آخری مدارج انجام ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی علل التهاب کے سلسلہ سے خارج ہیں۔ گذشتہ زمانہ میں ماہرین علم الامراض التهاب کو ہمیشہ ایک عمل تعفن و فساد اور باعث مضرت سمجھتے تھے۔ مگر زمانہ موجودہ میں عالمان علم الجراثیم نے تحقیق سے ثابت کر دیا ہے کہ سلسلہ التهاب اگر مناسب ضبط و تنظیم کے ساتھ محدود و جاری رکھا جائے تو، حفاظت و وقایت کا ایک قدرتی عمل ہے۔ کیونکہ یہ قدرت کا ایک ایسا حربہ ہے جس کے اثر سے مضرت رساں اور خطرناک اجسام

م الشیام

۱۔ مائع برونشائیٹس۔	۲۔ مائع فوج کیمیائی۔
۳۔ مائع التهاب۔	۴۔ مائع انجم۔
۵۔ مائع عارضہ ان جری۔	۶۔ مائع ماہرین علم الامراض۔
۷۔ مائع قوت حیات۔	۸۔ مائع عالمان علم الجراثیم۔
۹۔ مائع قابل انحلال۔	۱۰۔ مائع اجساد و تبقہ۔

دقیقہ (جراثیم) آگے بڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ اور بالآخر جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ مگر گاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جراثیمی حملہ کے بعد نظام جسم کی طرف سے جو جوابی عمل ممانعت (یعنی التهاب) ظاہر ہوتا ہے وہ ایسا سخت اور شدید ہوتا ہے کہ اس سے مرض کی حفاظت کی بجائے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں خود جراثیم کے سمیات مریض کی ہلاکت کا باعث ہو سکتے ہیں۔

اسباب التهاب :- یہ مختلف و متعدد ہیں۔

عموماً التهاب جراثیم کے باعث پیدا ہو جاتا ہے (علم الجراثیم کے بیان میں ادنیٰ تبدیلی اور عمومی حالات و اسباب کا تذکرہ ہو چکا ہے جن سے انسان میں جراثیم سے متاثر ہونے کی استعداد و قابلیت پیدا ہو جاتی ہے اور جو التهاب کی پیدائش میں مدد دیتے ہیں) +

التهاب کے اسباب کو پہلے دو جاعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسباب سابقہ یا مُعِدّہ اور اسباب مُتّو اصلہ یا محرک +

(۱) اسباب سابقہ یا مُعِدّہ۔ جن کی وجہ سے عضو میں التهاب کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہی اسباب ہیں جن سے جسم کی قوت ممانعت یا عضوی قوت حیوانیہ کم ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے بیرونی موزویات باسانی مضرت پہنچا سکتے ہیں۔ اسباب سابقہ یا مُعِدّہ دو قسموں میں تقسیم ہو سکتے ہیں جو درج ذیل ہیں:-

(الف) مقامی اسباب سابقہ۔ مثلاً:-

دوران خون کی خرابی۔ دوران خون کا غیر معمولی طور پر تیزی یا سست ہونا جیسا کہ

اسباب واسطیہ
مثلاً: قوت حیوانیہ و حیثیہ

اسباب سابقہ
مثلاً: قوت حیوانیہ و حیثیہ

عوارض عروق میں قلت الدم سے ہو سکتا ہے، یا دباؤ وغیرہ کے باعث استلاء دم سے واقع ہوتا ہے +

بعض مخصوص قسم کی سختیں، مثلاً غشیۃ مائیہ اور اغشیۃ زلالیہ اپنی مخصوص ساخت و بناؤں کے لحاظ سے بمقابلہ غشیۃ مخاطیہ، قبول التهاب کی زیادہ استعداد رکھتی ہیں۔ بشرطیکہ اون کی مضادوں کا تعلق بیرونی ہو اسے قایم ہو جائے +

جو عضو ایک مرتبہ ملتهب ہو چکا ہے، وہ شفا یاب ہونے کے بعد بھی دوسری مرتبہ التهاب میں مبتلا ہونے کی مخصوص اور زیادہ استعداد رکھتا ہے +

رعب عام اسباب سابقہ خون کی ترکیب کا فاسد و ناقص ہو جانا بوجہ بڑا پے کے، یا امراض و موزیات سمیتہ کے باعث مثلاً

کثرت استعمال شراب یا پارہ، سیہ نورین (فاس فس) کے استعمال سے فنا و خون کا ہو جانا، کیمیائی فاسد مواد کا خون میں جذب ہونا جیسے ذیابیطس سکی نقرس، وجع المفاصل وغیرہ میں ہوتا ہے +

خون کے فضلات کا طبعی طور پر خارج نہ ہونا جیسے گردہ کے بعض امراض میں ہوتا ہے +

خون کے معمولی اجزاء میں تغیر واقع ہونا جیسے فقر الدم، واء الحفریمیات جراثیمی مثلاً خنازیر، آتشک وغیرہ +

۱۔ قلت الدم۔ انیمیا۔	۲۔ ذیابیطس سکی۔ ڈیابیطس سکی ش
۳۔ استلاء دم۔ کنجس چن	۴۔ نقرس۔ گاؤٹ۔
۵۔ اغشیۃ مائیہ۔ سیرس ممبرین۔	۶۔ وجع المفاصل۔ روماتزم
۷۔ مخاطیہ۔ میکس ممبرین۔	۸۔ فقر الدم۔ انیمیا۔
۹۔ زلالیہ۔ سائنوویل ممبرین	۱۰۔ واء الحفر۔ اسکردی ریا، اسکارینوش
۱۱۔ نوریں۔ فاسفورس۔	۱۲۔ خنازیر۔ اسکامینلا۔
	۱۳۔ آتشک۔ سفلس۔

(۲) اسباب واصلہ یا محرکہ۔ یہ وہ ہیں جن سے خراش پیدا ہوتا ہے اور ورم کا سبب بنتا ہے انکو اسباب **مُتَبِعِجَہ** کہتے ہیں۔ جو چار قسم کے ہوتے ہیں +

۱۔ **مُتَبِیَاتُ آلِیَہ**۔ جیسے ضرب۔ زخم۔ صدمہ۔ رگڑ۔ تناؤ۔ دباؤ۔ کھچاؤ۔ موج لگوانہ وغیرہ +

۲۔ **مُتَبِیَاتُ طَبِیْعَہ** (الف) حرارت۔ احتراق (جلنا) یا پانی یا آگ کے اثر سے +

(ب) بردد۔ سردی۔ بچ بستیگی۔

(ج) برقی متوجلات۔ یہ یا تو طبعی برق درعد کے اثر سے صدمہ پیدا کر دیں یا غیر طبعی ہوں جیسے کرشدیر اور طاقت دار مصنوعی متوجلات برق، جو طیب یا جراح علاج کے لئے استعمال کرتا ہے، یا جو مصنوعات میں روشنی پیدا کرنے، گاڑیوں کو چلانے اور کھینچنے کے لئے مستعمل ہیں +

۳۔ **مُتَبِیَاتُ سِیمِیَہ**۔ انکی چند قسمیں ہیں +

(الف) **مُتَبِیَاتُ کِیمِیَاویَہ**۔ حموضات (تیزابات) قلیات (کھار)

(ب) **سِیمِیَاتِ نَہَاثِیَہ**۔ مثلاً روغنِ ثمال گوڑہ۔ روغنِ خرؤل +

(ج) **سِیمِیَاتِ حِیَوَانِیَہ**۔ مثلاً ذرارِ ریح رتیلیں کہیں بعض برساتی کیڑے جن کے

اثر سے ورم یا آبلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حشرات الارض کا ڈنک مارنا یا ڈسنا وغیرہ +

(د) **اَجْرَاتِیمِیَا** یا **اَجْسَاوُ دَقِیقَہ** (انکا مفصل بیان علم الجراثیم کے باب میں درج ہو چکا)

مثلاً ہیمہ۔ اری ٹینٹ۔

مثلاً مہیات آلِیَہ۔ یکہ نیل اری ٹینٹ۔

مثلاً مہیات مِعیَہ۔ فزیکل اری ٹینٹ۔

مثلاً مہیات کِیمِیَاویَہ۔ کیکل اری ٹینٹ۔

مثلاً حموضات۔ ایسڈز۔

مثلاً قلیات۔ الکلیز

مثلاً روغنِ جال گوڑہ۔ کرؤل آئل۔

مثلاً روغنِ خرؤل۔ مشرؤ آئل

مثلاً ذراریع کثرتہ زُطانی (یا بلشر

مثلاً اجساد و دقِیقَہ۔ مائیکرو آسگے زخم

۱. **انتباہ**۔ اسباب التهاب کے ضمن میں یہ ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ بہت سے استادان فن اجن کی سند ستندانی جاتی ہے۔ اسی التهاب کو اصلی حتمی مانتے ہیں جو جراثیمی ہیجیات کے اثر سے پیدا ہوا ہو یہ لوگ غیر جراثیمی اسباب طبعیہ آلیہ وغیرہ جن کا تذکرہ اوپر ہوا ہے اسکے اثر سے پیدا شدہ التهاب کو اصلی التهاب یا جسم کا جوابی عمل مدافعت اصلی صحیح معنوں میں نہیں سمجھتے۔

۲. **ظواہر التهاب**۔ التهاب کی ماہیت کو ذہن نشین کرنے کے لئے حیوانات پر تجارب کیے جاتے ہیں اور اصلی التهابی حالت کی چشمہ یہ کیفیت سے بصیرت حاصل کی جاتی ہے۔ چنانچہ اگر زندہ مینڈک کے پنجہ کی جھلی کو پہلے خوب تان کر خود میں کے نیچے پھیلا دیا جائے اور بغور دیکھا جائے تو سیلان خون کی طبعی کیفیت کا عجیب و غریب نظارہ آنکھوں کے سامنے پیش ہوگا۔

۳. **الف** (بجالت صحت شریافوں۔ وریدوں اور عروق شعریہ میں خون بہتا ہوا نظر آنے لگا۔ سیلان خون کا اندازہ کریات و مویہ کی نقل و حرکت سے بخوبی ہوگا۔ کریات حمراء یعنی خون کے سرخ دانے رہر منفرد کریہ و دوسرے کریہ سے جھانچا خون کے بہاؤ کے وسطانی یا مرکزی حصے میں بہتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کے گرد یعنی عروق کا محیطی حصہ جو کریات سے معرا ہوتا ہے بے حرکت و بے رنگ نظر آئے گا مگر اس میں بعض بعض کریات بیضاد یعنی خون کے سفید دانے آئیں گی و مست رفتاری کے ساتھ بہاؤ میں لڑھکتے ہوئے نظر آویں گے۔ گاہے بعض سفید دانے سرخ دانوں کے درمیان مرکزی حصہ میں بھی دکھائی دیں گے۔ شریافیں کہیں تپتی

۱۔ ظواہر فنامے۔

۲۔ عروق شعریہ۔ کپلریز

۳۔ کریات و مویہ۔ بڈ کارپیکل

۴۔ کریات حمراء۔ رڈ کارپیکل

۵۔ کریات بیضاد۔ بیڈ کو سائٹز

اور کہیں موٹی نظر آئیں گی۔ حالتِ صحت میں غن کے دانے ایک دوسرے کے ساتھ چپاں نہیں ہوتے +

(ب) شرائین صغیرہ کے جن میں مسلسل مستوی تغیرات نظر آئیں گے یعنی ادنیٰ جسامت ایک قسم کی ترتیب و باقاعدگی کے ساتھ متواتر کم و بیش ہوتی ہوئی نکلی دے گی۔ شرائین صغیرہ کی جسامت کا یہ اختلاف قلب کی حرکات کے اثر سے تو بے تعلق ہوتا ہے مگر عروقِ شعریہ کے اندر کے سیلانِ غن پر اس مدد و جذبہ تغیر کا نمایاں طور پر اثر ہوتا ہے۔

(ج) کریاتِ حرکی جسامت میں بھی تغیرات نظر آئیں گے، جو بیشتر روشنی کے اثر سے نمایاں ہوتے ہیں، ایسے جب روشنی زیادتی کے ساتھ ہوگی تو غیر رخ دانے نکل جائیں گے اور جب روشنی کم ہو جائے گی تو یہ دانے پھیل جائیں گے۔

۱۔ التهابِ حاد میں عروق کے تغیرات۔ اب اگر مینڈک کے پنجہ پر کوئی تیز یا بھج مرکب مثلاً نمک طعام کی ایک کنکری یا قدرے نوٹا دھڑا لگا دیا جائے اور پھر پنجہ کی جھلی کو خوردبین کے نیچے رکھ کر دیکھا جائے تو ابتداءً جھلی کے شرائین صغیرہ تھوڑی دیر کے لئے عارضی طور پر سکڑ جائیں گی۔ لیکن یہ عارضی انقباض چنداں اہمیت نہیں رکھتا اور صرف ایسے ہی التهاب میں عموماً نمودار ہوتا ہے جو تجربہ بہتجات کے اثر سے پیدا کیا گیا ہو۔ اس عارضی انقباض کے بعد ہی فوراً لمٹہب حصہ میں امتدادِ موی واقع ہو جاتا ہے اور یہ اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ حصہِ موز کے عروق بہ سرعت پھیل جاتے ہیں اور یہ اس طرح خاد دیر پا ہوتا ہے

مثلاً شرائین صغیرہ۔ آرٹری اول۔	مثلاً امتلا۔ موی۔ گنجھن
مثلاً مسلسل مستوی۔ رتھیل	مثلاً سرعت دوران۔ اگلے ریشم
مثلاً حاد۔ ایکوٹ۔	مثلاً استرخاء۔ ڈائٹھٹیشن۔
مثلاً نوٹا مدیہ۔ ایوٹیا۔	

اس مقام کا دوران خون تیز ہو جاتا ہے (سرعت دوران) غالباً یہ استرخاؤ نہیں
 صغیر کے اندر کے مقامی محرک اعصاب میں بعض تغیرات پیدا ہو جانے کی وجہ سے
 ظہور میں آتا ہے۔ دوران خون کی سرعت کچھ وقفہ کے لئے توجاری رہتی ہے مگر
 بالآخر خون کا بہاؤ بتدریج سست پڑتا جاتا ہے گویا رفتار خون کو آہستہ آہستہ کوئی
 چیز آگے بڑھنے سے روک رہی ہے (مزا حمت دوران) اس کے بعد ایک ایسا
 وقفہ نمودار ہوتا ہے جس میں خون کے دانے، جو پہلے جدا جدا رہے تھے۔
 ایک جگہ مجتمع ہو کر ٹھہر ٹھہر کر اور رگ رگ کر آگے قدم رکھتے ہیں اور کبھی آگے بڑھتے
 ہیں اور کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ اس حالت کو ذبذبہ کہتے ہیں بالآخر ایک ایسی حالت
 جمود پیدا ہو جاتی ہے کہ دوران خود بند ہو کر رگ جاتا ہے (اس حالت کو حالت
 وقوف یا رکود کہتے ہیں) اس وقوف یا رکود کا نتیجہ بعض حالات میں تو یہ ہوتا ہے
 کہ عروق کے اندر حسیاتی انجماد خون واقع ہو کر عروق کو قطعی بند کر دیتا ہے۔ اس
 حالت کو انسداد کہتے ہیں اور اس منجمد خون کو جو رگوں کے اندر جکراؤ نمونہ کر دیتا
 ہے انسداد کہتے ہیں۔

سندرجہ بالا اعمال کے دوران میں عروق کی دیواروں اور اجزاء خون کے
 باہمی طبعی تعلقات و اصطلاحات میں بھی بعض تغیرات واقع ہو جاتے ہیں اور اس کا
 باعث یہ ہے کہ خود عروق کی دیواروں میں بعض غیر محسوس تبدیلیاں پیدا ہو جاتی
 ہیں۔ خون کی ترکیب و ساخت کی کوئی تبدیلی یہ تغیرات نہیں پیدا کرتی۔ چنانچہ جیسے
 ہی استرخاؤ عروق واقع ہوتا ہے خون کے سفید دانے عروق کی دیواروں سے

مٹ مزا حمت۔ ریٹارڈیشن۔

مٹ انسداد۔ تھرامبوسس۔

مٹ فوجہ۔ آگزیٹیشن۔

مٹ سندہ۔ تھرامبوسس۔

مٹ وقوف یا رکود۔ اسٹیسس

مٹ سرعت دوران۔ ایکٹویشن۔

متصل ہو کر بہاؤ کے غیر متحرک محیطی طبقہ میں، مجتمع ہو جاتے ہیں۔ گویا وہ اپنی ہمراہی
فوج کی قطار سے علیحدہ ہو کر پھٹ جاتے ہیں۔ اولاً سفید دانوں کا اجتماع ورید میں
میں شروع ہوتا ہے۔ پھر عروق شعریہ میں اور آخر کار شریانوں میں خون کے سفید
دانے بھی، جو ابتداء ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ بہتے چلے جاتے تھے اب ایک
دوسرے کے ساتھ پیوستہ ہونے لگتے ہیں اور عروق کی دیواروں کے ساتھ چپلا
ہوتے جاتے ہیں، مگر خون کے سفید دانے بمقابلہ رنج دانوں کے عروق کی دیواروں
سے زیادہ چپلاں ہوتے ہیں +

مندرجہ بالا تمام تغیرات کو مجموعی طور سے امتلاء دموی کہتے ہیں۔
تغیرات عروق میں دوسرا اہم واقعہ اخراج رطوبت یا ترشح ہے جو نہایت
ابتدائی منزل میں ہی نمودار ہونے لگتا ہے۔ خون کا ہر ایک جزو اس عمل ترشح میں
حصہ لیتا ہے۔ یہ پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ خون کے سفید دانے عروق کی دیواروں
کے قریب یعنی محیطی حصہ میں مجتمع ہو جاتے ہیں۔ یہاں اس اجتماع کے دو وجوہ
ہیں، اول تو عروق کی دیواروں میں بطور خود چند تغیرات واقع ہوتے ہیں جن کی
وجہ سے یہ دیواریں زیادہ چپ چپی (رنج) ہو جاتی ہیں اور دانوں کو چپاں
کر لیتی ہیں۔ دوئم جراثیمی مرکبات کی کشش رجبے ہم کشش جراثیمی کے نام سے یاد
کر چکے ہیں انہیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ الغرض خون کے سفید دانے عروق کی
دیواروں کے قریب بکثرت جمع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری تبدیلی جو اس کے
بعد واقع ہوتی ہے یہ ہے کہ یہ سفید دانے عروق کی دیواروں کے اندر
لگے لگے باہر آ جاتے ہیں۔ یہ نقل و حرکت بالخصوص وریدوں کی دیواروں میں زیادہ

۱۔ کشش جراثیمی۔ بیکٹیریل انی فی فی۔

۲۔ امتلاء دموی۔ انی پر سیا۔

۳۔ ترشح۔ اگر وہ شے

نمایاں ہوتی ہے اور اس کے بعد عروق شرعیہ میں یہ عمل اخراج و ترشح خصوصی طور پر ایک قسم کی قوت حیوانی کا ظہور ہے اور حیثیت متشکلہ کی سی حرکت کے ذریعہ انجام پاتا ہے پہلے تو عروق کی غشاغشائے سبطن کے غلیات میں بوجہ عمل الہاب کے تفرق اتصال واقع ہوتا ہے۔ پھر انہی غلیات کے مابین مقامات تفرق میں سفیدانوں کے باریک زوائد جسکو یہاں تشبیہاً ہاتھ کہا جاسکتا ہے اگس جاتے ہیں اور وہ حیثیت دانوں سے بہ کر ان زوائد میں آسنے لگتے ہیں۔ حتیٰ کہ غشاء سبطن کے اجزاء و عناصر ایک دوسرے سے زیادہ جدا ہو جاتے ہیں۔ اور بالآخر یہ دانے نفوذ کر کے عروق کی دیوار سے باہر آس پاس کے بیچ خلوی میں آ جاتے ہیں۔ سفید دانوں کی یہ حرکت انتقالی صرف اُسی وقت تک قائم رہتی ہے جب تک رگوں میں خون دوران کرتا رہتا ہے۔ ورنہ جہاں خون جا اور سدہ واقع ہوا۔ بس اُسی وقت سفید دانوں کی یہ حرکت بھی بند ہو جاتی ہے۔ جب خون کے سفید دانے بھاگ کر رگوں کے باہر کی ساخت میں چلے جاتے ہیں۔ تو ان میں مختلف تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں مثلاً اقل تو ممکن ہے کہ یہ ہلاک ہو جائیں۔ اور ان کے ٹوٹنے کے بعد خیر نہیں تیار ہو کر الہابی جملہ دمویہ کے بنانے میں معاون ہو۔ جس کا بیان ابھی کیا جائے گا (۲) یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دانے ٹوٹ کر عروق جاؤ کہ سلسلہ دوران میں شامل ہو جائیں۔ (۳) یا یہ کہ پیپ کے دانوں کی شکل میں تبدیل ہو جائیں۔ علاوہ ان میں ان کے ٹوٹنے

۱۔ قوت حیوانی۔ وی ٹیٹی

۲۔ حیثیت متشکلہ۔ ای۔ با۔

۳۔ حرکت حریہ۔ ای۔ ہاتھ و سٹ۔

۴۔ غشاغشائے سبطن۔ انڈ و تعلیم

۵۔ غلیات۔ سٹ۔

۶۔ مادہ حیات۔ یروٹو ملازم۔

۱۔ بیج خلوی سیلیور ٹوٹ۔

۲۔ خیر نہیں۔ قاترین فرسٹ۔

۳۔ جملہ دمویہ۔ کوگلم۔

۴۔ عروق جاؤ کہ سلسلہ تک و سٹ۔

۵۔ پیپ کے دانے۔ پس سٹ۔

یا پیپ کے دانوں کی شکل میں آنے سے پہلے مرکز التهاب کے آس پاس کی مردہ ساخت کے خارج کرنے یا جراثیم کے ہضم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ واصل خون کے یہ دانے فضلات بدن کے صاف کرنے میں جاروب کٹ کے مانند ہیں یا یہ کہ قدرتی مقدمۃ الجیش ہیں جو حملہ آور دشمن کی روک تھام کرنے کے لئے عروق سے باہر آ جاتے ہیں۔ اور بدنی حفاظت کا کام سب سے پہلے ہی کرتے ہیں نظام بدن میں ان کا اولین فرض یہ ہے کہ یہ فاسد مواد اور مردہ ساخت کو بدن سے خارج کر دیں۔ اور عمل فنا کو محدود کر کے پھیلنے سے روک دیں۔ اس کے بعد اپنی جگہ یہ اپنے سے بہتر دانوں کو دیدیتے ہیں۔ جو فعل الیتام میں حصہ لیتے ہیں اور جنکو خلیات شجر ثومیہ لیفیہ کہتے ہیں۔

اسی طرح خون کے سرخ دانے عروق شرعیہ کی دیواروں سے چھن کر باہر آ جاتے ہیں (نہربہ) مگر یہ صرف التهاب میں ہوتا ہے۔ جب یہ عروق سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور ان کا رنگین مادہ یہاں کی ساخت میں پھیل جاتا ہے جو بالآخر دوبارہ جذب ہو جاتا ہے۔

اسی طرح التهاب کی صورت میں سائل دُموی بھی عروق سے باہر آ جاتا ہے۔ یعنی طبی مقدار سے بہت زیادہ باہر آتا ہے۔ ورنہ یہ ظاہر ہے کہ یہ ہمیشہ باہر آیا کرتا ہے اور یہ زیادتی اس قدر ہوتی ہے کہ باوجودیکہ عروق جاذبہ معمول سے زیادہ اپنا کام کرتے ہیں پھر بھی یہ دماں اس قدر اٹھا ہو جاتا ہے کہ وہ جذب کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ سائل دُموی بہ کر آس پاس کی ساخت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ دماں جا کر منجمد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ دماں کے ٹوٹے ہوئے سفید دانوں کے آس

مٹ۔ ہرب۔ ڈایا پے ڈی سس۔

مٹ۔ فعل الیتام۔ بیلنگ پرسس

مٹ۔ سائل دُموی۔ لاکر سنگو فی سن۔

مٹ۔ خلیات جراثیمیہ لیفیہ۔ فانبر دبار سنگلاز

عروق میں التهاب کس طرح تغیرات ہوتے ہیں



(۸) اس شکل میں طبعی عروق کی حالت دکھائی گئی ہے۔ جس کا محیطی طبقہ کڑا و مویہ سے خالی ہے۔ اور مرکزی حصے میں سیلان خون اس قدر تیز ہے کہ کريات الگ الگ نظر نہیں آتے ہیں۔

(۹) یہ رگ بحالت التهاب دکھائی گئی ہے۔ خون کی رفتار رُک گئی ہے۔ جس سے خون کے دانے الگ الگ نظر آ رہے ہیں۔ خون کے دانے محیطی طبقہ میں آ گئے ہیں۔ اور صورت انتقال مقامی کی ہے اسی طرح آس پاس کی ساخت میں مرنے والے بھی چند نظر آ رہے ہیں +

ادہ (دخیر لیفین) سے مل جاتا ہے جو اسے منجمد کر دیتا ہے + اس مقام میں التهاب کی وجہ سے عروق جاذبہ کی رطوبت مائیت دم بھی جمع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مصل دموی بھی ساختوں کے جال یا ان کی فضاؤں میں جمع ہو جاتا ہے۔ جس سے ایک مٹم کا نتیجہ التهابی پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر سطح میں تفرق اتصال کافی ہوتا ہے۔ تو یہ مصل بہرہ خارج ہونے لگتا ہے۔ اگر اس کا ترشح کسی غشاء مانی رشتا صفاق۔ غشاء الصدر۔ غشیہ زلالیہ) میں سے ہو تو یہ مصل وہاں کے جوف میں جمع ہو جاتا ہے۔ اول اول یہ مصل ذاتی طور پر منجمد ہونے کے قابل ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے اندر سائل دموی شامل ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر انجماد واقع ہو جائے تو یہ لوتھڑا یا سطح غشاء کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے۔ یا آزادی کے ساتھ پانی میں تیرتا رہتا ہے +

مذکورہ بالا بیان سے ظاہر ہے کہ اگر التهاب کو صرف لحاظ تغیرات عروق کیجھا جائے۔ تو التهاب دراصل احتقان دموی اور ارتشاح کا نام ہے جسے اس طرح ظاہر کیا جاسکتا ہے + التهاب = احتقان دموی + ارتشاح +

التهاب اگرچہ بظاہر ایک مرض ہے مگر دراصل التهاب کا ایک ایک فصل ایک مفید جواب عمل (رد عمل) ہے اور مریض کے لئے اس لحاظ سے مفید ہے کہ جو مواد فاسدہ اور جراثیم کی سمیت نظام بدن کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ امداد پاتا تسلط جانا چاہتی ہے۔ ان سے مدافعت و مقابلہ کیا جائے

۱۔ غشاء الصدر۔ پیسورا۔

۱۔ مائیت دم۔ لیفٹ

۲۔ غشیہ زلالیہ۔ سانی نویدیل مہرین۔

۲۔ مصل دموی۔ لیڈ سیرم

۳۔ احتقان دموی۔ ذاتی پریا

۳۔ نتیجہ التهابی۔ انفلاٹری ایڈیا

۴۔ ارتشاح۔ اگزوزیشن۔

۴۔ غشاء مانی۔ سیرس مہرین۔

۵۔ رد عمل۔ ری کمیشن۔

۵۔ صفاق۔ پری ٹونیم

چنانچہ اس سرعت دوران جو مقام الہباب میں واقع ہوتا ہے۔ اس سے یہ فائدہ پہونچتا ہے کہ سمیت جراثیم اس کے ساتھ ملکر خفیف ہو جاتی ہے۔ اور وہ دوران کی وجہ سے وہاں سے دور ہو جاتی ہے۔ اگر سمیت کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے۔ تو محض اسی سرعت دوران سے وہ کلیتہً خارج ہو جاتی ہے۔ اور الہباب کا عمل احتقان دموی سے شروع ہو کر وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے دوسرے ظواہر پیدا بھی نہیں ہونے پاتے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس مقام میں خون کی زیادتی سے تغذیہ زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ باوجود سمیت جراثیمی کے مفل ہونے کے زندہ رہ سکتے ہیں۔ تیسرا فائدہ سرعت دوران کا یہ ہے کہ اگر خون میں فادٹین یا دوسرے اجسام تریا قتیہ یا مادہ مستم موجود ہو جو جراثیم کی سمیت کو روک دیتے ہیں۔ یا خود جراثیم کو ہلاک کر سکتے ہیں ا تو یہ چیزیں جن کی یہاں شدید ضرورت ہے دوران خون کی تیزی کی وجہ سے بکثرت یہاں پہونچیں گی۔ اور چونکہ مقام الہباب میں سائل دموی کثیر مقدار میں مترشح ہو جاتا ہے۔ جس کے ساتھ یہ تمام اجسام ہوتے ہیں۔ اس لئے اس مقصد میں اس کا توشیحہ زائد معین ہو جاتا ہے اس سے توشیحہ کا فائدہ بھی ظاہر ہو گیا) اس کے بعد ظواہر الہباب میں یہ بتایا گیا ہے کہ خون کی رفتار میں صلاحیت واقع ہوتی ہے۔ اور بالآخر حالت خوف طاری ہو جاتی ہے اس کا فائدہ اگرچہ ابھی تک مبہم سا ہے۔ لیکن غالب گمان یہ ہے کہ اس سے خون کے سفید دانوں کے انتقال مقامی میں مدد ملتی ہے۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اگر خون

۱۔ سائل دموی۔ پلازما۔

۲۔ مزاحمت۔ ریٹارڈیشن۔

۳۔ خوف۔ اسٹیسس۔

۱۔ سرعت دوران۔ اسکیلر ریشن۔

۲۔ فادٹین۔ انٹی ٹاکسین۔

۳۔ اجسام تریا قتیہ۔ انٹی باڈیز

۴۔ مستم۔ ایکسین۔ کپلی منٹ

کے بہاؤ میں سستی نہ واقع ہوگی تو دافن کے لیے دیوار عروق سے چھٹا اور ان میں نفوذ کر کے باہر آجانا محال ہوگا۔ بلکہ یہ بہاؤ کے ساتھ بہتے ہوئے چلے جائیں گے۔
 رہا یہ امر کہ التهاب میں ان دافن کے باہر آنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں اسکا معضل تذکرہ پہلے ہی آچکا ہے۔

۲۔ تغیرات انسجہ۔ وہ تغیرات جو عمل التهاب سے مقام ورم کی ساخت میں واقع ہوتے ہیں۔ یہ اگرچہ نہایت اہم ہیں۔ مگر تغیرات عروق کی طرح انکا مشاہدہ آسانی سے نہیں ہو سکتا۔

جراثیمی التهاب حاد میں انسجہ کا رد عمل محض شین کی قوت ہیجہ پر موقوف ہے یا بالفاظ دیگر اس تناسب پر موقوف ہے جو اس قوت ہیجہ اور مریض کے انسجہ کی قوت مدافعت کے درمیان ہوگا۔ اسکو قاعدہ کلیہ ہیجنا چاہئے کہ اگر کوئی ہیج نہایت ضعیف ہو تو وہ خلیات کی پیدائش میں تحریک پیدا کر کے انہیں زیادہ کر دیتا ہے اسی طرح یہ بھی قاعدہ کلیہ ہے کہ اگر ہیج کافی قوی ہو تو وہ ساخت کو کم و بیش مرزہ کر دے گا۔ چونکہ ضعیف قسم کی آفات وفتور کا خوردبینی امتحان شاذ و نادر ہی کرنے کا موقعہ آتا ہے۔ اس لئے التهاب حاد میں انسجہ کی غیر طبعی افزائش کی سامہ شالیں انسان میں دیکھنے کا موقعہ کم آتا ہے۔ یہ ظواہر حیوانات کے غشیہ مانیہ کے التهاب حاد کے ابتدائی درجن میں بخوبی نظر آسکتے ہیں۔ جہاں غشیہ مضطربہ کی دہارت میں بجائے ایک خلیہ کے کئی خلیات ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے نواتشیں تیزی کے ساتھ عمل انتقام دیکھا جاتا ہے۔ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلیات

۱۔ انسجہ۔ ٹشوز۔

۲۔ سمین۔ ٹاسکین

۳۔ قوت ہیجہ۔ ارری ٹے ٹیپا ور۔

۴۔ خلیات۔ سلز۔

۵۔ غشیہ مضطربہ۔ اینڈوٹیلیئم

۶۔ نوات۔ نیوکلی اس۔

۷۔ انتقام۔ فلیکس۔ سی ٹوسس۔

کی افزائش غیر معمولی طور پر بڑھی ہوئی ہے۔ اسی طرح انگوٹھ بننے والی ساخت کے بیرونی حصے (حلقہ) میں بھی جہاں جراثیم تھوڑے ہوتے ہیں یہی صورت زخیات کی افزائش نظر آئے گی۔

مگر بیشتر حالات میں سین ہنایت تیز اور شدید ہوتے ہیں۔ اور اس کے اثر سے اعضاء کی ساخت مردہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ عمل اکثر موت الہیجا کی وجہ سے واقع ہوتا ہے۔ جس میں انجہ اور زخیات قابل انجہا وسائل و موسی سے اوجہ و ق سے باہر آتا ہے) تر ہو جاتے ہیں۔ اور سین کے اثر سے یہ سب چیزیں بخر ہو کر ہلاک ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مقام ماؤن کے ان اجزاء کی خصوصی ہیئت غائب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ فوات مخصوص رنگوں سے متلون نہیں ہوتے۔ اور وردین (ہیوٹاکسی لین) اور لمونات اصلہ کو خلافت معمول متبول نہیں کرتے۔ اور مقام انجہ تیزابی رنگوں (مثلاً سفید یا یوسین نامی رنگ) سے ایک جیسی رنگت اختیار کر لیتے ہیں حالانکہ طبی حالت میں مختلف رنگوں کی قابلیت اجزاء میں الگ الگ ہوتی ہے) اور اس کے بعد کی آفتیں اور تغیرات جو ساخت میں واقع ہوں گی وہ جراثیم کی نوعیت پر موقوف ہوتی ہیں۔ اگر یہ جراثیم از قسم صدیدہ ہوں تو مردار میں حصہ کثیر النسی کر یاٹ بیضہ کا جستماع ہو جاتا ہے۔ جن میں سے چند سین کے اثر سے مر جاتے ہیں۔ اور دماغ پپ پیدا ہو جاتی ہے جبکہ مفصل بیان باب تیج میں آئے گا، اگر جراثیم اس قسم کے نہ ہوں تو کثیر النسی کر یاٹ بیضہ زیادہ تعداد

۱۔ وردین۔ ہیوٹاکسی لین۔
۲۔ لمونات اصلہ۔ بے سک ڈائیز
۳۔ سفید۔ یوسین۔
۴۔ کثیر النسی۔ پانی نیوکلوس
۵۔ کر یاٹ بیضہ۔ بیکو ساٹ۔

۱۔ انگوٹھ کی ساخت۔ گرے نیوٹن شٹل
۲۔ موت الہیجا
۳۔ شفا قانس
۴۔ کوگوشین بکروین
۵۔ انجہادی

میں جمع نہیں ہوتے ہیں۔ بلکہ التهابی حصہ میں سفید دانوں کی گول اور چھوٹی قسم کا اجتماع ہوتا ہے جو کريات مایہ سے مشابہ ہوتی ہے۔ یہ اب تک محقق نہیں ہوا ہے کہ یہ دانے اس مقام میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ یا خون سے کھجکریاں آجاتے ہیں لیکن اس میں شک نہیں کہ التهابی حصہ میں ان دانوں کے اندر انقسام ہو کر ان کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اگر جراثیم ہلاک ہو جائیں۔ اور التهاب کا عمل اس درجہ تک پہنچ کر رک جائے تو ظواہر الختام نمودار ہو جاتے ہیں۔ اور التهابی حصہ میں بنی ساخت پیدا ہو جاتی ہے جس کا مفصل بیان باب الختام میں آئیگا۔

سلی مقامات کے غیر جراثیمی التهابات میں خلیات کے مابین رطوبات کی مقدار اس قدر ترشح ہو سکتی ہے کہ خلیات ایک دوسرے سے جدا ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ جس سے موت ذوبانی واقع ہوتی ہے (رذوبان) گھلنا جیسا کہ آگ سے جل جانے کے بعد آبلہ نمودار ہونے میں ظاہر ہوتا ہے۔

التهاب مزمن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نہایت تیزی کے ساتھ خلیات بڑھتے ہیں۔ اور مقام ماؤف میں صلابت (تختہ) پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر یہ التهاب مزمن زیادہ تر بیخ خلوی میں واقع ہوتا ہے۔ جس کے اثر سے عضلہ کی ساخت بھی تلف ہو جاتی ہے۔

۳۔ انجام التهاب۔ التهاب کا انجام (خاتمہ) مختلف صورتوں میں ہو سکتا ہے جس کا دارو دار مندرجہ ذیل امور پر ہے۔

۱۔ اسباب کی نوعیت پر کہ یہ جراثیمی یا غیر جراثیمی

۲۔ عمل التهاب کی شدت اور مدت تک۔

۱۔ کريات مایہ۔ لغو ساخت	۳۔ تختہ۔ اس کے رکس۔
۲۔ نرمی ساخت۔ اسکارٹو	۴۔ بیخ خلوی۔ سلیو رٹو۔
۳۔ موت ذوبان۔ کالیکو ٹروکروس	

۳۔ مریض کی قوت مراغت پر۔

التهاب جراثیمی کا انجام۔ ۱۔ تحلیل یعنی ساخت کی اصلی حالت کا لوٹنا اور درم کا زائل ہو جانا۔ یہ شاذ و نادر ہی واقع ہوتا ہے۔

۲۔ مقامی ساخت کا ضائع ہونا۔ یہ علی العموم ہوتا ہے۔ جراثیم اور غصہ ماؤف کی نوعیت کے لحاظ سے مندرجہ ذیل نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ (الف) التیام جس میں پروار حصہ غائب ہو جاتا ہے۔ اور نئی نئی اُس کی جگہ لے لیتی ہے۔

(ب) تقيُّم جس میں انجمہ ماؤف اور ترشحات کے رقیق ہو جانے سے پیپ بن جاتی ہے۔ جبکہ اگر پھوڑے سے خارج کر دیا جائے۔ تو جراثیم۔ مواد اور مردار ساخت نکل جائیں گی۔ اور اس مقام میں نیا سکڑا ہوا چرہ بن جائیگا (ج) تقرُّح۔ یہ اُس وقت واقع ہوتا ہے جبکہ عمل تقيُّم و فساد مردہ ہونا اسلحہ تک پہنچ جاتا ہے (د) وسیع حصہ ہلاک ہو کر فائقرانا کا مزدوار ہونا۔ یہ اُس وقت ہوتا ہے جبکہ جراثیم اپنے مضر اثر سے ساختوں کی قوت مراغت کم کر کے بہت دور تک پھیل جائیں۔ اس موقع پر اس بات کا جاننا خالی از دلچسپی نہیں کہ زیادہ اہم اور بانظم اعضا و احشاء بمقابلہ بیج الحاقی (بیج داخل) کی سادہ قوتوں کے زیادہ مستحکم ہوتے ہیں۔ حالانکہ اُن میں خون کی مقدار زیادہ ہوتی ہے مثلاً پھول کی لمبی ہڈیوں کے اجسام بلحاظ ساخت نہایت باقاعدہ اور بانظم ہوتے ہیں اسی وجہ سے یہ جراثیمی التهاب کے اثر سے خصوصیت کے ساتھ نفع ہونے کی استعداد رکھتے ہیں۔ ورنہ ایسا لیکہ اگر یہی جراثیم جلد کے نیچے کی بیج داخل میں اپنی

۱۔ تحلیل۔ ریزولیوشن۔

۲۔ فائقرانا۔ ٹنگرین۔

۳۔ التیام۔ ری پیر

۴۔ بیج الحاقی۔ کنکروٹو۔

۵۔ تقيُّم۔ سپورےشن۔

۶۔ بیج داخل۔ کنکروٹو۔

۷۔ تقرُّح۔ اسریشن۔

حالات کے ساتھ التهاب پیدا کریں تو اسکو اس قدر زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے +

غیر جراثیمی التهاب کا انجام۔ جب التهاب اسباب آئید یا دیگر غیر جراثیمی اسباب سے پیدا ہوتا ہے۔ تو عموماً رقیق رطوبات کا ترشح بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مگر ابتدائیں اس کے اندر غلیظیات بہت کم ہوتے ہیں۔ اور التهابی عمل نہایت محدود ہوتا ہے۔ اور زیادہ پھیلنے کی قوت نہیں رکھتا۔ اسکا انجام عام طور پر مندرجہ ذیل صورتوں میں ہوا کرتا ہے +

(الف) تحلیل۔ التهاب کی اس قسم میں تحلیل کامل اکثر ہوتا ہے۔

(ب) ایفی ندبی ساخت کا بننا۔ جیسا کہ مائیت التصاق کی صورت میں جم کر تاروں کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے +

(ج) گاہے عمل التهاب مزمن ہو کر حصہ ماؤف میں صلابت (تجربہ) یعنی وابت پیدا کر دیتا ہے۔ یا اس کی وجہ سے کسی جوف مائی میں مسلسل طوبت کا ترشح ہوتا رہتا ہے +

تحلیل۔ جس سے مراد یہ ہے کہ عضواؤف اپنی اصلی حالت اور طبعی فعل پر لوٹ آئے۔ یہ اُس وقت واقع ہوتا ہے جبکہ التهاب کا سبب اس قدر سخت نہ ہو کہ عضواؤف کی قوت حیوانیہ بالکل باطل ہو جائے۔ عمل تحلیل کے ظواہر عمل التهاب کے سے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ عمل تحلیل کے ظواہر کی ترتیب الٹی ہوتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے خون کے دانوں میں حرکت ذبیہ پیدا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بتدریج دوران خون دوبارہ لوٹ آتا ہے جبکی

۱۔ اسباب آئید۔ میکائیل کا زرد

۲۔ قوت حیوانیہ۔ مائیت

۳۔ تحلیل۔ ریزو لیوٹن۔

۴۔ ایفی ندبی ساخت۔ فائبرو سیکیر ٹیشن

حرکت اول تو سست لیکن بعد میں تیز ہو جاتی ہے۔ خون کے دانوں کا چپکنا بتدریج کم ہو جاتا ہے۔ مگر بعض اوقات عروق کے محیطی اور غیر محرک طبقہ کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی دیواروں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ خون کے سفید دانے جو عمل التهاب میں عروق کی دیواروں سے باہر چلے گئے تھے۔ وہ دوبارہ دوران خون میں واپس آنے لگتے ہیں۔ جن کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ عروق کی دیواروں میں سے چین کر پھر لوٹ آئیں۔ یا عروق جاذبہ کی راہ داخل ہو کر خون میں شامل ہو جائیں اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے (اور جو دانے ساخت میں باہر رہ جاتے ہیں۔ وہ بالآخر ٹوٹ کر جذب ہو جاتے ہیں۔ التهابی رطوبت جو کہ عروق سے باہر مترشح ہو چکی ہے۔ اب وہ عروق جاذبہ کی راہ سے جذب ہو جاتی ہے) التهاب حاد کے بعد کچھ عرصہ تک عضواؤں کے عروق اور غاصکوں کی ویریدیں پھیلی ہوئی رہتی ہیں۔ کیونکہ التهاب کے باعث انکی قوت انقباضیہ کمزور ہو جاتی ہے۔ لیکن بتدریج یہ حالت بھی دور ہو جاتی ہے۔

علامات التهاب

مقام التهاب کے علامات چار عنوانات میں بیان کیے جاسکتے ہیں۔ گہری۔ سرخی۔ ورم۔ درد۔ مگر اس میں ایک پانچویں اہم چیز کا اضافہ کرنا چاہئے۔ یعنی نفل میں خلل کا واقع ہونا۔

حرارت درگمی (مقام التهاب چومنے سے گرم معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر مقياس الحرارة کے ذریعہ سطح التهاب کو دیکھا جائے تو یہاں کی حرارت نمایاں طور پر آس پاس کی جلد سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو دراصل اس امر کا نتیجہ ہے کہ یہاں دوران خون تیزی سے ہوتا ہے۔ اور خون کی مقدار زیادہ آتی ہے۔ مگر مگر

مقام مقياس الحرارة۔ تھرماسٹر

حصہ کی حرارت خود مرکز دورانِ رول کی حرارت سے کبھی زیادہ نہیں ہوتی ہے۔
 حرارتِ دسرخی مقامِ التهاب میں جہتِ تلخِ خون کی وجہ سے ہوتی ہے۔ شدید
 اشتدادِ دوسوی کے ابتدائی درجہ میں اس مقام کا رنگ شورشِ گلابی ہوتا ہے۔ جو دبا
 سے فوراً ہلکا پڑ جاتا ہے۔ اور دباؤ ہٹانے کے بعد اسی تیزی سے لوٹ آتا ہے۔
 حالتِ مزاحمت میں جبکہ دورانِ خون سُست پڑ جاتا ہے۔ تو سرخی گہری دسیاہی
 (بک) ہو جاتی ہے۔ کیونکہ عروقِ شعریہ سے خوں کے گزرنے میں زیادہ وقت
 صرف ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے اس میں حمضین کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ مگر اب
 دبانے سے رنگ نہ جلد غائب ہوتا ہے۔ اور نہ جلد واپس آتا ہے۔ بلکہ دبانے
 سے اکثر ہلکی سی زردی و ماں رہ جاتی ہے۔ کیونکہ عروقِ دوسوی سے حرارتِ دوسوی
 ہو کر ساخت میں آ جاتی ہے۔ اور جب حالتِ وقتِ اشتداد آتی ہے تو دبانے
 سے سرخ رنگ غائب نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ حالت دیر تک قائم رہے تو اس مقام
 میں دوسبہ رہ جاتا ہے +

جب مہذبِ حصہ غیر عروقی ہوتا ہے۔ جیسے قرنیہ۔ غضروفِ منصفی۔ تو سرخی
 یقیناً اُس وقت تک موجود نہیں ہوتی۔ جب تک کہ نئے عروقِ ماں نہ بن جائیں۔
 مگر جب قرنیہ میں التهاب ہوتا ہے۔ تو سیاہی چشم کے گرد جزئہ ہیمی (حققان
 دوسوی کی وجہ سے گہری سرخی نمودار ہوتی ہے۔ اسی طرح التهابِ غنیمیہ میں بھی سرخی
 غائب ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کا گہرا رنگ (دادہ ملونہ) پھیلے ہوئے عروق کو چھپاتے

۱۔ اشتداد۔ تھرامبوسس۔
 ۲۔ غضروفِ منصفی۔ آرٹیکولر کارٹیلاج۔
 ۳۔ جزاءِ ہیمی سیلی اری ریجن۔
 ۴۔ غنیمیہ۔ آئرس۔
 ۵۔ دادہ ملونہ۔ گینگٹ۔

۱۔ اشتدادِ دوسوی۔ ہائی پریسیا۔
 ۲۔ مزاحمتِ دوران۔ ریٹارڈیشن۔
 ۳۔ حمضین۔ آکسیجن۔
 ۴۔ حرارتِ دوسویہ۔ ہموگلوبین۔
 ۵۔ وقت۔ اسٹےسس۔

رکتا ہے۔ جس سے ان کی سرخی ظاہر نہیں ہونے پاتی۔ ہاں اگر اس میں التهاب عرصہ تک قائم رہے تو چونکہ مادہ لئو نہ جذب ہو کر غائب ہو جاتا ہے۔ اس لئے قوت غلبہ نمایاں طور پر نہایت کٹخ ہو جاتی ہے +

درم۔ (سوجن) مقام التهاب میں سوجن کے پیدا ہونے کی وجہ بھی وہی دو ہیں۔ یعنی جہتماع خون۔ اور انقباض رطوبات ترشح، درم کی مقدار کا انحصار دو باتوں پر ہے۔ اول شدت فساد پر۔ دویم ساخت کی قوت تمدور پھیلنے کی قوت پر۔ یہ بھی واضح ہو کہ تمدور کی زیادتی کے ساتھ درد کم ہوتا ہے۔ اور اس کی کمی کے ساتھ درد نسبتاً زیادہ ہوتا ہے +

اگر التهابی حصہ کسی سخت اور موٹی جھلی سے ڈھکا ہوا ہو تو اس حالت میں نہ صرف تیناؤ کے باعث درد کی شدت زیادہ ہوگی۔ بلکہ بہت ممکن ہے کہ سوجن مقام التهاب سے دو نمودار ہو۔ مثلاً اگر تیلی کی جھلی کے نیچے التهاب کے بعد پھوٹا بچائے۔ تو سوجن پشت دست میں نمودار ہوگا۔ اگر التهاب کے مواد ڈھیلی ساختوں کے اندر چلے جائیں۔ تو وہ علامتیں کم ہو جاتی ہیں جنکو صرف مریض معلوم کر سکتا ہے۔ مثلاً درد و تکلیف مگر ممکن ہے کہ سوجن بہت زیادہ ہو۔ اسی طرح جبکہ تلوے میں التهاب ہوتا ہے۔ تو تیج دور کے مقامات میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور جب کھوپڑی میں التهاب ہوتا ہے۔ تو پوٹوں میں سوجن نمودار ہوتی ہے۔ التهاب کا سوجن مرنے کے بعد اگر کم ہو جاتا ہے۔ مگر فورے طور پر نہیں جاتا +

السم (درد) التهاب میں درد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اعصاب کے آخری سروں میں جسمانی تیج پہنچتا ہے۔ کیونکہ شریانوں کا تمدور بڑھ جاتا ہے۔ اور خارج شدہ رطوبتوں کا دباؤ پڑتا ہے۔ چنانچہ اگر گھیرنے والی جھلیوں کی دبازت کی وجہ سے

سو جن جلد نہ ہو سکے۔ تو درد نہایت شدید ہوتا ہے۔ مثلاً جب التهاب پتیلی یا آنکھ یا نصیتین میں ہو تو درد شدید ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت ممکن اور قرین قیاس ہے کہ موافق بھی اپنی تیزی کیفیت سے (براہ راست اعصاب پر کیا دی اثر رکھتے ہوں) اور درد کا سبب ہیں) خصوصاً جبکہ عضواؤں میں عمل فساد جاری ہو۔ یا جبکہ اچھے خون کی کمی سے اعصاب کو کافی غذا نہ پہنچتی ہو۔

التهابی درد کا یہ خاصہ لازمہ ہے کہ دبانے سے ہمیشہ بڑھتا ہے۔ خواہ یہ دباؤ اندرونی ہو۔ یا بیرونی۔ اندرونی دباؤ کی مثال یہ ہے کہ متورم ہاتھ کو لٹکا کر رکھا جائے جس سے التهاب کے عروق میں خون کا دباؤ بڑھ جائے۔ اور بیرونی دباؤ کی صورت یہ ہے کہ باہر سے کسی بیرونی جسم کے ذریعہ یا انگلی سے دبایا جائے۔ اس قسم کے درد کو ذکاوت حس کہتے ہیں۔

الم تقیح یعنی پیپ بننے کے وقت جو درد ہوتا ہے۔ وہ ضرباتی قسم کا رٹیں کا ہوتا ہے۔ اغشیثہ غاطبہ کے التهاب کا درد محرق (جلتا ہوا) ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کنکریاں چھری ہیں۔ اغشیثہ ماتیہ کے التهاب کا درد ایسا ہوتا ہے گویا کوئی میزہ بھونک رہا ہے (روح اطمن) ہڈی کے التهاب میں ایسا درد ہوتا ہے۔ گویا کوئی چھید کر رہا ہے (روح ناخس) اور یہ دردت کے وقت زیادہ ہوتا ہے۔ خصیوں کے التهاب کا درد بیزار کرنے والا ہوتا ہے (روح مرضن) جب آلات حواس خمسہ میں التهاب پیدا ہوتا ہے۔ تو حقیقی درد نہیں محسوس

بھونکنے والا درد
روح اطمن
روح ناخس
روح مرضن

مذ ذکاوت حس۔ ٹنڈرنس۔

مذ تقیح۔ سپرے شن۔

مذ ضرباتی درد۔ تھرابنگ پین۔

مذ الم محرق۔ برننگ پین۔

روح ناخس۔ برننگ پین۔

روح مرضن۔ سنکنگ پین۔

ہوتا ہے۔ بلکہ ان کے مخصوص افعال میں غیر معمولی زیادتی ہو جاتی ہے۔ مثلاً طبقہ شبکیہ میں جب التهاب ہوتا ہے۔ تو روشنی کے شعلے آنکھوں کے سامنے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح جب کان کے اندر روشنی سے میں التهاب ہوتا ہے۔ تو طنین کا مرض ہو جاتا ہے (یعنی از خود کان میں شور کی آوازیں آتی ہیں)

التهاب کا دور صرف اسی مقام میں محدود نہیں رہتا ہے۔ بلکہ اکثر اوقات دور کے اعصاب میں بھی محسوس ہوتا ہے۔ جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی عصب کی شاخیں ان دونوں حصوں میں پہنچتی ہیں۔ یا اس وجہ سے کہ مقام التهاب میں جن اعصاب پر اثر پہنچتا ہے۔ مزید سب اسول اس دور کو اس مقام کا بھگتا ہے جہاں اعصاب کی آخری شاخیں ختم ہوتی ہیں۔ مثلاً کولمے کے جڑ میں جب التهاب ہوتا ہے۔ تو در اکثر گھٹنے میں معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ دونوں جڑوں میں ایک ہی عصب کی شاخیں پہنچتی ہیں۔ اسی طرح سنگ گرد دیا در گردہ میں درد و عصب تناسلی نخذی کی پوری رفتار میں محسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں کچر ران اور ران کے سامنے درد محسوس ہوتا ہے۔ اور اگر مریض مرد ہے۔ تو اس طرف کا خضیہ اوپر چڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح ریڑھ کی ہڈی جب سڑ جاتی ہے۔ تو درد ان مقامات میں معلوم ہوتا ہے۔ جہاں اس مقام کے اعصاب ختم ہوتے ہیں۔ مثلاً جب پشت کے حصے میں یہ آنت ہوتی ہے۔ تو کمر کے پاس پورے گھیرے میں درد معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر التهاب پشت اور کمر کے انضائی مقام میں ہوتا ہے۔ تو شکم کے سامنے درد ہوتا ہے۔ گھبے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اعصاب شریکی کی وجہ سے ایک طرف کا

عصب تناسلی نخذی۔ جے نے
مس۔ ٹوکر بورل زرد۔

ع۔ اعصاب شریکی۔ کچے تھے بلک زرد

مس۔ التهاب شبکیہ۔ ریٹی ٹائٹس۔

مس۔ التهاب الاذن باطن۔ اوتانی ٹائٹس

مس۔ طنین۔ ٹائٹس۔

التهاب مقابل جانب بھی درو پیدا کر دیتا ہے۔ خصوصاً جبکہ یہ اعضاء جوڑے جوڑے ہوں۔ جیسے گردے +

اختلال عمل۔ مرض التهاب میں مندرجہ ذیل وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے

۱۔ ورم و سوجن کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے عضو متہب کے استعمال میں برقت واقع ہوتی ہے +

۲۔ گاہے دردی وجہ سے عضو کی نقل و حرکت مشکل ہو جاتی ہے +

۳۔ عمل التهاب سے اکثر اوقات مریض حصہ میں شتر عاد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جراثیمی التهابات میں سین کے ذاتی اثر نے ظاہر ہوتا ہے۔ جو کہ کریات کے مادہ حیات پر اثر کرتے ہیں۔ مثلاً التهاب چشم میں چند وجہ سے آنکھ کا استعمال بصارت کئے لئے تقریباً غیر ممکن ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب کوئی عضلہ متہب ہو جاتا ہے تو طبعا انسان اُسکو آرام میں رکھتا ہے۔ علیٰ ہذا اعضاء مذویہ مثلاً گردے اور جگر کا التهاب ان کے مخصوص افعال کو اگر بالکل مفقود نہیں کرتا۔ تو کم از کم ناقص ضرور بنا دیتا ہے +

علامات بدنئیہ۔ التهاب کی حالت میں ہمیشہ موجود ہوتی ہیں۔ اگرچہ اسباب کے اختلاف سے ان کی شدت میں کمی و بیشی ہوتی ہے۔ غیر جراثیمی التهاب میں اگرچہ مدت بخار ہوتا ہے۔ مگر یہ زیادہ مدت تک قائم نہیں رہتا ہے۔ مگر جب جراثیم موجود ہوں تو سین کے جذب ہو جانے سے تمام بدن میں عمومی علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ جو اپنی شدت میں محض معمولی حرارت سے لیکر خطرناک تسمم دم تک پہنچ کر مہلکت کا

۱۔ اعضاء مذویہ۔ گلینڈ و لارگنز۔

۲۔ علامات بدنئیہ۔ کانسٹیٹیویشنل سپٹم۔

۳۔ تسمم دم۔ ٹاکسی میا۔

۱۔ اختلال عمل۔ اسپرینٹ۔

۲۔ شتر عاد۔ پیرالائیٹس۔

۳۔ سین ٹاکسین۔

۴۔ مادہ حیات۔ پروٹوپلازم

باعث ہو سکتی ہیں۔ بائینہم یہ تعجب خیز امر ہے کہ اگر سپ کا ایک قطرہ بھی تناؤ کی حالت میں ہو تو گاہے شدید اختلال پیدا کر سکتا ہے۔

ارتفاع حرارت یا بخار۔ عمل التهاب کا یہ ضروری عرض ہے۔ جنکا اجمالی ذکر کرنا یہاں ضروری ہے۔ اس کی عام خصوصیات یہ ہیں کہ اس میں حرارت کا ازلیا مختلف ہوتا ہے۔ اور قلب و تنفس کی حرکات درجہ حرارت کے تناسب سے بڑھ جاتی ہیں۔ اگر بخار مسلسل جاری ہے۔ تو مریض لاغر ہو جاتا ہے۔ اس کی عضلی طاقت گھٹ جاتی ہے۔ منہ خشک اور زبان سیلی ہو جاتی ہے۔ اور آخری درجات میں لبوں اور دانتوں پر پھڑی سی جم جاتی ہے (جس میں رطوبت مخاطیہ کے ساتھ غذا کے اجزاء بھی ہوتے ہیں) کیمرک کم ہو جاتی ہے۔ ماضیہ خراب ہو جاتا ہے۔ قبض ہوتا ہے۔

اور پانسانہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ قارورہ کارنگ گہرا اور اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور اعضاء کے تغیرات و استحالات کی کثرت کی وجہ سے قارورہ میں مادہ بدبو دار اور بول آگین مرکبات زیادہ خارج ہونے لگتے ہیں۔ مادہ بولیہ کی زیادتی کی شائبہ اس طرح کی جاسکتی ہے کہ ایک مشبہشکی فی میں تھوڑا سا قارورہ یا جانے اور پھر اس میں ہوزن مثلاً تیزاب شورہ ملا دیا جائے۔ اس آمیزش سے بوئیہ شور آگین کے دانے سیال کی بالائی سطح پر تیرنے لگیں گے۔ اور شکل میں وہ مصری کی لنگریوں کی طرح دکھائی دینگے۔ مریض کی جلد بھی علی العموم خشک ہوتی ہے۔

بخار کے اسباب۔ یہ نامحقق ہے کہ حرارت بدنہ کے نظام کا خاص عصبی مرکز

۱۔ رطوبت مخاطیہ۔ میوکس۔	۲۔ تیزاب شورہ۔ ہائڈرک ایسڈ
۳۔ مادہ بولیہ۔ یوریا۔	۴۔ بولیہ شور آگین { ناشٹریٹ آف
۵۔ بول آگین۔ یوریش۔	یوریا۔

جسم مضلع میں ہے۔ اور اس کے ماتحت کچھ اضافی مراکز سطح میں بھی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ حرارت بدنہ کی پیدائش اور اس کے زوال کا باہمی اعتدال اس طرح قائم رہتا ہے کہ جلد تنفس اور دیگر ذرائع سے جس قدر وہ مناسبت ہوتی ہے۔ اسی قدر وہ پھر اعضا اور علی الخصوص احشاء و عضلات ارادیہ کے اعتدال انجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے بدن کے اندر ارتغاع حرارت کے دہی اسباب ہو سکتے ہیں۔ ۱۔ یا یہ کہ حرارت طبعی حالت سے مناسبت کم ہو۔ اور ۲۔ یا اسکی پیدائش اعتدال سے زیادہ ہو۔ لیکن مریض کی حالت کو دیکھ کر اس امر کا یقین کرنا دشوار ہے کہ اسکا بخار اسباب نقصان حرارت کی کمی سے واقع ہو اسے۔ اس لئے یہ ماننا پڑتا ہے کہ بخار کا باعث یہ ہے کہ حرارت پیدا کرنے والے انجہ خاصہ عضلات میں تیزی آ جاتی ہے۔ جس کی شہادت اس امر سے بھی ملتی ہے کہ بخار کی حالت میں مریض کے عضلات دبے ہو جاتے ہیں۔ اس کی عضلی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے قارورہ میں عضلی انجہ کے فضلات دہلیہ بل آگین وغیرہ) بکثرت پائے جاتے ہیں۔ تولید حرارت کی یہ تیزی غالباً انجہ میں اس وجہ سے واقع ہو جاتی ہے کہ مقام التهاب میں ایسے اجسام محرک حرارت پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو مراکز حرارت میں تحریک پیدا کر دیتے ہیں۔ تجربات سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ خمیر لیفین اور بہت سے ایسے مرکبات جو انجہ کے تخلیل و فساد سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے سمین جو جراثیم کے عمل سے پیدا

۱۔ اعتدال انجہ نشوونما بولزم۔

۲۔ عضلی انجہ میکروٹشوز۔

۳۔ خمیر لیفین۔ فائبرین فرمنٹ۔

۴۔ اشادہ۔ و سلا۔

۱۔ جسم مضلع۔ کارپس کسٹانی ایٹم

۲۔ اضافی مراکز۔ کسوری سنٹرز

۳۔ بخار۔ کارڈ۔

۴۔ عضلات ارادیہ۔ والنٹری سلا

ہو جاتے ہیں۔ ان سب میں کس قسم کی قوت ہوتی ہے کہ مرکز حرارت میں تحریک پیدا کریں +

بھار کی علامات کے متعلق اجنا لایہ کہنا کافی ہے کہ وہ زیادہ تر حرارت کی نیا نئی کے نتائج ہیں۔ یا ان فضلات سمیے کے نتائج ہیں۔ جو دوران خون میں شامل ہو کر اعضا غددی اور دیگر اعضا و احشائے خلیات پر اثر کرتے ہیں۔ یعنی ان کے اثر سے یہ اعضا نرم۔ متورم اور سنہ ہو جاتے ہیں۔ اس حالت کو مختلف ماہرین امراض نے مختلف ناموں سے یاد کیا ہے۔ مثلاً ورم ماویا ورم سحابی (درا بر آلود) مثلاً ورمی تریجہ اسی غدود کے خلیات مفروزہ در طوبت بنانے والے اجتم میں بڑھ جاتے ہیں۔ اور ان کا مادہ حیات نمایاں طور پر داند دار ہو جاتا ہے۔ جس سے نوات بھی مشکل نظر آتے ہیں۔ یہ دانے خاصیت میں رطوبت مایہ سے مشابہ ہوتے ہیں۔ اور تیزاب شکر کے اثر سے بالکل صاف ہو جاتے ہیں + اسی قسم کے تغیرات قلبی عضلات کے ریشوں میں بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ اور ان کے خطوط غائب ہو جاتے ہیں اور انہیں دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان سب باتوں سے اس کی انقباضی قوت میں کمی آ جاتی ہے + اعضا ہضم کے غدود پر جو اثرات پہنچتے ہیں ان سے بھار کے بہت سے عوارض کی علت معلوم ہو جاتی ہے۔ غدود لعابہ اور منہ کی دوسری گھٹیاں لعاب کا ترشح پورے طور پر نہیں کر سکتیں۔ جس سے منہ خشک ہو جاتا ہے۔ اسی قسم

۱۔ ورم حاد۔ ایکوت سولنگ۔	۱۔ ورم حیات۔ پروٹوپلازم۔
۲۔ ترشح مایہ۔ البیوری من انفلٹریٹ	۲۔ نوات۔ نیوکلیر
۳۔ ورم سحابی۔ کلاؤڈی سرنگنگ۔	۳۔ رطوبت مایہ۔ ایسیوس۔
۴۔ ورم تہجی۔ گرسے نیوڈی جزیشن	۴۔ تیزاب سرکہ۔ اسے ٹک ایسڈ۔
۵۔ غدود۔ کلینڈز۔	۵۔ غدود لعابہ۔ سیلیوری گلینڈز۔
۶۔ خلیات مفروزہ۔ سکرے ٹنگ سار۔	۶۔ سکرے گلیٹین۔ بکل گلیٹین۔
	۷۔ لعاب دہن۔ سلائی۔

کے تغیرات سے معجزہ کی قوت باضمہ میں فتور آ جاتا ہے +

بخار کی شدت اور اس کی نوعیت مریض کی سابقہ حالت اور مرض کی نوعیت اور مدت کے لحاظ سے مختلف ہوا کرتی ہے۔ نوجوان تندرست اور قوی اشخاص میں التهاب حاد کا بخار عموماً شدید قسم کا ہوتا ہے۔ اور اس میں حرارت اور اس کے دیگر عوارض مع ذیابان کے بہت نمایاں ہوتے ہیں (حمی القباۃ قویہ) اس کے کمزور مریضوں میں اور اسی طرح بے بخاروں کے انتہائی درجہ میں مثلاً حمی مطبقہ متناقصہ کے تیسرے ہفتہ میں اور شدید عددی جراثیمی مثلاً سرخاء اور نفعن دومی انتہائی ضعیف و مہبوط نمایاں ہو جاتے ہیں اس قسم کے بخار کو حمی القباۃ غیر قویہ کہتے ہیں اس حالت میں بخار کا تیز ہونا ضروری نہیں ہے اور مریض پر نیم بے عقلی سی طاری ہو جاتی ہے۔ یا کہ اس کے ساتھ ہلکا ذیابان ہوتا ہے۔ کپڑے نوچتا ہے۔ اور پاشخانہ پیشاب بستر ہی پر ہو جاتا ہے +

اقسام التهاب :- مظاہر التهاب کے بیان کرنے کے لئے مختلف اصطلاحات بولے جاتے ہیں جن میں چند درج ذیل کئے جاتے ہیں +

التهاب نزلی میں غشیہ مخاطیہ متاثر ہوتی ہیں۔ جو داخل میں خشک اور نہایت سرخ رہتے ہیں۔ اور ان میں درد و ملین ہوتی ہے۔ اس کے بعد اواخر میں رطوبت مخاطیہ یا پیپ ملی حوی رطوبت یا خالص پیپ کا اخراج کثرت

مع نفعن دومی، سچی میا۔

مع مہبوط۔ کو لیپس۔

مع حمی القباۃ غیر قویہ۔ یہ تھکے انفلماشری فیو

مع التهاب نزلی۔ کنارل انفلاشن

مع غشیہ مخاطیہ۔ میوکس ممبرینز

مع رطوبت مخاطیہ۔ میوکس

مع ذیابان۔ ڈیوریم

مع حمی القباۃ قویہ۔ استھنک انفلاشر

فیور

مع حمی مطبقہ متناقصہ۔ ثانی فائڈ فیور۔

مع عددی جراثیمی۔ بیکٹیریل انفکشن

مع سرخاء۔ اری سپلس

ہونے لگتا ہے۔ مہتاب جھلی میں اول اول رطوبت مخاطیہ کا بننا بند ہو جاتا ہے اور وہ رطوبتیں اس کے اندر نفوذ کر جاتی ہیں۔ جو التهاب کی وجہ سے عروق سے ترشح ہوتی ہیں۔ جن سے یہ جھلی بھی متورم ہو جاتی ہے۔ جھلی کے بشروہ کے کثرت بڑھنے لگتے ہیں۔ جس سے رطوبت مخاطیہ کی پیدائش زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جوں جوں جھلی میں سفید دانوں کا اجتماع ہوتا جاتا ہے اسی قدر یہ رطوبت مذکور میں شامل ہو کر اس میں سپ کی آمیزش کر دیتے ہیں۔ یا خالص سپ بناتی ہیں۔ سطحی بشروہ کے مائع ہو جانے سے چھوٹے چھوٹے زخم بھی پیدا ہو سکتے ہیں لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ اگر التهاب نزلی کے ترشحات کو خرویدن سے دیکھا جائے۔ تو ان میں کثرت قحیہ (سپ کے دانے) سفید دانے اور بشروہ کے کثرت مختلف حالتوں میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی بشروہ کے بعض کثرت مخاطیہ کے گول دانے پائے جاتے ہیں۔ اور بعض اپنی طبعی حالت میں ہوتے ہیں + نزلی التهاب گاہے جراثیم سے۔ گاہے مقامی ہیچات سے اور گاہے سردی کے لگنے سے ہوتا ہے +

التهاب غشائی (التهاب منبت) جس میں ایک جھلی اس وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ کہ عروق سے سائل و موی ترشح ہو کر جم جاتا ہے۔ اور بکا ہوا لیضین جھلی کی سطح پر جم جاتا ہے۔ جب اس قسم کا التهاب کسی غشاء غشائی (مثلاً

مثلاً مہجات۔ ارریٹیس
مثلاً التهاب غشائی۔ کردہس انفلاشن۔
مثلاً التهاب منبت۔ پلاسٹک انفلاشن۔
مثلاً سائل و موی۔ پلازما۔
مثلاً لیضین۔ فائبرین۔
مثلاً غشاء مانی۔ سیرس ممبرین۔

مثلاً بشروہ۔ اپنی تعلیم
مثلاً کثرت۔ سائل۔
مثلاً سفید دانے۔ لیکوسائٹس
مثلاً مہی بشروہ۔ سوپرنشیل اپنی تعلیم
مثلاً ترشحات۔ ڈسچارج۔
مثلاً کثرت قحیہ۔ پراسیڈز۔
مثلاً مخاطیہ۔ میوسین۔

غشاء مصدر. صفاق اور غشاء زللی یعنی جوڑوں کی جھلی کی سطح پر ہوتا ہے۔ تو
ماہیت دمویہ کا ایک طبقہ جھلی کے مانند جم جاتا ہے۔ اور اس پاس کی چیزوں
کو چپکا دیتا ہے۔ اس قسم کی حالت پھیپھڑے کے ہوائی خالوں میں ذات الریہ کے
اندر بھی واقع ہوتی ہے۔ جبکہ پھیپھڑے کا ایک ٹنڈا لوہڑا ملتب ہو جاتا ہے۔
ذات الریہ مضیہ (غشیہ مخاطیہ) جیسے طبقہ لمعہ اور طن کی جھلی پر اس قسم کے الہاب
سے گاہے سفید ٹکڑے گاہے کے مانند پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو نہایت آسانی سے
جدا کیے جاسکتے ہیں۔ ان کے جدا ہونے کے بعد ایک سرخ سطح نکل آتی ہے۔
جن میں ایک دو جگہ خون کے نقطے بھی نظر آئیں گے۔ مگر ساخت میں کوئی کمی
نہ ہوگی +

الہاب خنقی۔ دراصل یہ وہ الہاب ہے جو عصبی خناق و بانی کے اثر سے
کسی آزاد سطح پر پیدا ہو جائے (اس کا مفصل بیان خناق و بانی کے باب میں
آئے گا) +

مگر اکثر اس اصطلاح کا اطلاق عملاً دوسرے اسباب سے پیدا شدہ الہابی اعمال پر بھی
کیا جاتا ہے جن میں خناق و بانی کی طرح جھڑنی جھلی اسی نوعیت کی بن جاتی ہے۔
الہاب غشائی کی جھلی اور اس جھلی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اس کی ساخت میں صرف
لیغین ہی نہیں ہوتی بلکہ مردار ساخت کا بھی کم از کم کچھ حصہ تو ضرور شامل ہوتا ہے
اسی وجہ سے کمر چھڑے سے یہ شکل جدا ہو سکتی ہے اور جب اس کا کمر ٹوٹ جاتا ہے تو

۱ غشاء زللی۔ سائنو دیل مہرین۔

۲ غشاء مصدر۔ پلیورا۔

۳ ماہیت دمویہ۔ لغت

۴ ذات الریہ مضیہ۔ لوہر نیونیا۔

۵ غشیہ مخاطیہ۔ میوکس مہرین۔

۱ طبقہ لمعہ۔ کھنکھنایا۔

۲ الہاب خنقی۔ ڈفٹیرک انفلامیشن۔

۳ عصبی خناق و بانی۔ ڈفٹیریہ میسلس۔

۴ جھڑنی جھلی [۵ غشاء کاؤب] فاس مہرین

۲۔ لمہتب حصہ کو آرام و سکون میں رکھا جائے۔ جہاں کہیں التهاب واقع ہو اُس حصہ کو طبعی سکون سے رکھا جائے۔ اور اس سے حتی الامکان کام نہ لیا جائے۔ مثلاً اگر التهاب مفصلی ہے۔ تو پہلی باندھ کر اُس کی حرکت بند کر دی جائے۔ اگر پستان میں ورم ہے تو اسے سہارہ دیکر باندھ دیا جائے۔ اور ساتھ ہی ہاتھ کو بدن سے باندھ کر بے حرکت کر دیا جائے۔ اور دودھ پلانا بند کر دیا جائے۔ اگر قریب میں التهاب ہے تو اس میں روئی کی گدی رکھ کر پٹی باندھ دی جائے۔ تاکہ پوٹوں کی حرکت سے قریب کو رگڑ نہ لگنے پائے۔ اور اگر شبکیہ میں التهاب ہے تو اسکو آرام دینے کے لئے روشنی سے احتراز کیا جائے۔

۳۔ مقام التهاب خون کے دباؤ اور ارتقان عمومی کو کم کر دے۔ جس سے ترشح و رطوبات دور اور تناؤ کم ہو جائے گا۔ یہاں یہ ظاہر کرنا مناسب ہے کہ اگرچہ ارتقان عمومی اور ترشح و رطوبات یہ دونوں چیزیں ایک حد تک مفید ہیں۔ تاہم عموماً التهاب میں یہ اس قدر زیادتی کے ساتھ موجود ہوتی ہیں کہ انکو محدود کرنا ضروری ہوتا ہے اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے مناسب ہے کہ لمہتب عضو کو اونچا کر کے رکھا جائے۔ علی الخصوص جبکہ پاؤں میں التهاب ہو۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ عضو کو اس طرح اونچا کرنے سے وریدیں بوجہ ثقل طبعی کے خون سے خالی ہو جائیں گی۔ جس کے انعکاسی اثر سے شریانیں سکڑ جائیں گی۔ اس قاعدہ کو ضرورت سے زیادہ عمل میں نہیں لانا چاہئے۔ ورنہ عضو مازف سے خون کم ہو کر تغذیہ کے خلل سے قوت حیات باطل ہو جائے گی۔ اس لیے یہ قاعدہ اختیار کرنا چاہئے کہ عضو کو صرف اس قدر اونچا کیا جائے کہ وریدی خون کی واپسی تو آسانی سے ہوتی رہے۔ لیکن شریانی خون

۱۔ لمہتب۔ انفلیمڈ۔

۲۔ شبکیہ۔ رٹنا۔

۳۔ ارتقان عمومی۔ مانی پر بیا۔

۱۔ ترشح۔ اگزودیشن۔

۲۔ انعکاسی انقباض۔ ریفلیکس کنٹراکشن۔

کی آمین کو فی خلل واقع نہ ہو۔ مقاصی اخراج خون کے لئے جو تک لگانا یا پچھنے لگانا یا تریا خشک سنگھیاں کچھوانا مناسب حالات میں مفید ہوتا ہے۔ اور گاہے اس سے درد کو فوری فائدہ ہوتا ہے۔

سردی کا استعمال اگر مناسب طریقہ سے کیا جائے۔ تو احتقان دموی کے کم کرنے میں بہت بڑی مدد مل سکتی ہے۔ کیونکہ اس کے اثر سے شرائین صغیرہ سکڑ جاتی ہیں۔ لیکن سردی کا استعمال محض ابتدائی درجہ میں کرنا چاہئے کیونکہ سردی عضلات کی قوت حیات کو کم کر دیتی ہے۔ اس لئے اگر وہاں زیادہ اجتماع خون ہو گا۔ تو سردی فائدہ کے عوض نقصان پیدا کرے گی۔ اسی طرح بوڑھوں میں بھی اس کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس کے اثر سے جلد کے مردہ ہوجانے کا خطرہ رہتا ہے۔ سردی کا استعمال ربڑ کی پٹی میں بٹ بھر کر کیا جائے۔ یا ایک برتن اوپر لٹکا کر اس میں برتن کا پانی یا اور کوئی ٹھنڈا غول بھرو یا جائے۔ اور کپڑے کی دھجی اس برتن سے لگا کر عضلات پر پھیٹ دی جائے۔ تاکہ عضلات تک آہستہ آہستہ ٹھنڈائی آتا ہے یا کسی ٹھنڈک پہنچائیو غول ٹھنڈا غول خاص وغیرہ میں کپڑے کی ہٹی ترک کے برابر راست متنبہ حصہ پر رکھی جائے۔ اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ برف کا پانی سیسہ کی ٹالیوں کے ذریعہ گزارا جائے۔ یہ ٹالیاں چونکہ نرم ہوتی ہیں۔ اس لئے وہ ہر قسم کے عضو پر پٹی جاسکتی ہیں۔

گرمی۔ خصوصاً اگر اس کے ساتھ مرطوبت بھی ہو۔ تو عارض التهاب کے علاج کے لئے نہایت مفید اور کثرت استعمال ہے۔ اس کا اثر سردی کے خلاف عروق و

۱۔ جو تک لگانا۔ پچھنے۔	۱۔ غول۔ لوشن۔
۲۔ پچھنے لگانا۔ اسکیری فی کے شن	۲۔ غول رصاص۔ پیڈ لوشن۔
۳۔ سنگھی لگانا۔ پکٹنگ۔	۳۔ سیسہ کی ٹالیاں۔ لیٹرس ٹیوب۔
۴۔ شرائین صغیرہ۔ آرٹری اورز۔	

النجہ کو فوہیدہ کرنا ہے۔ جس سے تناؤ اور درد کم ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کا خاصہ بھی مفید ہے کہ چونکہ اس کے اثر سے عروق میں خون زیادہ پہنچتا ہے۔ اور عروق باذہر کا فعل راخذاب (تیز ہو جاتا ہے) اس لئے عضو مہذب کی قوت حیات بڑھ جاتی ہے۔ التهاب تحت الجلد کے علاج کے لئے ربڑ کی تھیلیوں میں گرم پانی بھر کر سینکنا۔ یا گرم پانی میں اینوں۔ یا لٹاس ملا کر یا خالص پانی سے سینکنا (کمپیٹسٹ) یا گرم پانی سے لندہ تر کر کے پچوڑ سننے کے بعد گرم کرنا۔ یا گرم پتھر کا لگانا یا سادہ رومی کو گرم کر کے سینکنا مفید و کارآمد ہے۔

خشک حرارت پہنچانے کے دوسرے طریقے ایک مستقل باب میں بتائے گئے ہیں۔ مگر وہ زیادہ تر التهاب کے مریض اقسام میں قابل استعمال ہیں۔

۲۔ التهاب جراثیمی کا مقامی علاج

جراثیمی التهاب کا مقامی علاج غیر جراثیمی کے اصول علاج سے کسی قدر مختلف ہے کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جراثیم ہلاک کیے جائیں۔ اور ان کے مواد سمیہ (سمین) خارج کر دیے جائیں۔ اور ساتھ ہی حتی الامکان ساختوں میں فتور و نقصان واقع نہ ہو۔ اس میں خاص دقت یہ پیش آتی ہے کہ مہذب حصہ کی رگوں اور عروق باذہر میں بوجہ وقوف در کو کے ابھنے خون کا دوران نہیں ہوتا۔ علاوہ انہیں جراثیم کے بنائے ہوئے مواد (سمین) موقوفہ پارک (النجہ) پر مضر اثر کرتے ہیں

۱۔ عروق باذہر۔ لیفٹک دسل	۱۔ بونہ پرنس
۲۔ تحت الجلد سب کیوٹے نہیں	۲۔ مرن۔ کراک
۳۔ لٹاس۔ بناؤنا۔	۳۔ سین۔ ڈاکسین۔
۴۔ تمکید۔ فومن۔ ٹے۔ شن۔	۴۔ رکود { اے ٹس
۵۔ لندہ۔ اسپنجو یا فین	۵۔ وقوف {

اور خون میں بھی جذب ہو کر اس کی ترکیب کو خراب کر دیتے ہیں۔ یہ امر مشتبہ ہے کہ دافع تقفن ادویہ جن کے اثر سے ماؤف ساختیں پُدرے طور پر ہلاک نہیں ہوتیں۔ ان جراثیم پر کوئی اثر رکھتی ہیں یا نہیں۔ جو کہ دماں اپنی جڑ جا لیتے ہیں۔ اگر ان ادویہ کے ضعیف سیال استعمال کیے جائیں۔ تو یہ جراثیم پر کوئی اثر نہیں کر سکتے۔ اور اگر زیادہ قوی لگائے جائیں تو خطرہ ہوتا ہے کہ ان کے اثر سے ماؤف ساختیں جو جراثیم سے پہلے متاثر ہو چکی ہیں۔ اور زیادہ خراب ہو جائیں۔ اور اس کے بعد عمل التھام میں مزاحمت واقع ہو۔ لہذا جراثیمی التهاب کے مقابلہ کے لئے ہمارے پاس مندرجہ ذیل وسائل ہو سکتے ہیں۔

(۱) خون کی دافع شہین اور دافع جراثیم طبعی خاصیتیں جو پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ ان کو خارجی وسائل مثلاً مصل دافع سین۔ تلیجات جراثیمی اور مناسب ادویہ و اغذیہ سے بڑھایا جائے (۲) بیرونی استعمال کی چیزیں اور دیگر وسائل اختیار کیے جائیں جن کے اثر سے خون کا انجماد اور ترشحات دور ہو جائیں اور تڑازہ خون ماؤف حصہ میں دوڑنے لگے۔ تاکہ التھام میں مدو لے۔ ان نتائج کے لئے حسب ذیل تدابیر اختیار کی جائیں۔

۱۔ حتی الامکان سبب کو دور کیا جائے۔ مثلاً اگر کوئی خارجی شے جس سے اکثر تقفن واقع ہوتا ہے۔ اور کوئی ٹانگہ جو ناصور کی گہرائی میں چھپا ہو۔ تو ان کو نکال دینا چاہئے۔ بعض حالات میں التهاب کے مقامی مراکز کو تمام و کمال قطع کر کے خارج کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً جب بندوق کی گولی سے جسم میں کوئی نالی پیدا ہو جاتی

۴۔ دافع جراثیم۔ بیکٹیری ساؤا۔

۵۔ مصل۔ سیرم۔

۶۔ تلیجات۔ دیکسینر۔

۷۔ ترشحات۔ اگزوٹوکسین۔

۸۔ دافع تقفن۔ اینٹی سپٹیم۔

۹۔ سیال۔ سولیریشن۔

۱۰۔ دافع سین۔ اینٹی ٹاکسین۔

ہے۔ اور وہ متعفن ہو جاتی ہے یا بشرۂ خبیثہ موجود ہو تو ان کو کاٹ کر خارج کر دینا چاہئے۔ اور گاہے اُن مراکز کو اگرچہ پورے طور پر قطع نہیں کیا جاتا ہے مگر سڑے ہوئے اور مواد سے بھرے ہوئے مقام کے بیشتر حصہ کو کاٹ کر اور کھرج کر صاف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے جمرہ یعنی شب چراغ میں۔ مگر یہ ترکیب اُسی وقت مفید ہو سکتی ہے جبکہ مدوی محدود اور مقامی ہو۔

۲۔ جہاں تک ممکن ہو مہذب حصہ کو آرام و سکون میں رکھا جائے۔ تاکہ نہ صرف اس سے جسمانی و اخلاقی آرام حاصل ہو۔ بلکہ اس لئے بھی کہ نقل و حرکت کی وجہ سے سمیت نہ پھیل جائے۔ اس غرض سے مریض کو بستر پر رکھا جائے۔ یا عضو اوٹ کو تختیوں میں باندھ کر یا حامل سے لٹکا کر اس کی حرکت بند کر دی جائے۔ مگر اس میں یہ احتیاط رکھنی چاہئے کہ زیادہ دیر تک غیر متحرک رکھنے سے اس کے ذاتی افعال تغذیہ وغیرہ میں کوئی بُرا اثر نہ پیدا ہو۔

۳۔ اور وہ اور عروق جاذبہ جن میں دورانِ شست پڑ گیا ہے اُن کو خالی کرنے کی غرض سے عضو کو اونچا رکھا جائے۔ اور سینک پہونچائی جائے۔ تاکہ وہاں کی ساختیں نرم اور ڈھیلی پڑ جائیں۔ اسی مقصد کے لئے ضرورت ہو تو کچھ خون بھی خارج کیا جائے۔ معمولی حالتوں میں پچھنوں سے بہت فائدہ پہونچتا ہے۔ لیکن جب حالت رکود واقع ہو کر تناؤ بہت بڑھ گیا ہو تو گہرے نشتر لگا کر خون خارج کر دیا جائے۔ جس کے ساتھ جراثیم اور مواد سمیہ بھی خارج ہو جائیں گے۔

۱۔ بشرۂ خبیثہ۔ ملکنیٹ پیچید

۲۔ حامل۔ سنگ

۳۔ جمرہ { شب چراغ } کا زہل

۴۔ اور وہ۔ وینز

۵۔ رکود۔ اسٹنس

۶۔ تنخی { اسپلٹ } جمرہ

نہ۔ رطوبات کا اجتماع کم کیا جائے تاکہ جراثیم کا اثر ساختوں سے کم ہو جائے
 اس غرض کے لئے حسب ذیل وسائل اختیار کیے جاسکتے ہیں (الافت) جب
 ساخت کی فضاؤں میں رطوبات کا اجتماع ہو جائے (ان فضاؤں کو اصطلاحاً مَضِیئۃ
 مَضِیئۃ کہتے ہیں) یا جو مدار پھوڑا بیگیا ہو۔ جس میں بیرونی اجسام اور مردہ ساختوں کا
 ہونا ممکن ہے۔ تو آزادی کے ساتھ کھلا شگاف دیا جائے۔ اور اس کے بعد
 اخراج رطوبت کے لئے کپڑے کی بقی یا برکی تیلیاں زخم میں رکھ دی جائیں۔
 (ج) جب رطوبات جمع ہو کر ساختوں کے اندر مقید ہو جائیں۔ اور اُن کے باؤ
 سے عروق کے اندر تازہ خون کی آمد و رفت بند ہو جائے۔ اور عروق سے مائیت
 کا ترشح بند ہو جائے۔ اور سفید دانوں کا ٹکنا رک جائے تو کوشش یہ ہونی چاہئے
 کہ ساختوں سے رطوبات خارج کی جائیں۔ اور مائیت کے بہاؤ میں مدد دی جائے
 یہ مقصد ایسی ادویہ کے مقامی و متواتر استعمال سے حاصل ہو سکتا ہے جو عصاب
 محرک عروق میں تحریک پیدا کریں۔ جس کے لئے بہترین شئی سائل نلکین (ہ فیصدی)
 ہے۔ جس کے بنانے اور استعمال کرنے کا طریقہ آگے بیان کیا جائے گا (ج)
 الہتاب کے آخر میں جبکہ پیپ خوب جاری ہو۔ تو اس کو صاف کرنے کے لئے
 زرد شئی ریچکاری یا حمامات جلد جلد استعمال کیے جائیں۔ تاکہ سفید دانوں کے
 ٹوٹنے سے جو ایک قسم کا خیر پیدا ہو جاتا ہے (جسکو فرکین کہا جاتا ہے) اور جو
 اعضا میں بیج اور ساختوں کے گھانے کا اثر رکھتے ہیں۔ وہ دھل کر مٹانے ہو جائیں
 اس مقصد کے لئے معمولی سائل نلکین مفید شئی ہے۔ جس میں ایک سے چار فیصدی

مسح حمامات۔ یا تھڑ
 مسح فرکین۔ ٹپ سین۔
 مسح فضیئۃ میتہ۔ ڈیڈ سچیمینز

مسح اعصاب محرک عروق۔ ویو موثر روز
 مسح سائل نلکین۔ سائل سربویشن۔
 مسح زردوق۔ ارری گیش

میک جسٹ کبریت آگین بھی ملایا جاسکتا ہے۔ جو سفید دانوں کے اخراج کو بڑھاتا اور اینت خون کے ترشح کو روکتا ہے۔

۵۔ حرارت و غزنت کے استعال سے اس حصہ میں اچھے خون کی آمد کو بڑھاتا جائے۔ چنانچہ اگر جلد سالم ہو تو لخت لگائے جائیں۔ اور اگر زخم ہو تو مائع بنی کے تمکیدات استعمال کیے جائیں۔ یا۔ وہ ذرائع استعال کئے جائیں جن سے مصنوعی طور پر آب تمام خون ہو جاتا ہے۔

الکسانی یا مصنوعی احتقان دموی۔ سلسلہ علاج میں اس وجہ سے شامل کیا گیا ہے کہ خون اور سفید دانوں کا مقام التهاب میں موجود ہونا بشرطیکہ مناسب طور پر اسکو محدود رکھا جائے بہر صورت مفید ہے۔ لیکن التهاب حاد میں چونکہ عام طور پر خون پہلے ہی سے زائد ہوتا ہے۔ اس لئے وہاں مصنوعی طور پر خون کا زیادہ کرنا مضر ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے پھر اچھے خون کے پہونچنے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ مصنوعی احتقان کے علاج میں پہلے قدرتی اور مضرت رساں احتقان کو زائل کیا جاتا ہے۔ اور اس غرض سے عضو کو اونچا رکھا جاتا ہے اور پھر اس کے عوض مصنوعی احتقان دموی پیدا کیا جاتا ہے۔ اور اسکو اپنے قبضہ میں محدود رکھا جاتا ہے۔ جس سے مہذب سے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اچھے خون سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ اس میں تریاتی اجسام موجود ہوتے ہیں۔ اس لئے جراثیم کے ہلاک کرنے میں یہ مدد دیتا ہے۔ اور صحت کو قریب لے آتا ہے۔

۱۔ الکسانی احتقان۔ آئنی فیشیل ٹائی پریا۔

۲۔ مصنوعی احتقان۔ انڈیرسٹڈائی پریا۔

۳۔ اجسام تریاقیہ۔ اینٹی باڈیز۔


۱۔ جت کبریت آگین۔ زنگ سلفیٹ

۲۔ لخت۔ پولش۔

۳۔ مائع پورقی۔ بورک ایسڈ۔

۴۔ تمکید۔ فوسلے شن

(۱۰) کرۂ مصاصہ (کلیپ)



یہ چھوٹے چھوٹے سطحی کمزرات یعنی دماییل یا شب چراغ وغیرہ کے لیے مناسب ہے

مصنوعی اختقان کی دو قسمیں ہیں۔ ذاتی اور قہری اختقان ذاتی میں خون کا بہاؤ اس حصہ کی طرف عروق کو پھیلا کر تیز کر دیا جاتا ہے اور یہ تیزی پہلے شریانوں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ مقصد استعمال حرارت سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ خواہ ٹکیدات عارہ استعمال کیے جائیں۔ یا عضو کو گرم پانی میں رکھا جائے۔ یا گرم ہوا کے مختلف طرق استعمال میں سے کوئی ایک طریقہ برتا جائے۔

اختقان قہری۔ جس کا آغاز وریدوں سے ہوتا ہے، اس طرح حاصل کیا جاتا ہے کہ حصہ متہب کے اوپر ریغینے اس کے اور قلب کے درمیان ایک پٹی کیچر باندھ دی جاتی ہے تاکہ وریدی خون کا اجتماع مقام التهاب میں پیدا ہو جائے (یہی مقصد حاصل کرنے کے لئے ایک مخصوص آلہ کا استعمال ہی کیا جاتا ہے جسکو کرہ معاصہ کلیپ کہتے ہیں۔ وریدی خون کو روکنے کے لئے اکثر ربر کی چکدار پٹی باندھ دی جاتی ہے، اس قسم کی پٹی مارش کی بنائی ہوتی بہت مناسب ہوتی ہے۔ اسکو بخوبی کیچر اس طرح باندھ دیا جائے کہ جس سے وریدی خون توڑک جائے مگر شریانوں میں رکاوٹ نہ ہو اور انکا دوران خون بہ طور جاری رہے۔ اگر یہ پٹی صحیح طریقہ سے باندھ دی گئی ہے تو عضواؤں سرخ و نیلگوں ہو کر اس میں سوجن اور اوڈیٹیا نمودار ہو جائے گا مگر درد پیدا نہ ہوگا۔ لیکن اگر پٹی ضرورت سے زیادہ تنگ بندہ گئی ہے اور اس سے شریانوں دوران خون میں مزاحمت ہو گئی ہے تو مریض کو درد بہ شدت محسوس ہوگا اور عضو ٹنڈا پڑ جائے گا جب پٹی ٹھیک ٹھیک بندہ جائے اور مناسب اور صحیح درجہ کا تناؤ حاصل ہو جائے تو عضو کو آرام محسوس ہوگا اسی حالت میں اسے اسی طرح پٹی سے بندھا ہوا سسل

کرہ معاصہ کلیپ کیپس کشن بال

اختقان ذاتی۔ ایکٹوائی پریما

کرہ اوڈیا۔ ایڈیڈ

اختقان قہری۔ پے سوائی پریما

بیس گھنٹے یا اس سے بھی زائد عرصہ تک اسی وضع میں رکھنا چاہئے۔ ہر روز پٹی کو دو تین گھنٹے کے لئے کھول دینا چاہئے تاکہ اندر میں تخفیف ہو جائے اور جرح شدہ خون رگوں کو ہمیشہ حالت رکو میں ہوتا ہے (عضو سے خارج ہو جائے۔ اس طریقہ سے علاج جاری رکھنا چاہئے حتیٰ کہ التهاب کم ہو جائے اور پھر اس کے بعد پٹی کی بندش کا وقفہ روزانہ بتدریج کم کر دیا جائے۔

کرہ مضامہ کلیپ کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب زہریلی پٹی بندھنے کا موقع نہ ہو مثلاً جب پشت یا گردن میں خراج یا جھڑ ہو، یا پستان میں التهاب ہو۔ یا کسی انگلی میں عفونت پیدا ہو جائے۔ پہلے کالچ کا ایک پیالہ یا مناسب صورت کا گلاس (جس کے کنارے کو چربی یا روغن لگا کر یا پانی سے تر کر لیا جائے) مقام التهاب پر بخوبی چپا کر دیا جائے پھر اس کے اندر کی ہوا برلپ راس آئیں ایک گیند کی شکل کا ربر کا پھیلاؤ ہے جو ہوا کھینچ سکتا ہے (سے کھینچ کر خارج یا کم کر دی جاوے۔ ایسا کرنے سے فوراً خون کھینچ کر مٹھبہ ساختوں میں بہر آتا ہے اور پھر یہ ساختیں بھی پیالہ کے جوف کے اندر کھینچ آتی ہیں۔ اگر اس مٹھبہ حصہ میں پھوٹے یا جبرہ وغیرہ کے منہ کھلے ہوئے واقع ہیں۔ تو ان کے اندر سے مواد اور مواد ساخت کے ٹکڑے وغیرہ بھی خارج ہو کر پیالہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ پیالہ پانچ یا دس دقیقہ تک لگا رہنے دیا جاوے۔ یہ عمل دن میں دو تین مرتبہ کرنا چاہئے +

۶۔ اگر زخم کھلا ہو ہے تو مناسب طریقہ سے مرہم پٹی کی جائے۔ اور واضح تعفن کا استعمال رکھا جائے۔ تاکہ بیرونی جراثیم داخل نہ ہونے پائیں +

۱۔ رکو۔ اسے سس	۲۔ وسیقہ منٹ۔
۳۔ خراج۔ ابس۔	۴۔ دافع تعفن۔ اینٹی سپٹامک۔
۵۔ جبرہ۔ کارنیل۔	

۳۔ التهاب کا علاج کلی

التهاب کا علاج کلی مریض کی حالت اور مرض کی شدت کے لحاظ سے مختلف

ہوتا ہے +

اگر مریض قوی اور توانا ہے۔ اس کے خون کا دباؤ زیادہ ہو اور نبض عظیم اور متلی ہو اور ساتھ ہی التهاب کی مقامی علامتیں، درد وغیرہ نمایاں ہوں تو ایسے حالات میں مناسب ہے کہ شریانی تناہک کم کرنے کی غرض سے ایسی ادویہ استعمال کی جائیں جیسے مرکبات کلیہ پچھانگ (خافق الذئب۔ عرق الذہب نوشتا دیغل آگین، کلکاش وغیرہ اور ایسے ذرائع بھی اختیار کیے جائیں جن سے جلد بدن۔ گردوں اور امعاء کے افعال میں تحریک ہو جائے تاکہ سمین اور دیگر ہیجات بدن سے خارج ہو جائیں اور خون صاف ہو جائے۔ چند حالتوں میں مثلاً جب فلتا یا یہ یا سرسام عشتائی موجود ہو، ابتدائی درجوں ہی میں فصد گھونٹنے کی ضرورت پیش آتی ہے مگر صرف ایسا قوی اور دوسری مزاج کے جوانوں میں ہی کرنا چاہئے اور ان میں بھی اسی درجہ تک کہ اس سے قوی میں زیادہ کمزوری نہ ہونے پائے۔ ازالہ بعد ایسی سادہ اور زود مضمر غذا کافی مقدار میں دینا چاہئے جس کی نوعیت و مناسبت کا اندازہ مریض کے بخار کی شدت یا قلت سے یا اس کے آلات انہضام کی حالت سے کیا جاسکتا ہے۔ فصد کی حالت زبان کے معائنہ سے معلوم ہو سکتی ہے +

۱۔ نبض عظیم۔ لارج پلس۔	۲۔ کلکاش۔ کال چی کم۔
۳۔ نبض متلی۔ ٹل پلس۔	۴۔ ذات الریہ۔ نمونیا۔
۵۔ کلیہ۔ اینٹی سنی۔	۶۔ سرسام عشتائی۔ سے نن جانی ش۔
۷۔ پچھانگ۔ خافق الذئب۔ اکوٹائٹ۔	۸۔ فصد۔ دینی سکشن۔
۹۔ عرق الذہب۔ اپی کاکرائٹا۔	۱۰۔ دوسری مزاج۔ نل ہڈو۔
۱۱۔ نوشتا دیغل آگین۔ ایسی شیت آٹا یونیا	

لیکن جب مریض ضعیف و کم طاقت ہو، اور خصوصاً جب اس کی طاقت مسلسل بخار اور تسنن الدم کے باعث بتدریج زائل ہو چکی ہو تو علاج کلی بالخصوص یہی ہے کہ غذا کافی پہنچائی جائے اور تیمارداری بنیاد پر احتیاط و خبرداری کے ساتھ کی جائے ایسی صورت میں مریض کی حالت کی درستی کا دار و مدار طبیب اور تیمار دار ہر دو کی ہوشیاری و متعدی پر یکساں طور سے رہتا ہے۔ بحر ہفتہ کے استعمال کی ضرورت ایسے مریضوں میں ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں امعاء اور گردوں کے امخال کو صبح و منقبض رکھنا چاہئے اگرچہ ایسا کرنے میں مریض کی طاقت کو کم نہ ہونے دیا جائے +

خیال کیا جاتا ہے کہ معتدل درجہ کی حرارت (ضعیف بخار) متعدی امراض میں بجائے مضر ہونے کے ایک طور سے مفید ہوتی ہے کیونکہ اس کے اثر سے اجسام تریاقیہ کے بننے میں تحریک ہوتی ہے۔ مگر شدید حرارت مضر ہوتی ہے کیونکہ اس کے اثر سے ساختوں میں اشتراک پیدا ہو جاتا ہے اور تریاقی اجسام کی پیدائش بند ہو جاتی ہے۔ لہذا منقبض حرارت ادویہ کا استعمال اس وقت تک نہیں کرنا چاہئے جب تک کہ حرارت شدید نہ ہو اور جب یہ ضرورت پیش آئے تو ایسی دواؤں پر استناد رکھنا چاہئے جیسی کہ کثیف اسپیرین، نفین، یا نیم گرم پانی سے اسنج کو ترک کر کے بدن کو پونہ چاہئے کہ حرارت یکم ہو جائے +

۱۔ اشتراک۔ پیرلے سس۔

۲۔ منقبض حرارت۔ اینٹی پائٹے ٹکس۔

۳۔ کثیف۔ کثیف۔ کورن۔

۴۔ اسپیرین۔ نفین۔

۱۔ تسنن الدم۔ ٹاکسی میا۔

۲۔ تیمارداری، تمریض ندرنگ

۳۔ محرکات۔ ہسٹی مولٹ

۴۔ اجسام تریاقیہ۔ اینٹی باڈیز۔

التهاب مزمن

اسباب۔ یہ التهاب حاد کے اسباب سے مشابہ ہیں مگر ان کا عمل زیادہ خفیف اور دیرپا ہوتا ہے۔ مریض کے مخصوص مزاج، متاد و بنیہ اور استعداد بنی کا اثر بھی حدوث التهاب پر نہایت نمایاں داہم ہوتا ہے +

جراحات میں جن التهابات مزمنہ کے دیکھنے کا زیادہ تر اتفاق ہوتا ہے وہ بیشتر آتشک و زرن شرمادہ سلیہ انقرس، یا وجع المفاصل میں سے کسی ایک عارضہ کے باعث پیدا شدہ ہوتا ہے، لہذا طبیب کو لازم ہے کہ التهاب مزمن کے علاج کے وقت پہلے ان امراض یا اس کے خفیف اثر کی موجودگی یا غیر موجودگی کے متعلق تحقیق و طمینان کر لے +

ظواہر۔ التهاب مزمن کے ظواہر و کیفیات اصولاً التهاب حاد سے مشابہ ہیں، اگرچہ علامات قدرے مختلف ہوتی ہیں +

(۱) احتقان دموی۔ کم درجہ کا مگر دیرپا ہوتا ہے کیونکہ التهاب پیدا کر نیوالا، مہج عموماً کم تیز ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مقامی علامات و عوارض چنناں نمایاں نہیں ہوتے، درواز مہج مرض اور کم شدت کا اور ایک مہج کا بھاری پن معلوم ہوتا ہے، حصہ مافوق نسبتاً کم گرم ہوتا ہے۔ سرخی شوم رنگ کی نہیں بلکہ سیاہی مائل ہوتی ہے، اور اکثر عضواؤں کے انجم میں وجہ پڑ جاتے ہیں۔ عروق

ملا نفرس۔ گاؤٹ۔

ملا وجع مفاصل۔ روماتزم

ملا ظواہر۔ فاسے نا۔

ملا احتقان دموی۔ انٹی پیری

ملا مہج مرض۔ ایکنگ پن۔

ملا التهاب مزمن۔ کرائک انفلامیشن۔

ملا متاد و بنیہ۔ ڈیاسے بس۔

ملا استعداد بنی۔ کنٹریٹوشنل ہیڈ پوزیشن

ملا آتشک۔ سفس۔

ملا وزن۔ ڈوبرکل۔

اور خصوصاً اور ہڈی کی قوت انقباض میں بہت کمی آجاتی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت دیر تک پھیلی ہوئی رہی ہیں، لہذا ان کو درجہ اعتدال پر لانا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔

(۲) خون کے دانے ایک دوسرے کے ساتھ اوس قدر چپاں نہیں ہوتے جیسے کہ التهاب حاد میں ہوتے ہیں اور چپک کر ویسی ٹکیوں کے ڈھیر نہیں بناتے خون کے دانوں کا انتقال مقام یا ہرپٹ دینے اور نکاح و ق سے خارج ہو کر ساختوں میں مترشح ہو جانا، اگرچہ ہوتا ہے مگر نہایت ہی محدود درجہ کا ہوتا ہے ترشحات و رطوبات زیادہ رقیق مہم کے ہوتے ہیں۔ اور ان کی ترکیبیں بسین یا مادہ بیضیہ نسبتاً کم ہوتے ہیں۔ اغشیہ نائیک کے بعض التهابات مزمن میں توازن کے کیے ایسی تین رطوبت سے پُر ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ثقل نوعی مصل دم کے ثقل سے بھی کم ہوتا ہے۔

(۳) حاد اور مزمن التهاب کے درمیان سبب زیادہ نمایاں اور اہم فرق اوس تفاعل کی صورت میں نمودار ہوتا ہے جو ساختہ کے ماؤف کی طرف سے التهاب کے جواب میں ظاہر ہوتے ہیں۔ التهاب حاد میں ساختوں کے اندر خلیات کی افزائش عموماً چنداں نمایاں نہیں پائی جاتی، کیونکہ اوس میں سمین اس قدر شدید ہوتے ہیں کہ انہج کی قوت حیات اوسے اکثر نازل ہو جاتی ہے بخلاف ازیں التهابات مزمن میں ایسا نہیں ہوتا، یا کم از کم اگر ہوتا ہے تو مرض کے انتہائی درجوں میں ہی ہو سکتا ہے، جیسے کہ آتشک اور تدرن میں۔

۱۔ ثقل نوعی کم ہے سے فک گرے دیٹی
۲۔ وزن مخصوص کم

۳۔ مصل دم۔ بلڈ سیرم

۴۔ تفاعل۔ ری ایکشن۔

۵۔ تدرن۔ ٹیوبریکل

۱۔ انقباض۔ کنٹریکشن
۲۔ ہرپ۔ ڈیاپے ڈی بس

۳۔ لیٹین۔ فائبرین۔

۴۔ مادہ بیضیہ۔ ایومن۔

۵۔ اغشیہ نائیک۔ سیرس مہرین۔

جب کسی مقام پر التهاب مزمن موجود ہوگا تو رقبہ ناف میں گول دانوں کا ترشح و اجتماع مختلف ذرائع سے پیدا ہو جائے گا۔

(الف) بعض ساختوں میں رادوں کی مخصوص ساخت کی وجہ سے دانوں کی پیدائش و افزائش بہت نمایاں ہوتی ہے، خصوصاً ان خلیاتِ مبطنہ میں جو عروق اور مائیت کے خانوں میں استرکتی ہیں، یا پستان کی جوہری ساخت کے دودھ پیدا کرنے والے دانوں میں بخلاف ان میں بعض اعضا میں دانوں کی یہ افزائش و پیدائش بالکل ہی نہیں ہوتی، جیسے کہ مرکزی نظام اعصاب میں۔

(ب) اگر بیشتر حالات میں یہ گول دانے خلیاتِ مائیت ہوتے ہیں اور چھوٹے عروق کے آس پاس کثیر تعداد میں مجتمع پائے جاتے ہیں۔ مزمن مسموم کی رشتہ میں جن کی ترکیب انڈارجمیہ سے ہوتی ہے (سلعہ اریک) اس مسموم کے خلیاتِ مائیت کی پیدائش نمایاں طور سے ہائی جاتی ہے اور ان خلیات سے بنے ہوئے وسیع رستے ملتے ہیں۔

(ج) ایک اور قسم کے دانے جو اس قسم کے التهابات میں عموماً پائے جاتے ہیں اور حال ہی میں جن کے متعلق گہری دلچسپی کا اظہار ہوا ہے خلیہ سائل کے نام سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ یہ دانے بمقابلہ خلیاتِ مائیت کے بہت بڑے ہوتے ہیں اور ان کی شکل بیضوی ہوتی ہے، ان کے ذات اُستے ہی بڑے ہوتے ہیں جتنے کہ خلیاتِ مائیت میں یہ عموماً پانچ چھ حصوں میں

۱۔ رادوں کے گول دانے۔ رادوٹیل۔	۱۔ رادوں کے گول دانے۔ رادوٹیل۔
۲۔ خلیاتِ مبطنہ۔ انڈوٹیلیس سبیلز۔	۲۔ خلیاتِ مبطنہ۔ انڈوٹیلیس سبیلز۔
۳۔ مائیت۔ لیمف۔	۳۔ مائیت۔ لیمف۔
۴۔ مرکزی نظام عصبی۔ سنڈل ٹروس سسٹم۔	۴۔ مرکزی نظام عصبی۔ سنڈل ٹروس سسٹم۔
۵۔ خلیاتِ مائیت۔ لیمفوسائٹس۔	۵۔ خلیاتِ مائیت۔ لیمفوسائٹس۔
۶۔ رادوں کے گول دانے۔ رادوٹیل۔	۶۔ رادوں کے گول دانے۔ رادوٹیل۔
۷۔ سلعہ اریک۔ رادوں کے گول دانے۔ رادوٹیل۔	۷۔ سلعہ اریک۔ رادوں کے گول دانے۔ رادوٹیل۔
۸۔ سلعہ اریک۔ رادوں کے گول دانے۔ رادوٹیل۔	۸۔ سلعہ اریک۔ رادوں کے گول دانے۔ رادوٹیل۔
۹۔ خلیاتِ سائل۔ پلانڈامیل۔	۹۔ خلیاتِ سائل۔ پلانڈامیل۔

منقسم ہوتے ہیں اور دانے کے عین مرکز میں نہیں ہوتے بلکہ خارج مرکز ہوتے ہیں۔ (ان کا مادہ حیات مخصوص رنگوں سے متاثر ہونے کی خصوصیت رکھتا ہے گا ہے اس قسم کے دانے التهاب مزمن میں اس کثرت سے پائے جاتے ہیں کہ وسیع رقبوں میں انکے سوا دوسرے کوئی قسم کے دانے شاید دوسری کھائی دیتے ہیں، مگر عموماً انکے ساتھ خلیات مانیہ بھی ملے جلتے پائے جاتے ہیں +

الغرض یہ نئے بنے ہوئے دانے، خواہ ان کا ماحذ کچھ بھی ہو، بالآخر بدل ہو کر نئے یعنی انسجہ بناتے ہیں، مگر گا ہے ان سے طبعی ساخت ہی بن جاتی ہے پس التهاب مزمن کی ایک نمایاں خصوصیت نئی ساخت بنانا ہے +

نتائج۔ جو حقیقتہً نمودار ہوتے ہیں وہ عضو اذیت کی طبعی ساخت اور مریض کے مزاج و استعداد مرض کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ التهاب بیسط مزمن میں، جو آتشک یا تدرن کے باعث نہ ہو، عضواً ذیت میں ترشحات و رطوبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اگر یہی صورت حال جاری رہتی ہے تو یعنی ساختیں بکر نیجہ ٹیسٹ (نئے ریشوں کا بچانا) یا تجر و صلا (سخت ہو جانا) ہوتا ہے۔ مثلاً ہڈی کے التهاب مزمن میں ہڈی موٹی اور ٹھوس ہو جاتی ہے رتجہ العظم اور ہڈی کے اوپر کی جھلی رتجہ عظم میں جبکہ التهاب مزمن واقع ہوتا ہے تو اس جھلی کے نیچے نئی ہڈی بن جاتی ہے التهاب غدد میں گلیٹوں کے بیج الحافی میں ازویا و خلقت واقع ہو جانے سے وہ بڑی ہو جاتی

مثلاً صلابت۔ تجریم اسکے روس
مثلاً سخت ہو جانا اسکے روس
مثلاً تجر العظم۔ آسٹیا اسکے روس
مثلاً غلاف عظم۔ پری آسٹیم
مثلاً ازویا و خلقت۔ باقی پر ہا گیا۔

مثلاً خارج مرکز۔ اکس سنٹر بیکل
مثلاً یعنی انسجہ۔ فائبرس ٹشو۔
مثلاً التهاب بیسط سہل انفلامیشن
مثلاً تدرن۔ ڈبرکل۔
مثلاً یعنی ساخت بچانا۔ فائبرس

ہیں اور ان میں سختی اور صلابت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر جلد میں التهاب مزمن ہو جائے تو وہ موٹی ہو جاتی ہے یا اوس کی طبعی ساخت یکسر منحرف ہو جاتی ہے اور وہ تھخ کے بعد یا بغیر تھخ کے از رار لحمیہ میں متغیر ہو کر یعنی مذہبی ساخت اختیار کر لیتا ہے۔ حقیقی تھخ شافری پیدا ہوتا ہے اگرچہ بعض اجساد و قبیحہ جن کی حدت سمیٹہ ادنیٰ اور جہ کی ہوتی ہے کبھی پیپ بھی پیدا کر دیتے ہیں +

علاماتِ ہڈیٹہ۔ یہ باستثنائے اُن علامات کے بہت کم ظاہر ہوتی ہیں جن کا انحصار مریض کے مزاج یا اوس کی استعداد و مرض پر ہے جس کے ہٹ التهاب مزمن کی مقامی کیفیت نمودار ہو گئی ہے یا جو تغیرات عفونیہ کے باعث ثانوی طور پر پیدا ہو گئی ہوں +

علاج۔ التهاب مزمن کا علاج بمقابلہ التهاب حاد کے زیادہ دیر طلب اور مشکل ہے، اور اس کا باعث یہ ہے کہ عموماً یہ اخلاط و مزاج کی خرابیوں سے پیدا ہوتا ہے جو اس پر وہ اس کی بنیاد ہوتی ہیں +

۱۔ سبب التهاب کو حتی الامکان دور کرنا ضروری ہے۔ ماؤف یا مردار ہڈی کو خارج کر دینا چاہئے اور مادہ سلیہ کو نشتر یا وارنٹھ کے ذریعہ کاٹ کر نکال دینا چاہئے جس کے بعد مقام ماؤف پر سیال حامض نظرائی کی پھر پری لگا دینا اکثر مفید ہوتا ہے۔ خراج مزمن کی موجودگی مقامی تباؤ کو بڑا کر اوس ابتدائی ہیچ کے مضر اثر کو اور بھی بڑا دیتی ہے جو دراصل التهاب کا محرک ہو ہے لہذا ایسے

۱۔ از رار لحمیہ۔ گرمیہ زور نشو۔	۲۔ ثانوی۔ سکندری
۳۔ یعنی مذہبی ساخت۔ فائبرو سکیٹیریشل نشو	۴۔ دہار وارنٹھ۔ شارپ اسپون۔
۵۔ اجساد و قبیحہ۔ مائی کرو آرگے نرم	۶۔ حامض نظرائی۔ کار بولک ایسڈ۔
۷۔ حدت سمیٹہ۔ ویرولس۔	۸۔ خراج مزمن۔ کرائمک لیس۔
۹۔ علاماتِ ہڈیٹہ۔ کانٹری ٹیوشنل سپٹس۔	

پھوڑے کا علاج جس قدر جلد ممکن ہو رشتہ وغیرہ لگا کر کرنا چاہئے۔

۲۔ عضو کو آرام و سکون دینا چاہئے۔ یہ التهاب مزمن میں بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح التهاب حاد میں۔ مفصل کو رکتی یا پٹی باندھ کر غیر متحرک کرنا چاہئے۔ ریڑھ کے ستون سے مخصوص آلات و تابیر کے ذریعہ یا مریش کو بستر پر لٹا کر ریڑھ سے وزن دور کرنا چاہئے۔ اغزازات پیدا کر نیوالے غد کا فضل شست کر دینا چاہئے۔ اور اعصاب سے حاس کو اتھج سے بچانا چاہئے۔

۳۔ امانہ ریا اتھج خارجی التهاب مزمن میں علاج کے بہترین اقسام میں سے ایک ہے۔ یہ مرض کی نوعیت اور عضو مائل کی خصوصیت کے لحاظ سے متعدد طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر تلبش صرف ہاتھ سے کی جائے یا فروقات محرک عضو متہب پر چھڑ کر تریج کی جائے تو اس سے جلد میں احتقان پیدا ہوتا ہے اور سطحی حصوں میں مقامی تحریک ہوتی ہے جس کے اثر سے حین باختر کو نمک کی طور پر فائدہ پہونچتا ہے۔ اسکاٹ کی پٹی بھی اسی غرض سے استعمال کی جاسکتی ہے۔ اس کی ترکیب استعمال یہ ہے کہ پہنے کپڑے کی پٹیوں پر مرہم سیاب مرکب درہم سیاب ۱۰ حصہ، موم ۲۴ حصہ، روغن زیتون ۲۴ حصہ، کا فور ۱۲ حصہ، لگا کر متہب حصہ کو اون سے ملفوف کر دیا جائے، پھر اس کے اوپر مشع صابن خالی یا نرم چمڑے دھرن کے چمڑے لگا کر لگا دیا جائے، بنفشین بھی چمڑی

۱۔ غد و مغزہ۔ سکرٹینگ گلیٹلز۔	۱۔ محرک۔ اسی سوٹ۔
۲۔ اعصاب سے حاس۔ آرگنز آف سنس	۲۔ احتقان۔ آبی پر سیا۔
۳۔ اتھج۔ اری ٹے شن۔	۳۔ مرہم سیاب مرکب۔ انگوٹھ۔ ہاتھ راجا ملی پوٹھ
۴۔ امانہ۔ کو نٹر اری ٹے شن۔	۴۔ مشع۔ پلاسٹر۔
۵۔ فروقات۔ امبرو کیشنز۔	۵۔ بنفشین۔ آبروٹین۔

سے لگائی جاتی ہے اور نہایت مفید ہوتی ہے۔ تنفیذ راہلہ پیدا کرنا مناسب حالات میں بہترین علاج ہے۔ چھالے ڈالنے کی ترکیب یہ ہے کہ مہتہب حصہ خلاصہ ذرا ریح کی پٹی چڑھا دی جائے، یا سائل لاصوق منقظ پھریری سے لگا دیا جائے۔ ^{۲۲}مقتضہ یہ وہ زخم ہے جو کہ شوره کا محلول الکولی جلد پر لگا کر اور جلا کر پیدا کیا جاتا ہے +

حتمہ زخم کا تازہ رکھنا پہلے کسی طریقے سے سطح پر تھچ پیدا کر لیا جائے پھر اسے کسی مقامی ریح کے اثر سے مثلاً چنے کا دانہ زخم پر باندھ کر اسے تازہ رکھنا جائے، یا کوئی ریح دوا مثلاً مرہم ابٹل کی پٹی لگائی جائے۔ خزانہ جلد کے نیچے ایک دانہ ڈالکر اس کے دونوں کناروں پر دو دو گرہ لگا دی جائیں اور پھر وژا دہاگر کو جلد کے نیچے کھینچا جائے۔ ان تمام تدبیروں کا آجکل استعمال تقریباً متروک ہے، تاہم گاہے ان سے فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے کی حقیقی راگ سے داغنا یہ ابالہ کا نہایت شدید مہتم کا طریقہ ہے اور ہڈیوں اور جوڑوں کے مزن التهاب میں بالخصوص مفید ہوتا ہے +

ابالہ کا طریق عمل پورا واضح نہیں ہے، لیکن قرین قیاس یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض حالات میں اس کا مفاد اس احتقان دوسے سے حاصل ہو جاتا ہے جو مقام باؤف میں اس کے اثر سے پیدا ہوتا ہے۔ بعض دیگر حالات میں ان کا اثر اعصاب کے ذریعہ ہونا خیال کیا جاتا ہے +

۱۔ تنفیذ۔ بلشرنگ۔	۲۔ محلول الکولی۔ اسپریٹس سولیشن
۳۔ خلاصہ ذرا ریح۔ اکثر ٹیکٹ کنٹریڈس	۴۔ حتمہ۔ اشیو۔
۵۔ سائل لاصوق منقظ۔ کوہواؤن بلشرنگ فرم	۶۔ ابٹل سینڈن
۷۔ مقتضہ۔ پاک۔	۸۔ خزانہ سینڈن۔
	۹۔ کی حقیقی۔ ایکچوئل کاوٹری۔

۴۔ خارجی دباؤ و ضغط (التهاب مزمن کے عوارض کا ایک نہایت اہم علاج ہے۔ اور اس کا طریق عمل غالباً یہ ہے کہ وہ التهاب کے اثر سے ڈھیلے اور پھیلے ہوئے عروق کی قوت انقباض میں تحریک پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ شکایتیں۔ نیز دباؤ کے اثر سے التهابی رطوبات و ترشحات کے انجذاب میں مدد مل جاتی ہے۔ دباؤ پہنچانے کا عام طریقہ یہ ہے کہ عضو موقوف پر پٹی کچھکر باندھ دی جائے یا اسے کسی نرم اور لچکدار چیز کا سہارا دیدیا جاوے جو بالخصوص مستعمل ہے۔

۵۔ اکتسابی یا مصنوعی احتقان۔ (بیشک علاج) یہی التهاب مزمن کے لئے مفید ہے اور اس کا بہترین فائدہ گم حلمات سے یا بکلی کے خارجی استعمال کے مختلف طریقوں سے (جسکا بیان علیحدہ آئے گا) یا بالمش اور ورزشی علاجوں سے حاصل کیا جاتا ہے +

۶۔ عمومی یا بدنی علاج۔ التهاب مزمن جن مخصوص یا نوعی مزاجوں اور خلطوں کے ساتھ وابستہ ہوا تو اسکا مناسب علاج کیا جائے، مثلاً آتشکی مزاجوں میں سیلاب اور شخارہ نفش آمیز کا استعمال کیا جائے +

۷۔ التهاب جراثیمی ہیں۔ مخصوص نوعی جراثیم کو علیحدہ کر کے تعلق طیار کر کے علاج مناسب طریقہ سے کیا جائے (جسکا بیان علم الجراثیم کے باب میں مذکور ہوا ہے)

۸۔ معمولی جراثیمات کے اعمال حسب ضرورت کیے جائیں کیونکہ یہ بھی ضروری ہیں +

نسخہ نسخہ نسخہ نسخہ نسخہ نسخہ نسخہ

۱۔ تعلق۔ دیکھیں۔

۲۔ ضغط۔ ہر شے

۳۔ شخارہ نفش آمیز۔ پشاش آریو ڈاٹ۔

بَابُ سُوْمِ عَدُوِّ صَدِيدِيهِ غَيْرِ نَوْعِيهِ اول

جراحاتِ عدوی

اس باب میں اس سلسلہ عوارض کا بیان کیا جانے گا جن میں پیپ بنی ہو یا جو پیپ بننے سے مشابہ ہیں اور جو دراصل غیر نوعی جراثیم کے باعث پیدا ہو جاتے ہیں یہ اجسام و جنکو علی العموم صمدیہ کہا جاتا ہے، ساختہائے مائتہ میں ایک قسم کا جواری عمل التهاب پیدا کر کے اولیٰ میں رطوبات و ترشحات بنا دیتے ہیں۔ لہذا رقیق شدہ مادہ کو پیپ (پچ) کہتے ہیں اور جن ظواہر و اعمال سے بالآخر پیپ پیدا ہو جاتی ہے ان کو تقیم کہتے ہیں۔ پیپ کے اس مقامی اُتکل کو جو ساختوں کے اندر ہو جائے پھوٹا (خراب) کہتے ہیں، اور یہ اپنی سرعت رفتار کے لحاظ سے حادثیّا مزمن ہو سکتا ہے، اگرچہ خراج مزمن کتر پایا جاتا ہے۔ گاہے عدوی کے اثر سے عضو مائتہ کا نیچ ٹکوی کم و بیش وسعت

۱۔ نان اپنے سے فک افش۔	۲۔ پایو بے نک۔
۳۔ غیر نوعی جراثیم نان اپنے سے فک نکر دار گے	۴۔ قح۔ بدہ۔ پن۔
۵۔ نرم (وہ کہلاتے ہیں جو مخصوص امراض میں خصوصیت کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ اور نوعی جراثیم وہ کہلاتے ہیں جو خاص خاص امراض میں پائے جاتے ہیں مثلاً انگ۔ کے جراثیم۔	۶۔ تقیم۔ سپورے شن۔
۷۔ آرگے نرم۔	۸۔ ابس۔
	۹۔ اکیٹ۔
	۱۰۔ کرائک۔
	۱۱۔ سیلیورٹش۔

کے ساتھ مہتب ہو جاتا ہے تو اس حالت کو التھاب خلوی اور فلتعونی کہتے ہیں +

ان نظام ہر مقامی کے ساتھ جو عام علامات برنیہ نمودار ہو جاتے ہیں وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں (الف) جب صرف مراد سین جذب ہو جائیں تو شیم دم یا اس سے مشابہ حالت پیدا ہو جاتی ہے یا رب (ب) جب خود جراثیم و ذرات خون میں داخل ہو کر دور و دراز کے مقامات میں پھیل جائیں تو اس سے تعفن دم یا تقيح دم پیدا ہو جاتا ہے +

ان مختلف حالات کا تفصیلی بیان فردا فردا پیش کیا جائے گا مگر پہلے اس پورے گدھا کے مشنوک جراثیم کا بیان ضروری ہے +

عدوی صدیدیہ غیر نوعیہ کے جراثیم
جراثیم صدیدیہ میں سے مندرجہ ذیل اہم ہیں

(۱) ابروشیات عنقودیہ صدیدیہ - خاذ اور معنی تقيح میں یہ جراثیم نہایت عام طور پر پائے جاتے ہیں، خصوصاً جلد اور تحت الجلد انجم کے تقيح میں + حجم میں یہ کرویدہ اوسط درجہ کا ہوتا ہے اور سپکے اندر انگوڑے غوغوں کی صورت میں اس کے جھنڈ پائے جاتے ہیں۔ طریقہ جزام سے یہ جراثیم رنگ قبول کر لیتے ہیں اور مادہ ہا سیر یا نمجہ متصل دم کو رقتیں کر دیتے ہیں کیونکہ ان میں

۱۔ سیلو لائی ٹس	۱۔ پائو جے ٹک بیکٹیریا
۲۔ فیک مونس	۲۔ اسٹیفٹوکوکس پائو جے ٹس۔
۳۔ مستم دم - ہاکی میا۔	۳۔ سب کیوٹے ٹس ٹسٹو۔
۴۔ تعفن دم - ہسپی سیبا۔	۴۔ ناگرام مے ٹسٹو۔
۵۔ تقيح دم - پانی میا۔	۵۔ جیلے ٹس۔
۶۔ نان آپے سے ٹک انکشن۔	۶۔ سلی ڈی فائڈ بلڈ سیرم۔

ایک ایسا تخمیر کیا دی پیدا کر دینے کی خاصیت ہے جو طوبت معدہ (مضین) کی طرح موادِ لحمہ کو تحلیل کر دینے کا خاصہ رکھتا ہے، یہ کرویات تقریباً ہر قسم کی زمینوں (مواد زرعیہ) میں آسانی سے کاشت کیے جاسکتے ہیں اور مضین کی بکثرت موجودگی میں بہترین افزائش پاتے ہیں۔

ٹھوس قسم کی زمین میں ان کی کاشت بہ سرعت بڑھتی ہے اور انکی توانائی خوب پہنچتی ہیں۔ یہاں تک کہ زمین کی سطح پر ان کی ایک دبیز تہ جم جاتی ہے جو رنگ میں نارنجی، ترنجبی (آترنجی) یا سپید ہوتی ہے۔ انھیں رنگوں کی نسبت سے ان اجسام کی تین قسمیں شناخت کی گئی ہیں، یعنی کثرتِ یاتِ عنقودیدہ صدیدیدہ نارنجیہ، کثرتِ یاتِ عنقودیدہ صدیدیدہ اتوجیہ، کثرتِ یاتِ عنقودیدہ صدیدیدہ بیضیہ۔ لیکن بعض حالات میں ایک قسم دوسری قسم میں تبدیل ہو جاتی ہے، بالخصوص اس میں شک نہیں کہ یہ تینوں ایک ہی نوع یا جنس سے تعلق رکھتے ہیں۔

کرویات عنقودیدہ صدریہ بہت عام وسعت رکھتے ہیں اور ہوا گرود خبار میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ جلد انسانی میں بھی پائے جاتے ہیں گویا اس مقام کے معمولی یا طبعی باشندے نہیں ہیں جلد اور تحت الجلد

۱۔ انزائم۔	۱۔ آرکائیو۔
۲۔ پپ سین	۲۔ پپ سین۔
۳۔ موادِ لحمہ { پروٹین	۳۔ کرویات عنقودیدہ صدریہ نارنجیہ۔
۴۔ میڈیا۔	۴۔ اسٹے فیو کوکس پاہرے سن آفریہ۔
۵۔ کلچر میڈیا	۵۔ کرویات عنقودیدہ صدریہ اتوجیہ۔
۶۔ آکسی جن	۶۔ اسٹے فیو کوکس پاہرے سن آفریہ میں
۷۔ کالونیز	۷۔ کرویات عنقودیدہ صدریہ بیضیہ۔
	۸۔ اسٹے فیو کوکس پاہرے سن آفریہ۔

ساختوں کے التهابات صدیدی (ورم متعج) بیشتر حالات میں انھیں کرویات عنقویہ کے باعث پیدا ہوتے ہیں اور جب کبھی ابتداء التهاب کسی دوسرے جراثیم کے اثر سے پیدا ہو جاتا ہے تب بھی کرویات عنقویہ کا ثانوی مدوی ضرور ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال تو ہائے متعدیہ اور چیچک (جدری) کے دانوں میں ملتی ہے۔ ان دونوں میں ابتداء مرض کا باعث کرویات عنقویہ ہیں مگر ثانوی طور سے کرویات عنقویہ صدیدیہ بھی حملہ آور ہو کر آمو جو دہوتے ہیں +

جلد بدن کے جن عوارض کا باعث کرویات عنقویہ ہیں، ان میں سے متاثرہ ہیں نہ پھوٹے (خرافات) و ذل۔ جمرہ۔ بثور بنیہ وغیرہ بعض مرضی ہیں وسیع التهاب خلوی یعنی فلفوفی بھی انھیں کرویات عنقویہ کے باعث پیدا ہوتا ہے، مگر ایسا غازی ہوتا ہے۔ عین ساختوں کا نتیجہ ہی مثلاً التهاب مخ العظام التهاب صفق، تیغ صدر، کرویات عنقویہ کے باعث پیدا ہو سکتا ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جراثیم بدن کے حصہ میں پسپ پیدا کر سکتے ہیں +

تقن دم، تیغ دم، التهاب بطانہ قلب (معہ تیغ) بھی اگرچہ کرویات عنقویہ کے اثر سے پیدا ہو سکتے ہیں اور اس حالت میں انکا انجام نسبتاً کم خطرناک ہوتا ہے مگر بیشتر یہ امراض کرویات عنقویہ کے باعث پائے جاتے ہیں +

۱۔ مدوی ثانویہ۔ سکندری ٹیکشن	۲۔ بثور بنیہ۔ پیچوراکنی۔
۳۔ اسپرٹیکٹو چیروسا	۴۔ التهاب مخ العظام۔ آسٹیوما فی لانی ش
۵۔ جدری۔ چیچک۔ اسمال پاکس	۶۔ التهاب صفق۔ پریٹونی ش۔
۷۔ اسٹریٹوکوکائی	۸۔ تیغ صدر۔ اسپائی ما۔
۹۔ پھوٹا۔ ایس	۱۰۔ تقن دم۔ سپی میا۔
۱۱۔ ذل۔ بوزل	۱۲۔ تیغ دم۔ پائی میا۔
۱۳۔ جمرہ۔ شب چراغ۔ کارنبل۔	۱۴۔ التهاب بطانہ قلب۔ انڈوکارڈائیٹس

تفح کی بہت سی حالتیں، جو اعمال جراثیم میں غیر عفونی یا مانع عفونت اعتبار
دوسائل کی کمی کے باعث پیدا ہوجاتی ہیں، عموماً کرویات عفودیہ کی تنہا موجودگی
کے باعث یا دیگر جراثیم کے ساتھ مخلوط ہونے کے باعث ظہور میں آتی ہیں۔

۲۔ کرویات عقدیہ صُدیہ۔ ان اجساد کے افراد چھوٹی یا بڑی زنجیروں
کی صورت میں مرتب ہوتے ہیں۔ طریقہ جراثیم سے یہ رنگے جاسکتے ہیں مگر مصنوعی
کشتوں کی زمینوں میں یہ بہت آسانی سے نہیں بڑھتے ان کی نشوونما کے لئے
حرارت برنیہ کے قریب قریب گرمی کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے یہ مادہ ہلاکت
کی زمین میں بخوبی نہیں بڑھتے۔ ان کی نوآبادیاں چھوٹی چھوٹی اور نیم شفاف ہوتی
ہیں، زیادہ نہیں پھیلتی اور نہ ایک دوسرے سے مخلوط ہوتی ہیں۔ یہ ایسا کوئی کیسا
خیر نہیں بناتے کہ جس سے شجر مُصل دم ریا مودھیہ) تحلیل ہو کر رقیق بن جائے
ان کی نئی کاشتیں جلد ہلاک ہوجاتی ہیں۔

کرویات عقدیہ صدیدیہ کے اقسام کا جدا کرنا ایک مشکل امر ہے اور اب تک
ان کی تقسیم نوع مشکوک و مبہم ہے۔ البتہ کرویات معویہ یا کرویات عقدیہ
برازیدہ تو ایک مخصوص و ممتاز نوع ہیں۔ یہ امعاء کے طبعی باشندے ہیں، اور
میدان جنگ کے زخموں میں عموماً ملتے ہیں۔ مگر خوش قسمتی سے انکی حدت سیمہ
نسبتاً کمزور درجہ کی ہوتی ہے جس سے تضرع دم یا تفح دم خافہی پیدا ہو سکتا ہو
ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نہایت مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں اور اکثر بیضی

۱۔ غیر عفونی۔ اسپ بک۔	۲۔ کرویات معویہ۔ اسٹر و کوکس۔
۳۔ مانع عفونت۔ انٹی اسپ بک۔	۴۔ کرویات عقدیہ برازیل اسٹر و کوکائی فیکس۔
۵۔ اسٹر و کوکس پایوجنس۔	۶۔ ویر ولس۔
۷۔ گرام سے تقصا۔	

اور عضوی اشکال پائے جاتے ہیں، یہ نہایت سخت جان ہوتے ہیں اور دن جراثیم
 مسطرات اور حرارت وغیرہ سے بمقابلہ معمولی اقسام کے شکل ہلاک ہوتے ہیں۔
 کرویات عقدیہ برازیہ کے سوا اور کوئی قسم، کرویات عقدیہ صدیریہ کی قابل
 تفریق نہیں سمجھی گئی ہے اور ممکن ہے کہ ایک ہی قسم کے اجساد کو ہم مختلف درجہ
 کی صحت سیمہ میں پائیں اور کشتوں میں ہم ایک ہی چیز کو مختلف اوقات میں متغیر
 و تبدیل صورتوں میں دیکھیں۔ ان کو نہایت شدید و زہریلے انواع میں یہ متاثر
 خصوصیت ہے کہ وہ ایک ایسا مادہ پیدا کر دیتے ہیں کہ جس میں خون کے سرخ
 دانوں کو تحلیل کر دینے کی قوت ہوتی ہے جس سے کہ خون کا شح جوہر (وٹمین)
 الگ ہو جاتا ہے۔ جب آجاء و موی کی زمین میں انکو مصنوعی طور سے کشت کیا
 جاتا ہے تو ان جراثیم کی نوآبادیوں کے گرد ایک گلابی رنگ کا طبقہ اوس جگہ بن
 جاتا ہے جہاں اس طرح خون کے دانوں کی تحلیل واقع ہو کر دوسرین خالص ہو جاتی
 ہے۔ جب کسی زخم کے مواد میں اس قسم کے کرویات عقدیہ صدیریہ کی تفریق و
 تیز ہو جائے تو اسے ایک نہایت مسعود شگون سمجھا جاتا ہے، کیونکہ انکی موجودگی
 متعین دم کا پیش خیمہ ہے اور عمل انتقام ہمیشہ سست ہو گا۔ جن زخموں میں اس قسم
 کے جراثیم پائے جائیں، انکو اگر ٹانگے لگا کر بند کر دیا جائے گا تو وہ مندمل
 نہیں ہو سکتے۔

کرویات عقدیہ صدیریہ بمقابلہ کرویات عنقودیہ صدیریہ کے زیادہ زہریلے
 اجساد ہیں اور بجائے مقامی پھوڑے کے زیادہ تر وسیع پھیلنے والا حاد التهاب
 پیدا کر دیتے ہیں، اگرچہ گاہے یہ مقامی پھوڑا بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ حمزہ رسر خانی

مل راڈ شپٹ۔

مل آجاء و موی۔ بلڈا گار۔

مل د موبن۔ بیوٹو گلورین۔

پیدا کرنے والے کرویات عقدیہ کو پہلے ایک ممتاز جداگانہ نوع خیال کیا جاتا تھا، مگر معمولی اقسام کے کرویات عقدیہ اور ان کے درمیان اس قدر خفیف اور غیر اہم فرق ہے کہ اب ان دونوں اقسام کو متحد و مشابہ نوع ہی سمجھا جاتا ہے۔ التهاب عدوی یعنی فلفونی بھی عموماً کرویات عقدیہ صمدیہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تعفن دم اور تعفن دم میں بھی یہی اجساد کرویات عقدیہ صمدیہ (بہایت اہم حصہ لیتے ہیں، اور التهاب و تقرح بظانہ قلب بھی اکثر ان کے باعث پیدا ہو سکتا ہے۔

۳۔ کرویات ذات الریہ۔ یہ عموماً ذات الریہ نصیبہ (التهاب شش مفتی) میں کرمیات ترسجیہ کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، جن میں سے ہر فرد شش میں مثلاً نایا نشتر سے مشابہ ہوتا ہے، اور ایک کا چنیدار قاعدہ (دوسرے کے چنیدے سے متوازی اور برابر لگا ہوا ہوتا ہے۔ جب یہ جرثومہ کسی مادہ جمع شدہ یا سپ میں واقع ہوتا ہے تو اس کے گرد ایک غلاف بنتا ہے۔ مصنوعی کشتوں میں یہ جرثومہ کرویات عقدیہ صمدیہ سے قریبی مشابہت رکھتا ہے شش سے منتقل رکھنے والے التهابات میں اور خصوصاً تھیمو صمدیہ میں یہ مخصوص اہمیت رکھتا ہے شش کے تمام التهابی عوارض ہیں، جن کی ابتداء خواہ کسی طور پر بھی ہوئی ہو یہ تقریباً ہمیشہ عدوی؛ ثانیہ (دوسرے درجہ) کی صورت میں پایا جاتا ہے، مثلاً جب مرض سل میں پھیپھڑے کے اندر غار ہو جاتے ہیں، تو ان غاروں کی دیواروں میں عموماً صرف تنہا کرویات ذات الریہ کے باعث یا ان کے ساتھ اور دیگر جراثیم مخلوط ہو جانے سے سپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اصل میں جو یہ اور اس کے باعث

مثلاً لوریموٹا

مثلاً ڈیپلوکوکس

مثلاً غلاف کشتوں۔

مثلاً اپنی فی ما۔

مثلاً شل ایرڈیزیز۔

پیدا ہو جانے والے جھمکہ یا جھمکہ کے اندر دنی اعضا کے عوارض بھی عموماً انہیں جراثیم کے باعث پیدا ہو جاتے ہیں التهاب مفاصل بھی کرویات ذات الیہ سے پیدا ہو سکتا ہے جس میں بالآخر پیپ بھی پیدا ہو سکتی ہے اس قسم کا التهاب مفاصل عموماً التهاب شش ر ذات الیہ کے بعد واقع ہوتا ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ ذات الیہ کے بعد ہمیشہ مفاصل میں بھی لازمی طور پر التهاب ہو انہی اجزاء کے باعث بچوں میں التهاب مفاصل بھی ہو جاتا ہے، جو ابتداءً ان سے پیدا ہو یا امراض شش کے بعد ثانوی طور پر نمودار ہو۔ کرویات ذات الیہ کا ہے دوران خون میں داخل ہو کر تعفن مطلق پیدا کر دیتے ہیں جس کے ساتھ التهاب و تفرج بطانہ قلب بھی موجود یا غیر موجود ہو سکتا ہے +

(۴) عصا قولونی یہ طبعی طور پر تندہرست امعاء کے فضلات میں موجود ہوتا ہے یہ ایک چھوٹا عصی ہے جس میں حرکت کرنے کی قابلیت ہوتی ہے مگر انڈسے (انڈس) نہیں بنا سکتا، طریقہ جراثیم سے رنگا جا سکتا ہے، حضنین کی موجودگی میں بہترین نشوونما حاصل کرتا ہے، مگر غیر ہوائیہ آکسیجینا یہ ہوتا ہے۔ یہ تھیرموفیل (جس سے مواد ہلایہ تحلیل ہو جاتے ہیں) نہیں بناتا، لہذا مادہ ہلایہ اس کے اثر سے رقیق نہیں ہو سکتا، مگر یہ کثرت بدبودار ریاح پیدا کر دیتا ہے بدبو پیدا کرنے والے جراثیم میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والے اجزاء عصی قولونی ہی ہیں

۱۔ عصا قولونی۔ میسیس کالانی۔

۲۔ میسیس۔

۳۔ اسپورس۔

۴۔ حضنین۔ آکسیجن۔

۵۔ نیکٹے ٹران ایروب۔

۶۔ انڈس۔

۱۔ جھمکہ۔ کرکے نیم۔

۲۔ التهاب مفاصل۔ آرٹھرائٹس۔

۳۔ التهاب مفاصل۔ پری ٹونائیٹس۔

۴۔ سپٹی میا۔

۵۔ سرپٹنڈو کارڈائیٹس۔

یہ موادِ نجس کو تجزیہ و تحلیل کے ذریعہ سے توڑ کر نیل بُودر اندال (اور اوس سے مشابہ اجسام اور ایسے بخارات (ریاح) بنا دیتے ہیں جن میں پائے خانہ کی سی بدبو ہوتی ہے۔ یہ حمی معویہ کے جراثیم سے بہت قریبی مشابہت رکھتے ہیں مگر اذن کی جیسی خاصیت مختلف شکروں پر اثر پیدا کرنے کی نہیں رکھتے جس کے باعث اذن سے متاثر طور پر شناخت کیے جاسکتے ہیں۔ مثلاً اگر شوربہ میں شکر انگور (شکر ذرا کم) کی آمیزش کر کے اُس زمین میں عصی حمی معویہ کو اُگایا جائے تو حاتمض پیدا ہو جاتا ہے مگر ریشم نہیں بنتے، برخلاف اس کے اگر اسی زمین میں عصی قلوبی کو اُگایا جائے تو حاتمض اور ریح دونوں پیدا ہو جاتے ہیں۔ عصی قلوبی اور عصی حمی معویہ یہ دونوں اجزاء و تھکے کے ایک بڑے اور اہم خانہ کے رکن ہیں جو شکل و صورت میں تو ایک دوسرے سے قریبی مشابہت رکھتے ہیں مگر اپنے کیمیائی افعال میں مختلف ہوتے ہیں +

معمولی اور طبعی حالات میں اس نوع کے جراثیم جو امعاء کے فضلات میں واقع ہوتے ہیں، زیادہ سمیت نہیں رکھتے۔ مگر جب امعاء کے اندر کسی قسم کے تغیرات مرضیہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً جب آنتیں کسی وجہ سے گھٹ کر وہب جاتی ہیں (خفقن) یا اذن میں زخم یا چھید ہو جائیں (تقرح و شقیقہ) تو ان جراثیم کی سمیت میں زیادتی ہو جاتی ہے جس کے باعث ساختوں میں تلف و مباد پیدا ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ جراثیم اکثر البتاب و دودہ اعوز البتاب صفاتِ حادہ وغیرہ

۱۔ اجزاء و تھکے، ماکرو آرگنزم
۲۔ خفقن۔ اسٹریگیٹیشن۔
۳۔ شقیقہ۔ پرفوریشن۔
۴۔ اینڈیسیسٹس
۵۔ پریٹروپائیٹس۔

۱۔ نیل بُودر اندال
۲۔ حمی معویہ۔ مانی فائبر
۳۔ شکر انگور گریپ شوگر۔
۴۔ ایڈ
۵۔ گیس

پیدا کر دیتے ہیں اور انکے اثر سے جو پیپ بنتی ہے اس میں پاشخانہ کی مدد پائی جاتی ہے۔ یہ جراثیم مجری مرارہ میں داخل ہو کر الہتائب مرارہ اور الہتائب مجری مرارہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عصی قولونی الہتائب مثانہ کے پیدا کرنے کے عام ترین اسباب میں سے ہیں۔ لیکن عصی قولونی میں قارورہ کو ٹنکین بنانے کی طاقت نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پیشاب میں عموماً ایک مخصوص قسم کے جراثیم موجود ہوتے ہیں جنکو پہلے کرویات بولیدہ دقیقہ کے نام سے پکارا جاتا تھا اور جو اب ادن کرویات بشرہ بیضا سے مشابہ سمجھے جاتے ہیں جو کہ جلد میں عام طور پر طبعاً پائے جاتے ہیں۔

(۵) عصی حمی معویہ۔ یہ بعض اوقات پھوڑے پیدا کر دیتے ہیں جو عموماً حمی معویہ کے بعد، خصوصاً ہڈیوں اور جوڑوں میں نمودار ہو جاتے ہیں بعض حالات میں یہ جراثیم پیپ نمودار ہونے سے برسوں پہلے جسم میں پوشیدہ پڑے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ بعض مرضی حمی معویہ ہونے کے بعد ان جراثیم کو قارورہ اور براز سے برسوں بعد تک خارج کرتے رہتے ہیں۔ اور جب یہ براز میں پائے جاتے ہیں تو اکثر مرارہ انکا مرکز عددی ہوتا ہے جہاں سے ٹکڑیہ براز میں پہونچ جاتے ہیں۔ ایسے اشخاص کو حاث مل حمی معویہ کے نام سے پکارا جاتا ہے اور ان کی وساطت سے حمی معویہ دہانی صورت میں ناگہانی طور پر پھیل سکتا ہے جو بظاہر ہر ناکی سبب کے معلوم ہوتا ہے۔

۱۔ الہتائب مرارہ۔ کول سستانی ٹش	۲۔ کرویات بشرہ بیضا۔ ٹانگو کو کس اپنی ڈرمی ڈس ایس۔
۳۔ الہتائب مجری مرارہ۔ کولنجائی ٹش۔	۴۔ عصی حمی معویہ۔ ٹانی فائڈمی ایس
۵۔ الہتائب مثانہ۔ سستانی ٹش۔	۶۔ حامل حمی معویہ۔ ٹانی فائڈ کیریہ۔
۷۔ کرویات بولیدہ دقیقہ۔ ٹانگو کو کس بوری	

(۶) عصبی تھیمہ ذرقاۃ۔ رنجیہ پیپ والے + ذرقاۃ نیلے (شہری آبادی کے مرضی میں یہ جراثیم پیپ کا باعث شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں۔ مگر یہ جنگی مریضوں اور خصوصاً بندوبست کے زخموں میں اکثر پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا باعث جو پیپ بنتی ہے اسے اگر پٹی پر اکٹھا کیا جائے یا ہڈیوں میں کھنڈا رکھا جائے تو اس کا رنگ نیلگوں بنز ہو جاتا ہے۔ اس کے عدوی کے باعث زخموں سے مواد نہایت کثیر مقدار میں نکلتا ہے جس میں شیرہ انگور کی سی بڑی ہوتی ہوئی ہوتی ہے۔ جب ان جراثیم کے باعث عدوی پیدا ہو جائے تو وہ عموماً خطرناک نہیں ثابت ہوتا اور واضح جراثیم مطہرات کے ذریعہ اور پیپ کے خارج ہونے کا معقول انتظام کے بعد اسپرل عدوی پر پورا قابو آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن گاہے جراثیم خون کے اندر بھی دیکھے جاتے ہیں اور ان کے اثر سے اسہال و پیشانی کان رنجیہ کا التهاب اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ عمومی عدوی پیدا کر سکتا ہے +

(۷) عصبی سوزاک اس کا بیان سوزاک کے باب میں آئے گا
(۸) کرویات رباعیہ (رباعیہ - چار والے) ان کے افز و چار چار کی صورت میں ہوتے ہیں اور یہ بہت کم پائے جاتے ہیں +

نتیجہ بہت سی صورتوں میں عدوی مختلطہ کے سبب سے پیدا ہوتا ہے جس میں مندرجہ بالا جراثیم کی سمتوں میں سے دو یا زیادہ ملکر سبب مرض ہو جاتے ہیں۔ (مختلطہ - ملا ہوا) میدان جنگ کے زخموں میں تو بعض غیر ہوائی

۱۔ کرویات رباعیہ - ہلکے و کس شرجی سے

۲۔ عدوی مختلطہ - کسہ نفاکشن۔

۳۔ غیر ہوائی - ان ایر میز

۱۔ میس باپریسیانس

۲۔ التهاب جربہ - اذنی میڈیا

۳۔ عمومی عدوی - جزئی نفاکشن۔

۴۔ کانڈاکس۔

جراثیم رجبکا بیان علیحدہ درج ہے، یہی شامل ہو کر حد و ثب مرض کا باعث ہوتے ہیں۔ بعض دیگر حالات میں ابتداء پھوٹا جو معمولی جراثیم صمدیہ کے اثر سے پیدا ہو جاتا ہے بعد میں کسی بسیط مسم کے جراثیم عفنه رتبت (العفونت) کی تلیق پاکر اونسے بھی ثانوی طور پر متاثر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ جراثیم عفنه مر فارسیپ ہی میں نشو و نما پا سکتے تھے اور زندہ ساخت پر کچھ اثر نہیں کر سکتے تھے۔ ایسا اتفاق (حادثہ) کسی ایسے بڑے پھوٹے ہی میں ہو سکتا ہے جس میں مواد کے پورے طور سے خارج ہونے کا انتظام نہ ہو اور جس کی پٹی احتیاط کے ساتھ نہ بدلی جاتی ہو۔ اس مسم کا حادثہ بہ احتیاط تمام پیدا نہ ہونے دینا چاہئے، کیونکہ مختلط عدوی کے زخم و جراحات نہایت وقت سے مُذہل ہوتے ہیں، اور علاوہ ازیں ساختہائے جسم ایک ہی مسم کے جراثیم کے لئے قناعت نہایت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں مگر ان میں دیر زیادہ مسم کے جراثیم کی ممانعت ایک ہی وقت میں نسبتاً زیادہ وقت اور مشکل کے ساتھ پیدا ہو سکتی ہے۔ اس امر کی وجہ سے کہ زخم پہلے ہی سے مُذہب ہو چکا ہے احتیاط میں کمی کرنا اصولی تھپیر کی فوری ممانعت ہر ممکن طریقہ سے نہ کرنا جائز اور خطرناک ہے۔

خُرَاجِ حَاد

نوعیت اسباب

(الف) اس بات کو ایک مسلمہ اصول کی طرح ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ جراثیم میں جب کبھی تلیقہ رسیپ کا موجود ہونا پایا جائے گا تو وہ ہمیشہ جراثیم کے

۱۔ خراج حاد۔ ایکوٹ ایس

۲۔ سپرو فائش

۳۔ مُذہب۔ انفکٹ

فعل کے باعث ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ منتقل (تجنگاہ) میں کیا دی ہنجیات کے استحال سے حیرانات میں غیر عینی تفتیح پیدا کر لینا ممکنات سے ہے، مگر انسان میں ایسا واقع نہیں ہوتا۔ یہ بھی سچ ہے کہ بعض پھوڑوں رجن میں سے خراج کبد اور تفتیح متاخر قابل تذکرہ ہیں) کے مواد و رطوبات کے اندر غرور دہنی اور کشتوں کے امتحان میں بھی کسی مہم کے جراثیم نہیں پائے جاتے مگر اس کی اہلی وجہ یہ ہے کہ جراثیم ہلاک ہو کر تلف ہو گئے ہیں اور خراج پھیلنے سے رک گیا ہے، بعض دیگر حالات میں جراثیم بنایت قلیل تعداد میں موجود ہوتے ہیں یا وہ معمولی کشتوں کی زمینوں میں نہیں ادر گئے۔ علاوہ ازیں اس موقع پر یہ ظاہر کر دینا بھی ضروری ہے کہ جراثیم مرض آئے دن نئے نئے دریافت ہوتے رہتے ہیں جن کے وجود کا پہلے وہم و گمان تک نہ تھا۔

(ب) جراثیم اس مقام پر جو مہتب ہو جاتا ہے جسم کے باہر یا اندر دونوں طرف سے پہنچ سکتے ہیں۔ بیشتر اوقات تو جراثیم باہری سے داخل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ محققین دکا رسی اور برخار دم کی تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے۔ ان محققین نے کرویات عنقودیہ صدیدیہ نارسجیہ کی اگائی ہوئی کشتیں اپنے بازوؤں کی جلد پر کیں اور وہاں تفتیح حاو پیدا کیا، جو اس طرح شروع ہوا کہ پہلے تو سطحی ٹیٹور پھنسیاں، نمودار ہو گئے اور یہ بالآخر دھل یا جہرہ کی صورت میں مبدل ہو گئے۔ کرویات عنقودیہ صدیدیہ عموماً جلد بدن میں موجود رہتے ہیں۔ اور اکثر ہوا کے ذریعہ سے آلات جراحیہ، مرہم پٹی وغیرہ پر جم جاتے ہیں۔ لہذا

۱۔ اسپیکس۔ سپورکشن	۲۔ شبد۔ سپچول۔
۳۔ تفتیح متاخر۔ پائریٹنکس۔	۴۔ دھل۔ بوزائل۔
۵۔ اسٹینیلوکس پالوجے نس آدمی	۶۔ جہرہ۔ شبہ چراخ۔ کارنبل۔

بیشتر حالات میں تقيح پيدا ہونے کا سبب یہی ہوتا ہے کہ جراثيم ان خارجی ذرائع میں سے کسی نہ کسی ایک کے ذریعہ داخل بدن ہو جاتے ہیں اور وہی پيدا کر دیتے ہیں +

لیکن بعض حالات میں جراثيم خون کے اندر سے ساختہائے بدن (انسجہ) میں پہنچ جاتے ہیں۔ مثلاً گاہے کسی گہری ساخت کا تفرق و منادو رہے کہ عضلہ رباط کا ٹوٹ جانا) بالآخر تقيح پيدا کر دیتا ہے اگرچہ اس مقام کے اوپر کی جلد کا چمڑا مسلم ہوتا ہے اور جلد اور مقام ضرب کے درمیانی انسجہ بظاہر مندرست و صحیح ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں ہیں عدوی فاتیہ کا واقع ہونا فرض کر لینا چاہئے جس میں جراثيم پلانے اور مزمن تقيح کے کسی مرکز (مثلاً تقيح لثہ، یا تفرح دہن یا تفرح امعاء) سے خون میں داخل ہو جاتے ہیں +

بعض دیگر حالات میں خراج ان جراثيم کے سبب سے پيدا ہو سکتا ہے جو انسجہ میں پوشیدہ اور چھپے ہوئے پڑے ہوں اور ممکن ہے کہ اس حالت خفاء میں ایک عرصہ دراز سے ہوں۔ اس حالت کا تذکرہ علم الجراثيم کے بیان میں ہو چکا ہے اور یہ خصوصاً ہمارا اور کھڑے زخموں کے بعد مزمن اور دیر پا تقيح کے مراکز بن جانے سے پيدا ہو سکتی ہے۔ اس قسم کے امکانات کا خیال اس وقت پیش نظر رکھنا ضروری ہے جبکہ اس بات کا فیصلہ کرنا منظر بروکرجرامی کے بعض ثانوی اعمال (مثلاً ڈیوں اور عصا پر) کرنے کے لئے بہترین وقت کون سا ہونا چاہئے۔ عموماً ایسے موقعوں پر تین سے چہ ماہ تک

۱۔ عضلہ مسل۔	۲۔ تقيح لثہ۔ پائریا۔
۳۔ رباط لگنٹ	۴۔ حالت خفائی جراثيم۔ لثنی
۵۔ عدوی فاتیہ۔ آؤٹونکشن	۶۔ آف جرمز۔

اقتضار کرنا مناسب ہے اور اس درمیان میں مریض کو پہلے سے خوب قوی بنالینا چاہئے۔ اس امر کے متعلق قطعی حکم لگانا (فیصلہ کرنا) مشکل ہے کہ جراثم کی یہ حالت خفاد کن حالات و اسباب کے ماتحت پیدا ہو جاتی ہے، مگر ممکن ہے کہ یہ کسی خفیف سی خارجی چیز (جسم غریب) کے اندر گھس جانے یا پسپ کی نہایت خفیف مقدار درجہ ثانیہ خوردین ہی سے (کچی باکے) میں جھلی سے گھیر کر اور مختلف ہو کر ساختوں میں رو جانے کے باعث ہونی جراثیم محدود ہو جاتے ہوں اور ادن پر حالت جمود طاری ہو جاتی ہو :

پس جب اس قسم کی مقامی حالت پہلے سے موجود ہو، تو حصہ ماؤن کا ذرا سا چھل جانا جس میں سطحی تفرق اتصال بھی واقع نہ ہو، یا عمل جراحی کے دوران میں اتفاقی زخم کا لگ جانا، یا بغیر کسی قسم کے زخم کے ہی صرت عام صحت جہانی میں کمی پیدا ہو جانا۔ اس بات کے لیے کفایت کرتا ہے کہ شاید نتیجہ ازمرئہ پیرا او بھر جائے۔ دوسری مثال ہڈیوں کے ادن پھوڑوں میں ملتی ہے جو بعض اوقات حئی معویہ ہونے کے مہینوں یا برسوں بعد پیدا ہو جاتے ہیں اور جو عصی حئی معویہ کے باعث ہوتے ہیں۔ مگر اس حالت میں یہ بھی ممکن ہے کہ ان جراثیم کا عددی بعد میں بھی دوبارہ پہنچ گیا ہو :

جب جراثیم صدیدہ ایک مرکز قح سے جسم کے کسی دوسرے حصہ میں منتقل ہو جاتے ہیں، تو وہاں ایک بالکل مختلف اور جدا گانہ مزاج (قسم) کے پھوڑے پیدا ہو جاتے ہیں جن کو خراج سمدی ثانوی کہتے ہیں اور یہ نتیجہ دم سوزناک و عجیبہ میں نمودار ہو جاتے ہیں :

خراج سمدی ثانوی۔ سکندری امبولک
ابس

جسم غریب۔ خارجی جسم۔ فارن باڈی
مل ثانوی فائڈ فیور

عقیمہ و مطہر اجسام غریبہ رشتہ چاندی کا تار یا کانچ کے ٹکڑے (تقیم نہیں پیدا کرتے۔ مگر بعض ہنایت نادر حالات میں عدوی ذاتیہ کے باعث ان سے بھی سپ پیدا ہو سکتی ہے۔ مثلاً ایک مسافر خانے کے ملازم کی گردن میں آب زہیہ کی بوتل کے پھوٹنے سے کانچ کی ایک ٹکڑی ناہوار کچھ (ٹکڑا) سوا قیراط لمبی، ڈیڑھ قیراط چوڑی داخل ہو گئی۔ اس کے بعد کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی رقیق واقع نہیں ہوا) اس واقعہ کے دس ماہ بعد جب یہ کانچ کا ٹکڑا اوس کی گردن سے نشتر کے ذریعہ نکالا گیا تو دیکھا گیا کہ اوس ٹکڑے کے گرد ایک جلی کا غلاف بن گیا تھا جس نے اوسکو محیط کر رکھا تھا۔

اس اصول سے کہ مطہر اجسام اندرون بدن داخل ہونے کے بعد سپ نہیں پیدا کرتے، اعمال جراحیات میں رات دن منفعت حاصل کی جاتی ہے اور جسم کی ساختوں کے گہرے طبقات کو مطہر کردہ اندرونی ٹانگے لگا کر جوڑ دیا جاتا ہے یا منقطع شدہ ساختوں رشتہ ڈھریاں، رباطات، وغیرہ کو دات کے تاروں، پیچ کیل وغیرہ یا اسی قسم کے دیگر اندرون بدن سامان و ذرائع کی مدد سے لگا کر جوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر یہ آلات و اسباب بہ احتیاط تمام کلی طور پر عقیمہ و مطہر نہ کئے جائیں تو بے حد و حساب تکلیف و مٹاؤ کا باعث ہوں گے۔

لہذا مندرجہ بالا تشریح سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ اگرچہ حیوانات میں نتیجہ تجربہ جراثیم کے بغیر بھی پیدا کیا جاسکتا ہے، لیکن انسان میں معمولی حالات میں نتیجہ بغیر جراثیم صدیق کی موجودگی اور بلا اذن کے حیوانی فعل کے واقع نہیں ہو سکتا۔

۱. عقیمہ و مطہر اسٹرے لائزڈ	۲. کانچ
۳. سوڈا وارٹر	۴. اندرونی ٹانگے۔ بیورڈ سپرچ

(۱۱) گردہ میں پھوٹے کا بننا



(۱۱) مرکز میں جراثیم کا کتہہ لڑجہ ہے۔ اور اس کے گرد مردہ ساخت کا ایک
منطقہ یعنی حلقہ ہے۔ اور اس حلقہ کے گرد زندہ ساخت کا حلقہ ہے جس میں
بیضادات کثیر المنزات جمع ہو گئے ہیں +

خراجِ حاد کے اسباب: یہ عملی طور سے تین عنوانوں میں منضبط کیے جاسکتے ہیں:-

(۱) غالباً مریض خراج پہلے ہی سے خراب اور کمزور صحت رکھتا ہے اور اس کے جسم کی قوتِ دفعِ جراثیم ناقص ہوتی ہے۔ جب ایک ہی شخص میں پھوٹے ایک سے زائد مرتبہ ہو چکے ہوں تو اس بات کا گمان غالب ہوتا ہے کہ کوئی دوا غلطی ذریعہ عروسی (مثلاً عفونتِ دہن) یا کوئی خارجی آلائش (آلودگی زینٹائیسیل اور خلاصت کی نالیوں اور نلوں کے خراب ہونے کے باعث غلیظ و بدبودار بن جاتا) موجود ہے۔

(۲) ایک مقامی مرکز عفونت کا موجود ہونا لازمی ہے جس کی قوتِ حیوانیہ مجروح ہونے کی وجہ سے یا سردی یا گرمی وغیرہ کے اثر سے کم ہو گئی ہو۔

(۳) یہ مقام یا مرکز جراثیم صدیدیہ سے ملوث ہو جاتا ہے، جو اس مقام پر اندرونِ جسم سے یا جسم کے باہر سے پہنچ جاتے ہیں۔

خراجِ حاد کی پیدائش و ساخت: جراثیم جو ساختوں میں داخل ہو چکے ہیں نشوونما پر آمین پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ سمین آس پاس کی ساختوں میں پھیلا دیا، التهابِ حاد پیدا کر دیتی ہے۔ عروق پھیل جاتے ہیں اور اندرون میں استرنا ہو جاتا ہے، دورانِ خون پہلے تیز ہو کر پھر سست ہو جاتا ہے (یعنی سرعیت و مزاحمت کی حالت طاری ہو جاتی ہے) جس کے بعد کئی اسناد واقع ہو کر سسکا لا بجاتا ہے اور خون کے سفید دانے ارتشاح و انتقال کے ذریعہ عروق سے باہر نکل جاتے ہیں۔ مجروح ساختوں پر سیات کا زیادہ شدید اثر اذکی قوتِ حیوانیہ کو نابود کر دیتا

مل مزارعت ریٹارڈے شن۔

مل تھراسین۔

مل دفع جراثیم جری سائڈ۔

مل سرعیت دوران۔ اگلے رٹن۔

ہے اور یہ ہلاکت ساخت عموماً شقاقوں، انجماوی کے عمل کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے۔ اب اگر مقام ماؤف کو اس درجہ مرض کے موقع پر تراش کر زخرو میں سے دیکھا جاوے تو اس میں دو نہایت متفرق و متنازعہ نظریاتیں گے ۱) ایک مرکزی رقبہ جس میں ساختیں مردہ ہو گئی ہیں اور جن سے رنگ قبول کرنے کے خاصائص زائل ہو چکے ہیں۔ ان مردہ ساختوں کے ساتھ جراثیم صدیہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ (۲) ایک محلی طبقہ جو معمولی التهابِ حاد کی صورت میں ہوتا ہے، اور جو بتدریج آس پاس کی تندرست ساختوں کے ساتھ ملکر ادن میں غائب ہو جاتا ہے۔ اس مہرب طبقہ میں خون کے سفید دانوں کا شدید ترشح و اجتماع موجود ہوگا، اور امتحان سے ظاہر ہوگا کہ یہ دانے زیادہ تر وہ ہیں جنہیں کثیر النوات کرویات بیضاء کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے اور جو اس مقام پر جراثیم صدیہ کے افزائش کی خاص کشش و نظم کیماوی کے باعث کچھ چلے آئے ہیں۔

خراجِ حاد کا مرکزی مرفار حصہ جس میں جراثیم بھی شامل ہیں ایک اس مرحلہ تک آس پاس کے انسج سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اگر اس وقت اس مقام کو کاٹ کر دیکھا جاوے تو یہ مرکزی حصہ بطور ایک سرٹے ہوئے ٹکڑے زائل کے نظر آئے گا جسے جدا کرنے میں وقت محسوس ہوگی۔ لیکن یہ حالت محض ماضی ہوتی ہے اور جلد بدل جاتی ہے۔ رطوبات اور خصوصاً سائل و موی کی مسلسل زیادتی

۱۔ پالی نیوکیئر دیکر سائش

۲۔ کیوٹیکس

۳۔ اسلف

۴۔ سائل و موی۔ پلازما۔

۱۔ شقاقوں، انجماوی، کوکریٹین، نکروسس

۲۔ سنٹرل لبریا۔

۳۔ پاپوے، نک، بیکٹیریا۔

۴۔ پری فیبرل زون۔

کے باعث مرکز التهاب کا اندرونی تناؤ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ مرکزی مردہ حصہ کا انصال و تعلق اس پاس کی ساختوں سے منقطع ہو جاتا ہے اور ایک تیسرا طبقہ بن جاتا ہے جس میں (۳) بیضاوات کثیر النوات رطوبت کے اندر تیرتے پھرتے ہیں۔ یہ طبقہ مرکزی مردہ حصہ اور باہر کے محلی ملہب طبقہ کے درمیان بنتا ہے اور جہاں سینٹن خلیہ کیادی کے ذریعہ مادہ لحمیہ کو تحلیل کرینے کا اثر پیدا کر سکتے ہیں تو یہ عمل تحلیل ساختوں کو رقیق بنانے میں ایک حد تک مؤمد ہو جاتا ہے +

مرکزی چھوٹے ٹرے ہوئے حصے کا انجام بجا ط حالات مختلفہ مختلف قسم کا ہوتا ہے بعض اوقات جبکہ کوئی چھوٹا سا پھوڑا (نشرتے) پھوڑا جاتا ہو تو وہ بجنہ تیز کیا جاتا ہے جیسے کہ دس کی کیل ر ام ایتھ (گرہشتر حالات میں اُسے سفید دانے جذب کر لیتے ہیں یا وہ کیسا دی خمیر (خمیر ماضم) اُسے ہضم کر لیتے ہیں جو اکثر جراثیم صمد یہ طبقہ بناتے ہیں اور جن کے اثر سے مادہ لحمیہ مہضم و تحلیل ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مخصوص حصہ (مکمل) مجموعی طور سے مردہ ہو کر جدا نہیں ہوتا بلکہ ابتدائیں ہی جراثیم یہ اثر پیدا کر دیتے ہیں کہ سفید دانے ملہب ساخت میں جو اب تک زندہ ہوتی ہے بکثرت هجوم کرتے ہیں اور ساخت کے ایک ایک خلیہ کو یکے بعد دیگرے چن چن کر ہلاک کر کے ہضم کر لیتے ہیں +

لہذا پھوڑا (خراج) سفید دانوں کا وہ مجموعہ ہے جو رطوبت میں محلق اور ساختہائے ملہب کے طبقہ سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ سفید دانوں اور رطوبت

۱۔ شرب مک انزائم۔

۲۔ انزائم۔
۳۔ پھوڑے کی کیل کم سوراف ہوائی
۴۔ ام ایچ

کو مجموعی طور پر پیپ (میدہ قیہ) کہتے ہیں، اور اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ خراجِ حاد کی پیپ کے خصوصی دانوں کی شناخت یہ ہے کہ وہ کثیر النوات ہوتے ہیں۔ مگر یہ دانے معمولی خون کے سفید دانوں سے قدرے مختلف صورت کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے بہترے تو سمین سے ہلاک ہو جاتے ہیں رجب تازہ پیپ کو آٹھ مجہر کے گرم کرو تختہ نظر پر رکھ کر دیکھا جائے تو جو دانے ہلاک ہو چکے ہیں ان کی حرکت غائب نظر آتی ہے یہ ان کی ہلاکت کی دلیل ہے اور پھر ان میں مناد کے مختلف تغیرات واقع ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض کے اندر جراثیم بھی ہو سکتے ہیں۔

ابتداء میں تو پھوڑا اکثر سرخت کے ساتھ پھیلتا ہے، مگر دو ایک دن کے بعد بیشتر حالتوں میں ایک گونہ مقامی مناعت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر بھوڑا نسبتاً آہستہ آہستہ پھیلنے لگتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ عضو اذنی کی ساختیں اولاً تو جراثیم اور سمین کے زلف میں آکر مغلوب سی ہو جاتی ہیں مگر بعد اذنی کے ساتھ مقابلہ کے لئے آمادہ ہو جاتی ہیں، اس درجہ پر پہونچ کر پھوڑے کی اذرونی فضائیں نئے انگور (ازرار الحیمہ) کا استر ہو جاتا ہے جو ایک موٹی، نرم، مخملی تہ بنا دیتا ہے اور جس کا رنگ شوخ گلابی ہوتا ہے انگور کی ساخت و ترکیب میں نو ساختہ خون کی رگوں (عروق) کے کثیر التعداد حلقے سے ہوتے ہیں جو سفید دانوں اور مقامی انسجہ کے خلیات کے انبار میں گڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان دانوں اور خلیات میں پیدائش اور زیادتی کے ذریعہ افزائش موجود ہوتی ہے

۱۔ خلیاتِ بڑے۔ پس سبز۔	۲۔ درجہ۔ اسینج۔
۳۔ پالی نیوکلیر	۴۔ ڈی جنریشن۔
۵۔ مائی گراسکوپ	۶۔ ازرار الحیمہ۔ مگر نیو لینٹن۔

انگور کی موجودگی سے یہ لازم نہیں آتا کہ پھوڑے کا پھیلنا قطعی بند ہو گیا ہے۔ کیونکہ اب بھی موادِ سپہ (سین) اس قدر قوی ہو سکتے ہیں کہ انگور کی نئی بنی ہوئی ساخت کے دانے اونکے اثر سے فرداً فرداً ہلاک ہو جائیں۔ مگر بیشتر حالتوں میں انگور اس بات کی علامت ہے کہ عملِ التھام و درستگی کا دور شروع ہو گیا ہے جو دراصل ساختہائے جسم کی آخری فتح کا پہلا دروازہ ہے۔ انگور کے دانوں کے عروق کی پتلی دیواروں میں سے خون کے سفید دانوں کا نقل و ہجوم پھوڑے کی اندرونی فضا میں جاری رہتا ہے۔ یہ دانے پیپ کے دانوں کی سین کی جذب و کشش کی یاد کی وجہ سے عروق کے باہر کھینچے چلے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے انگور کی تہ کو جس سے پیپ و رطوبت کا اخراج نمایاں معلوم ہوتا ہے، پہلے عشاء سے صمدیدی کہتے تھے۔ گزشتہ زمانہ میں جبکہ پیپ کا منو دار ہونا ضروری کے التھام کے لئے ضروری اور لازمی سمجھا جاتا تھا کیونکہ پیپ جراثیم اور جراثیمی سین کے مفتاح اور مدافعت کے لئے ایک دیوارِ فاصلہ ہوتی ہے اور انکو خون میں داخل نہیں ہونے دیتی، اوسوقت کے طبیب جراح عشاء سے صمدیدی پیدا ہونے کی آرزو رکھتے تھے اور اس کا انتظار کرتے تھے۔ چونکہ اس قسم کی عشاء صمدیدی، زروی مائل رنگ کی گاڑھی اور لمائی جیسی پیپ پیدا کر دیتی ہے اس لئے اس زمانہ میں جب کبھی ایسی پیپ بن جاتی تھی تو اس کے بعد مریض کو تھم دم کے خطرہ سے آزاد سمجھ لیا جاتا تھا اور اس قسم کی پیپ کو نیک شگون خیال کر کے مصلحہ فاضلہ کے نام سے پکارتے تھے +

یہ قاعدہ عام ہے کہ پھوڑے بدن کے ہر ایک حصے میں یکساں نہیں پھیلتے

مصلحہ فاضلہ - لاؤڈیل پس۔

مصلحہ عشاء صمدیدی - پایوجہ نک مہرین

مصلحہ تھم دم - بلڈ پرائزنگ۔

کیونکہ بعض ساختیں خصوصاً ہڈیاں اور عضلی جھلیاں (الغائف) بہ نسبت بیج
خلوی اور چربی کے زیادہ سخت و مزاحم ہوتی ہیں۔ پھوڑے کا پھیلاؤ اسی طرح
زیادہ ہوتا رہتا ہے جو صرر وک اور مزاحمت کتر ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ کسی سطح کے
قریب پہنچ کر اوپر آتا ہے اور بالآخر جلد کے باہر یا بھرنی غذائی یا اور کسی جوف
کے اندر پھوٹ پڑتا ہے، ایسا ہونے کے بعد جراثیم اور جراثیمی سمین و دونوں خارج
ہو سکتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غشائے صمدیہ پران کا اثر ہلکا پڑ جاتا ہے
اور جب یہ واقع ہو جاتا ہے تو ساختہائے جسم کی قوتِ مدافعت جو پہلے جراثیم
کی قوتِ مضرت کے مقابلہ میں مغلوب تھی، غالب آ جاتی ہے۔ پھوڑا پھوٹنے
کے بعد جو جراثیم باقی رہ جاتے ہیں، اب سفید دانے اون پر غلبہ حاصل کر کے
بتدریج انکو خارج کر دیتے ہیں۔ سمین کی مقدار میں کمی آ جاتی ہے، پھوڑے
کی دیواروں کے اندر الہابی عمل ہلکا پڑنے لگ جاتا ہے، اور بالآخر انکو
کی ساخت کا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عمل پھوڑے کی اندرونی گہرائی و جوف
خارج کے پسند سے اسے شروع ہوتا ہے اور اس کے بالائی حصص کی
دیواریں، سپ کی وجہ سے، جو اب تک مترشح ہوتی رہتی ہے (اگرچہ بتدریج
کم ہوتی جاتی ہے) ایک دوسرے سے جدا رہتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھوڑا
کا جوف نیچے سے بھرتا ہوا چلا آتا ہے۔ اور بالآخر بالکل مندرج ہو جاتا ہے۔
اگر پھوڑے کی رطوبات کے اخراج اور بہاؤ کے لئے تشفی بخش ذرائع اختیار
کیے جاتے ہیں تو جراثیم اور سمین بہ سرعت خارج ہوتے رہتے ہیں اور اس کے
بھرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔

گاہے جسم کی قوتِ مدافعت اس قدر شدید ہوتی ہے کہ وہ جراثیم سپ

بننے کے بعد اور اوس کے خارج ہونے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتی ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پیپ جذب ہو جاتی ہے اور پھوٹنے کا جوت بھر کر مسدود ہو جاتا ہے۔ یا صرف پیپ کا رقیق حصہ جذب ہو جاتا ہے اور سفید دانہ مادہ شخی (رنا شخی) میں متغیر ہو کر پیپز نارم اور ناقابل شناخت ساخت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بہر حال پھوٹنے کی دیواریں یعنی ساخت بن جاتی ہیں۔ جس سے اندرونی مَنڈُہ بن جاتا ہے اور مذہب کے بیچ میں خشک اور گاڑھی پیپ رہ جاسکتی ہے۔ مگر ایسا واقعہ باستثائے شکم کے بہت شاذ و نادر ہوتا ہے۔ اور جب شکم میں ہوتا ہے تو خصوصاً زائدہ و دویہ، مجرئی قاذف یا کبد میں ہوتا ہے +

علامات۔ خراج حاد کے علامات کی تقسیم تین خاص قسموں میں مرتب کی جاسکتی ہے +

(۱) مقامی علامات مظلواہر۔ ساخت ماذف ملتہب ہو جاتی ہے اور اوسکا التهاب چار چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی حرارت، درد، سرخی (حرمت) اور سوجن (درم) سوجن ابتدائیں تو سخت تہی ہوتی اور پھولی ہوتی ہوتی ہے مگر جب پیپ بن جاتی ہے تو اوس کامرکزی حصہ نرم اور چلکدار ہو جاتا ہے، سطحی شیعج زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے، اور درد میں ٹیس ہوتی ہے، (روح ضرابانی) اس درد کی شدت ساخت ماذف کی صفاقت (ٹھوس ہونے) اور اُس کے اعصاب حیتہ کی مقدار کے لحاظ سے کم یا زیادہ ہوتی ہے۔

۱۔ فیٹی ڈی جزیشن	۲۔ مجرئی قاذف۔ ٹلوپین ٹیڈ
۳۔ مذہب۔ اسکار۔	۴۔ سطحی شیعج۔ سو فریشیل اڈیبا۔
۵۔ زائدہ و دویہ۔ اپنڈیکس ریفاکس۔	۶۔ روح ضرابانی۔ تھرائنگ ہین۔

اور جب کسی سخت جھلی (مثلاً غشائے کعب دست) کے نیچے پیپ بنتی ہے تو درد نہایت شدید ہوتا ہے۔ تھوچ کا پایا جانا اس بات کی خاص پہچان ہے کہ رقیق شئی (پیپ) موجود ہے۔ اس کے دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹوبے ہوئے (مترم) حصہ پر ایک خاص جگہ ہاتھ کی ایک یا زیادہ انگلی رکھ کر کسی قدر دبایا جائے اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو مترم حصہ کے دوسرے مقام پر قدرے فاصلہ سے رکھ کر دیکھا جائے کہ جب سوجن کو دبایا جاتا ہے تو اندر کی رقیق چیز کی موج درمیانی حصہ میں لینے پہلی جگہ سے گذر کر دوسری جگہ تک منتقل ہوتی ہے یا نہیں اگر رطوبت ہوگی تو موج محسوس ہوگی۔ بعض نجد اور غیر رقیق اجسام جو نرم ساخت کے ہوتے ہیں ان میں بھی اس قسم کا موج محسوس ہو سکتا ہے جیسے کہ سلعہ شحمیہ (چربی دار رسولی) اور سلعہ لچمہ (گوشت کی رسولی) میں۔ بر غلاف انہیں موج بعض حالات میں غائب بھی ہوتا ہے مثلاً جب رطوبت میں بہت تناؤ ہو، یا جب کوئی دبیز دیوار رطوبت کے گرد محیط ہو یا جب رطوبت کسی غدوثی ساخت وغیرہ میں مثلاً پستان کے اندر بہت پھیلی ہوئی ہو۔

گاہے پیپ تھوڑی مقدار میں ہوتی ہے تو دبائے سے موج کے بجائے صرف ایک قسم کا چکدار دباؤ (مقاومت لدنہ) مترم اور تے ہوئے حصہ کے عین مرکز میں محسوس ہوتا ہے، اگر تجربہ کار اور مشاق کی انگلی موج کی طرح اسی علامت کو یقینی سمجھ کر اس سے فوراً پیپ کی موجودگی محسوس کر لیتی ہے۔ جب پیپ عضلات یا الغائف کی سطحوں کے نیچے گہرائی میں موجود ہو تو اسکو پہنچانے کے لیے نہایت

۱۔ غشائے کعب دست۔ پالرفیشیا۔

۲۔ سلعہ شحمیہ۔ سارکوا۔

۳۔ تھوچ۔ نلکھونے شن۔

۴۔ گھینڈ ڈور ٹشو۔

۵۔ مقاومت لدنہ۔ الاسٹک ریسٹنس

۶۔ الغائف فی شحمیہ۔

۷۔ سلعہ شحمیہ۔ پیپوئے نا۔

احتیاط و فکر کے ساتھ امتحان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات قابلِ لحاظ ہے کہ عضلے کے ریشوں میں آڑے طور پر وہاں کر دیکھنے سے اکثر اونٹلی کو متوجہ سا معلوم ہوتا ہے (حالانکہ وہاں کوئی رطوبت نہیں ہوتی) لہذا طبیب کو چاہئے کہ اس فاسد علامت سے وہو کا نہ کھائے بلکہ لمبی ریشوں کے متوازی وہاں متوجہ کو محسوس کرے اور جب یہ حاصل ہو تو پیپ کی موجودگی کا یقین کرے۔ نمایاں اور بڑھتا ہوا شیش (ر او فیا) عموماً اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ پیپ بہت گہرے مقام پر موجود ہے۔ بسا کہ التهاب ریح اعظم (بڑی کے مغز کا التهاب) اور التهاب الشدی صدیہ میں ہوتا ہے +

اگر پھوڑے کو اس کی طبعی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ بالآخر مند نکالنا ہے اور خود بخود پھوٹ جاتا ہے، جوں جوں وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، وہ اسی سمت کا شیش کرتا ہے جس سے مزاحمت کم ہوتی ہے اور اس طرح پھیلنے کے بعد بالآخر وہ سطح تک جا پہنچتا ہے یا گزشت اور جلیوں کی سطحوں کے مقابل اندر اندر کھوکھلا کرتا ہوا بڑھتا ہے یا قریب جوار کی مضائل میں جالسا ہوا پھوڑے کا انفجار حقیقی ریح طور پر پھوٹتا (گاہے کسی قسم کی جراحات یا ضرب کے باعث ہوا کرتا ہے، خواہ یہ ضرب جراحات خفیف ہی سی کیوں نہ ہو مگر اکثر پہلے جلد میں تفرج ہو جاتا ہے۔ یا وہ مردہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھوڑا پھوٹ جاتا ہے۔

(۲) پھوڑے کے دباؤ کے نتائج۔ یہ نتائج بیشتر اوقات اس وجہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں کہ اس پاس کی ساختوں پر سو جن اور دم کا جسمانی دباؤ

۱۔ التهاب الشدی۔ مستثنیٰ ش۔

۲۔ جسمانی۔ بیکانیل۔

۱۔ التهاب ریح اعظم۔ استثنیٰ مافی

۲۔ لانی ٹلس۔

پڑتا ہے۔ زیادہ نمایاں اثرات وہ ہیں جو اعصاب کے تیغ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جس کے باعث قصبی درد نمودار ہو جاتا ہے اور مریض اس درد کو کسی دور دراز کے مقام پر جو تندرست ہے محسوس کرتا ہے۔ بعض حالات میں جبکہ بڑے بڑے عروق مرکز تیغ سے ہو کر گزرتے ہیں تو ان رگوں کے اطراف کی ساختیں تو لٹکت ہو جاتی ہیں اور خود رگیں پھوٹنے کے جوف میں کھلی ہوئی اور بے ڈوروں یا شموں کی صورت میں دکھائی دیتی ہیں۔ بعد ازاں میں انجناد خون ہو کر انسداد واقع ہوتا ہے اور یہ خصوصاً دریدوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ گاہے شرائین کے گرد التهاب ہو کر ان کی دیواریں سڑ کر نکل جاتی ہیں اور جربان ٹخن واقع ہو جاتا ہے۔

گاہے دیواروں کے سڑنے سے پہلے شریان میں پھیلاؤ کی وجہ سے انورٹما بھی ہو جاتا ہے اور اس کا باعث یہ ہوتا ہے کہ التهاب کے بعد آس پال کی ساختوں کا سہارا جاتا رہتا ہے اور شریان پھیل جاتی ہے۔ اس قسم کے نتائج خراج حاد اور خراج مزمن ہر دو میں نمودار ہوتے ہیں۔

(۳) عمومی اثرات۔ خراج حاد ہونے کے عمومی اعراض یہ ہیں کہ بخار پیدا ہوتا ہے۔ گاہے پھریری (قشریرہ) اور جاڑو (نافض) چڑھ جاتا ہے اور کثرت بیضادات ہوتا ہے۔

۱۔ ارری ٹیشن۔	۵۔ جربان خون۔ ہمورج۔
۲۔ نیورینجک پین۔	۶۔ انورسما۔ انورزم۔
۳۔ تھراپوسس۔	۷۔ ایکوٹ ایس
۴۔ التهاب شریانی ظاہر۔ ہیری آس	۸۔ کرائک ایس
۵۔ ٹرافی ٹس	۹۔ کثرت بیضادات۔ ایکوسائی ٹوسس۔

لرزہ چڑھنے میں بعض خصوصی مظاہرات مستقل طور سے پائے جاتے ہیں جو اس طرح پیدا ہوتے ہیں کہ خون میں سمیتن مجتمع ہو کر مرکز حرارت کو تحریک دیتے ہیں۔ یہ لرزہ اوس سے بہت مشابہ ہوتا ہے جو فصلی بخار رچی متعلقہ میں ہوتا ہے اور اس میں لرزہ سے پہلے شدید سردی اور بے چینی محسوس ہوتی ہے، چہرہ متغیر ہو جاتا ہے اور دانت بکھنے لگتے ہیں۔ مگر بخلاف فصلی بخار کے (جلد خشک و گرم ہو جاتی ہے، اور حرارت بدنہ تیزی سے بڑھ جاتی ہے، سردی محسوس ہونے کا سبب کچھ تو یہ ہے کہ معمولی اور معینہ درجہ حرارت کی ہوا اسی جلد پر لگتی ہے جو کہ گرم اور خشک ہے اور جس میں پسینہ نہیں آ رہا ہے۔ دوم اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس حالت میں بیرونی اعضاء کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے +

چاڑھے اور لرزہ کی حالت کم و بیش عرصہ تک قائم رہتی ہے، اس کے بعد مریض کو بتدریج گرمی محسوس ہوتی ہے، اوس کا منہ تھما کر شیخ پڑ جاتا ہے اب اگر مقیاس حرارت لگا کر دیکھا جائے تو درجہ حرارت اوپر نہیں چڑھتا اور مریض کی جلد پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالآخر خوب پسینہ نکلتا ہے اور اس کے ساتھ ہی حرارت یکبارگی گر جاتی ہے۔ پسینہ نکلنے سے غالباً سمیتن تو خارج ہو جاتے ہیں مگر پسینہ کے بعد مریض کو کم و بیش کزوری محسوس ہوتی ہے۔ کثرت بیضاد است سے نتیجہ میں کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اوس سے اس کی تشخيص میں کس طرح امداد ملتی ہے۔ اس کا مفصل بیان آئندہ مناسب موقع پر آئے گا +

۳۔ تھرامیٹر۔

۴۔ تھرموجیک سنٹر۔

۵۔ میریا

پسپ اور اوس کے اجزاء طبعی ہدیہ۔ (جسے گزشتہ زمانہ میں ^{مٹکا} فاضلہ یا ^{مٹکا} مٹکا کہتے تھے) ایک گاڑھی لیسار بالائی جیسی رطوبت ہے جس کا ثقل ^{مٹکا} نوری ۱۰۲۰ ہوتا ہے، قلوبی تاثیر رکھتی ہے اور بے بو ہوتی ہے۔ البتہ جب پسپ سڑنے لگتی ہے یا اوس میں عصی قلوبی کی پیدائش ہوجاتی ہے تو اس میں بدبو پیدا ہوجاتی ہے (پسپ کے قوام میں ۵۰ سے ۹۰ فی صدی تک پانی کا جزو ہوتا ہے۔ اگر پسپ کو بجالت سکون چھوڑ دیا جائے تو اس کے دو طبقے ہوجاتے ہیں، ایک بالائی حصہ جو رقیق ہوتا ہے اور سائل مٹکا کہتے ہیں۔ یہ حصہ عموماً شفاف یا دو دھیارنگ کا (لبنی اللون) ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ جو منجمد ہو کر تھین ہوجاتا ہے، زردی یا نل بھورے رنگ کا اور جسامت میں نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ سائل صدیدی یعنی حصہ رقیق اوس سائل دمی سے حاصل ہوتا ہے جو عروق سے مترشح ہوتا ہے۔ بدن سے علیحدہ کیے جانے کے بعد یہ حصہ منجمد ہو سکتا ہے مگر اس کا لٹھڑا (جلبط) بہت ڈھیلا اور ملایم ہوتا ہے۔ لیکن بارسا ایسا انجامد نہیں بھی ہوتا ہے۔ جس کی وجہ شاید یہ ہو کہ یہ پھوڑے کے اندر ہی ایک مرتبہ منجمد ہو چکا ہو اور اس انجامد میں یضیق کی جو جالی بن چکی تھی وہ سین کے خمیر یا ضم سے تحلیل ہو چکی ہے یا سفید دانے اسے کھاکر ختم کر چکے ہیں۔ پس جب یضیق موجود نہیں ہے تو سائل دمی کا منجمد ہونا محال ہے البتہ ترکیب کی یا دمی سمیٹال من کو ایک رقیق زلالی مادہ سے مرکب ہے جو مصل نام

۱۔ لٹھڑا۔ جلبط۔ کلاٹ

۲۔ فاضلہ یا مٹکا

۳۔ پسپون شنگ فرمنت۔

۴۔ ایسوی سن۔

۵۔ بلڈ سیرم۔

۱۔ لٹھڑا یا بل پس۔

۲۔ ثقل نوری۔ اسے سے ٹک گئے ویٹی

۳۔ قلوبی تاثیر۔ الکلائی ری کشن۔

۴۔ سائل صدیدی۔ لاکر پورس

سے بہت مشابہ ہوتا ہے لیکن یہ نسبتاً زیادہ رقیق (مخفٹ) ہوتا ہے اور اس میں جراثیمی سین، خیمات کیٹیاویہ اور ٹکین (پرڈون) یعنی وہ مرکبات ہوتے ہیں جو مادہ لحمیہ وغیرہ کے ہضم و تحلیل سے بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات جب پھوڑا کسی شئی ساخت میں ہوتا ہے تو چند روغنی گیات بھی سطح پر تیرتے ہوتے ہیں یا سیال صمدی کی رطوبت کے ساتھ مکرثیرہ نما محلول بنا دیتے ہیں۔

منجدر حصہ جرتہ نشین ہوتا ہے وہ بیشتر بیضادات کیٹر انکونی پر مشتمل ہوتا ہے جن میں سے زیادہ تر دوائے تو مردہ اور ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں مگر بعض دوائے زندہ بھی پائے جاتے ہیں اور یہ حرکت ذاتیہ کی قابلیت رکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس منجدر حصہ میں ساخت ماؤف کے خلیات کے ٹکڑے اور ذرات، یعنی ساخت کے ریشے دیگر ذرات اور جراثیم بھی پائے جاتے ہیں اور اکثر اوقات چند مٹخ دانے بھی ہوتے ہیں۔

جب پیپ میں خون کی آمیزش ہو تو اسے جڈا ڈھونڈ (رغلی پیپ) کہتے ہیں۔ جب پیپ رقیق اور حریف (تیز) ہوتی ہے تو اسے مڈا ڈھونڈ کہتے ہیں۔ جب وہ دہی کے ریشے نما ذروں کی آمیزش رکھتی ہے جیسا کہ اکثر سلی یا ذنی مزاج کے تیج مزمن میں دیکھا جاتا ہے، تو اسے مڈا ڈھونڈ کہتے ہیں (رانب دہی) مڈا ڈھونڈ (نیلگوں پیپ) اور مڈا ڈھونڈ (خضراء) (سبز پیپ) جو

۱۔ ڈائی یوٹ۔	۱۱۔ مڈا ڈھونڈ۔ سے فی اس میں دیا سنگولی نہیں
۲۔ انزاس	۱۲۔ مڈا ڈھونڈ۔ اگر رس ہیں۔
۳۔ پرڈون۔	۱۳۔ مڈا ڈھونڈ۔ اگر ڈی ہیں۔
۴۔ پالی نیو کلیریکو سائٹس۔	۱۴۔ مڈا ڈھونڈ۔ بیو ہیں۔
۵۔ اسپان ٹے فیس مودسٹ۔	۱۵۔ مڈا ڈھونڈ۔ گرین ہیں۔
۶۔ نیو کلیائی۔	

عصبی تھیمہ زرقام کی تاثیر و تحریک کے باعث پیدا ہو جاتا ہے، اوسکا نیلگون یا سبز رنگ اکثر زخم کی پٹی کی بیرونی تہوں میں جو ہوا کے مقابل اور کھلی ہوتی ہوتی ہیں، نمایاں دکھائی دیتا ہے مدۃ مخاطیہ و لمغی پیپ (سیدار اور صاف ہوتا ہے اور غشیہ ثانیہ کے التہابی حالتوں سے پیدا ہو جاتا ہے مدۃ مائیدہ یا مصلیہ رپانی جیسی پیپ (مصل و موسی کی آمیزش کے باعث زیادہ رقیق اور پستکا ہوتا ہے اور غشیہ ثانیہ کے التہابات سے پیدا ہوتا ہے۔

گاہے پھوٹے کے اندر نہ صرف پیپ ہوتی ہے بلکہ بخارات بھی ہوتے ہیں ایسا اوسوقت ہوتا ہے جبکہ پھوٹے کا تعلق براہ راست کسی کھوکھے فضا دار عضو مثلاً شکم یا اعمار سے ہو جائے۔ اسی حالت میں تر حجاب حاجز کے نیچے کے پھوٹوں میں پانی جاتی ہے۔ زائدہ دودھ کے التہابی پھوٹوں کے اکثر اقسام میں جو بخارات پائے جاتے ہیں وہ عموماً عصبی قولونی تہیا یا اس کے ساتھ دیگر جراثیم کے اختلاط سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اعضائے طرفیہ (ماقہ پاؤں) میں یہ اکثر بخارات پیدا کرنے والے فیر ہوائی جراثیم مثلاً عصبی او فیرا خبیثہ عصبی ہوائیہ غلافیہ کے ہٹ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی پیدائش شدید التہاب خلوی منتشر یا غائرانا کے ساتھ وابستہ پانی جاتی ہے۔

۱۔ مدۃ مخاطیہ۔ میوکوس۔	۱۔ مکیمیس اوڈی میٹس گنی۔
۲۔ میوکس لمبرین۔	۲۔ میسیس ایر و جینس کپوسے
۳۔ مدۃ ثانیہ۔ سیروپس۔	۳۔ لٹ
۴۔ سیرس لمبرین	۴۔ اسپریٹنگ سیدو لانی ش۔
۵۔ ڈایا فرام	۵۔ لنگرین۔
۶۔ اینڈکس در میفار مس۔	

خراجِ حاد کا علاج

انسدادِ قیچ۔ جب کسی مقام پر التهاب واقع ہو کر پیپ بننے کا خطرہ پیدا ہو جائے تو قیچ کی روک تھام شاذ ہی ہو سکتی ہے۔ ابتدائی درجوں میں عضواؤں کو ادھار کھنا اور اسے آرام و سکون دینا، بخارات کی شکل میں اڑانے والے عنسلات کو نین کے ساتھ فلوئڈ کا اندرونی استعمال وغیرہ سے ممکن ہے کہ بعض اوقات انسدادِ قیچ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، یا ممکن ہے کہ حصہ مازوف میں علامت بے زیر کے طریقہ عمل سے عارضی احتقان دموی پیدا کرنا اسی مطلب کے لیے مفید پڑ جائے۔

انجذابِ قیچ۔ جسم کے بعض حصوں میں پیپ پیدا ہو جانے کے بعد جذب بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ انجذاب جسم کی بعض اہل فضاؤں میں ہی ممکن ہے جن میں قوتِ انجذاب شدید ہوتی ہے، مثلاً مکھ کا خزانہ مقدمہ، قیچ خزانہ مقدمہ، یا کیبنہ سفاف۔ قیچ خزانہ مقدمہ (مدہ کا سنہ) میں مقامی اور عمومی علاج کے اثر سے پیپ کی مقدار میں عملِ انجذاب سے جو کمی ہو جاتی ہے وہ وقتاً فوقتاً دیکھی جاسکتی ہے اصولِ علاج۔ مگر پھوڑے کے علاج کا عام کلیہ عمر نیا ہوتا ہے کہ درد کو کم کرنے اور پیپ بننے میں مدد دینے کے لیے پیپ سینک اور تکیدات کا استعمال کیا جاتا ہے (تکید کے ساتھ ایفون یا بیروژ و افاح کا مقامی استعمال بھی مفید ہوتا ہے) یا عضواؤں پر لچاٹ لگانا جاتے ہیں، پھر جوں ہی پیپ

مدہ ایو اور سے ٹنگ لوشتر

مدہ بیو ریڈیٹ منٹ

مدہ ہانی پر سیا

مدہ انٹریو چیمبر

مدہ ہانی پر ہانی ان

مدہ ہانی پر ہانی ان

مدہ تکیدات سینک۔ فوس ٹی شن

مدہ بیروژ۔ افاح۔ بلا ڈونا

مدہ لنجہ۔ پولش

پیدا ہو جاتی ہے، اگر نشتر لگا کر پیپ خارج کی جاتی ہے۔ نشتر لگا کر اس طرح شکاف دینا چاہئے کہ پیپ اس مقام پر دوبارہ اکٹھی نہ ہو سکے، اور شکاف ایسے مقام پر ہو کہ پیپ وہاں سے باسانی بہ کر خارج ہوتی رہے مگر مقام شکاف پر تا زنی تقدیر کا اثر نہ پہنچنے پائے اور اس کی سمت ایسی ہو کہ عضو کے حرکت سے شکاف بند نہ ہونے پائے۔ اگر پھوڑے کا منہ (شکاف دیکر) ایسے مقام پر کیا گیا ہو جو نیچے کے فح پر نہ ہو تو مناسب ہے کہ زخم کے اندر انگلی یا سلائی (میشر) ڈال کر اسے پھوڑے کی دیوار کو دبایا جائے۔ یہاں تک کہ سلائی یا انگلی جلد کے نیچے او بھری ہوتی معلوم ہو۔ اور یہ مقام پھوڑے کے اصلی مقام سے نیچے ہو۔ اس جگہ دوسرا سوراخ شکاف دیکر بنا دیا جائے تاکہ پیپ باسانی خارج ہوتی رہے (جب پھوڑا گہرائی میں نازک اور خطرناک مقامات پر واقع ہو ر خراجات غائرہ) تو اس میں طریقہ جَلْطُون سے شکاف دینا مناسب ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ پہلے صرت جلد اور سطحی ساختوں کو قطع کیا جائے۔ پھر پھوڑے کے جرت میں نا صوری یا معمولی چمچی (ملقطہ) یا صوری معمولی ملقطہ غیار (داخل کر دی جائے۔ اب جبکہ چمچی کو کھول کر چڑا کیا جائے گا تو اتنا بڑا سوراخ نمودار ہو جائے گا کہ اس میں انگلی یا ربر کی ٹکی را نبوبہ (تقریباً) اخراج رطوبت کے لئے داخل کی جاسکے۔ پھوڑے میں شکاف دیتے وقت دافع تعفن وسائل اور مہارت عفونت کے لئے نہایت سخت احتیاط برتنا چاہئے، کیونکہ اگرچہ پھوڑا میں جراثیم پہلے ہی سے موجود ہیں تاہم یہ ضروری ہے کہ دوسرے تازہ جراثیم

۱۔ سکندری کٹائی نیشن۔

۲۔ سلائی۔ میشر ہر دوپ۔


۳۔ ڈیپ ایلس۔

۴۔ طریقہ جَلْطُون۔ فہن سے تھنڈ

۵۔ ملقطہ نا صوری۔ سائی نس فار سپس۔

۶۔ ملقطہ غیار۔ ڈر سنگ فار سپس۔

۷۔ را نبوبہ تقریباً۔ ڈرسے پنج ٹیوب۔



(۱۵) پاؤں کا غائر انامشیخو جید اس حالت میں پاؤں کو گھٹنے سے اوپر کاٹنا چاہئے۔
اور شریان مابعض بحالت ہمایست اور متحرک باقی جاتی ہے۔



(۱۶) دیوار شکم کا درم بنایا (سفر دی)

داخل نہ ہوں اور انکے اثر سے مخلوط عدوی نہ پیدا ہو جائے جس کی موجودگی عمل الحام میں تاخیر پیدا کر دیتی ہے +

اگر پھوٹے میں سڑے ہوئے مکڑے (افسارخ و تا کلات) موجود ہوں تو انکو خارج کر دینا مناسب ہے، اور جب پھوٹا اندر سے کھوکھلا ہو جائے یا جب اسکا جوف بہت بڑا ہو تو اس کے اندر اونگلی ڈالکر ٹوٹا چاہئے، اگر اس کے اندر کی انقباضی ساختوں یا ڈوروں اور ریشوں کو راجن میں غن کی موٹی رگیں بھی موجود ہو سکتی ہیں) بالائیز و تفریق بے احتیاطی سے نہیں توڑنا چاہئے +

مندرجہ بالا عمل (شکاف و اخراج مواد) کے بعد اب اگر کسی قسم کے عوارض (مثلاً سڑی ہوئی ہڈی وغیرہ) موجود نہیں ہیں تو بس یہ ضروری ہے کہ اخراج طوبت کا مناسب انتظام کر دیا جاوے اور زخم میں مخلوط چھوت (مخلوط عدوی) نہ پیدا ہونے دی جاوے۔ اخراج طوبت کے لیے ربڑ کی یا سٹیشہ کی ٹنگی زخم کے اندر رکھی جاتی ہے، یا کپڑے کی جچی داخل کرنا چاہئے۔ مخلوط عدوی کی روک کے لئے نہایت احتیاط کے ساتھ دیار کی ہونی غیر عفنی (مطہر) یا دافع عفونت (غبارت و بنش) زخم پر لگانا چاہئے یا پھوٹے کے جوف کے اندر جا لیدار باریک اور ملایم کپڑے (روشام) کی بٹی مثل بنش (زانی صدی) کے شیرہ میں بھگو کر بھر دینی چاہئے۔ عموماً پہلے چوبیس گھنٹے میں بہت خون ضائع ہوتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ عروق شعریہ نرم ہوتی ہیں۔ اور پھوٹے کی دیوار سے تناؤ یکایک دود ہو جاتا ہے، مگر یہ خطرناک نہیں ہے۔ کیونکہ خون خود بخود بند ہو جاتا ہے یا معمولی دباؤ کے اثر سے ٹک سکتا ہے قاعدہ ہو

۱. کمند انگلشن	۲. دسام۔ گاز۔
۳. اسلٹ	۴. شیر و نل بنش۔ آیوڈ فارم ایشن۔
۵. اوٹے ٹرن	۶. کپڑے۔
۷. غبارت۔ ڈرنک۔	

کہ جب پھوڑے کی رطوبت ایک دفعہ خارج کر دی جائے تو پھر پیپ نہیں بنتی بشرطیکہ خارجی آلائش (مخلوط مدوی) داخل نہ ہوتی ہو، اور جو رطوبت نکلتی ہے وہ محض مانی کپانی میسی ہوتی ہے، زخم جلد بھر کر اچھا ہو جاتا ہے، اور یہ سب باتیں اس امر کے باوجود واقع ہوتی ہیں کہ کچھ عرصہ تک جراثیم بھی زخم کے اندر موجود رہتے ہیں۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ مقامی سائنٹ پیدا ہو جانے کے باعث جراثیم نشوونما نہیں پاتے ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر غیر عضوی حالات قائم رکھے جائیں تو ایسا پھوڑا بھی جس کے اندر پہلے گندہ اور بدبودار پیپ ہو، اچھی رفتار سے سنبھل ہو جاتا ہے، اور اگر اس پھوڑے کا تعلق شکم یا امعاء سے قائم نہیں ہے تو چند ہی روز کے عرصہ میں اس کے مواد سے بدبودار ہو جاتی ہے۔

اگر شکات دینے کے بعد بھی کسی پھوڑے سے مسلسل پیپ آتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا منہ بہت چھوٹا ہے یا یہ کہ مواد کسی تیلی میں بند ہے۔ یا یہ کہ اس میں مخلوط مدوی پیدا ہو گئی ہے، یا گاہے یا اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ مریض کی قوت حیوانیہ اس قدر ضعیف ہو گئی ہے کہ صحیح التھام کا قائم ہونا مشکل ہو گیا ہے، یا یہ کہ عضواؤں آرام و سکون سے نہیں کھا گیا ہے۔ پھوڑے کے کامیاب علاج کے لئے ضروری عناصر یہ ہیں: رطوبت کا بہ آسانی خوب خارج ہونا، مریض کی عام صحت میں اصلاح کرنا، عضواؤں کو آرام و سکون سے رکھنا، لہذا اگر پھوڑے کا شکات یا منہ چھوٹا ہے تو اسے چوڑا اور بڑا کر دینا چاہئے، اگر پھوڑے کے جوف میں چھوٹے چھوٹے کیسے بگنے ہیں تو ان کو کھوکھلا کر خارج کر دینا چاہئے، اور اگر ضرورت ہو تو ایک شکات

دیگر دوسرا مقابل سورخ بنا دینا چاہئے۔ نقیہ اور کم طاقت مریضوں کو جن کا زخم جلد مندمل نہ ہوتا ہو بعض اوقات تبدیل آب ہوا گئے لیے ایسے مقامات پر بھیجنے ضروری ہوتا ہے جو سمندر کے کنارے پر واقع ہوں تاکہ زخم بھر جائے +

خراج مزمن صدیدی

تعریف۔ یہ پیپ کا وہ مجموعہ ہے جو تبدیل آب اور آہستہ آہستہ بنتا ہے اور جس کے بننے میں شدید التهاب کے علامات ظاہر نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے اسے اکثر خراج بار دیا خراج دموی بھی کہتے ہیں۔

اسباب۔ ۱۔ بیشتر یہ مادہ سلیہ (درنہ) کے باعث پیدا ہو جاتے ہیں۔

۲۔ بعض اوقات یہ سلعہ اریک کی تحلیل سے پیدا ہو جاتے ہیں۔

۳۔ بعض اوقات کمزور جراثیم صدیدیہ کے عدوی سے پیدا ہو جاتے ہیں

۴۔ بعض اوقات مزمن قیح الدم کے باعث پیدا ہو جاتے ہیں +

ظواہر مرضیہ (علامات) یہ خواہ مادہ سلیہ کے باعث ہوں یا سمندر جب بالا

دیگر وجہ سے، انکے علامات و ظواہر بہر حال یکساں ہوتے ہیں اور وزن کے

بیان میں تفصیل درج کیے جائیں گے۔ مگر ان دو صورتوں میں ایک نمایاں فرق یہ ہے

کہ خراج صدیدی مزمن کی ویداروں میں جو جھلی استر کرتی ہے وہ محض اندر ٹیمہ کی

ایک پرت ہوتی ہے جو کم بیش مؤثر باعث تحریک ہوتی ہے، مگر خراج سلی

مزمن میں اس جھلی کے اندر زندہ مادہ سلیہ موجود رہتا ہے +

۱۔ خراج مزمن۔ کراٹک ابس

۲۔ خراج بارو۔ کولٹا ابس

۳۔ خراج دموی۔ پنچسٹو ابس

۴۔ نیوورکوس۔

۵۔ سلعہ اریک۔ گرے نیو لومیتا۔

۶۔ پا یو جے نک بیکٹیریا۔

۷۔ کراٹک پانی میا۔

لہذا تم اول کے علاج میں صرف ایک سادہ شگاف، غیر عضوی وسائل کے ساتھ لگا دینا کافی ہوتا ہے۔

مگر تم دوم (خراج سلی نرمن) میں شگاف کے بعد مادہ ملیہ کی ساخت کو بھی چھ رملعہ (یا اور کسی ذریعہ سے کھرچنا رکھتے) اور صبا کرنا چاہئے۔

مجرئی اور ناصو

جب کوئی خراج عادی نرمن، پھوٹنے یا کھولے جانے کے بعد پوری طور سے مندرجہ ہو اور ابتدائی مقام مرض اور باہر سے تعلق قائم ہو جائے، تو اندر اورد باہر کے اس سلسلہ اتصال کو مجرئی یا ناصو (مجرئی، نالی) کہتے ہیں۔

مجرئی یا خجیب۔ انگوڑا ریکہ اسے استر کیا ہوا وہ تنگ راستہ ہے جو انجہ کے اندر نفوذ کیے ہوئے ہوتا ہے، اور جس کا ایک سہ ردا نامہ بند ہوتا ہے اور دوسرا کھلا ہوا۔ اس کی رطوبت گاہے پیپ دار ہوتی ہے اور گاہے محض مانی ناصور۔ وہ پیدا آئشی یا آکتابی، غیر طبعی اخلت ہے جو دو جوفوں کے درمیان یا ایک جوف اور دوسری خارجی سطح کے درمیان واقع ہو۔ یہ حالت جب کسی صمدی خراج کے غیر مندرجہ رہ جانے کے باعث پیدا ہو جاتی ہے، تو ناصور کی دیواروں کا بیرونی حصہ یعنی نرمنی ساخت سے بنتا ہے، اور دیواروں کا اندرونی حصہ تقریباً بیچ انگوڑی تہ سے بنتا ہے۔ لیکن اگر خراج سلی مرقم کا ہو، تو اندرونی تہر میں مادہ سل کے ادبجار بھی موجود ہوتے ہیں، اگر ناصور کی نالی چھوٹی ہے تو اس کی دیوار پر بشرہ لگا استر چڑھ جاتا ہے اور جب یہ حالت ہو تو ناصور کے طبعی طور سے

ملاکت۔ اسکریننگ۔

مجرئی۔ نالی نرمن۔

مناصور۔ نچولا۔

منا غایبر کسکلیٹریشل ٹشو

منا بشرہ۔ اپنی تعلیم

مسدود ہونے کا امکان نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ بشرہ دور نہ کر دیا جائے۔ اور اس سے سطح کو آزاد نہ کر دیا جائے +

جیبُ اور ناصور کے نہ بھرنے کے اسباب۔ اکثر ناصور اور جیب کے مندمل ہونے میں سخت دقت واقع ہوتی ہے اور اونکی نالیاں کھلی اور غیر مندمل رہ جاتی ہیں، جس کے اسباب مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) کسی دیرپا یا نہ منہیج کی زخم کی گہرائی میں موجودگی، مثلاً کپڑے کا ٹکڑا گرہ یا ٹانگوں کی تانت در و ترالتر کا ٹکڑا رجو جذب نہ ہر سکا کسی عمل جراحی میں استعمال کیا ہوا ریشم کا ڈورا یا چاندی کا تار، یا کوئی بری ساخت جیسے سٹری ہوئی یا مرادھی کا ٹکڑا (ربہ) +

(۲) مواد ہتھکے کسی غیر طبعی راستہ سے نکل کر مقام ماؤف میں خراش پیدا کرنا جیسے پیشاب، پاخانہ، یا گندہ پیپ +

(۳) زخم کے کسی گہرے جوف سے مواد کا کافی طور پر خارج ہونا، جس سے کہ زخم میں ہمیشہ کچھ تناؤ قائم ہے +

(۴) عضو ماؤف میں آرام و سکون کا نہ ہونا۔ جس کی دو صورتیں ہیں (۱) حرکات ارادیہ کی وجہ سے جیسے کہ ہاتھ پاؤں کی حرکت (۲) غیر ارادی حرکات کی وجہ سے۔ جیسا کہ اس وقت ہو سکتا ہے۔ جبکہ ناصور مقعد میں ہو۔ جس میں ہزار کے وقت ہمیشہ حرکت ہوتی رہتی ہے +

(۵) ناصور کی دیوار میں مادہ سل (دون) سے عدوی پیدا ہونا، یا ناصور کی گہرائی میں مادہ مذکور کے رداسب کا ہونا +

۶) ناصور کے اندر یا اس کے کنارے پر بشرہ کا بڑھ کر پھیل جانا +

سل رداسب۔ ویپارٹ۔

سل و تراہر کیٹ گٹ۔

(۷) ناصور کے گرد و بیزار سخت ریشہ دار ساخت کا ہونا +

(۸) صنعت قوی بدنیہ۔

ناصر کا دمانہ بعض اوقات نیچے دبا ہوا نظر آتا ہے۔ یا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دمانہ کے ارد گرد درطوبات کا انصباب و ترشح زیادہ ہوتا ہے جس سے وہ مقام پھول جاتا ہے، لیکن جب آس پاس کا حصہ تندست ہو تو دمانہ تھوڑا سا شکر جانا ایک اچھی علامت ہے۔ جب اندر کوئی خارجی شے داخل ہو کر رگنی ہو یا جب مٹری ہوئی ہڈی موجود ہو، اس وقت ناصر کا دمانہ اکثر ابھرے ہوئے انداز بحیثیت نظریہ سے گھرا ہوا پایا جاتا ہے +

علاجہ۔ جب ناصر کے علاج میں ابتدائی اصول یہ ہونا چاہئے کہ سبب مرض کو دفع کیا جائے۔ تنگ راستہ کو پھیلا کر چوڑا کر دیا جاوے یا اس میں شکاف دیکر بڑا کر دیا جاوے تاکہ زخم کے اندرونی اور گہرے حصہ تک آسانی ملے ہو سکے اور اگر کوئی خارجی شے دماں ہو تو وہ نکالی جا سکے یا اگر جوف گہرا ہو تو اس میں سپ باسانی خارج ہو سکے + اکثر حالات میں ناصر کے نچلے حصے کے مقابل شکاف دیکر ایک دوسرا سوراخ بنانا کافی ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے مواد ناصر باسانی خارج ہوتے رہتے ہیں۔ علاوہ ان میں مقام ناف کو مہر کرنے کے لئے خالص حامض قطرائی یا جست اخضر آمیزہ مضمحل ایک اوقیہ میں بھی استعمال کیا جائے اس کے بعد زخم کو مناسب چیزوں سے بھر دیا جائے۔ اور عضو کو آرام و سکون سے رکھا جائے اور حس و حرکت نہ دی جائے۔ مزید برآں مریض کی عام صحت

۱۔ جست اخضر آمیزہ کھورائٹ آف زنگ

۲۔ قہہ گرین۔

۳۔ اوقیہ ادس۔

۱۔ انداز بحیثیت نظریہ { نئے ٹنگ گئے پٹن
ارکیہ نظریہ

۲۔ حامض قطرائی۔ کاربالک ایسڈ

کی اصلاح مقویات سے کی جائے۔ گاہے معمولی گول پٹی رصاہہ درجہ ۱ بانہ دینے سے عضومیں کافی دباؤ پہونچکر اس کی حرکت بند ہو جاتی ہے۔ یا ایک مکڑی کی تختی (رجیٹر) بانہ کر عضو کو ناقابل حرکت بنا دیا جائے +

نہایت کارگر اور کامل طریقہ علاج یہ ہے کہ جیب یا ناصورہ شگاف دیگر بخوبی کھول دیا جاوے، پھر اسکو خوب کھرج کر تمام انگور کے دانے جو استر بنا رہے ہوں توڑ دیے جائیں یا ان کو تیز بات وادیہ کا دیہ سے) جلا دیا جائے اور ارد گرد کی سخت ساخت کو کاٹ دیا جائے۔ اس کے بعد نائے لگا دے جائیں۔ یا زخم میں دسام (بتی) بھر دیا جائے۔ تاکہ انگور بند زخم گہرائی سے بھر آئے +

اگر ناصورہیں بشرہ کا استر ہو جائے تو اس کے کناروں کو (پنچی سے) چٹا دینا چاہئے، اور سوراخ کو بند کرنے کے لئے کوئی مناسب حال عملیت تریق اختیار کیا جائے +

ناصورہ کے علاج میں تلقیحات سے بہت اچھا اثر ہوتا ہے، اور بالخصوص جب مرض تھج الصد کے بعد ناصورہ جانیں تو اکثر ہلاک کردہ کروئیہ ذات الرینہ کی ایک ہی پکاری (جس میں ہر دوڑے) اگر وٹیک جراثیم ہوں) کارگر ہو جاوے گی۔ نواصیر سلیبہ جیسے کہ اکثر گردن کے غد کے عمل جراحی کے بعد رہ جاتے ہیں، اگلے صرین کی پکاریوں سے اچھے ہو جاتے ہیں لیکن اگر مردہ ہڈی یا نقل حرکت

مٹ پائی میا۔

مٹ نیمو کوکس۔

مٹ درمین۔ ٹیوبر کوکس۔

مٹ عصابہ درجہ۔ رار بنڈج۔

مٹ جیرو۔ مکڑی کی تختی۔ اسپلٹ

مٹ عمل تریق۔ پلاسٹک آپریشن۔

مٹ اپنی تھیلیم۔

کے باعث زخم مندمل نہ ہوتا ہو تو ایسی حالت میں تعلیقات کے استعمال سے حصول کامیابی کا چنداں امکان نہیں ہوتا +

عرصہ تک تقيج قائم رہنے کے نتائج

جب کسی خراج، حاد یا مزمن، صمدی یا ذوقی، کا غیر عفونی وسائل سے علاج کیا جاتا ہے تو پیپ بہ سرعت بند ہو جاتی ہے۔ اگرچہ یہ ممکن ہے کہ زخم مہینوں تک مندمل نہ ہو اور صرف رطوبت مائتہ جاری رہے ایسی حالت میں عمومی عوارض و علامات ظاہر نہ ہونگے۔ بشرطیکہ کوئی دوسرا مرض موجود نہ ہو۔ نہ بخار ہوگا اور نہ عام صحت خراب ہوگی۔ لیکن اگر خراج دردی کردیا تو صمدیہ سے ملوث ہو جائے یا اگر کردیات صمدیہ کے پھوٹے میں مخلوط عدوی واقع ہو جائے، تو پیپ جاری رہتی ہے یا دوبارہ موجود ہو جاتی ہے، ازاں بعد بخار مختلف درجہ کا پیدا ہو جاتا ہے۔ جب یہ حالت کسی وسیع یا گہرے پھوٹے میں واقع ہو تو مواد کی مقدار بہت زیادہ آگے لگتی ہے، بہت شدید بخار ہو جاتا ہے۔ احتشاش میں خطرناک تخیلات نمودار ہو جاتے ہیں، اور گاہے قسم الدم او ضعف قوی کے باعث مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔ دیر پا اور سلسل تقيج کا قائم رہنا یا مڈار عدوی کی علامت اور منجلہ امن عوارض کے جو اس کے باعث پیدا ہو جاتے ہیں۔ دو عوارض (حمی ذوقیہ اور احتشاش کا مرض شخی) مخصوص طور پر قابل تذکرہ ہیں +

حمی ذوقی کی تعریف یوں ہو سکتی ہے کہ وہ ایک مزمن قسم الدم ہے جو سینہ کی خفیف مقدار کے مسلسل جذب ہوتے رہنے سے پیدا ہو جاتی ہے، اور مزمن عروہ کی کسی حالت میں نمودار ہو سکتی ہے، مثلاً ہڈیوں اور جڑوں کے حاد یا مزمن


۱۔ حمی ذوقی۔ کن ملن نیور۔

۲۔ مرض شخی۔ فاروے سس ڈیزیز۔

۱۔ دیر پا کوکائی۔

۲۔ کسہ اششن۔

۳۔ دوسرا۔



(۱۳) گزده کا مرض شحمی دور اول میں

(الف) طبعی عروق شمریہ (ب) شحمی عروق شمریہ (ج) شحمی بشرہ عنایت
 گزده کا (چ) شحمی بشرہ کھاد گزده کا (د) روغنی نقتے عروق شمریہ کی دیوار پر
 دلا (بشرہ کے آزاد شحمی کرات (و) بشرہ کے ڈھیلے شحمی کرات (ز) غلبہ زنجیر
 دہن سے سانپ بننے ہیں (ح) شحمی سانپ قطع کیا ہوا۔ (ط) شریان شحمی۔ (ی)
 شحمی عروق شمریہ (ک) بیج داخل کا ترشح سفید دافن سے (ل) کرات مستحضر
 (سفید دانے) انبوہ بولیکے اندر

امراض تشنج کے بعد پھیپھڑوں کے مرض سل میں، مزمن آتشکی یا سرطانی تقرح میں حتیٰ دق کی متاثر خصوصیت یہ ہے کہ حرارت روزانہ تیز ہو جاتی ہے اور یہ تیزی دوپہر کے بعد یا شام کے وقت ہوتی ہے اور اس وقت چہرہ سرخ ہو کر تھلنے لگتا ہے (حرمت) دقیقہ جو رخساروں پر نمودار ہوتی ہے (آنکھوں میں تیزی اور چمک پیدا ہو جاتی ہے، پٹیلیاں چوڑی ہو جاتی ہیں، اور مریض اپنے تئیں اس وقت زیادہ قوی اور بہتر پاتا ہے۔ لیکن نبض صغیر و ضعیف اور سرخ ہو جاتی ہے۔ معمول کے نسبت اس کے ضربات دس یا بیس زائد ہو جاتے ہیں۔ یہ حالت زیادہ رات گزرنے تک جاری رہتی ہے اور اس عرصہ میں بخار تیز ہو کر چار یا پانچ درجہ بڑھ جاتا ہے۔ علی الصباح بخار اسی سرعت کے ساتھ اتر جاتا ہے جس سرعت سے وہ پہلے چڑھا تھا اور اکثر معمولی درجہ پر بلکہ گاہے معمولی درجہ سے بھی نیچے گر کر کم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پسینہ بہت آتا ہے جس کے سبب سے مریض کو بہت ضعف لاحق ہو جاتا ہے۔ ہر روز یہی حالت جاری رہتی ہے، اور مسلسل بخار اور پسینہ کے باعث مریض بہت جلد نایاب طور پر ڈبلا ہو جاتا ہے۔

مرض نشانی۔ مزہلکی یا شیمی جو مختلف اعضاء میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ حالت ہے جو دوران خون میں کمی مرکبات کے پہونچنے اور گردش کوٹنے سے پیدا ہو جاتی ہے، جن کے اثر سے پہلے تو شرائین صغیر کی دیواریں اور اناں بعد

ماہ مرض نشانی۔ امی لائڈ ڈیٹیز۔	ماہ حرمت و قیہ۔ کھنک فلش
مرض زلالی۔ ایسوی نائڈ	ماہ نبض صغیر اسمال ہیں۔
ڈیٹیز	ماہ نبض ضعیف۔ کمپرس ایبل ہیں۔
ماہ مرض شیمی۔ لارڈ کے سیس ڈیٹیز۔	ماہ نبض سریع۔ کوئیک ہیں۔

بعض اعضاء کا مادہ حیاتیات ایک قسم کی مومی ساخت میں مبتدل ہو جاتا ہے، یا
 اوس میں اس مومی ساخت کا ترشح ہونے لگتا ہے۔ اس مومی ساخت سے
 ششہین نامی خلاصہ نکل سکتا ہے۔ جو مادہ لحمیہ کے قسم سے مگر ناقابل ذوبان
 ہوتا ہے۔ اس مرض کا نام نشانی ایک بالکل نامنزلوار لقمہ ہے کیونکہ ششہین
 نشاستہ سے بالکل مماثل نہیں ہے بلکہ وہ ایک مومی تشابہ الاجزاء شے ہے جو
 صبیغ بنفشین کے لگانے سے گدے بھورے رنگ کی ہو جاتی ہے اور اس کے
 بعد اگر اس میں تیزاب گندھک لگا دیا جاوے تو اس کا رنگ سیاہی و دات کے
 مانند نیلا ہو جاتا ہے۔ اگر نشانی مواد میں خشبین بنفشی لگایا جاوے تو اس کا رنگ
 شخ یا قوت احمر کی طرح ہو جاتا ہے، بخلاف ازیں خشبین بنفشی معمولی طبعی ساختوں
 پر لگایا جائے۔ تو اوس کا رنگ اودا یا نیلا ہو جاتا ہے۔ کبد، طحال، گردے اور
 اور امعاء کے خل یہ سب اعضا بالخصوص مرض مذکور سے متاثر ہوا کرتے ہیں۔
 کبد (جگر) مرض نشانی کے باعث ہمواری کے ساتھ بڑے کر حجم میں ہیت بڑا
 ہو جاتا ہے اور اکثر بچوں میں پہلی سے شروع ہو کر نات تک بلکہ اوس سے
 بھی بچے پہنچ جاتا ہے، اوس کی ساخت ربر کی طرح سخت ہو جاتی ہے اور
 نہیں ہوتا، اور قطع کرنے کے بعد موم نما نظر آتا ہے فضیضات یعنی کبد کے
 چھوٹے لوتھڑوں کی درمیانی شرائین صغیرہ اور عروق ششہین میں پہلے تغیر شروع

۱۔ سلفیورک ایسڈ
 ۲۔ خشبین بنفشہ جی تیل داؤٹ۔
 ۳۔ خل امعاء۔ دلالی آف انشان
 ۴۔ ربر
 ۵۔ مطلق
 ۶۔ لوتھڑوں

۱۔ پروٹوپلازم۔
 ۲۔ ششہین۔ لارڈے سین۔
 ۳۔ مادہ محمد۔ پروٹید۔
 ۴۔ تشابہ الاجزاء۔ ہیموجے نس۔
 ۵۔ ششہین آف ایوڈین۔

ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ تبدیلی خود جگر کی ساخت (خلیات) میں ہونے لگتی ہے۔ اس تبدیلی کا قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جگر کا وہ فعل جس کا تعلق بکونین شکر (شکر بنانے) اور بکونین صفراء سے ہے مختل ہو جاتا ہے، جس کے باعث باغضمہ کے عمل میں اور خصوصاً ٹیچی مرکبات کے انجذاب و تحلیل میں غرابی واقع ہو جاتی ہے، اگرچہ اشتہابہ ستور قائم رہ سکتی ہے۔

گروے۔ بھی اسی طرح بڑھ جاتے ہیں۔ یہ تغیر شرایین صغیرہ سے شروع ہوتا ہے جہاں آخر عنایتہ کلیہ میں منتہی ہوتی ہیں۔ لیکن عروق شعریہ اور انابیب کا بشرہ بہت جلد بسترلا ہو جاتا ہے۔ چونکہ مجری البول کی نالیوں سے تلف و فنا کے باعث ترشح کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اس لئے اس درجہ میں پیشاب بھی بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے اور اس کا رنگ پھیکا اور شفاف ہوتا ہے اور اس میں مجری البول کی تھیلی کے شفاف قسم کے ٹکڑے (قوائب زجاجیہ) اور ٹیچی خلیات بھی پائے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد جبکہ نالیاں اس تغیر میں بہ شدت بسترلا ہو جاتی ہیں تو پیشاب کی مقدار گھٹ جاتی ہے اور اس کا تھقل نوعی زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس میں مادہ بیضیہ (زلال) بہت کثرت سے پایا جاتا ہے +

طحال۔ حجم میں بڑھ جاتی ہے، لیکن ہمیشہ اتنا نہیں بڑھتی جتنا دوسرے احشاء بڑھتے ہیں۔ اس کی ساخت کے عنایتہ میں یہ فنا خصوصیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے +

۴۰ نقل نوعی۔ اسے سے نکال گے دیکھو

۴۱ البیومن۔

۴۲ عنایتہ۔ مال پی مین باؤیز۔

۴۳ عنایتہ کلیہ۔ گلوے رویائی۔

۴۴ باللائن کا سٹ۔

۴۵ ٹیچی خلیات۔ فیٹی سلز۔

خلل امعاء کے عودن شعریہ میں بھی شمی تغیر ہو جاتا ہے۔ عودن شعریہ سے خون کی ماہیت کا ترشح زیادتی کے ساتھ ہونے لگتا ہے، جس سے اسہال پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی باعث انجذاب اغذیہ میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو زیادتی ترشحات و اخراج فضلات کے باعث دویم قلت انجذاب غذا کے سبب مریض کی قوت بدرتج کم ہوتی جاتی ہے۔

جب احتشاش میں کس قسم کے تغیرات واقع ہو جائیں تو یہ ایک معتبر علامت اس بات کی ہے کہ بلاتامل عل بنراحی کر کے مرض کو خارج کیا جائے، البتہ اگر مریض کی عام حالت بہت ضعیف اور عمل جراحی کو برداشت کرنے کے قابل نہ ہو تو تاخیر و انوائجا مزید ہے۔ اگر قاحی مرض اکسی قسم کے عل جراحی (مثلاً حامض کو کاٹ کر خارج کرنے، یا عضو کو ایک دم قطع کرنے سے بہت مست و تابزد ہو سکتا ہو تو بہت ممکن ہے کہ اس قسم کے عمل کے بعد اعصاب و احتشاش کے نشانی عوارض بھی خود بخود بالکل دور ہو جائیں۔ لیکن ساتھ ہی کس امر کا خیال بھی ضرور رکھنا چاہئے کہ عوارض نشانیہ کے دوران میں گردوں میں ایسا خطرناک فساد واقع ہو جاتا ہے کہ تیز مطہرات و دافع تعفن ادویہ (مثلاً حامض قطرانی) جو خون میں جذب ہو کر پیشاب میں خارج ہوتی ہیں، اگر دلوں میں التهاب نہ پیدا کر سکتی ہیں اور ممکن ہے کہ یہ مہلک نتائج بھی پیدا کر دیں۔

نتیجہ و نام ویر پا پیپ کار بنالہ حضرت پوڑوں کو چیرنے کے بعد ہوتا ہو بلکہ دیرینی بہت سے دیگر حالات میں نمودار ہوتا ہے، جن میں سے ایک متاثر صورت عفونت دھن تعفن ملی ہے اسکا باعث عموماً وہ سقم ہے جسے تقیم اولیٰ رہی رہے کہتے ہیں اور جس میں دانتوں کی جڑوں کے گرد مسوڑھوں میں

نتیجہ و نام ویر پا پیپ کار بنالہ حضرت پوڑوں کو چیرنے کے بعد ہوتا ہو

نتیجہ و نام ویر پا پیپ کار بنالہ حضرت پوڑوں کو چیرنے کے بعد ہوتا ہو

ہرپن کے کیسٹہ بن جاتے ہیں اور یہ ایسے دانتوں میں عموماً ملتے ہیں جو گندے
سٹرے ہوئے اور سیل کیل سے بھرے ہوئے ہوں۔ زبان پر پیر پیری جی ہوتی
ہوتی ہے اور تنفس میں بد بو آتی ہے اس علاوہ کے باعث خطرناک نتائج پیدا
ہو سکتے ہیں۔ جبکہ باعث اول قریب ہے کہ ایسی حالت میں اثر اور جراثیمی میت
متواتر نہ سے لگی جاتی ہے۔ دویم یہ کہ مسوڑوں کے گہ جواڑا رانجیہ رانگور
زخم ہوتے ہیں اور دانتوں پر محبہ ہوتے ہیں۔ دو بھی جراثیم کو براہ راست
بذبح کر دیتے ہیں۔

(۱) جراثیم صدیرہ اور اونکے سمین ملحق سے نیچے اور تر کے معدہ اور معد
کی آغشیدہ غلیظہ پر مضراثر پیدا کر دیتے ہیں جس سے رطوبت معدیہ کی طبی قوت
دفع تفسن کم یا مٹا دیتی ہو جاتی ہے۔ اس میں مزید انتہا تب معدہ قروح معدویہ
قروح آٹنا عشری قروح عجیبہ نمودار ہو سکتے ہیں۔ علاوہ ان میں یہ بات بھی قابل لحاظ ہے
کہ انتہا تب زائدہ دویمہ کے مریضوں میں بھی آغشیدہ دانتوں کے خراب ہونے کے
باعث دہن کی گندہ عفونی حالت پائی جاتی ہے۔

انتباہ۔ اسی ضمن میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دہن زبان اور ہنڈہ

معدہ امعاء وغیرہ کے تمام اعمال جراحی سے پہلے اور ان کے بعد ہی دہن کو
مہترات اور دفع تفسن اور یہ سے خواہ احتیاط کے ساتھ ساتھ مہتمم
کر لینا چاہئے تاکہ نوٹ مددی کا خطرہ نہ ہو جائے۔

۱۔ آغشیدہ معدہ کیسٹہ شعلہ۔	۱۔ لگے نیوٹیشن۔
۲۔ قروح معدہ کیسٹہ لکھن۔	۲۔ پاؤں سے نکال دینا۔
۳۔ قروح آٹنا عشری۔ قروح عجیبہ۔	۳۔ رطوبت معدیہ کیسٹہ لکھن۔
۴۔ ہنڈی سالی شعلہ۔	۴۔ طبی قوت دفع تفسن۔ نیچرل انجی
۵۔ غش۔ آٹنا عشری۔	۵۔ سب تک پاؤں

(۲) عفونت دہن کے باعث تنفس کے راستے بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ اور التهاب قصبۃ الریه جس کے ساتھ پیپ و بلغم خارج ہوا پیدا ہو سکتا ہے، ایسی حالتوں میں اگر مریض کو داروئے یہوشی سنگھائی جائے تو تشش میں التهاب مقتضای ہوجانے کا سخت خطرہ ہوتا ہے۔

(۳) ایک خفیصت فقر الدم ثانوی قسم کو پیدا ہو سکتا ہے، جس کے خوردبینی استخوان خون و شمار اجزاء میں تیس لاکھ کے قریب قریب شیخ دانے ۶۰ سے ۷۰ فی صدی تک دُمین کی کمی ظاہر ہوگی اور کثرت بیضادات یعنی سفید دافوں کی زیادتی اوسط درجہ کی پائی جائے گی۔ گلبے فقر الدم زیادہ شدید و خطرناک قسم کا بھی پایا جاتا ہے جو فقر ضعیف سے بچائش ہوتا ہے۔ یہ بھی عالی از دیگر ہی نہیں کہانی، ایضا دم ر خون کا سفید ہوجانا، کے مرض میں اکثر قروح دہن ہی پائے جاتے ہیں کثرت بیضادات کی ایک ہلک شکل ”ایضاض دم“ ہے۔

(۴) دوسری بہت سی عام حالتیں ہیں عفونت دہن کے باعث پیدا ہو سکتی ہیں۔ مثلاً مسلسل سٹخاں و ماندگی کا رہنا و سرخ خفیت قسم کے وائیل التهاب عصب کے مختلف ظہور، کبھی کبھی نہایت شدید بخار، حمی متعویہ کے قسم کا بھی پایا جاتا ہے مگر جوں ہی دہن اور دانتوں کو احتیاط کے ساتھ سطر و صاف کر دیا جاتا ہے بخار بہ سرعت اتر جاتا ہے اور مریض شفا یاب ہو جاتا ہے مریض التهاب عظم

۱۔ ملوث۔ الفکٹڈ۔

۲۔ التهاب قصبۃ الریه۔ ٹریکیائیٹس۔

۳۔ التهاب تشش۔ پنومونیا۔

۴۔ وائیل۔ فرکیوٹوسس۔

۵۔ التهاب عصب۔ نیورائیٹس۔

۶۔ التهاب عظم۔ آسٹائیٹس۔

۷۔ التهاب تشش۔ پنومونیا۔

۸۔ وائیل۔ فرکیوٹوسس۔

۹۔ التهاب عصب۔ نیورائیٹس۔

۱۰۔ التهاب عظم۔ آسٹائیٹس۔

اور التهاب مفاصل ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ہڈیوں اور جوڑوں کا وہ مزمن مرض بھی جسے مرض عظمی مفصلی (رہی اور جوڑ کا مرض) کے نام سے آئندہ بیان کیا جائے گا۔ سہی مادہ کے مسلسل جذب ہونے سے پیدا ہو جاتا ہے۔

۲۔ ورم فلغمونی۔ التهاب خلوی

التهاب خلوی اسے پہلے فلغمون مناشراً کہا جاتا تھا (اس مرض کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اس پھیلے ہوئے التهاب (التهاب منتشر) کی علامتیں پائی جاتی ہیں جو جلد کے نیچے یا بیچ خلوی میں ہو۔ یہ مرض جراثیم شدیدہ (دیرپیک) سے ہوتا ہے۔ اور بالآخر اس میں سپ پڑ جاتی ہے یا گل کر اس سے تانکلات بنتے ہیں۔ اور ایک ویٹ حصہ بالکل مراد ہو جاتا ہے (غالغرایا)

اسباب۔ اس کا مخصوص سبب وہ جراثیم ہیں جو بیچ خلوی میں کسی طور پر داخل ہو گئے ہوں۔ مثلاً کسی عیلت جراحی کے زخم کی راہ۔ یا عارضی جلدی تفرق کی راہ۔ یا خیف خراش یا کانٹہ وغیرہ کے سوراخ کی راہ۔ گاہے یہ حالت ان گہرے جراثیمی زخموں سے بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جن کے مراد کے اخراج کا مناسب سامان نہ کیا گیا ہو۔ علی الخصوص اس حالت میں جبکہ اس شخص کی عمومی صحت خراب ہو۔ وہ بول زلالی یا فربہ بیٹس میں مبتلا ہو۔ یا وہ گندگی میں گھرا ہوا ہو۔ جہاں کہیں بیچ خلوی زیادہ ڈھیلی ہوتی ہے۔ التهاب کے علامات وہیں نمودار ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس پاس کے لمٹ مقابلت سے جراثیم جذب ہو کر

۱۔ ورم فلغمون مناشراً

۲۔ اسلفٹ

۳۔ بول زلالی۔ ایسوی فوریا۔

۴۔ انفکٹڈ۔

۱۔ التهاب مفصل۔ آرٹھرائٹس۔

۲۔ آسپیٹو آرٹھروڈیٹس۔

۳۔ ورم فلغمونی۔ فیک مونس انفلامیشن

۴۔ سلیمونائیٹس

یہاں چلے آتے ہیں۔ مثلاً رحم کے مرنے سے اکثر عورتوں میں اور
حلق کے قرح سے گردن میں التهاب غوی ہو جاتا ہے +

جراثیم۔ التهاب غوی میں زیادہ تر کرویات عقدیہ صدیہ یہ پاسے جاتے
ہیں۔ علی الخصوص جبکہ التهاب پھیل رہا ہو + لیکن بعض مقامی التهابات غویہ میں
کرویات عقدیہ صدیہ یہ بھی جوتے ہیں۔ اسی طرح شدید خطرناک انتہام فلغزانی
میں عموماً اسے اوزیباویہ جدیدہ سبب مریض ہوتے ہیں۔ اور اس وقت اس کی
حالت اس مریض سے مشابہ ہوتی ہے۔ جبکہ غانغریا مغربیہ یا غانغریا ریجیہ
عاودہ کہتے ہیں +

علاعات۔ مضمون اور سیت جراثیم کے لحاظ سے اس کے علامات
فحشہوت جوتے ہیں۔ جراثیم اس کے نتائج مقامی نشی سے لیکر شدید ترین غانغریا
سامیرہ تک پہنچے جاسکتے ہیں۔ اور درجہ کے حالات میں جبکہ کچھ چھٹنے یا
خرامش لگنے کے بعد جراثیم کا مرکز ہو گیا ہو۔ علی اعموم دو تین روزوں کی علامت
کا ظہور نہیں ہوتا ہے۔ اور اس مقدمہ میں التهاب کی طبیعت علامات ظاہر ہوتی ہیں
اور وہ کسی قدر نازک اور دردناک ہو جاتا ہے +

مریض کی عیوضت۔ اگرچہ کسی قدر فحشہوتی ہوتی ہے۔ مگر وہ اپنا کام جاری رکھ
سکتا ہے۔ لیکن ناخوردہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کچھ تو اسے درد
ہوتا ہے۔ اور کچھ اس کی عیوضت خراب ہو جاتی ہے + کم و بیش بخار تقریباً

۱۔ غانغریا صدیہ۔ انفکاد لنگرین۔	۲۔ جراثیم مریض۔
۳۔ غانغریا ریجیہ عاودہ ایکوٹ۔ غانغریا ریجیہ	۴۔ اسٹریپٹوکوکس باکٹیریا۔
۵۔ مقام نتیجہ۔ سائٹ آف اناکولیشن۔	۶۔ اسٹریپٹوکوکس پیو جنس۔
۷۔ غانغریا سامیرہ۔ اسپرڈنگ لنگرین۔	۸۔ بیسیل آڈی۔ سے شش لنگرین۔

ہمیشہ ہوتا ہے۔ شدید صورت میں ایک دو مرتبہ لرزہ بھی آتا ہے اور گا ہے
حرارت طبعی حالت سے گھٹ بھی جاتی ہے۔ جس کی وجہ خون کا زہر بڑھا ہوا
ہے (تسم دم) ہے۔ مقام مرض گرم۔ نازک اور رطوبت سے تر ہوتا ہے۔ اگر وہ
سلیجی ہے تو سنج اور سو جا ہوا نظر آتا اور چھوٹے میں سخت رہا ہوا محسوس ہوتا ہے
بعض حالات میں التهاب کے دیگر مظاہر کے ساتھ مقامی طور پر اخراج خون ہوتا
ہے۔ یا دماغ خون کے دہنے پڑ جاتے ہیں۔ مرض کی رفتار کا دار و مدار زیادہ
تماہیر و علاج پر ہوتا ہے۔ اگر کھلے دل سے وہاں شگاف دیے جائیں۔ تو التهاب
رُک جائے گا۔ اور انتہام کا عمل جلد شروع ہو جائے گا۔ خواہ وہاں پیپ پڑ چکی
ہو۔ یا نکات بگنے ہوں۔ ہاں اگر سمیت زیادہ شدید ہو۔ یا مریض کی قوت مقابلہ
کمزور ہو۔ یا متورم حصہ کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا گیا ہو۔ یا صرف لُجھ دیا گیا ہو۔
تو التهاب علی العموم تیزی سے پھیل جاتا ہے۔ اور وہاں کی ساخت کا بیشتر حصہ
فاسد ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں دزد کی شدت۔ بیداری کا ہے ہیان سمیت
کا بخار (حمی تکی) جس سے مریض جلد نڈال ہو جاتا ہے۔ بالآخر پیپ پڑ جاتی
ہے۔ لیکن علی العموم اس کی رفتار تیز نہیں ہوتی۔ لیکن گردن سے مقامات میں
بعض اوقات درم کی سختی اور جو داسی طرح عرصہ تک قائم رہتا ہے۔ اس سے یہ
اندازہ کرنا دشوار ہوتا ہے کہ آیا پیپ پڑ گئی ہے یا نہیں۔ گاہے جلد کے نیچے کی
ساخت (سُج خلوی) جس میں مواد کا ترشح ہوتا ہے۔ اندر سے گل جاتی ہے۔ اور
جلد کے نیچے ایک پھیلا ہوا شقاق قلوں (مردہ حصہ) ہو جاتا ہے۔ اور اوپر کی جلد تو
چند مخصوص حصوں کے صحیح و تندرست ہوتی ہے۔ اسی لئے اس حالت میں جلد

۱۔ نافض۔ لرزہ۔ ریگہ۔

۲۔ پولٹس۔

۳۔ ڈیبریم۔
۴۔ حمی تکی۔
۵۔ نکات۔

اور غلافٹ غائرہ کے درمیان و در تک سبب رسانی و داخل ہو جاتی ہے گے
التهاب عضو کے ایک حصہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ اور مرکز التهاب
مقام تلیق سے دور تر تہی پاتا ہے۔ اور مقام تلیق محض خفیف طور پر متاثر ہوتا ہو
یا اس میں عروق جاذبہ کے شدید التهاب کی علاماتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ
یہ ہوتی ہے کہ عروق جاذبہ کے ذریعہ اس مقام کے جراثیم یا ان کی سمیت منتقل
ہو کر گی دوسرے مقام میں رگ جاتی ہے۔ گاہے یہ مرض سچ خلوی کے گہرے
مقامات میں اور بذاتِ خاص عضلات میں پھیل جاتا ہے۔ جس میں گاہے پیپ
پڑ جاتی ہے۔ یا وہ مقام سڑ جاتا ہے۔ ان شدید حالات میں عمدی تعفن الدم
یا تلیق الدم کا اندیشہ ہوتا ہے ۔

علاج۔ اگر اعمال جراحیہ یا عارضی جراحات میں قواعد نظہیر و پاکیزگی
کا پورا خیال رکھا جائے۔ تو عمدی فلغمونی نہیں پیدا ہونے پاتی ہے۔ خماش اور
کھلے ہوئے معمولی زخموں کی بھی ہمیشہ نگہداشت رکھنی چاہئے۔ ان زخموں کو
مطہر کرنا چاہئے جو اندر تک نفوذ کیے ہوئے ہوں۔ خصوصاً جبکہ مریض کپٹنے خاص
میشہ۔ یا اگر دوپٹل کے حالات یا نوعیت زخم کی وجہ سے خاص طور مددی کا
اندیشہ ہو۔ جب التهاب کے علامات نمودار ہو جائیں تو کمادات مطہر و مثلاً نچریا
تکسید برفی کے استعمال سے التهاب پھیننے سے رگ جاتا ہے۔ اس حالت
میں آنتوں کے فعل کو تحریک دینی چاہئے رگمین اسعادم اور عام صحت کا خیال

۱۔ ڈیپ فیشیا۔	۲۔ پانی سیا۔
۳۔ سبب پر دہ۔	۴۔ فوسٹے مشنر
۵۔ التهاب جاذبات۔ یعنی جاتی ٹس۔	۶۔ بوریک فوسٹے ٹس راور
۷۔ سپٹی میا۔	۸۔ پولٹس۔

رکھنا چاہئے۔ اگر وہاں پیپ پیدا ہو جائے یا پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو عضو کے طول میں آزادی کے ساتھ کشادہ شکاف سختی کے مقام میں دہنا چاہئے تاکہ وہاں سے رطوبات اور مواد مہیجہ خارج ہو جائیں۔ اور گلے سڑے ٹکڑے (تاکاٹ) کاٹ کر یا کھرچ کر الگ کر دیے جائیں۔ اس طرح زخم کو صاف کرنے کے بعد اس کے اندر دسٹم (جالی) نل تنغی سے لت کر کے ہلکے سے بھر دیں۔ اور اس کے اوپر معمولی پٹی باندھ دیں۔ اس سے غرض یہ ہے کہ زخم کی رطوبات باہر ہتی رہیں۔ اسی لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جالی اور باہر کی پٹی کے درمیان کوئی ایسا موثر تعلق پیدا کر دیا جائے۔ جس سے اس مقصد میں امداد حاصل ہو۔ مثلاً ان دو فسل کے درمیان روئی وغیرہ جذب کرنے والی چیزیں رکھیں (اسی لئے یہ بہتر ہے کہ پٹی کی آخری تہ میں پاک صاف موم جامہ یا اسی قسم کا کوئی دوسرا کپڑا مثلاً طبرخی یا موم جامہ) شامل کر لیا جائے۔ تاکہ زخم خشک نہ ہونے پائے۔ اور اُس کی رطوبت آسانی ہتی رہے۔ مرض کا پھیلاؤ اس امر کو چاہتا ہے کہ اوپر بھی شکاف لگائے جائیں۔ اس لئے جراح کو یہ کام مرض کے مطابق نشتر سے کرنا چاہئے۔ اس حالت میں مریض کی صحت اور طاقت کو مناسب غذاؤں اور دوائوں مثلاً کوئین و مقویات اسے قائم رکھنا چاہئے۔

جبکہ شکاف کے بعد خون کا بہنا رُک جائے۔ تو عضو کو روزانہ چند گھنٹے تک گرم پانی میں ڈوبا رکھنا چاہئے (گرم حمام) تاکہ مواد وسیعہ ہلکے پڑ جائیں۔ اور انہیں بے ضرر بنادے۔ ایک وقت میں عضو کو تین چار گھنٹے سے زیادہ پانی

مداوری ٹے ٹنگ ڈسچارج۔

مدا نل تنغی۔ آبرو دارم۔

مدا اسلف۔

مدا طبرخی۔ گنا پرچا۔

مدا اسٹی مولنٹ۔

مدا دارم ہاتھ۔

مدا دسام۔ جالی۔ گاز۔

میں نہ رکھنا چاہئے۔ ورنہ پانی لگنے کا اندیشہ ہے۔ اس حمام کے لیے ٹیالینک
مطہر بہتر ہے۔ جس کی حرارت ۱۰۵ سے ۱۱۰ تک ہو۔ جب یہ مرض ایک مرتبہ
شروع ہو جاتا ہے۔ تو ادویہ مطہرہ (مانع عفونت) علامتوں کے روکنے میں بیکار
ثابت ہوتی ہیں۔ بلکہ اس میں جراح کو چاہئے کہ وہ تناؤ کو دور کرے۔ یہی مواد
کا اخراج جاری رکھے۔ اور ساخت کی طبیعت مقابلہ کو قائم رکھے۔ تاکہ عفونت کے
خلاف یہ کام کرتی رہے۔ اس وقت اس امر کی بھی پوری احتیاط چاہئے کہ
کسی دوسرے زخم کا تازہ یا مخدوہ مدوی اس کے فضلات کی شمولیت سے
نہ پہونچ جائے۔

مصلحتاً متعدد الانواع ضد کردیات عقدیہ بھی بطور علاج کے استعمال کیا
جاتا ہے تاکہ کردیات عقدیہ اس کے فعل اذابت و تحلیل جراثیمی سے ضائع
ہو جائیں۔ اور تاکہ اعضا میں جراثیم کی ترقی کے خلاف قوت ممانعت پیدا ہو جائے
اسے م. کمعوب سنٹی میٹر ایک کمعوب سنٹی میٹر (۱۰) سے شروع کیا جائے۔ اور
آخر میں ۱۰ کمعوب سنٹی میٹر دن میں دوبار دیا جائے۔ اس کی پیکاری پشت یا دہانہ
شکم کی جلد کے نیچے کی جائے۔ اس کا نتیجہ خفایت ہوا کرتا ہے۔ گاہے اس کا اثر
نمایاں ظاہر ہوتا ہے۔ اور اکثر اس کے نتائج غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ علاج
بالقیح بھی کم درجہ کی شدت میں مؤثر ثابت ہوتا ہے۔

۱. اسٹریپٹوکوکائی	۱. اسٹریپٹوکوکائی
۲. کمعوب سنٹی میٹر ایک	۲. کمعوب سنٹی میٹر ایک
۳. کمعوب سنٹی میٹر ایک (۱۰)	۳. کمعوب سنٹی میٹر ایک (۱۰)
۴. کمعوب سنٹی میٹر ایک (۱۰)	۴. کمعوب سنٹی میٹر ایک (۱۰)
۵. کمعوب سنٹی میٹر ایک (۱۰)	۵. کمعوب سنٹی میٹر ایک (۱۰)
۶. کمعوب سنٹی میٹر ایک (۱۰)	۶. کمعوب سنٹی میٹر ایک (۱۰)
۷. کمعوب سنٹی میٹر ایک (۱۰)	۷. کمعوب سنٹی میٹر ایک (۱۰)
۸. کمعوب سنٹی میٹر ایک (۱۰)	۸. کمعوب سنٹی میٹر ایک (۱۰)
۹. کمعوب سنٹی میٹر ایک (۱۰)	۹. کمعوب سنٹی میٹر ایک (۱۰)
۱۰. کمعوب سنٹی میٹر ایک (۱۰)	۱۰. کمعوب سنٹی میٹر ایک (۱۰)

التهاب خلوی کی مخصوص اقسام

۱۔ بغل کا فلغمونی اکثر ہاتھ کے زخم سے ظاہر ہوتا ہے۔ جیسا کہ اکثر تشریح بعد الموت کے وقت ہاتھ میں پہنچ جایا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ عام طور پر طبیبوں۔ طالب علموں اور تیمار داروں کو جو پایا کرتا ہے۔ گاہے یہ اس تناؤ سے بھی ہوتا ہے جو بغل کی گلیشوں کے درم سے پیدا ہوتا ہے۔ بغل کی سخت سخت اور بوجھ سی ہو جاتی ہے۔ درد سخت ہوتا ہے علی الخصوص شانہ کی تحریک کے وقت اس میں زیادتی ہوتی ہے۔ گاہے یہ مرض سینہ تک پھیل جاتا ہے خواہ عضلات صدریہ کے نیچے نیچے یا ان کے مابین۔ گاہے یہ اوپر کی طرف بڑھتا ہے۔ اور شانہ کے جوڑ کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جوڑ کا ربط کسی گل جاتا ہے۔ اور اس میں شدید التهاب (التهاب مفصل) پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں ضرورت ہے کہ جلد بڑے بڑے کشادہ ٹنگان لگائے جائیں تاکہ اس قسم کے خطرناک عوارض نہ پیدا ہوں۔ لیکن ٹنگان لگائے کے وقت بغل کی بڑی بڑی رگوں اور اہم پٹھوں کا خیال رکھیں۔

فلغمونی راس۔ راجد سر کا فلغمونی (یہ عام طور پر ان زخموں کا نتیجہ ہوتا ہے جو عضلہ یا فروخیہ کے درمیں فیض سے گذر کر سر کی متصلہ نرم خانہ دار ساخت میں کھلتے ہیں۔ گاہے یہ سر کی معمولی خراش سے پیدا ہوتا ہے۔ اور سطحی رہتا ہے چنانچہ

مث۔ التهاب مفصل۔ آر تھرائیٹس۔

مث۔ آکسی میٹھ فرانسےٹس۔

مث۔ پائٹورکس۔

مث۔ اری اور ٹشو۔

مث۔ پوسٹ مدرم اگزامیشن

مث۔ اورام عند جاذبہ۔ یعنی ڈی ٹائیٹس

مث۔ کمپورل مسڈ

مث۔ کمپورل گنٹ۔

اس آخری صورت میں سر کی جلد رخ۔ پھولی ہوئی (رتھچی) اور دردناک ہوتی ہے۔ لیکن اس میں الہتاب عموماً کم دیش محدود اور مقامی ہی رہتا ہے۔ برعکس اس کے پہلی حالتیں ہیپ دزدکور کے نیچے پیدا ہوتی ہے۔ اور دزدکور کے حدود انصال تک پھیلی ہے۔ چنانچہ اس کے پھوٹے عموماً پیشانی پر ٹیٹک ابرو کے اوپر اسی طرح عظم زنج کے اوپر یا فحہ کے بالائی خط نخی پر نمودار ہوتے ہیں۔ سر کی ساری جلد کسی قدر ابھر جاتی ہے۔ سر کی پڑیوں کے مرہ ہو جانے۔ اور مختلف دماغی عوارض کے پیدا ہونے کا خطرہ دانسیگر ہتاہو لیکن جلد اس شاذ و نادر ہی گھتی ہے۔ کیونکہ اس میں عروق دومیہ کی کثرت ہے۔ مذکورہ بالا ہر دو صورت میں حرارت بدنہ علی العموم زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور بعض سخت بیمار ہوتا ہے۔ اسکا علاج یہ ہے کہ جہاں تک جلد ممکن ہو کشادہ ولی سے عروق کی رفتار کے متوازی بہت سے شکاف دیں۔ اگر ہیپ دزدکور کے نیچے ہو تو اس کے ہاؤس کے لئے ٹلیاں (انوبات) داخل کریں +

فلغمونی مجر (چشم خانہ کا فلغمونی) چشم خانہ کے اندرونی زخموں سے اکثر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایسے تنگ مقام کو پاک کرنا اور اس کے مواد کا خارج کرنا دشوار ہوتا ہے۔ گاہے یہ چشم خانہ کی استخوانی دیواروں کے الہتاب رجو افغیہ حجبہ کے قبیح سے ہوتا ہے (کا بھی نتیجہ ہوتا ہے۔ چشم خانہ کی ساخت میں مواد کا ترشح ہونے لگتا ہے۔ اور یہ پھول جاتی ہیں۔ پوٹوں میں بھر بھر ہٹ ہو جاتی ہے۔ آنکھ کا ڈھیلا سامنے کو نکل آتا ہے (مچھوٹ) گاہے الہتاب

مل ذاتی گوا۔

مل آکسی پیل بون۔

مل سوپریریکوڈ لائن۔ مل اڈیے ش

مل ٹیوبز

مل آرٹ

مل کرنیل سافٹنر۔

مل پردہ پوسس

چشم خانہ سے عشیقہ دماغ تک پھیل جاتا ہے۔ کیونکہ اُم غلیظہ چشم خانہ کی عشا
عظمیٰ سے اُن سوراخوں کے ذریعہ متعلق رکھتی ہے۔ جن سے عروق و
اعصاب چشم خانہ میں دماغ سے پہنچتے ہیں۔ گاہے اس سے چشم خانہ کی دیواریں
مردہ ہو جاتی ہیں (رشفۃ قلوب) اسی طرح خود آنکھ بھی مبتلا ہے آلام ہو جاتی ہیں
یعنی آنکھ میں غدود جاذبہ کے مدوی سیال التهاب عمومی ہو جاتا ہے یا عصبہ
موجودہ میں آنکھ کے پچھلے حصہ کے التهاب دو باؤں سے التهاب ہر جاتا ہے۔ یا آخر
میں عصبہ موجودہ میں انقباض کے باعث ہزال دلاخری پیدا ہو جاتی ہیں
یعنی جب زخم جڑنے لگتا ہے۔ تو رماں کی ساخت میں قدرتا تشنج و انقباض
واقع ہوتا ہے (انقباض نمبی) جس سے عصبہ موجودہ دب جاتا ہے۔ اور بے
سے اس میں ہزال پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر چشم خانہ کی نیچ خلوی گل جاتی ہے۔
تو کرفہ چشم کے حرکات میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ یا بالکل کھو جاتی ہیں۔ اسی طرح
کبھی ہونٹے اس قدر پیچھے کھینچ جاتے ہیں کہ پوری طرح آنکھ بند نہیں ہوتی +
علاج۔ چشم خانہ کے قروح نافذہ میں اگر ذرا بھی مدوی و عفونت کا احتمال
ہو تو ہرگز اسے بند کرنے کی کوشش نہ کرنی چاہئے۔ بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ
انھیں بتدریج کٹا دینا چاہئے۔ تاکہ اندرونی ساختوں کا دیکھنا (استحسان کرنا)
اور ان کے مواد کا خارج کرنا آسان ہو۔ لیکن اگر ان سے غلغلوئی پیدا ہو جائے
تو اصلی زخم کو کھول دینا چاہئے۔ اور جہاں تک ممکن ہوئے شگاف پوٹوں کے

۱۔ انقباض نمبی۔ سیکٹیو شیل کنٹریکشن۔

۲۔ اثر دینی۔

۳۔ قروح نافذہ۔ پنی ٹریٹنگ و ونڈ۔

۴۔ اصلی اور خزل۔

۵۔ ڈیوڈ ایئر۔

۶۔ پری اسٹیم۔

۷۔ التهاب عمومی چشم۔ پان آفٹنڈائیٹس

۸۔ آپٹک نرو۔

۹۔ التهاب موخرین۔ رٹرو آکیو لانفلٹیشن

درمیان یا ملتحمہ کے موٹے دینے چاہئیں۔ اس کے بعد کمالات مطہرہ استعمال کرنا چاہئے۔ اگر آنکھ میں عمومی التهاب پیدا ہو جائے۔ تو کڑھ چشم میں صلیبی شگاف لگانا چاہئے۔ یہ عین اعلیٰ استیصال و باطل باہر نکال لینا ہے بہتر ہے۔ کیونکہ اس کا اغشیہ و داغ میں درم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

فلغونی گردن۔ گاہے حلق کی عفونت وغیرہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوزتین کے التهابت بزانی۔ خناق کلبی۔ اور قرمزیت کے ساتھ ہوتا ہے۔

ادانل میں گردن کی گہری غد و جاذبہ پھول جاتی ہیں۔ پھر فلغونی ہوتا ہے۔ یہ گاہے گردن کی علیات جراحیہ کے بعد بھی ہوتا ہے۔ گردن کے گہرے ثقافت علی العموم

کریات حصہ یہ سے غوث ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جلد یا بریہ پیپ پڑ جاتی ہے۔ گردن کا غوث حصہ متورم، منخ اور سخت ہوتا ہے۔ گہری ساخت میں تناؤ و کثت

درم ہوتا ہے۔ جرم اور چڑے کی حرکت سے شدید تر ہو جاتا ہے بعض اوقات درم خصوصی طور پر سخت اور نمجہ ہوتا ہے۔ اور اوزیا اگرچہ گاہے موجود ہوتا ہے

مگر چند روز تک جراح کے لئے اس کا پتہ چلانا دشوار ہوتا ہے کہ فلاں حصہ نرم ہو رہا ہے۔ اور تیج کا مرکز ہی ہے۔ اس عرصہ میں جینی عمومی عوارض شدید ہو جاتے ہیں۔ بخار گاہے سخت ہوتا ہے۔ مریض درد اور بیداری سے بیقرار ہوتا ہے۔

ننگے کی دشواری کی وجہ سے اس کے تغذیہ میں بھی خلل واقع ہوتا ہے خطرناک عوارض نمودار ہونے کی چند وجوہ ہوتی ہیں۔ اہم اور ضروری عروق و اعصاب

کے کچھ نکشا نیوا۔

۱۔ ایٹمی سپلم فوسٹے مشنڈ۔

۲۔ کروٹلی

۳۔ اینوکلسن۔

۴۔ درم اغشیہ و داغ۔ منجانی ش۔

۵۔ التهاب و زنی جرابی۔ فانی

۶۔ کیوٹا منجانی ش

۷۔ ڈفقیہ

۸۔ اسکارٹ نیور۔

۹۔ فیشیا۔

۱۰۔ اسٹرپٹوکوکائی۔

دباؤ پڑنے کے باعث۔ حجاب نصف یا سب سے زیادہ تھک التھاب کے پھیل جانے کے باعث جس سے اوزنیا کے بعد تنفس میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ یا تنفس دم کے باعث جو دریدوں کے استناد سے پیدا ہو سکتا ہے۔ علی العموم اس مرض کا انجام یہ ہوتا ہے کہ شیخ غلوی مردہ ہو جاتی ہے۔ تنفس ہو جاتا ہے۔ اگر اندرونی لٹائف میں شگاف دیکر اندر کی پیپ خاصج نہ کی جائے۔ تو وہ مختلف جہات کی طرف رخ کرتی ہے +

علاج۔ حلق کے اصلی مرض کی طرف لازمی طور پر توجہ کرنی چاہئے۔ جو اس مرض کا سبب ہے۔ زخم کو اچھی طرح کھول دینا۔ اور مواد کے بہاؤ کا انتظام کرنا چاہئے۔ مقوی سیال غذاؤں اور دواؤں (مثلاً کوئین) سے مریض کی قوت و صحت کو ترقی دینی چاہئے۔ مصل ضد کربیات عقدیہ کی پیکاری بھی کی جاسکتی ہے لیکن گاہے مصل متحد خناق نہایت مفید ثابت ہوتا ہے دغواہ زیر جلد اس کی پیکاری کی جائے۔ یا براہ دہن کھلایا جائے (مقامی طور پر) اوائل میں کمادات کا استعمال کیا جائے۔ لیکن اگر پیپ پڑ جائے۔ یا دباؤ کے عوارض مثلاً عسر تنفس وغیرہ شدید ہوں۔ یا مرض نمایاں طور پر بڑھ رہا ہو تو کثادہ شگاف عروق وغیرہ بجا کر لٹائف غائرہ کے نیچے دیں تاکہ مدد کم ہو جائے۔ اور مواد آسانی خارج ہونے لگیں + یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہئے کہ چونکہ اس مقام کی ساختیں باہم مستعد چسپاں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر پیچیدگی سے ملی ہوئی ہیں کہ ان کا تیز کرنا دشوار ہوتا ہے۔ اور چونکہ پیپ علی العموم یہاں زیادہ گہری میں ہوتی ہے اسلئے

۱۔ میڈی ایشنم۔	۲۔ تقریباً بکس۔
۳۔ گلاش۔	۴۔ اینٹی اسٹرپٹوکوکک بیرم۔
۵۔ ڈسپنیا۔	۶۔ اینٹی ڈیفنڈیکل بیرم۔

نہایت سخت احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ اہم اجزاء میں کوئی زخم نہ پہنچے۔
 اس مرض کی وہ قسم جو جبرٹے کے نیچے کے حصے (قسم تحت الفک) میں
 ہوتی ہے خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ اس قسم کو فلغمونی تحت الفک کہتے
 ہیں۔ یہ علی العموم منہ کے کسی عفوئی مرکز کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور گاہے اس وجہ
 سے بھی ہو سکتا ہے کہ درم گلیٹوں کے غلاف سے تبادر کر کے پھیل جائے اور
 گاہے کان کے درمیانی حصے کی بیماری سے پیدا ہو جاتا ہے۔ جبکہ مرض عضلہ
 ذات اہلین کے پچھلے لٹن کی طرف اتر آتا ہے۔ ان اقسام میں سوجن ٹھوڑی
 کے نیچے سانس کی طرف پھیلتا ہے۔ اور گاہے فرش دہن اور زبان کی جڑ تک بھی گہر
 لیتا ہے۔ جس سے زبان سانس کی طرف دیتی ہے۔ اور گاہے منہ سے باہر نکل
 آتی ہے۔ گاہے خجروہ میں اوزیا پیدا ہو جاتا ہے۔ یا زبان کے نیچے پھوڑا بھجنا
 ہے۔ اسکا علاج وہی ہے جو اوپر بتایا گیا ہے۔ اور اس میں ایک یا دو شگاف کی
 ضرورت پیش آتی ہے۔ خجروہ کے اوزیا کے لئے علی العموم عمل شفیع نقصبہ کی ضرورت
 پڑتی ہے۔

فلغمونی عانہ۔ جو عانہ کے اعضاء پر ڈھیلی ڈھالی نیچ خلوی استرکتی
 ہے۔ اس میں گاہے متعفن الہاب ہو جاتا ہے۔ یہ گاہے ان جراحات نافذہ
 سے پیدا ہوتا ہے۔ جو اتفاقی طور پر ہو جاتا ہے یا عمل جراحت کے لیے کیا جاتا
 ہے۔ اور جو اس حصے میں پہنچ جاتا ہے۔ مثلاً مثانہ میں حمید ہو جائے۔ یا دھنق

- ۳۔ بلی
 ۴۔ فتح نقصبہ ٹرکیا ٹوٹی۔
 ۵۔ پلوک سیلولاٹی ٹس۔
 ۶۔ پنی ٹرسے ٹنگ و ونڈز۔

- ۱۔ فلغمونی تحت الفک { لڑکس انجمنہ
 ذبحہ رنگ
 ۲۔ کپشول
 ۳۔ ڈائی گیسٹرک سل ۴۔ سب گزری کین

سے باہر پٹے۔ پتھری نکالنے کے لئے فوق العادہ شکاف دیا جائے۔ یا جانی
عملیۃ الحصاصت کیا جائے جس میں پتھری کے خارج کرنے کے لئے عجان لینے
سیون میں شکاف دیا جاتا ہے یا بیقا عدگی سے قاطا طیر داخل کیا جائے۔ یا رحم
کو آدہ کٹنے سے چھینا جائے۔ یا اسقاط جنین کی کوشش کی جائے + یہ گاہے اُن
جراثیم کے جذب ہونے سے بھی ہو جاتا ہے۔ جو کہ احتشاء عانہ مثلاً مثانہ۔ غذائی
مستقیم۔ رحم یا مجری قافون میں ہوتے ہیں + اس کے ساتھ گہرے التہاب کی تمام
مقامی اور عمومی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ بلکہ گاہے التہاب باریطون کی علامتیں
بھی ساتھ ہوتی ہیں۔ چنانچہ تپتا ہوا۔ سخت اور دردناک ورم ہوتا ہے۔ جو معاً مستقیم
یا ہبل سے معلوم ہوتا ہے اور گاہے قوش عانہ کے اوپر التہابی ترشح کی وجہ سے
کوئی سخت ٹکڑا معلوم ہوتا ہے۔ جس کے ٹھوکنے سے بھاری آواز نکلتی ہے +
گاہے اس سے بھڑے بجاتے ہیں۔ جو گاہے باہر کی طرف رباط انفار پیہ کے
اوپر پھوستے ہیں۔ اور گاہے جوت عانہ کے کسی عضو میں۔ اور گاہے دونوں طرف
جس سے پانچخانہ یا پیشاب کے نہایت بڑے غیر العلان نواسمیر پیدا ہو جاتے
ہیں۔ اور گاہے وریدوں میں سدہ اور گاہے تیج دم ہو جاتا ہے +
اس قسم کے احوال میں گاہے جراح کو ادوائل مرض ہی میں بلایا جاتا ہے۔

۱۔ عملیۃ الحصاصت فوق العادہ سوپر ایویم	۱۔ مک فلیمین ٹیوب۔
۲۔ لیٹل لتافری۔	۲۔ ہری ٹونا سنش
۳۔ کٹنڈر کیورٹ۔	۳۔ وجائنا۔
۴۔ ابارشون۔	۴۔ ہیوہک آرج۔
۵۔ پراس ٹیٹ گینڈ۔	۵۔ پوہرش گمنٹ۔
۶۔ رگم	۶۔ پوک کیوٹی۔
	۷۔ فنجولی۔

جبکہ اس میں پیپ نہیں پڑی ہوتی ہے۔ اس صورت میں مریض کو راحت و آرام سے رکھنا چاہئے۔ غذا کی مقدار کو کم کر دینا چاہئے۔ تہوڑی مقدار میں افیون دینا چاہئے۔ مہتمم فحش پر تکیہ رات کا استعمال کرنا چاہئے۔ گاہے ان باتوں کے ساتھ مستقیم یا ہبل میں مطہرات سے گرم سکوب (ترطیہ) کیا جاتا ہے اور گاہے جراح کو اس وقت بلایا جاتا ہے۔ جبکہ اس میں پیپ پڑ چکی ہے۔ اور پھوٹے کے کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس حالت میں ایک شکاف رباط الاربیہ سے اوپر شوکہ ثانیہ کے پاس لگایا جائے۔ اور شکم کے عضلات کو اس حد تک کاٹا جائے کہ جراح نیچے کی طرف لٹاؤ متعزضہ اور باریطون کے دینا کام کر سکے۔ اور باریطون کو ایک طرف ہٹا دیا جائے۔ تاکہ رباط عریض تک پہنچنا ممکن ہو۔ جہاں علی العموم پیپ پائی جاتی ہے۔ جس وقت باریطون کے نیچے کی ساخت کھل جائے۔ اسی وقت چاقو تھام سے رکھ دیا جائے۔ اور کھنڈا لٹا یا اٹھلی سے کام کیا جائے۔ پھوٹے کے جوف کو اچھی طرح دھویا جائے۔ اور اس کے مادہ کے بہاؤ کا پورا انتظام کیا جائے۔ اور اگر ممکن ہو تو ہبل میں اس کے مقابل کوئی دھانہ بنایا جائے۔

عوارض بعیدہ کے طور پر انسجہ التامیہ کے انقباض سے گاہے آنتوں میں سہوہ واقع ہوتا ہے۔ اسی طرح گاہے اسی طریقے سے مائٹ کے دب جانے

ملا پری ٹونیم۔	ملا پری ٹونیم۔
ملا براڈ لگنٹ۔	ملا فومن ٹیٹن۔
ملا بلنٹ انٹر وینٹ۔	ملا سکوب۔ ڈڈش۔
ملا ریموٹ سکولا۔	ملا پیوبک ہسپان۔
ملا سکیٹ ریش ٹشو۔	ملا ٹرنسوریل فیسیا۔
ملا یورے ٹر۔	

کے باعث استعمال الکلیہ بھی ہو جاتا ہے +

۳۔ عمدی جراحات۔ ٹکوت جراحات

جب کوئی جراحہ خواہ عارضی ہو یا عملی جراثیم سے ملوث ہو جاتی ہے۔ تو فعل الحتام کے طبعی رفتار میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اور جراثیم سے مقابلہ کرنے کے باعث التهاب کے آثار بڑھنے لگتے ہیں۔ جن میں بالآخر پیپ پڑ جاتی ہے اس حالت کے لئے پہلے لفظ "عقونٹ" استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن علم کے موجودہ دور انقلاب میں لفظ عقونٹ اور عقونٹی کی کم ضرورت پڑتی ہے۔ اور جہاں تک ممکن ہو اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے +

جب اتفاقی طور پر کوئی جراحہ واقع ہوتی ہے۔ تو علی العموم عمدی سے پرہیز ناممکن ہوتا ہے۔ کیونکہ اکثر اوقات جلدیلی ہوتی ہے۔ یا اتفاقی عارضہ فی نفسہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ زخم کا ملوث ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد دافع عقونٹ اشیاء کے استعمال کے باوجود زخم کا پاک کرنا محال ہو جاتا ہے یہ صورت جنگ کی حالت میں خصوصاً بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جہاں زخم گھٹنوں بلکہ بعض اوقات دونوں تک بغیر کسی توجہ و شیاد کے یوں ہی پڑے رہتے ہیں۔ اور مریضوں کے کپڑے اکثر میلے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کو مہنتوں کپڑے دھونے اور بدلنے کا موقعہ نہیں ملتا۔ لیکن جراحات عمیہ میں زخموں میں جو جرح اپنے عمل سے پیدا کرتا ہے (اگر عمدی واقع ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ جرح کی وہ فاش غلطیاں اور بے احتیاطیاں ہوتی ہیں۔ جن سے اسے گریز کرنا چاہئے اور

۱۔ سپس

۲۔ سپنگ۔

۱۔ استعمال الکلیہ۔ اینڈروفرورس۔

۲۔ عمدی جراحات کے دواؤں کا مشق

جو ممکن عمل ہیں۔ لیکن گاہے عدوی ذاتیہ بھی اسکا باعث ہوتا ہے + ایشیم یا وتر رسلانی کاتانت جو اکثر فی کئی آنسوں سے بنایا جاتا ہے۔ و تراثر کی نامکمل تطہیر اکثر اوقات عدوی کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ربر کے دستا نے جراح اور اس کے مذکوروں کو پہن لینا چاہئے۔ جس سے ان کے ہاتھ محفوظ رہ جاتے ہیں اس ستم کے زخموں میں بعض اوقات امید سے زیادہ انشام کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ اصابت بعد اعلیات یعنی ان زخموں میں جو عمل جراحۃ کے بعد پیدا ہوتے ہیں عام طور پر کڑیات عنقودیہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن زیادہ برے زخموں میں کڑیات عقدیہ ہوتے ہیں۔ بلکہ گاہے مخلوط عدوی ظاہر ہوتا ہے۔ (جس میں مختلف ستم کے جراثیم شریک ہوتے ہیں) اتفاقی اور ناگہانی زخموں میں اور اسی طرح جنگ کے زخموں میں عام طور پر مخلوط عدوی پایا جاتا ہے۔ جس میں مذکورہ بالا انشام کے ساتھ غیر ہوشی جراثیم بھی شامل ہوتے ہیں +

مقامی عفونت یا مقامی عدوی اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ زخم میں صرف نتیجہ حاد یا نتیجہ تحت الحاد کی علامتیں نمودار ہوتی ہیں۔ یا شیج خلوی میں شدید غنمی پیدا ہو کر اس پاس کی ساخت میں بہت جلد پھیل جاتا ہے +

اعمال جراحی کے بعد کے ہلکے زخموں میں گاہے عفونت اندرونی ساخت کے اندر گہرے نامکد میں یا بیرونی سطح میں شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ جب بیرونی سطح کے قریب عفونت شروع ہوتی ہے۔ تو زخم کے کنارے سرخ اور پھوٹے ہوئے

۱۔ کڑیات عقدیہ۔ اسسٹریٹو کرکائی۔

۲۔ مخلوط عدوی۔ کمسڈ انفکشن۔

۳۔ غیر ہوشی۔ این ایرڈیزز۔

۴۔ تحت الحاد۔ سب ایکوٹ۔

۵۔ آؤٹو انفکشن۔

۶۔ و تراثر۔ ریٹ گٹ۔

۷۔ پوسٹ آپرے ریٹو کیسز۔

۸۔ اسٹے فیڈو کرکائی۔

نظر آتے ہیں۔ اور ٹانگوں کے درمیان کی ساخت اس طرح پھول جاتی ہے کہ وہ خوب تنی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اور جب اس کے اندر سلاخی ریشہ ہوا کی جاتی ہے۔ تو گاہے اندر سے پیپ برآمد ہوتی ہے۔ مریض درد کی شکایت کرتا ہے۔ جو عام طور پر ضرباتی قسم کا ہوتا ہے (ٹیس کا درد) گاہے حرارت بھی کسی قدر زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور بعض بڑی حالتوں میں بخار کے ساتھ تشعیرہ (پھریری) ابھی ہوتا ہے + خفیف احوال میں عفونت صرف زخم کے قریب خست ہی تک محدود رہتی ہے۔ لیکن اگر بے پروائی کی جائے۔ یا مریض کی صحت خراب ہو۔ یا اگر جراثیم شدید سمیت کے ہوں۔ تو غلغلہ فی حاوی کی علامتیں نمودار ہو جاتی ہیں جب عفونت زخم کی گہری ساختوں میں شروع ہوتی ہے۔ تو اس کی سطح پر چند روز تک خفیف درم اور چھونے پر ہلکے سے درد کے سوا اور کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی + لیکن عام طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ حرارت بدنی کسی قدر بڑھ جاتی ہے اور تھوڑا کا درد کسی قدر ظاہر ہوتا ہے + اس کے بعد جلد یا دیر ایک پھوٹا نمودار ہوتا ہے۔ اور بیرونی سطح تک آ جاتا ہے۔ اور جب تک کہ اصلی مساد (یعنی بندش یا اندرونی ٹانگہ) دور نہ ہوتا سو کی سی کیفیت باقی رہتی ہے۔ انی تم کی کیفیتیں چاندی کے تاروں پہچوں اور طبعول (پر توں) اور دوسری چیزوں سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ جنکو اتمام قروح سے پہلے علاج کر دینا چاہئے +

سخت حادثات کے بھاری زخموں میں مدوی کی وجہ عرصہ تک ہی نہیں ہوتی ہے کہ جلد پھٹ جاتی ہے۔ بلکہ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ لوث اور گندہ ہوا اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً مریض کے کپڑے۔ سرک کی گندیاں۔ خاک اور

مثلاً تشعیرہ۔ ریڈر

مثلاً لوث انگلیڈ

مثلاً مسبر پر وہ

مثلاً ضرباتی درد۔ تھرا بنگ پین

کارخانوں میں مختلف قسم کی چربیوں وغیرہ اور اس کے ساتھ ان کے یا لٹین کی جلد کے یا مذکورگانہ دان دوسٹوں کی انگلیوں کے جراثیم بھی اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جو ان ناسد شدہ ساختوں کے اندر اپنی پرورش و افزائش کا بیشتر مناسب مواد پاتے ہیں۔ پھر جتنی گہرائی تک یہ تفرق انفال پھیلتا ہے اس کے موافق نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً اذت ساخت کے مختلف حصے میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ یا دہ گل کرتا کلات وادسٹخ بنالیتے ہیں + اس کی پیپ اندرونی کسل ہونی ساختوں کی طرف راستہ کر کے چلی جاتی اور وہاں جمع ہو جاتی ہے۔ اور سطحی حصوں کا دم مرض میں اور بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ گہری ساختوں سے مواد کے اخراج میں دباؤ کی وجہ سے رکاوٹ پیدا کرتا ہے جس سے تباہیوں الگ زیادتی ہوتی ہے۔ اور جراثیم کے لئے کمزورت سے عمدہ خوراک الگ ہینا ہوتی ہے۔ جو کہ زخم کی گہرائی میں جمع ہوتی ہے + اس قسم کے حالات میں عموماً جس طرح غیر ہوائی جراثیم کا مددی ہوتا ہے۔ اسی طرح کرویات صمدیہ بھی شریک ہوتے ہیں +

مددی جراحۃ کے عمومی علامات عام طور پر سین کے مقدار بخار کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ نیز اس میں اس امر کو بھی دخل ہے کہ یا غل کے اندر قوت مقابلہ موجود ہے یا نہیں +

۱۔ قسم حادہ پہلے اس کا نام حمی عفونیہ عامر ضئیدہ تھا + یہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ عفونی التهاب سے (جو کافی پیلاؤ اور شدت کا ہو) کسی مواد کی

۱۔ اس کا نام حمی عفونیہ عارضیہ سہلکم

۲۔ کرویات صمدیہ + پانی اوکا کافی۔

۳۔ قسم حادہ + کیوٹ ٹاکسی میا۔

۴۔ عفونی۔ انفکٹو۔

بڑی مقدار خون میں جذب ہو جاتی ہے + گھسے پیپ کا خیف اجتماع بھی
 (جو دباؤ اور تناؤ رکھتا ہو) شدید کسی علامات پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح پھیلے ہوئے
 التهابات جیسے سرخباؤہ اور فلفغونی میں بعض اوقات علامات سخت خطرناک ہوتی
 ہیں + جو صفات کے عفونی التهابات میں بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ خصوصاً جبکہ
 جو مذکور کا بالائی نصف مرلیض ہو۔ کیونکہ اس صورت میں حجاب عاجز کے عروق
 جاؤبہ بھی القمال کے باعث آسانی سے شریک ہو جاتی ہیں۔ بسم دم اکثر اوقات
 حقیقی تعفن دم کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ اور عوارض علامات کے لحاظ سے ان
 دونوں کے درمیان فرق کرنا تقریباً محال ہوتا ہے۔

علامات۔ اس کی علامتیں بخار کی علامتوں سے مشابہ ہوتی ہیں۔ ان بعض
 شدید اقسام میں حرارت بجائے زیادہ ہونے کے کم ہوتی ہے۔ لیکن حرارت کم
 ہونے کے باوجود نبض تیز ہوتی ہے + بخار کے ساتھ بھوک کی کمی۔ زبان کی
 خشکی۔ نبض کی تیزی جو بہت جلد ضعف سے بدل جاتی ہے۔ شدید درد سر شیبے
 وقت کسی قدر ہڈیاں ہوتا ہے۔ اول اول قبض ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد معدہ
 اور آنتوں کے خراش سے فی اور اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ انجام شدید
 اضمحلال اور مہلک ہبوط اور انحطاط قوی ہوتا ہے۔ یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرلیض
 کو موت سے پہلے گہری فینہ دہانت اور بے خبری کی حالت طاری ہو جاتی ہو
 جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ سمیت (سٹین) براہ راست اعضاء غذا یا اعضاء

مدوی صدیہ فی فزعیہ۔

مد ڈیبریم۔

مد کرلیس۔

مد کوما۔

مد اکیس۔

مد سرخباؤہ۔ اری سپلس۔

مد فلفغونی۔ سیلڈ لائی ٹس۔

مد ہری ٹونیم۔

مد ڈایا فرام۔

مد لطف ٹمس۔

عصبی پر اثر کرتی ہے۔ گاہے پھیپھروں کے اجتماع خون سے سانس میں وقت
(عسر تنفس) واقع ہوتا ہے۔ اور گاہے پیشاب میں ماح یا رطوبت ماحیہ ظاہر ہوتی
ہے (بول زلالی)

علاج۔ گاہے یہ علامات سرخست کے ساتھ نازل ہو جاتی ہیں۔ جبکہ مؤثر
علاج مثلاً پھوڑے کا فوراً چیر دینا اور مواد کا بہانا، اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن
پہلے ہونے الہاب میں شتم دم کی علامتیں کچھ عرصہ تک نہیں پانی جاتی ہیں +
گاہے اس مرض کا حمد ہلک ہوتا ہے۔ اور موت کے بعد اس کی حالتیں
تغصن دم کے خواہر سے مشابہ ہوتی ہیں۔ لیکن خون یقینی طور پر عضوی جراثیم سے
خالی ہوتے ہیں +

شتم مزمن کی حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ جراثیم کی سمیت (سین)
کسی مقامی مرکز عضو سے دیر تک جذب ہوتی ہے + کر کے عضلات کے
عضوی پھوڑے سے جو حالت پیدا ہوتی ہے وہ اس حالت کی نمایاں مثال
ہے۔ اور اگر اسکا مناسب تدارک نہ کیا جائے تو حوی و دن کی علامتیں جلدیا میر
منو دار ہو جاتی ہیں +

شتم مزمن عفن۔ یہ لفظ اب عمل جراحہ میں بہت کم استعمال کیا جاتا ہے
لیکن گاہے اس لفظ کا استعمال اس حالت کے لیے کیا جاتا ہے۔ جو ہتک
نفاس میں کسی قدر شتم کے باقی رہ جانے اور اس کو کھڑ جانے سے واقع ہوتی

۱۔ کراک انکسی سیا۔

۲۔ کراک مینور۔

۳۔ سپیریٹا۔

۴۔ پوٹر پیریم۔

۵۔ پے سنٹا۔

۱۔ کبوس جن۔

۲۔ ڈسپ نیا۔

۳۔ بول زلالی { البیو منوریا

۴۔ مان { البیو من۔

۵۔ سپی سیا۔

۶۔ انفکونیکیٹیریا

ہے۔ کیونکہ اس سے مخلوط حدوی کی صورت واقع ہوتی ہے۔ علاوہ
معمولی طبع پر شدید ہوتے ہیں۔ جو کمیادی سمیات کے نتائج ہوتے ہیں
اسکا علاج یہ ہے کہ میٹھ کا باقیاندرہ سڑا ہوا حصہ خارج کیا جائے۔ جس سے
تقریباً ساری علامتیں اور بخار بہت جلد دور ہو جاتا ہے۔

۲۔ نفخ دم۔ جس وقت جراثیم زخموں کے علاوہ خون میں بھی پھیل جاتے
ہیں۔ تو یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں اور تھم حاوی کی علامتوں میں قدر
مثابہت ہے کہ دونوں کے درمیان حد و امتیاز قائم کرنا مشکل ہے۔ اسکا مفصل
ذکر آگے آئے گا۔

۳۔ نفخ دم۔ جس طرح جراثیم خون میں الگ الگ داخل ہو کر اور نسل بڑھا کر
مختلف علامات پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح گاہے اجتماعی شکل میں خون کے متفرق
لو تقرطوں کے ساتھ عروق کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جب اس قسم کے خون
کے سدھے عروق کے اندر پہنچتے ہیں۔ اور پھر جہاں کہیں یہ اقامت اختیار
کرتے ہیں۔ وہیں ایک دوسرا پھوٹا بنا دیتے ہیں۔ اسی حالت کا نام نفخ دم ہو
جس کے مخصوص علامات مریض میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور جس میں تھم کی نمایاں
علامتیں بھی پائی جاتی ہیں نفخ دم کا ذکر آگے مفصل آئے گا۔

عقوی جراحۃ کا مقامی علاج۔ دو باتوں پر منحصر ہے۔ اول یہ کہ
عقویت یا حدوی کو کتنا عرصہ گزرا۔ دوم یہ کہ مریض کے موجودہ حالات
کیا ہیں۔

جراحی کے بعد ہلکے زخموں میں جس امر کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں

۱۔ امبولس۔

۲۔ اینٹکٹوڈونڈ۔

۱۔ کسٹنکشن۔

۲۔ سپیسیا۔

۳۔ پانی سیا۔

تناؤ کو کم کیا جائے۔ اور حرارت و رطوبت کا استعمال کیا جائے تاکہ ساختوں کے اندر اندمال کی مقامی قوتیں تیز ہو جائیں۔ بیرونی اور اندرونی ٹانگے فوراً دور کر دیے جائیں۔ اور زخم کو اچھی طرح کھول دیا جائے۔ تاکہ سہولت سے سپ نکلتی رہے۔ بے ضرورت زخم کو نہ چھیڑا جائے۔ مثلاً نہ اسے کھرچا جائے۔ نہ نچوڑا جائے اور نہ پککاری کی جائے۔ اور اس قسم کے دوسرے کام نہ کیے جائیں۔ در نہ ان باتوں سے جراثیم پھیل جاتے ہیں۔ تیز دفع نقع کشیاد کا استعمال بے فائدہ ہے۔ کیونکہ اس سے جراثیم ساختوں کے اندر نفوذ کر جاتے ہیں۔ اور پھر اس وقت تک تباہ نہیں ہوتے۔ جب تک کہ پھر ان ساختوں کو اسی طرح در ذاکت کیا جائے۔ علاوہ انہیں اس سے خون کے سفید دانوں کی قوت ہضم جراثیم و ہضم بیضادات ابھی کام کرنے سے رک جاتی ہے۔ زمانہ حال کی چٹانغ عفونت و انہیں مثلاً اخطر امودانی راہوں کورائش اور فلفل دان ایسی ہیں کہ ان کے استعمال میں کچھ زیادہ مضائقہ نہیں ہے اور بعض اوقات مفید ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بہت ممکن ہے کہ ان چیزوں کے مناس استعمال سے جو فائدہ مترتب ہوتے ہیں وہ ایسے اسباب نقع رکھتے ہوں جنکو ہم فعل دفع نقع سے الگ سمجھیں۔

گلی سٹری ساخت (تاکل) کو دور کر دینا چاہئے۔ مگر عام طور پر اس لئے چھوڑ دی جاتی ہے کہ وہ خود بخود قدرتی طور پر جدا ہو جائے۔ اور اس فعل کی امداد کے لئے محلول نمک قوی (۱۰ فیصدی) میں دھبی تر کر کے رکھتے ہیں۔ یا ٹیگن اور نل نفیشی (۱۰ فیصدی) کا شیشہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر زخم کے اندر گہرائی

۱۔ دانی پر لک ماسٹ سوکشن۔

۲۔ سون۔ کھیرین۔

۳۔ نل نفیشی۔ آئوڈ فارم۔

۴۔ ایلشن۔

۱۔ فیکو مانی ٹرسس

۲۔ بانہو کھورائش۔

۳۔ فلفل دان۔ آئری فلفل دان۔

۴۔ اسلف۔

زیادہ ہو تو مواد کے بہانے کے لئے زخم کے اندر صاف کی ہوئی (مٹھڑا) ربر کی نئی (انبوٹہ) تقریف (داخل کریں) + ورنہ زخم کو نرمی سے بھر کر گرمی اور تری پہونچائیں۔ مثلاً تکیہ آت بوریقہ کا استعمال کریں + آنتوں کا بھی اس حالت میں خیال رکھیں۔ لمینات سے رفع قبض کریں۔ مرینے کی محبت عامہ کی طرف پوری توجہ رکھیں + چند دنوں کے بعد جب انگو زخم میں پہونچائیں تو محلول نمک سے زخم کو دھویا جائے۔ یا مینٹھن آئیزر علی سے صاف کیا جائے + آخر میں یہ زخم انگو ربر بھر کر لگایا جائے۔ لیکن گاہے سرعت التیام کے لئے زخم کے کناروں کو باہم ملا کر باندھ دیتے ہیں۔ اور گاہے پیوند لگاتے ہیں +

اگر ان تدابیر سے کام نہ چلے۔ تو زخم کو زیادہ کٹاؤ دے کر دیا جائے۔ جس سے یہ بھی یقیناً عیاں ہو جائے گا کہ زخم اندر سے خوب پھینکا ہوا ہے۔ تو درمیان (رغفوشی) کے مانند علاج کرنا چاہئے + گاہے ذیل کے لٹچے کے استعمال سے بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اردو تخم کتان (اسی) کو غسل حامض بورتی میں جو ابال کھارنا ہو گا کہ دم آئیزر (جی) کے درمیان رکھ کر زخم پر باندھ دیا جائے۔ اس قسم کا لٹچہ پاک صاف (غیر عفونی) ہوتا ہے۔ اور اس کی گرمی بمقابلہ تکیہ کے زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے۔ نیز یہ زیادہ نرم بھی ہوتا ہے۔ اور سطح کے نشیب فراز میں باسانی بیٹھا جاتا ہے + دوسری حالتوں میں کارل ڈکن کا علاج برتا جاسکتا ہے۔

۱۔ اسٹریپٹو ککس	۲۔ فلیگ بکس
۳۔ ٹیچ ٹیوب	۴۔ مٹھڑا
۵۔ بوریٹک فینٹل ٹیچ	۶۔ بورک ایسڈ پوٹش
۷۔ انیڈروجن پراکسائیڈ	۸۔ سی بی ٹائڈ
۹۔ گرافٹنگ	۱۰۔ اسپرٹک
۱۱۔ سلینولائیٹس	۱۲۔ کارل ڈکن ٹریٹمنٹ

مقامی عددی کی زیادہ شدید حالتوں میں زیادہ مؤثر اور قوی نتائج کی ضرورت ہے۔ اور آجل بہت سے جدید طریقے معلوم ہوئے ہیں۔ جو خصوصیت کے ساتھ گولی کے گندہ زخموں کے لیے زیادہ مؤثر ہیں۔ اور ان کے خطرناک عوارض کا ان سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ یہ نتائج جس طرح ان فوجی زخموں کے لیے مفید ہیں۔ بعینہ اسی طرح یہ عام عفونی زخموں میں بھی قابل استعمال ہیں اسی وجہ سے ان کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے +

فوری علاج۔ بھاری عفونی زخموں کے فوری علاج کا دار و مدار اس وقفہ پر ہے جو زخم لگنے کے بعد اب تک گزرا ہو + یہ بات اچھی طرح تسلیم کر لی گئی ہے کہ آٹھ سے بارہ گھنٹے تک جراثیم اعصاب کی گہری ساختوں میں نفوذ نہیں کرتے ہیں۔ جراثیم کی ایک محدود تعداد جو زخم کے اندر داخل ہوتی ہے ان کے بٹھنے میں ایک عرصہ صرت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر زخم لگنے سے بارہ گھنٹے تک مکمل طور پر اسکو کیما دی اور غیر کیما دی ذرائع سے ہوشیاری کے ساتھ صاف کیا جائے مظهراً تو جراثیم کے اثر کا خاتمہ ہونا ممکن ہے +

زخم کو پاک کرنے کی پہلی کوشش۔ مریض کو بچس کیا جائے۔ اور اس کے کپڑے دور کر دیے جائیں + جریان خون کا بند کرنا ضروری ہے۔ اور زخم کے جوف میں مہموں پر کسی مناسب دافع عفونت غسل میں دھبی تر کر کے بھر دی جائے مثلاً غسل نظرائی + پلہ محلول + مکن۔ اخضر نورانی کا تیز محلول یا کوئی دوسرا غسل جبکہ معالج مناسب خیال کرے) اس پاس کی جلد موند کر پاک صاف کر دی جائے + زیادہ میلے زخموں میں مناسب یہ ہے کہ پہلے تارپین سے

مٹا ہوا پانی استعمال کریں۔

مٹا ہوا پانی استعمال کریں۔

مٹا ہوا پانی استعمال کریں۔

مٹا ہوا پانی استعمال کریں۔

صاف کیا جائے۔ اس کے بعد جلد کو صابون کے محلول ایٹری سے دھویا جائے
آخر میں لٹمر کا قوی محلول یا سیاب بنفش آمیز ثنائی کا الکھولی محلول استعمال کیا
جائے + لیکن دوسرے عنوانات بھی اسی طرح استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ اس کے
بعد زخم لکھول دیا جائے۔ اور اس کا علاج کیا جائے +

زخم کے گلے سڑے کنائے کاٹ دیے جائیں۔ اسی طرح دوسرے مردہ
اور فاسد اجزاء بھی دور کر دیے جائیں۔ عضلات کو اچھی طرح ملاحظہ کیا جائے۔
خاصہ کہ ان حادثات میں جو سڑکوں اور گلیوں میں واقع ہوتے ہیں۔ اور گلی کے
زخموں میں۔ ورنہ ممکن ہے کہ ان کے اندر عفونت ہوائی رونما ہو + جو ریشے
کھل گئے ہوں انہیں کاٹ دیا جائے۔ یہاں تک کہ عضلات کے تندرست ریشے
ظاہر ہو جائیں۔ عضلات کے تندرست ریشوں کی علامت یہ ہے کہ جب ان کو
لمعت سے چھوا جاتا ہے۔ تو یہ فوراً متاثر ہو کر سڑکتے ہیں۔ بیرونی اجسام اور
میل کیل کو لازمی طور پر زخم سے دور کر دیا جائے۔ اور جلد کے زخموں کو مناسب
خط پر شگاف دیکر بڑا کر دیا جائے۔ تاکہ اندرونی اور گہری ساخت کھل جائے +

جو زخم اس طرح کھولا گیا ہے۔ اگر اس کی حالت سے جراح مطمئن ہو جائے
تو خیاطتِ اولیہ کا عمل کیا جائے۔ یعنی زخم کو سی دیا جائے۔ خواہ اس کے ساتھ
ایٹری اور رشح انخر کے مانند کوئی پھیٹنے والا دافع عفونت دسیاب بنفش آمیز

مک پرائمری سیورج۔

مک ایٹھر

مک اسپرٹ۔

مک ڈیفوزیل۔

مک اینٹی سپٹک۔

مک بانیو ڈائنڈ آف مرکی۔

مک لٹرس اسٹانگ کمپرس۔

مک بانیو ڈائنڈ آف مرکی

مک الکھالک سولیشن۔

مک گیس گنگرین

مک فاسپس۔ مکتی ریل سولیشن۔

ثانی پیلے کے ساتھ یا اس کے بغیر استعمال کیا جائے۔ یا نہ + بعض دوسرے جراح
الکھول سے زخم کو صاف کرنے کے بعد آرٹین کا طریقہ علاج استعمال کرتے
ہیں۔ زخم کو بند کرنے اور صفائی کے لئے بہتر ہے کہ پیٹیم کے کیڑے کا ڈورا استعمال
کیا جائے۔ لیکن مناسب یہ ہے کہ ٹانگوں کے بعد مواد کے اخراج کا کوئی مناسب
انتظام کیا جائے +

اگر زخم کی حالت سے جراح مطمئن نہ ہو۔ تو ہرگز مناسب نہیں ہے کہ
اسے فوراً بند کر دیا جائے۔ بلکہ ایسی حالت میں مناسب یہ ہے کہ فلیوٹن (ریلیف)
میں جاتی رومی اتار کے زخم کی گہرائی میں بھر دی جائے۔ یا اس میں ارسین کا عقیقہ
بھر دیا جائے۔ یا کارل ڈاکن کا طریقہ علاج برتا جائے۔ اگر دو تین دن کے بعد
زخم پاک ہو جائے۔ یا یہ کہ اس کے مواد میں محض چند جراثیم ثابت ہوں۔ تو اب زخم
میں ٹانگے لگا دئے جائیں۔ اس عمل خیاطت کو جو ایک عرصہ کے توقف کے بعد
کیا جاتا ہے خیاطتِ اَدَلِیَہ مَتَاخَرَہ کہا جاتا ہے۔ اس حالت میں جراثیم کا انتقال
نبایتِ اجمیت رکھتا ہے۔ خصوصاً اس لحاظ سے کہ لیا خون کے گچھلانے والے
کریات عقدیہ موجود ہیں۔ یا نہیں۔ اگر موجود ہوں تو زخم کا سینا فضول ہے +

اگر دو تین گزرنے کے بعد عدوی و عفونت کے آثار شدید ظاہر ہوں۔ اور
مواد میں بے شمار جراثیم پائے جائیں۔ تو درم فلفوشی کے مطابق مندرجہ ذیل
علامات میں سے کوئی ایک طریقہ خستہ یا رکھا جائے۔ آخر میں زخم انگوڑے پھرنے
لگتا ہے۔ جس کی مذکور کے لئے گاہے پیوند لگایا جاتا ہے۔ یا جلدی کے خیال سے

۱۔ بی آئی پی پی ٹریٹ منسٹ۔	۲۔ بیولا ٹرنک۔
۳۔ بی آئی پی پیٹ	۴۔ اسٹریچو کوکانی۔
۵۔ ڈی بیڈر، ٹری سید پر	۶۔ سیلوفانی ٹس۔

ٹانگے لگا دیے جاتے ہیں۔ اتنی تاخیر کے بعد جو ٹانگے لگانے جاتے ہیں۔ اسکو
خیاطتِ ثانویہ کہا جاتا ہے۔

ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا علاج یہاں نہیں بتایا جاسکتا ہے۔ بلکہ اس کے ہدایات
ایک خاص باب (باب کسٹریکٹور) میں۔ جن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔

مذکورہ بالا تمایز و تجاویز کے موثر و مفید ہونے کا ثبوت جنگی اور ملکی حادثات
میں کثرتِ بل چکا ہے۔ مثلاً ایک لڑکا شفا خانہ میں داخل ہوا جس کے ایک
پاؤں پر بھاری موٹر گزر گئی تھی۔ زخم گھسنے سے ٹخنہ تک آیا تھا۔ جلد اور جلد
کے نیچے کی ساخت ٹانگ کے پورے دور میں غالتفت غائرہ و عضلات کی
گہری جھلیاں اور عضلات سے اس طرح جدا ہو گئی تھی کہ زخم کے اندر ہاتھ
داخل ہو کر جلد کے نیچے نیچے دائیں طرف اچھی طرح گھوم سکتا تھا۔ کیونکہ
دائیں طرف ناقصان پہنچا تھا۔ سڑک کی خاک زخم کے اندر اچھی طرح گھس
چکی تھی۔ اور اگرچہ کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی۔ مگر عضلات کی جھلیاں کہیں کہیں سے
غراب ہو گئی تھیں۔ اور پورا عضو میلہ تھا۔ لڑکے کو بیہوش کر کے چند گھنٹے
میں دستکاری کی گئی۔ جلد کا ایک حصہ کاٹ لیا گیا۔ زخم کو موثر طور پر پاک
کرنے کے لئے تار پٹین۔ صابون اشیر۔ مخلوط قوی۔ اور دینین شیف آسیر اعلیٰ
استعمال کیا گیا۔ زخم کو بند کرنا اگرچہ غیر ممکن تھا مگر جلد کے کنارے سے جہاں چل
ممکن تھا وہاں تقریباً ملا دئے گئے۔ ان تمایز کے موثر ہونے کا ثبوت
اس امر سے ملتا ہے کہ اگرچہ سلائی کے مقام پر جلد کا بیشتر حصہ مردہ ہو گیا

۱۔ سکندری سیورج۔

۲۔ فریچر۔

۳۔ ڈیپ فیشیا۔

۴۔ ٹرینٹائن۔

۵۔ ایتھرسپ۔

۶۔ اسٹریکٹور۔

۷۔ ڈائیڈروجن پراکسائیڈ۔

تھا۔ مگر سپ کا ایک قطرہ ہی نہ بنا۔ اور پچہ تمام حواری عفوئنت سے محفوظ رہا۔

ایک نوجوان شخص تقریباً چھ سٹاکڑ ۲۰۰ قدم کی بندی سے لگا۔ اور اسے گہرے زخم پہنچے۔ بائیں گھٹنے کا جوڑ کھل گیا۔ دائیں گھٹنے کی ہڈی روضہ ابھی ضرب میں شریک ہو گئی تھی۔ پٹلی کی ہڈی کے اگلے کنارے کی جلد دو تین مقام پر عضلات کی گہری جلیوں تک تارعل سے کٹ گئی تھی اور کل کا ایک حصہ بائیں عضلہ مقربہ کے مقام میں گھس گیا تھا۔ جو باطلہ اریک نیچے عضلات میں گھستا ہوا جوف حکم میں اخل ہو گیا تھا۔ جس سے ورید ٹھن کا شدید جریان ہو رہا تھا۔ زخم کو مندرجہ بالا طریقہ سے صاف کیا گیا۔ رشح اور سیاب منہن آمیز ثانی کا بکثرت استعمال کیا گیا۔ ان کے علاوہ باقی تمام زخموں کو پورے طور پر سی دیا گیا۔ ران کے مقام پر زخم کو کھلا اس لئے رکھا گیا کہ وہاں سے زخمی وریدوں کو ٹیک کیا جائے۔ اور اس میں جالی بھر دی گئی۔ جوف متفان کو بھی اس لئے کھولا گیا تھا۔ تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اندرونی احتشائیں تو کوئی ضرب دزخم کا اثر نہیں ہے۔ مریض کو وقفی طور پر اس شدید ضرب سے بہت تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ مگر اسے بہت جلد بلا کسی رکاوٹ و علامت عفوئنت کے صحت ہو گئی۔

میدان جنگ میں اکثر ایسی صورت واقع ہوتی ہے کہ زخموں کو جلد پاک کرنے کا

۱۔ سپرٹ	۱۔ پینک کپلی کیشنرز
۲۔ بانوڈا آفٹ مری	۲۔ فینٹ
۳۔ کارڈ	۳۔ پے ٹنا
۴۔ پری ٹونیل کیوٹیٹی	۴۔ اوڈرسل
۵۔ دوسرا	۵۔ پورپاٹس گنٹ

موقعہ نہیں ملتا ہے۔ کیونکہ اول تو مریض کو شفا خانہ تک پہنچانے میں پرگتی ہے۔ جہاں باقاعدہ علاج ہو سکتا ہے۔ دویم کام کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ ہر ایک مریض پر زیادہ وقت صرف نہیں کیا جاسکتا۔ اور ہر ایک مریض کو پورے طور پر یقین کے ساتھ پاک کرنے کا موقعہ نہیں ملتا۔ تاہم بہت بڑی تعداد میں گولی کے بھاری زخموں میں کامیابی ہوتی ہے۔ جنکو صاف کرنے کے بعد پورے طور پر اسی وقت سی دیا گیا تھا۔ رخیاطت اولیہ یا جن میں ٹانگے عرصہ کے بعد لگائے گئے تھے (رخیاطت متاخرہ)

جن حالتوں میں کامل تطہیر ناممکن یا مشتبہ ہو۔ اور اس لئے اُس کا فوراً سینا بھی مشکوک ہو۔ تو اس حالت میں مناسب یہ ہے کہ رخیاطت ثانویہ کے خیال سے زیادہ دیر تک تکھیر کی جائے۔ اور وقفہ کے بعد اسے بند کیا جائے۔ اس مقصد و تطہیر کے لئے بہت سے جدید طریقے ایجاد کیے گئے ہیں۔

طریقہ علاج استاذ ذکن

اس طریقہ علاج کا دار و مدار انضواء متداولی کے اور خصوصاً ماحول ذکن کے دافع عفونت خواص پر موقوف ہے۔ جو کہ جراثیم کو تباہ کر دیتے ہیں لیکن سفید دانوں کے نخل مضہم جراثیم میں اور اعضاء کے قوت اندام میں کچھ زیادہ خلل اندازی نہیں کرتے۔ اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ زخم کو پورے طور پر کھول دیا جائے۔ اور پورے طور پر عفونی زخم کی گہرائیوں کو صاف کیا جائے۔ اور تمام مردہ اور فاسد اجزاء کو دور کر دیا جائے۔ لیکن ہمیشہ یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ

۱۔ پرائمری سیورج۔	۲۔ پینوکلورائٹرز
۳۔ ڈیپڈ سیورج۔	۴۔ ڈکنس سولوش
۵۔ کارل ڈکنس ٹریٹمنٹ آف وونڈس	۶۔ فیکوسانی ٹرسس۔

مواد کے بہاؤ کا مستقل انتظام کیا جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ زخم کی گہرائی محلول
 مذکور کے لئے ایک اچھا طرف ہے۔ جس میں محلول مذکور بھرا جاسکتا ہے۔ پھر
 بہت سے انا بیٹیب (نلیاں) جنکا قطر ۱/۲ قیراط اور لمبائی تقریباً ۱/۲ قیراط ہونے
 کے اندر اس طرح داخل کی جائیں کہ یہ اس کی تمام فضاؤں میں پہنچیں۔ اور ان کو
 اپنی جگہ پر جالی کی دھبیوں کے ذریعہ جنہیں محلول دکن سے ترکہ دیا گیا ہوتا تھا
 رکھا جائے۔ یعنی یہ دھبیاں ان نالیوں کے درمیان۔ اور ان کے اور زخم کی
 دیواروں کے درمیان بھری جائیں۔ یہ نائیاں ایک طرف سے بند ہوں۔ لیکن
 اس طرف دور تک باریک باریک سوراخوں سے چھدی ہوتی ہوں۔ بڑے نلیوں
 میں اس قسم کی چھ۔ آٹھ اور گاہے بارہ نلیاں درکار ہوتی ہیں۔ انکے آڑا دوسرے
 شیشے کی ایک نلی سے لگا دیے جاتے ہیں۔ جس میں ایک دو یا زیادہ دانے ہوتے
 ہیں۔ پھر یہ شیشے کی نلی لمبی نالیوں کے ذریعہ ایک یا زیادہ ظروف (برکر) سے
 تعلق قائم کر دیتی ہے۔ جو مریض کے بستر کے پاس ٹکے رہتے ہیں۔ اور جن میں
 محلول دکن بھرا رہتا ہے۔ اس ظرف سے ہر دو گھنٹے کے بعد محلول مذکور کی ایک
 معینہ مقدار بہانی جاتی ہے۔ تاکہ زخم اس محلول سے دھلا رہے۔ اور اس پیکاری
 کے ذریعہ دوا اندر پہنچتی رہے۔ اگر اس قسم کا ظرف مخصوص (برکر) وقت پر مہیا
 نہ ہو تو دفعہ صحت محلول سے ایک پیکاری بھر کر بڑی نالی میں پیکاری کی جائے
 یہ ضروری ہے کہ اس بڑی نلی میں بہاؤ کے روکنے کا کوئی ذریعہ مثلاً ^{مقطع} ہوتا چاہئے
 تاکہ محلول مذکور بہت زیادہ بہکر باہر نہ صناع ہو جائے۔ بلکہ صرف استفادہ کرے کہ

۱۔ ریڈر وارٹر۔

۲۔ ڈکس سوڈیشن

۳۔ کلپ۔

۱۔ ٹیوبز

۲۔ می بیٹر

۳۔ پکشی پیٹر

باریکت باریک سوراخوں سے محلول مذکور گذر کر زخم کی گہرائی میں پہنچتا رہے۔
یہ نائیاں زخم سے باہر اس طرح آتی ہیں کہ دھجی میں لپیٹی ہوئی ہوتی ہیں جو محلول مذکور
سے تر ہوتی ہے۔ اور غیر جاذب اور مٹھرا دن کی تہ سے پوشیدہ ہوتی ہیں۔ محلول
دکن گاہے جلد میں خراش پیدا کر دیتا ہے۔ خصوصاً اگر خالص قلبیات موجود ہوں۔
اس سے محفوظ رہنے کی یہ تدبیر کریں کہ زخم کے گرد جالی کی کٹی تہ صاف و مٹھرا
دیزی لین میں توڑ کر رکھ دیں۔ محلول مذکور جو ہر دو گھنٹے کے بعد داخل کیا جاتا
ہے اس کی مقدار بہت زیادہ نہ ہونی چاہئے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایسا انتظام
کرنا چاہئے کہ بستر اس سے تر نہ ہونے پائے۔ کیونکہ اس محلول سے بستر کی چادر
غراب ہو جاتی ہے۔ جب زخم بھرنے لگے۔ اور خیاطت ثانویہ کا عمل نہ کیا جانے
تو اس حالت میں مرہم کلورڈین مفید ہے۔ جس کے اندر کلورڈین ٹی دس حصے۔ ریسیڈ
دس اگلیں ۱۰ حصے۔ اور پانی چار حصے۔

جب اس طریقے کو باقاعدگی سے برتنا جاتا ہے۔ تو اس سے قیمتی فوائد
حاصل ہوتے ہیں۔ مگر اس میں وقت یہ ہے کہ اول تو نہایت دانیائی اور ہوشیاری
کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی ضرورت ہے۔ دویم تعلیم یافتہ تیمار داروں کی امداد
کی ضرورت ہے۔ سویم ایک ہوشیار کیمیا داں کی شرکت عمل کی ضرورت ہے جو
سیال مذکور کو پوری احتیاط کے ساتھ تیار کرے۔ چہارم ایک ماہر علم جراثیم کی
ضرورت ہے۔ جو اس امر کی صحیح اطلاع دے سکے کہ زخم کے اندر اس قدر جراثیم
موجود ہیں۔ بعض فرانسیسی شفا خانوں اور دیگر اطلاعات سے اس طریقہ علاج
کی نمایاں کامیابی ثابت ہوئی ہے۔ لیکن یہ طریقہ جب ایسے مریضوں پر برتنا جاتا
ہے۔ جنکو ہر سی یا بحری طویل سفر کرنا ہو۔ تو اس طریقے کا صحیح استعمال مشکل یا تقریباً

محل ہوتا ہے۔ اور اس وجہ سے اس کے نتائج بہت زیادہ اچھے نہیں بنتے ہوتے + اس طریقہ علاج کے فرائض کامیابی میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ جراح خود اپنے ہاتھوں سے مرہم چچی کرے۔ اور یہ بذات خود ایک امر مشکل ہے + مواد کے جراثیم کی تعداد بار بار شمار کرنی چاہئے۔ اور جب کبھی اسکا شمار کیا جائے تو بعد ازل میں اسکا اندراج ہوتا ہے۔ ادا میں جراثیم اسقدر بڑھتا ہوتے ہیں کہ ان کا گننا محال ہوتا ہے۔ لیکن جب اختصر آمروادنی اپنا عمل شروع کر دیتا ہے۔ تو ان کی تعداد بتدریج کم ہونے لگتی ہے۔ یہاں تک کہ دس سے چودہ دن تک گاہے چند امتحانات میں ایک آدھ جرثومہ پایا جاتا ہے۔ اسوقت یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب زخم پورے طور پر مٹھا رہا ہے صاف ہو گیا ہے۔ اور اب خیاطت ثانیہ کے عمل سے ٹانگے لگائے جاسکتے ہیں + اسوقت بخار اور شرم دم میں نمایاں طور پر کمی آجاتی ہے۔ مریض کی شکایات بہت گھٹ جاتی ہیں۔ اور اندرونی اعضا اور ساخت کی وہ اذیتیں کم ہو جاتی ہیں جو زخم کے اثر سے ان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ التھام و اندمال کا فعل سرعت سے جاری ہو جاتا ہے۔ اور دوسری خرابیاں اور برعنائیاں جو عام طور پر دوسری حالتوں میں ہوا کرتی ہیں وہ نسبتاً کم ہو جاتی ہیں۔ اگر خیاطت ثانیہ کے عمل اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کی عملیات کا موقعہ جلد ہی مل جائے۔ تو اسکو ایک امر مستقیم سمجھنا چاہئے +

لیکن اس وقت یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ فاضل رائٹ اس محلول کو جو بطور

۱۴ سکندری سیورہ

۱۵ ماسکیا

۱۶ سرٹے رائٹ

۱۷ چارٹ

۱۸ ایوکلورائٹ

۱۹ اسٹرائل

دافع عفونت کھلی ہوئی ساختوں پر استعمال کیا جاتا ہے نبض شک و کیتا ہے اور یہ تجویز کرتا ہے کہ دوسرے ذرائع سے بھی اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں اس طریقہ علاج میں زخم کو بہت زیادہ کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے جس میں مواد کے بہاؤ کے لئے بہت سی نالیاں رکھی جاتی ہیں اس میں اس امر کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ بار بار پچکاریاں کی جائیں۔ اس میں ایک شخص کی مستقل اور دائمی نگہبانی اور ایک ہوسٹیا جرح کی نگہداشت کی ضرورت ہے علامہ انیس یہ سیال ہی اپنے اثرات کے لحاظ سے نہایت قوی در تیز ہے و غرض اس کے نزدیک اس میں متعدد خرابیاں موجود ہیں ۶

طریقہ علاج مارلین

فاضل مارلین سے اس طریقہ علاج کا رواج ہوا ہے۔ اس کے مفید سادہ اور قیمتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس طریقہ علاج میں پہلے زخم کو کھول کر اسے لاحق سے اس طرح صاف کیا جاتا ہے کہ فاسد اجزاء کو کاٹ کر نکال لیا جاتا۔ یا دجی سے پونچھ لیا جاتا ہے۔ جریان خون (نزف) بند کر دیا جاتا ہے اس کے بعد زخم کو اشیاء الکحول سے خشک کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دجی میں ذیل کا دافع عفونت عسیدہ لئی کی سی دوا لگا کر زخم پر مل دیا جاتا ہے۔ اس عسیدہ میں بمبت نخم آگین ایک حصہ۔ نل نبشی دوسرے۔ اور پیرافین بیال اس قدر کہ ساری دوا مجموعی طور پر لکڑ منجہ بالائی کے مانند ہو جائے ۶ اس دوا کے تیار کرنے سے پہلے تمام اجزاء کو مطہر کر لیا جائے۔ نل نبشی کو عنول قطرانی

۱۔ بہتہ کار بونیٹ

۱۔ بی آئی پی پی ٹریٹ منٹ

۲۔ آیدو ڈو فارم

۲۔ ہیرو سٹس

۳۔ کار بولک نوش

۳۔ مارلین پیٹ

(۱) میں دھویا جائے۔ بہت اور پیرافین کو ۲۰ درجہ کی دھند اور جاتی حرارت میں آدھ گھنٹے تک گرم کیا جائے۔ بہت اور نل بنٹی کو مطہر کھل میں ملایا جائے۔ اور پھر آہستہ آہستہ پیرافین ڈالتے جائیں۔ امداد چھی طرح حرکت دیتے جائیں۔ یہاں تک کہ کوئی ٹکڑا اور کسی قسم کی کرکڑا ہٹ باقی نہ رہے۔ اس عسیدہ کو زخم کی پوزی سطح میں اس طرح لگانا چاہئے۔ کہ ایک باریک سی تہ تمام سطح زخم کو استر کر دے۔ اور ہوشیاری اور نرمی کے ساتھ مطہر پھر ٹری سے لگانا چاہئے۔ علی الخصوص عضلات میں نہایت نرمی کی ضرورت ہے۔ زخم کی گہرائی میں عسیدہ کا کوئی ٹکڑا یا ریزہ نہ چھوڑنا چاہئے۔ اور بہت بڑی مقدار بھی اس کی استعمال نہ کرنی چاہئے ورنہ سخی علامات کے نمودار ہونے کا ڈر ہے۔ بڑے زخموں میں عام طور پر اسکا ایک درہم کافی ہوا کرتا ہے۔ جب یہ ظاہر ہو کہ زخم کے اندر رطوبت و مواد کی کثرت نہیں رہی۔ اور دیگر علامات سے زخم کی حالت اچھی نظر آئے۔ تو زخم کو مکمل طور پر سی کر بند کر دیا جاسکتا ہے۔ اور اخراج مواد کے لئے راستہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر حالات زیادہ اچھے نہ ہوں۔ تو زخم کو کھلا رکھنا اور اس کے اندر مطہر دھجی کا بھر دینا مناسب ہے۔ جب کوئی خاص سبب مگر پٹی باندھنے کا پیش نہ آئے تو زخم کو پانچ چھ روز تک چھوڑ دیا جائے۔ جب جمی زخم سے نکالی جاتی ہے۔ تو زخم نہایت میلانظر آتا ہے۔ کیونکہ اس میں پیپ اور عسیدہ کا مخلوط تمام لٹھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جب زخم کو مطہر مکمل ٹک سے دھویا جاتا ہے۔ تو زخم کی سطح صحیح نظر آتی ہے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح مرہم پٹی کر دی جائے اور اسی طرح پانچ چھ روز تک چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد زخم نمایاں طور پر تیزی سے بھرتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔

ان حالات میں عموماً خیاطت ثانیہ کا عمل ممکن ہوتا ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے پہلے ارد گرد کی جلد صاف کر لی جائے۔ اس کے کٹائے کسی قدر اندر تک کاٹ لئے جائیں + زخم کے انگوڑ کو اچھی طرح کھیرچ لیا جاتا ہے۔ اور جریان خون کو پورے طور پر بند کر دیا جاتا ہے۔ زخم کی سطح اٹیر یا انگوڑ سے خشک نہ کی جاتی ہے اور ہوشیاری کے ساتھ عسیدہ مذکور لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹائے لگائے جاتے ہیں۔ اندر کے ٹائے عضلی شکافوں میں دتر اتر دبی کے تانت سے اس کے بعد کے ٹائے جو ریشمی ڈورے یا دتر و دالقر ریشمی کیڑے کے تانت سے دیے جائیں زخم کا بیشتر حصہ اسی سے سیا جاتا ہے اس کے بعد بیرونی جلد کو ٹیک اپنی وضع پر قائم کر کے باریک دتر اتر (رودہ گرہ) سے سی لیا جائے +

عسیدہ مارین ان زخموں کے لئے بھی مفید شئی ہے جو تندرست ساختوں میں سڑی گئی ہڈیوں کے خارج کرنے یا متعفن شجاریوں کو خالی کرنے کے لئے پیدا کیے جاتے ہیں۔ ان اجزاء کو خشک کرنے کے بعد عسیدہ مذکور اچھی طرح مل دیا جائے۔ اس سے عفونت کے آثار و افعال بند ہو جاتے ہیں + مرکز عفونت کے کھولنے یا مردہ ہڈی کے ٹکڑے (شہ) کو نکالنے کے لئے زندہ ہڈی کے تراشنے (برو) میں ہڈی میں مرکز عفونت (عدوی) کے لگ جانے کا زبردست احتمال ہوتا ہے۔ اس صورت میں عسیدہ مذکور کا استعمال ہڈی کے خانوں میں عفونت کے پھیلنے سے باز رکھتا ہے۔ کسی عضو کے کڑکٹنے میں بھی رضامند جبکہ انگوڑ کی سطحیں موجود ہوں عسیدہ مذکور کا استعمال عام طور پر کئے ٹھہرتے

۱۔ سلک درم گٹ۔

۲۔ بی آئی بی پی۔

۳۔ سی کوئٹرم۔

۴۔ پی سلک۔

۵۔ سکٹری سپرچ

۶۔ ایتھر۔

۷۔ الکھال۔ ۸۔ کیٹ گٹ۔

۹۔ سلک

عصنی کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس سے جراح کو بہت جلد یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ زخم کو بالکل بند کر دے۔ اور زخم کے سرعت اندمال کی امید رکھے +

اس دونوں کے استعمال سے گاہے کسی علامت نمودار ہو جاتی ہیں۔ جس کا زیادہ تر تعلق بسمت کی سمیت سے ہے + مسوڑھوں کی جگہ جگہ رنیل ہو جاتا ہے گاہے یہی رنگ رخساروں اور زبان کی غشاء مخاطی پر بھی ہوتا ہے۔ گاہے معدہ اور امعاء کے اندر بھی خرابیاں بصورت درد۔ قورنج و اسہال ظاہر ہوتی ہیں۔ اور گاہے موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ گاہے قولون کے تقرق سیسی میں قرعہ اور تامل پایا جاتا ہے + اس میں یہ بھی احتیاط چاہئے کہ پیرافین بالکل خالص ہو۔ اگر یہ پورے طور پر مصفی نہ ہو۔ تو اکثر حالات میں زخم کے کناروں پر خراش پیدا ہو جاتی ہے +

آخر میں ہیں یہ بھی بتانا ہے کہ زخم کے اندر عصیدہ مذکور کی موجودگی شاع رائیجی کے امتحان میں خلل اندازی کرتا ہے۔ کیونکہ سایہ پیدا کرتا ہے۔ اور یہ کہ عصیدہ مذکور کا بکثرت استعمال قایم رہنے والا نامور اور گاہے دوسرا پھوڑا پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ کہ اس وقت تک اچھا نہیں ہوتا جب تک کہ تمام غیر ضروری مقدار خارج نہ ہو جائے +

فلسفہ وائن۔ کالت محلول را یک فی ہزار) کو بعض لوگ بہت پسند کرتے

۱۔ بسمت	۱۔ السز
۲۔ میکس مبرجی	۲۔ اسلفنگ
۳۔ کون	۳۔ اکسین۔ رائٹ جن ریز
۴۔ گمانڈ فلکس	۴۔ پیٹ

ہیں۔ اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی قوت دفع عفونت مصل دم کی موجودگی میں زیادہ ہو جاتی ہے اور ان خضر آموات ادنیٰ کا فعل مصل مذکور کی وجہ سے دب جایا کرتا ہی نیز اس کی وجہ سے فعل مضارع جراثیم راجعہ بیضافات اور زندہ اعضا کے انحال میں بھی کوئی فساد نہیں آتا۔ نیز یہ بالکل غیر سی مرکب ہے نیز اس کے اثرات عفونی زخموں میں نہایت نمایاں ہوتے ہیں۔ جبکہ اس کے محلول میں دہی ترک کے زخم کے اندر دیر تک رکھی جاتی ہے اور ساختوں کے ساتھ ملی ہوئی چھوڑ دی جاتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے جراثیم بہت جلد تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور زخم بہت سرعت سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سے بمصرین ان دعاوی کی اور غیر معمولی شفا بخشی کی تصدیق نہیں کرتے + عام رائے یہ ہے کہ جب سپ کا رسنا بندہ ہو جائے اغفال اندمال میں بھی تاخیر ہو جائے۔ اور بشو کی پیدائش رک جائے۔ چنانچہ ایک ہفتہ کے بعد اگرچہ زخم میں سپ نہ آئے تاہم زخم کی سطح اسی نظر آئے جیسی کہ زخم کے شروع میں ہوتی ہے + کچھ عرصہ کے بعد ایک زرد پٹری یا جلی سی بن جائے جس میں کھلی ہوئی ساختوں کے بیرونی (سطحی) طبقات بھی شریک ہوں اور زخم قرعہ ضلہ کی طرح نظر آئے تو ان حالات میں اگر فلیوائن کا استعمال ترک کر دیا جائے۔ اور اس کے بجائے دوسری چیزیں مثلاً سموشی محلول نمک یا یوٹال استعمال کی جائیں۔ تو بہت جلد زخم کی حالت اچھی نظر آنے لگتی ہے۔ گاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ زخم دوسری دافع عفونت ادویہ سے اچھے نہیں ہوتے ہیں، مگر جب فلیوائن استعمال کیا

۱۔ بلڈ سیرم۔	۲۔ کیلس السز
۳۔ ایلو گھوڑا شکر۔	۴۔ نارل سالٹ سو لوشن۔
۵۔ نیگوسائی ٹوس۔	۶۔ ایک دافع عفونت سیال۔
۷۔ اپنی تیلیم۔	

جاتا ہے۔ تو بہت جلد صاف ہو جاتے ہیں۔ علی الخصوص اُس وقت جبکہ زخم ایسے مقام میں ہوں جہاں سے پیپ آسانی بہ نہ سکتی ہو۔ بلکہ وہاں یہ خطرہ ہو کہ پیپ پھوٹ کر عضلات کی جھلیوں (لفائف) کے اندر یا عضلات کے درمیان چکی جائے گی۔ مثلاً پنڈلی اور پشت میں + اسی طرح یہ عضو کے گرد کاسٹے رقعہ لگانے کے وقت عضفی ساختوں کے لئے قابل استعمال اور مفید ہے۔ فلیو ائن کے بخار (خشو) کے اوپر لگتے ہوئے گوشت کو باہم ملا کر سی دینا چاہئے۔ گاہے عضفی زخموں کے چیرنے کے بعد بھی بعینہ اسی طرح عمل کیا جاتا ہے۔ جس میں فوراً ٹانگہ لگاتا مناسب نظر آتا ہے۔ گاہے جوڑوں میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ اور ان میں فلیو ائن کی پچکاری کی جاتی ہے۔ جس سے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ پہلے اس جوف کی پیپ کو امتصاص کے ذریعہ راکھ مصاصہ سے یا معمولی محلول نمک کی پچکاری سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فلیو ائن کی پچکاری کی جاتی ہے + آخر میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ بالکل امراض ہے کہ فلیو ائن میں بہت سی مفید قوتیں موجود ہیں۔ لیکن بہت ممکن ہے کہ ابھی تک ہمیں اس کے صحیح استعمال کا طریقہ نہ معلوم ہو۔ بہر حال ضرورت ہے کہ قبل اس کے کہ اس کی قدر و قیمت کے متعلق کوئی متقلب یقین قائم کیا جائے ابھی بہت سے تجارب مختلف طریقوں سے کیے جائیں +

طریقہ علاج استاذ لائٹ

اس میں شک نہیں کہ جنگِ عظیم، چھڑ جانے کے وقت گولی کے عضفی

مک۔ ایس ہائی ریڈر

مک۔ سر آرم رائڈ رائٹس فریڈلر جیل

سے متحد آف ٹریڈنگ و ہندز۔

مک۔ فریشیا۔

مک۔ ہونٹن

مک۔ ہیکس۔

مک۔ ایس ہائی ریڈر۔

زخموں میں تمام غیر عفونی اور دافع عفونت تدبیریں جو غیر جنگی زخموں میں مفید ثابت ہوا کرتی ہیں بہت زیادہ ناکام رہیں۔ اگرچہ گمان غالب یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ علامہ لکھنے کے اصول غلط ہیں۔ بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اصول تدابیر کو نیم توہجی اور بے دلی سے برتا گیا۔ معمولی غیر عفونی تدابیر تو باطل بے فائدہ ثابت ہوئیں۔ لیکن خطرناک جنگی زخموں کے مقابلہ کے لئے ماہرین علم الامراض و علم الجراحات کی بہترین مساعی کو دعوت عمل دی گئی۔ ان میں سب سے اہم اور قابل ذکر فاضل راستے کے مساعی ہیں جنہوں نے اپنے مسئلے میں اہل مسئلہ پر غور و فکر کرنے کے بعد مدوی یا عفونت کے اس جدید طریقہ علاج کی بنا ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ گولی کے تازہ زخموں کی سطح علی العموم غیر عروقی ہوتی ہے کیونکہ اس مقام کی ساخت مردہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ کہ عروق جاذبہ کی فضائیں کھلی ہوتی ہوتی ہیں۔ اس مقام میں سوائے اس کے اور کوئی صورت حفاظت کی نہیں ہو سکتی کہ سفید دانوں سے (جو کہ یہاں جمع ہو جاتے ہیں) اور مایست دم سے (جو کہ یہاں مترشح ہو جاتی ہے) مدولی جائے۔ لیکن جراثیم ان پر حملہ آور ہو کر ان کو فاسد کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ جراثیم نہایت شدید سمیت کے ہوتے ہیں چونکہ یہاں جراثیم کو مناسب خوراک بکثرت مل جاتی ہے۔ اور عموماً نہایت تیزی کے ساتھ یہاں بڑھ جاتے ہیں۔ اس لئے مجروح ساختوں میں نہایت وسعت سے پھیل کر وسیع رقبہ میں التہاب پیدا کر دیتے ہیں۔ اور تجربہ سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ زخمی آدمیوں کے شفا خانہ تک پہنچنے میں اکثر دیر لگ جایا کرتی ہے۔ اس لئے اور بھی مرض میں ترقی اور خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

۱۔ لطف الہک اسپے سیز۔

۱۔ لیور شیر۔

۱۔ نیکور

اس مضمون کے زخموں کے علاج میں اہم مشکلات یہ ہیں:-

(۱) جراثیم اس قدر گہری ساختوں میں نفوذ کر جاتے ہیں کہ تا وقتیکہ اچھی ساختوں کی بڑی مقدار تباہ نہ کر دی جائے اس وقت تک ان کا دور کرنا محال ہوتا ہے۔

(۲) مجروح ساخت میں طوہات کا ترشح ہوتا ہے۔ اور وہ متورم ہو جاتی ہے عروقی شعریہ کا دوران خون خراب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مائیت مترشحہ کا رگوں پر دباؤ پڑتا ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر زخم مائیت دم سے محدود و گھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور وہاں طوہات کا بہت کم اخراج ہوتا ہے۔

(۳) جو مائیت رگوں سے باہر آکر زخم میں جمع ہوتی ہے۔ وہ فاسد ہو کر اپنے تیز اور شدید طبعی خواص (ضد جراثیمی) کو کھو دیتی ہے۔ یا فریکین کی موجودگی کے باعث بگڑ جاتی ہے۔ جو کہ سفید دانوں کے ٹوٹنے سے پیدا ہوتی ہے۔ علیٰ ہذا وہ مصل جو فریکین کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے (مصل فرکی) وہ جراثیم کے لئے بہترین خوراک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عدویٰ سے مقابلہ کرنے کے لئے طبیعت کی تمام کوششیں جراثیم کی افزائش کے لئے مناسب ہوتی ہیں تا وقتیکہ ہوشیاری کے ساتھ اس پر قابو نہ کیا جائے۔ اور اس کی مناسب اصلاح نہ کی جائے۔

(۴) اگلے سطرے (تاکثات) کا آس پاس ہونا تازہ جراثیم کی افزائش کے لئے مستقل پریشانی بن جاتا ہے۔ اگر یہ اجزاء دستکاری کے ذریعہ دور نہ کیے جائیں تو طبیعتی افعال کی وجہ سے یہ وہاں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس

۱۔ ٹرپ سین
۲۔ ٹرپ سی ناز ڈیہرم
۳۔ ایلٹ

۱۔ کپریز
۲۔ نیٹی بیکیٹریل

طبعی فعل میں یہ امر بھی شریک ہے کہ جزوی یا کلی طور پر فرکین کی وجہ سے جو کہ زخم کے مواد میں موجود ہوتی ہے۔ یہ تاکلات منہضم بھی ہوتے ہیں یعنی فرکین کی وجہ سے یہ منحل ہو جاتے ہیں (یہ فعل منہضم جس طرح مردہ اجزاء کے دور کرنے میں مفید ہے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ یہ زندہ اعضاء میں پھیل کر اہم اجزاء کو مبتلا کر کے دوسری شکایات (آفات ثانویہ) پیدا کر دے مثلاً شرائین کی دیوار میں مبتلا ہو جائیں (اس کے بعد یہ پھٹ جائیں۔ اور جریان خون ہونے لگے)۔

جب اس قسم کا عدوی واقع ہو تو علاج کے بڑے وسائل کا تعلق تین چیزوں سے ہوتا ہے +

(۱) ماحیثیت دم سے۔ جب یہ تازہ ہوتی ہے۔ تو یہ امر مسلم ہے کہ اس میں جراثیم کے مارنے کی پوری خاصیتیں ہوتی ہیں۔ اور فرکین کے برباد کرنے کی بھی کافی قوت ہوتی ہے۔ جس شخص میں عدوی کا اثر ہوتا ہے۔ اس میں یہ دوسری قوت تیزی سے بڑھنے لگتی ہے۔ لیکن ماحیثیت کے باقی ہونے پر یہ کھو جاتی ہے +

(۲) خون کے سفید دانون سے اور اس کی قوت منہضم جراثیمی (بجوم بیضادات) سے۔ جس سے جراثیم تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور اعضاء میں قوت اندمال بڑھ جاتی ہے +

(۳) اعضاء کی ساخت سے۔ یہ ظاہر ہے کہ جب جراثیم اعضاء کے اندر اچھی طرح کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اعضاء کی ساخت فوراً اپنا غلبہ ظاہر کرتی۔ اور تیزی

۱۔ ٹرپسین۔	۳۔ لٹ
۲۔ سکندری۔	۴۔ ٹرپسین۔

کے ساتھ ان کے طبعی امثال اندمال کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں۔

زخم کے طبعی امثال میں جو مزاحمت اور برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان سے مقابلہ کرنے اور امثال اندمال میں تحریک پیدا کرنے کے لئے فاضل راشٹریہ (۱) اخضر آمیز رنگ) کا محلول استعمال کرتے ہیں۔ خواہ بصورت محلول قوی یا بصورت محلول متوسطی + محلول نمک قوی (۱۰ یا ۱۰۰ فیصدی) مختلف جہات سے مفید اثرات رکھتا ہے (۱) ساخت سے انصباب مائیت میں تقویت پہنچاتا ہے۔ جس سے نہ صرف یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ باسی (رویرکی) مائیت دور ہو جاتی ہے۔ اور اس کی بجائے تازہ اور مفید مائیت حاصل ہو جاتی ہے۔ بلکہ احتباس مائیت کو کم کر کے خون کی آمد اور اعضا کے تغذیہ کو بڑھا دیتا ہے (۲) غین کے سفید دانوں کے خروج کو بھی محدود کر دیتا ہے۔ جس سے پیپ کا ترشح کم ہو جاتا ہے (۳) جس سفید دانہ سے یہ ملائی ہوتا ہے اسے توڑ کر فریکین کی ایک محدود مقدار زخم کے اندر چھوڑ دیتا ہے۔ جو زخم کے مردہ اجزاء کو اپنی قوت مہضم و تقطیع سے ڈھیلہ کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ اور اس قوت میں زیادتی اسوج سے نہیں ہونے پاتی کہ اچھی مائیت میں اس کے خلاف عمل کرنے کی قوت (مضاد فریکین) پائی جاتی ہے۔ ان حقائق و واقعات سے یہ امر واضح ہے کہ محلول نمک قوی جراحات عددی کے ابتدائی مراحل کے علاج کے لیے ایک قیمتی شے ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس کا اثر کم ہو جاتا ہے اور اس وقت یقیناً اس کا استعمال مفید ہونے کی بجائے مضر ہوتا ہے اور

۱۔ آسٹوٹانک سویڈش۔

۲۔ ٹریپ سین۔

۳۔ اینٹی ٹریپ ٹم۔

۱۔ ری ہیرو۔

۲۔ سوڈیم کلورائیڈ۔

۳۔ ہائپرٹانک سویڈش۔

جراخ اس وقت معمولی محلول نمک (محلول مستوی) جو شکاری کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے (۸۵ فیصدی) اس سے سینہ دانے جذب ہو کر آتے ہیں اور اس لئے عمل مضمر جراثیمی (بجوں بیماریاں) میں مدد مل جاتی ہے۔ اور جراثیم کا آخری قلع قح ہو جاتا ہے۔

نمک کا محلول قوی کیونکر عمل کرتا ہے؟ اس میں بہت کچھ بحث و تحقیق کی جا چکی ہے۔ اسٹافرائٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ساختوں سے عمل ترشح کے ذریعہ رطوبات کو جذب کرتا ہے۔ لیکن بڑے زور سے اس کی تردید کی گئی ایک فاضل کا خیال ہے کہ مائیت کے انساب میں کمی اس وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے کہ (۱) بیرونی سطح پر خشک شدہ مائیت دوسرے جمع ہو جاتی ہے۔ جس سے مسامات بند ہو جاتے ہیں (۲) مائیت دم کے ہماری عروق کے دباؤ سے بند ہو جاتے ہیں۔ جس سے مائیت سطح تک نفوذ کرنے سے رک جاتی ہے۔ چنانچہ خشک شدہ مائیت کو مرطوب چیزوں کے لگانے سے قابل نفوذ و متخلل بنا یا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اس کے اندر صرف لیٹین کے بال اور مسامات ہوتے ہیں۔ جو پیپ کے دانوں سے بند رہتے ہیں۔ اگر محلول نمک قوی اس پہنچال کیا جائے۔ تو دھناٹے مذکور کی رطوبتیں چھن کر باہر چلی آتی ہیں۔ اور دانے سکڑ جاتے ہیں۔ اس لئے ساخت کے عروق جاؤہ کی رطوبت کے لئے راستہ کھل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مائیت بکثرت بہنے لگتی ہے۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ حائل قویہ کا استعمال جرعات صدوی میں فائدہ

۱۔ نادرل سالٹ سولیریشن۔	۲۔ پری ایبل۔
۳۔ فیکو سائی ٹرس۔	۴۔ فائبرین۔
۵۔ پیری مارگین۔	۶۔ مائی پرائیمک سولیریشنز۔

خالی نہیں۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ محض محلول نمک ہی سے یہ فرائض مرتب ہوں۔ بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں استعمال کی جاسکتی ہیں۔ مثلاً طوینٹن جیسا کہ پڑانے طریقہ کے مطابق مستحکم نل منبشی میں دس فیصدی استعمال کی جاتی تھی (شکر ۱۰ یا ۲۰ فیصدی) اسی طرح اس کے مانند دوسری چیزیں مثلاً ۲ فیصدی صابون سبز کا محلول + فاضل رائٹ یہ بھی کہتا ہے کہ محلول دکن بھی زیادہ تر محلول قوی کی طرح اثر کرتا ہے +

مختلف زخموں میں ماییل مذکورہ کا استعمال مختلف طرق سے کیا جاتا ہے بیرونی سطح کے معمولی جراحات و تفرقات میں صرف اس قدر کافی ہے کہ سطح پر ناکہ مطہر یا جاتی کی معمولی گدی بنا کر رکھ دیں۔ اور اسکو محلول مذکور سے ترکیب یعنی اس پر محلول مذکور ڈال دیا کریں۔ یا اس گدی کو وقتاً فوقتاً محلول مذکور میں ڈوب دیا کریں۔ لیکن بہتر ہے کہ محلول کو کسی ظرف میں لٹکا کر قطرہ قطرہ ٹپکائیں۔ لیکن گہرے زخموں میں محلول کے پہنچانے کے لئے دکن کا طریقہ اختیار کریں۔ جس میں ربکی نالیوں زخم کے اندر رکھی جاتی ہیں۔ جن میں سیال جاتا ہے اور زخم میں ہو کر باہر آ جاتا ہے +

جس زخم کا علاج اس طریقہ سے کیا جاتا ہے۔ اس کی شکل مخصوص ہوتی ہے۔ یعنی وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ رنگت گلنی خستیا کر لیتا ہے۔ انگوڑی کی ایک باریک تہ سطح پر محیط ہو جاتی ہے۔ جس سے تھوڑی تھوڑی پیپ ہتی ہے یا پیپ بالکل نہیں ہوتی۔ جراثیم کی تعداد بھی بہت گھٹ جاتی ہے + اس قسم کے

مٹ گلیسرین۔

مٹ آہ ڈو فارم ایلین۔

مٹ سوپریشن آف گرین سوپ۔

مٹ لٹ۔

مٹ گار۔

مٹ کارل ڈکن میٹھ۔

زخم بہت اچھے دکھائی دیتے ہیں۔ اگرچہ ہمتی سے گاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب تک محلول قوی کا استعمال جاری رہتا ہے اس وقت تک مغل اندال بھی سنت ہو رہے۔ لیکن اگر اس کی بجائے معمولی محلول نکلیں استعمال کیا جائے تو زخم کی سطح بھوری ہو جاتی ہے۔ اور سپ کی کافی مقدار بہنے لگتی ہے۔ مگر انکو بہت جلد بچاتے ہیں۔ اور مغل اندال تسلی بخش صورت میں جاری رہتا ہے۔



مذکورہ بالا غرایبوں کی اصلاح کے لیے بطور ترمیم کے دوسری صورت پیش کی گئی ہے جس میں زخم کے اندر رنگ خاص طور پر بھرا جاتا ہے (جلائج بخیر) (البلج) اس طریقہ کے مطابق پہلے زخم کو ماتھے سے اچھی طرح صاف کیا جاتا ہے اس کے بعد مٹھر جالی کو چارچہ تہ کہہ فیصدی کے محلول نمک میں تر کیا جاتے اور زخم کے ہر ایک گوشے میں اس طرح بھرا جاتے۔ کہ زخم کی پوری سطح اچھی طرح اس سے ملتی ہو جائے۔ اس کے بعد ۲۰ رتی کی چند نمک کی ٹیکسٹ اس کے اوپر زخم کے زیادہ گہرے حصہ میں رکھ دی جائیں۔ اس کے بعد زخم کے جوف کو اچھی طرح جالی سے بھر دیا جائے۔ تاکہ نمک کی قرصیں بیچ میں آجائیں۔ اور اوپر نیچے جالی سے گھر جائیں۔ زخم کے جوف میں کوئی جگہ نہیں چھوڑنی چاہئے جس میں سپ جمع ہو سکے۔ اس کے بعد بیرونی سطح پر جالی کو کئی تھکر کے رکھ دیا جائے۔ پھر اون کی موٹی تہ رکھ کر اچھی طرح باندھ دیا جائے۔ اس سے مواد کو کثرت خارج ہوتا ہے۔ اور اگر بیرونی اون وغیرہ تر ہو جائے تو نیا اون استعمال کیا جائے۔ ورنہ زخم کو چار پانچ روز تک چھوڑ دیا جائے۔ بشرطیکہ نبض حرارت

اور دو میں زیادتی نہ ہو۔ اور پٹی بدلنے کی ضرورت داعی نہ ہو۔ بعض اوقات پٹی کھولنا کر اہستہ اور نگاہی طبع کا باعث ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بڑی حد تک بیرونی حصے تک ہی محدود ہوتا ہے۔ اس کی براس طرح چھلکی جاسکتی ہے کہ جالی کے بیرونی (سطحی) طبقات پر کلورومین ٹی سفوفٹ چھڑک دی جائے پہلے مرتبہ پٹی بدلنے کے وقت رجو کہ عموماً بحالت بیہوشی کی جاتی ہے) زخم کے اندر سے وہ بھری ہوئی چیزیں باسانی خارج ہو جاتی ہیں۔ زخم کی سطح کھلنے پر گلے سرے اجزاء نکلتے اسے پاک نظر آتی ہے۔ اور اس سے جو پیپ ہوتی ہے وہ اچھی قسم کی ہوتی ہے۔ پھر دماں کی جلد پر بنفیشن لگا دی جاتی ہے۔ اور پانچ چھ روز کے لئے پھر وہی عمل کیا جاتا ہے۔ یعنی دوسری نئی جالی اسی طرح زخم کے اندر بھری جاتی ہے۔ جس کی مقدار پہلے سے کم ہوتی ہے۔ جب زخم کی سطح باطل صاف نظر آتی ہے۔ تو خیانت ثانیہ کا عمل کیا جاتا ہے۔ نرم اعضاء کے اکثر زخم اس حالت میں تین ہفتے تک رہتے ہیں۔

یہ بتانا نہایت ضروری ہے کہ فاضل رائٹ بذات خود اقرار کرتا ہے کہ اعضاء کی مردہ فضائیں۔ یعنی وہ فضائیں جن میں پیپ تھیلیوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ خواہ اس کے ساتھ مردہ اجزاء۔ بوسیدہ ہڈی وغیرہ موجود ہو یا نہ۔ ان فضائوں کو اچھی طرح کھول دینا اور مواد کے بہاؤ کا انتظام کرنا چاہئے۔ ورنہ محلول ٹنک شدید القوت کے استعمال سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہوگا۔ زخم کے مواد کے نئے اخراج کا اس طرح انتظام کرنا کہ پیپ یا کسی رطوبت کو ان مردہ فضائوں

ملے پاؤ ڈرڈ۔

ملے سکندری سیچر۔

ملے آئیو ڈین۔

ملے ٹانی پرائیم سالٹ سربوشن۔

میں صبح ہونے کا موقع نہ ملے۔ سالہا سال سے جراثیم مددوی کے علاج کی بنیاد رہا ہے +

بہت ممکن ہے کہ مذکورہ بالا جدید طرق میں سے بعض زیادہ عرصہ تک پائدار نہ رہیں۔ لیکن اُس حقیقی اور صحیح ترقی سے کسی طرح انکار نہیں کیا جاسکتا۔ جہاں میں سے بعض کے ساتھ وابستہ ہیں +

اس امر کا مطالعہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ ان طریقوں سے غیر فوجی زخمیوں میں کس قدر نتائج اچھے مرتب ہوتے ہیں۔ اور اسی قسم کے فوجی زخمیوں میں کس قدر۔ لیکن اس میں ایک بات کو فراموش نہ کرنا چاہئے کہ غیر فوجی زخمی عام طور پر ایسی صحت نہیں رکھتا۔ جیسی کہ ایک زخمی سپاہی۔ اسی وجہ سے سپاہی میں قوت مقابلہ زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح برعکس اس کے یہ امر بھی ذہن نشین ہونا چاہئے کہ غیر فوجی زخمیوں کا علاج بمقابلہ میدان جنگ کے زیادہ مستعدی سے کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان صحیح طور پر مقابلہ نہیں کیا جاسکتا +

۴۔ تعفن دم

یہ ایک شدید عفونی حالت ہے۔ جو تمام بدن میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ حالت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ بعض قسم کے پھپ کے جراثیم خون میں بڑھ جاتے ہیں + یہ تعفن دم سے اس طرح ممتاز ہے کہ اس میں پھوڑے (ابسز) نہیں ہوتے ہیں (اگرچہ بعض حالات میں اس کے ساتھ پھوڑے بھی ہوتے ہیں جیسا کہ اس کے بعد ذکر کیا جائے گا۔ اور قسم دم اور قسم عفون سے اس طرح ممتاز

۱۔ ٹاکسی یا۔

۲۔ سپیریٹیا۔

۳۔ سپٹیسیا۔

۴۔ فانیسیا۔

۵۔ سکندری ابسز۔

غصا قلوبیہ اور اس کے مانند دیگر جراثیم مثلاً عصا تجیہ زر قار نیلی پرپکے جراثیم (عصا اذویا ویہ خبیثہ) اور کروہ سوزاک سے یہ مرض شاذ و نادر ہوتا ہے۔ کیفیت حدوث: نقص دم کی حالت عام طور پر اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ براہ راست کوئی جراثیم بدن کے کسی غیف تفرق انفال کی راہ بدن کے اندر داخل ہو جاتا ہے (تقیح) جیسا کہ گاہے اُن زخموں سے ہو جاتا ہے جو تشریح بعد الوفا سے پیدا ہوتے ہیں۔ یا اُن خراشوں اور جلد کے سوراخوں سے ہوتا ہے جو آلودہ سوئی یا دبا بیس (یا آلودہ آلات جراحیہ سے حادث ہوتے ہیں۔ یہ گاہے جراحی عملیات کے زخموں سے اور گاہے شدید جراحات تفرقیہ (پٹھے ہونے زخم) سے بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ حالت عام طور پر فائغرا ناساجیہ (پھیلنے والا فائغرا ناس) کے ساتھ پانی جاتی ہے۔ اور گاہے یہ فلعنونی اور کلتہ (نمل) کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ مریض جو اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے وہ عام طور پر نہایت نحیف و ضعیف اور رگی ہوئی حالت میں ہوتا ہے۔ جس میں گاہے اس وجہ سے بھی زیادتی ہو جاتی ہے کہ وہ شراب یا کسی دوسری چیز کا مادی ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی طبعی قوت بہت کم ہو جاتی ہے۔ اور مریض کے حملوں کے مقابلہ کی تاب نہیں رہتی +

مقام تقیح میں جہاں سے جراثیم داخل ہوئے ہیں گاہے کوئی مقامی کلینک

مکس بیسیس کولائی۔	مکس پوسٹ مارٹم انڈامی نیٹن۔
مکس بیسیس پاپسیانس۔	مکس پنز۔
مکس بیسیس اوڈی میٹس لگنی۔	مکس بیسی ریڈ انگریز۔
مکس گائوکس۔	مکس سیلولا ٹی ٹل۔
مکس اناکلشن۔	مکس کلکم ادریس۔

بھی ہوتی ہے۔ جنکو ہم نے بھی غلغلوئی کے زیر عنوان بیان کیا ہے۔ یہ علامت معمولی انتہائی سرخی سے لیکر شدید ترین خافضاً ساعیہ تک ہوتی ہے۔
 علامات عمومیہ۔ بخار ہوتا ہے جو گاہے شدید شریہ دھیریری اسے شروع ہوتا ہے۔ حرارت ایک سو چار یا ایک سو پانچ درجہ تک ہوتی ہے۔ اور عام طور پر اسی شدت کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ حمی لازمہ ہوتا ہے یعنی دن رات چڑھا رہتا ہے۔ جس میں کسی وقت خفیف سی کمی (فترتہ) آجاتی ہے۔ مگر وقفہ (تعلق) کبھی نہیں ہوتا۔ غذا کی خواہش بند اور ساتھ ہی سستی ہوتی ہے۔ زبان بھوری اور خشک ہوتی ہے۔ نبض سریع اور ضعیف۔ قلب کی آدازیں ہلکی۔ اور بذات خود قلب پیلا ہوا ہوتا ہے۔ جلد کی رنگت گاہے خفیف یرقانی ہوتی ہے اور خون کے نقطے نظر آتے ہیں۔ دست عام طور پر ہوتے ہیں۔ جس میں گاہے خون کی سرخی بھی نمودار ہوتی ہے۔ پیشاب زلالی ہوتا ہے۔ جس میں خون بھی ہوتا ہو مریض کو جزیان ہوتا ہے۔ اور ہائشی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ مر جاتا ہے۔ اور گاہے موت سے پیشتر سانس میں تنگی لاحق ہوتی ہے گاہے حرارت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور گاہے بہت گھٹ جاتی ہے۔ لیکن حرارت کا درجہ اعتدال سے کم ہونا اور باوجود اس کے نبض کا تیز ہونا ہمیشہ زیادہ خطرے کی علامت ہے۔ گاہے سفید دانٹے خون میں زیادہ ہو جاتے ہیں جو ابتدائی حالت میں زیادہ نمودار ہوتا ہے۔ لیکن بُری متمنیں اور جہلک علامات

۱۰ البیڑی ش یورن
 ۱۱ ڈیوریم
 ۱۲ کوما
 ۱۳ ڈسپینا۔
 ۱۴ لیکوسائی ٹرسس۔

۱۵ اسپرٹنگ گنگرین۔
 ۱۶ جنرل پمپش
 ۱۷ ریگر
 ۱۸ رمی شین۔
 ۱۹ انٹر سٹن

کے ظہور کے وقت یہ کیفیت نظر نہیں آتی۔ ان حالات میں اسی نسبت سے بیضادات کثیر النومی بھی بڑے جلتے ہیں +

گاہے اس مرض کی حالت اچھی رفتار پر ہوتی ہے۔ جبکہ مقامی مرکز عفونت کی موثر طریقہ سے تدبیر کی جاتی ہے۔ یا مناسب تلقیح کے ذریعہ علاج کیا جاتا ہے۔ حرارت بتدریج گھٹ جاتی ہے۔ اور مریض تسکلی سے اپنی سابقہ صحت پر لوٹ آتا ہے +

ظواہر بعد الوفاۃ۔ (موت کے بعد کے احوال) لاش میں تعفن و فساد بہت جلد شروع ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اعضاء کی سختی (صلابت بعد الموت) شدید نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح موت کے بعد اعضاء کی سیاہی (زرقت بعد الموت) علی الخصوص سطحی درمیوں کی لمبائی میں اور پیچھے کی طرف نمایاں ہوتی ہے۔ خون اچھی طرح نہیں جمتا ہے۔ اور وہ سیاہ قطران کی طرح ہو جاتا ہے۔ اگر خون کو ہٹرایا جائے تو جمائیت (معلل) داہنلے خون سے خارج ہوتی ہے۔ وہ بہت زیادہ رنگین ہوتی ہے۔ کیونکہ دیگر شدید احوال عفونت و معدوی کی طرح اس حالت میں بھی خون کے سنج دانے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی حالت کے پورے موت کے بعد کی سیاہی کی کمی و بیشی کا دار و مدار ہے۔ اور اسی وجہ سے قلب کی اندرونی جھلی (غشاء مبطن قلب) اور بڑی رگوں کا اندرونی طبقہ موت کے بعد رنگین ہو جاتا ہے۔ اور اس قدر رنگین ہوتا ہے کہ پہلے اسکو الہتہاف شریانی منتشر

۱۔ پالی نیوکلیر

۲۔ وکیمین۔

۳۔ ریگنڈرٹس۔

۴۔ کیڈا ویرکیریسی ڈیٹی۔

۵۔ نار۔

۱۔ سیرم۔

۲۔ انڈوکارڈیم۔

۳۔ میونیکا انٹی۔

۴۔ ڈیفیوز آرٹریائیٹس۔

(پھیلا ہوا) کا نتیجہ سمجھا جاتا تھا۔ آئینہ مائیک کی بہت سی فضائیں ایک رنگین سطوت سے کم و بیش بھری رہتی ہیں۔ اور تقریباً تمام آئینہ مائیک کے نیچے علی الخصوص آئینہ یعنی غلاف العکب اور غشاء الریہ کے نیچے خون کی جتیاں (نقطہ نزفہ) نمایاں ہوتی ہیں۔ پھیپھروں کے اندر علی الخصوص اس کے پچھلے حصے میں شدید جماع خون (اختقان) اور اوڈینا کی حالت ہوتی ہے۔ جگر، طحال اور گردے بڑے ہوتے۔ نرم۔ پلپے اور خون سے بڑھتے ہیں۔ یہ حالت طحال میں نسبتاً زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ اگر خردین سے امکان کیا جاتا ہے۔ تو اکثر مزد و مغررہ کے بشرہ میں انتفاخ غمی کی علامتیں پائی جاتی ہیں +

حکایات برائے توضیح احوال۔ ایک خادمہ جس کی عمر بائیس سال کی تھی۔ موسم گرما میں کسی کیرٹے نے اندرونی گوشہ چشم و باقی انہی کے پائٹس لیا اور غالباً یہ کیرٹہ کسی گندہ (ملوث) مقام میں تھا۔ جس سے زخم میں بھی گندگی جا پہنچی۔ چوبیس گھنٹے کے عرصہ میں اسے متلی شروع ہوئی۔ اور لرزہ و تافض اور سردی سے بجا چڑھا جہاں کیرٹے نے کاٹا تھا وہ ابھر گیا۔ اور اندرونی گوشہ چشم میں دردناک رم ہو گیا جو نہایت سے بڑھ کر نیچے کی طرف پھیل گیا۔ چوتھے دن کے ختم ہونے پر دیکھا گیا کہ اس کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی اور خون سے پر ہیں۔ اور ایک الہابی صلابت معلوم ہوتی تھی۔ جو ناک کی بالائی دیوار سے چہرہ۔ گردن اور ورید و داج کے مقام تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ صلابت غالباً ورید الوجه (چہرہ کی ورید) کی تھی۔ جو غلیظ ہو گئی تھی اور اس میں

مٹ ایڈیا۔

مٹ سکرٹینگ گلیٹنڈز۔

مٹ کاؤڈی سڑنگ۔

مٹ اپنی تعلیم۔

مٹ سیرس مبرین۔

مٹ پری کارڈیم۔

مٹ ہیورا۔

مٹ ٹیٹھی۔

مٹ کپسین۔

بھی شک نہیں کہ یہ صلابت صرف اسی درجہ تک محدود نہ تھی بلکہ آگے تک بڑھی ہوئی تھی + مریضہ کو بخار چڑھا ہوا تھا۔ اور ہڈیاں میں یک سری تھی۔ چشم خانہ میں شگاہ دہے گئے تاکہ تناؤ اور دم میں تخفیف ہو۔ اور جو پیپ وہاں موجود ہے وہ آسانی سے نکل سکے۔ مگر مفائدہ۔ اس کے بعد مریضہ کو میند کی سی کیفیت (رہات) طاری ہو گئی۔ اور ایک ہفتہ کے بعد مر گئی +

دوسری حکایت۔ ایک بوڑھا آدمی شرک پر گر پڑا۔ دائیں طرف سے سسکا ہاتھ چل گیا۔ ایک ہی دن میں اس کی کلائی پھول گئی۔ اور دو روز کے بعد غائر اپٹوڑا ہو گیا۔ ارتشاح یعنی انصباب رطوبات کی کیفیت شانہ یک بڑھ گئی۔ اور پانچ روز کے بعد مریض شدید تقفن دم سے مر گیا +

تشخیص۔ تتم عن کو ان حیثیات طفیدہ بخارجین سے بدن پر دوڑے پیدا ہوں اسے شخص کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے جو نہایت درجہ شدید ہوں۔

اور جن میں مریض اس قدر جلد ہلاک ہو جاتا ہے کہ ان حیثیات کے خصوصی علامات نمایاں بھی نہیں ہونے پاتے۔ اس متم کے حالات میں عموماً تشخیص کرنا ناممکن ہوتا ہے جب تک کہ اصل عدوی کی کوئی علامت وہاں موجود نہ ہو + اسی طرح شدید شتم دم کی صورت میں جراثیم عدوی (عضوت) کا کوئی نمایاں مقام ضرور ہوتا ہے

لیکن گاہے شتم دم کی حالت اس قدر شدید ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے یہ باور کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ آیا تقفن دم موجود ہے یا نہیں۔ لیکن اگر زخم کو اچھی طرح کھول دیا جاتا ہے اور مواد کے بہاؤ کا مناسب انتظام کر لیا جاتا ہے۔ تو بخار کے فوراً زائل ہو جانے سے اس امر کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی خطرناک عدوی ضرر نہیں ہے۔ بلکہ محض مقامی فساد ہے۔ اگر تقفن کو زیادہ واضح کرنے کی ضرورت ہو تو خون کو

طریق ذریعہ رکاشت کے ذریعہ سے امتحان کر کے دیکھا جائے اگر جراثیم موجود ہونگے۔ تو تعفن دم سمجھا جائے گا۔ درنہ ستم دم + اسی طرح اسکو تعفن دم سے اس طرح مشخص کیا جاتا ہے کہ تعفن میں قشریہ دھیریری (بار بار نہیں آتا۔ اور نہ پھوٹا) راخر چٹا فوجیہ نکلتے ہیں +

انذار رائج نام مرض بتانا + شدید تعفن دم کا انجام علی العموم خطرناک ہوتا ہے لیکن اگر جدید وسائل علاج استعمال کیے جائیں جنکا ذکر ذیل میں کیا گیا ہے۔ تو امید چھی ہو سکتی ہے۔ اور انجام مکی بقدا دگھٹ سکتی ہے +

علاج۔ التهاب کے مقامی مرکز کا نہایت عجلت کے ساتھ علاج کیا جائے چوڑے چوڑے بہت سے شگاف دیں۔ صاف کریں۔ اور مواد کے اخراج کا مناسب انتظام کریں۔ یا اس مقام کو کلینینہ کاٹ کر پھینک دیں۔ لیکن انفوس یہ ہے کہ یہ عمل اکثر بے سود ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ خون اس سے پہلے آلودہ ہو چکا ہوتا ہے۔ ان تدابیر کے ساتھ مقویات۔ محرکات اور مناسب تغذیہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر سبب مرض کو ایات عقدیہ ہوں۔ تو معمل صند کر دیا عقدیہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس طریقہ علاج سے اکثر کامیابیاں ہوتی ہیں + یا یہ کہ ورید کے اندر معملی محلول ننگ کو بڑی مقدار میں پکپکاری کے ذریعہ داخل کریں۔ یہ عمل ون میں دو تین بار کرنا چاہئے۔ اس عمل سے پیشاب اور دست بہتر آتے ہیں۔ جس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جراثیم اور اس کے مواد خارج ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ علاج جتنا کہ ستم دم میں مفید ہے اس قدر حقیقی

۱۔ اسٹرپٹوکوکس۔

۲۔ اینٹی اسٹرپٹوکوکس سیرم۔

۳۔ مارل سیلان سویڈش۔

۱۔ پانی میا۔

۲۔ سکندری اسپرمنز

۳۔ پراگنوسس۔

تقضن دم میں نہیں ہے +

بعض حالات میں تلقیح ذاتی سے علاج کیا گیا ہے۔ اور کامیابی ہوئی ہے چنانچہ اگر وقت اور مہلت اس کی اجازت دے دیکر نہ کہ تلقیح کے تیار کرنے میں تین چار روز صرف ہو جاتے ہیں، تو اس طریقہ علاج کو بھی برتنا چاہئے۔ اور اس عرصہ میں تلقیح ذخیرہ استعمال کی جاسکتی ہے۔ جو اسی قسم کے خارجی جراثیم سے تیار کی گئی ہو +

تلقیح عینی یا تلقیح ذاتی سے وہ مادہ تلقیح ہے جو براہ راست مریض کے خون سے تیار کی گئی ہے۔ اور تلقیح خارجی یا غیر عینی سے مراد وہ ہے جو دوسرے شخص کے خون سے تیار کی گئی ہو۔ مترجم۔

لیکن یہ ضروری ہے کہ شدید اور مہلک احوال میں اس سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ جتنا کہ علاج بالاصل ہے۔

تقضن دم مزمن

تقضن دم کی ایک مزمن صورت بھی معلوم ہوئی ہے۔ جو سفوفوں بلکہ بعض ہینوں تک چلی جاتی ہے۔ اس کی تاریخ بھی عام طور پر مقامی التهاب سے شروع ہوتی ہے جس سے مریض کبھی ہی پورے طور پر شفا یاب نہیں ہوتا ہے۔ بخار کی شکل غریبی کی سی ہوتی ہے۔ جس کی حرارت ہر رات تین چار درجہ تک چڑھ جاتی ہے۔ جس کے ساتھ پسینہ بکثرت آتا ہے۔ جراثیم خون میں امتحان سے کبھی کبھی معلوم ہوتی ہیں۔ اس مرض کا عمومی سبب یہ ہے کہ عرصہ تک دوران خون میں کسی مقامی تلقیح سے

۱۔ آڈو جینس وکیمن۔

۲۔ اسٹاک وکیمن۔

۳۔ آڈو جینس

۴۔ اگر جینس وکیمنز

۵۔ سیرم ٹریٹ منٹ۔

مثلاً دیکھ لیں کہ سے یا قرعہ مرارہ سے یا قلعہ زائده دودھ سے یا قلعہ جراثیم جذب ہوتے رہتے ہیں۔ بعض حالات میں قلب کی اندرونی غشاء کا التهاب مُعَدِّی رُحْمٰی کا التهاب اسکا سبب ہوتا ہے۔ مریض کی صحت اور قوت بند کچ کم ہوتی جاتی ہے۔ اور اگر مقامی ضرر کا علاج نہ کیا جائے۔ تو موت واقع ہوتی ہے۔

دستکاری کرنا ایسے کمزور مریض میں اگرچہ ایک خطرناک امر ہے۔ لیکن ازالہ سبب کے لیے اہلی علاج بھی ہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ تلیق کے ذریعہ بھی علاج کیا جلتے۔ تاکہ عمومی صحت و قوت میں ترقی ہو۔ اور خون اور انسجہ اعضا میں مقابلہ کرنے کی قوت پیدا ہو۔

۵۔ قلعہ دم

یہ ایک مرض ہے جس کی خصوصی علامات ایہ ہیں کہ باری سے بخار آتا ہے رُحْمٰی ثَابِتہ یا حُمّی متقطعہ (ساتھ ہی بدن کے مختلف مقامات میں متعدد پھوڑے نکلتے ہیں۔ جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی مقامی زخم سے مواد صدیدی (سپ) تمام بدن میں جذب ہو کر پھیل جاتے ہیں۔

بکثرت جراثیمی۔ ہر قسم کے صدیقیہ جراثیم اس مرض کے باعث ہو سکتے ہیں۔ اور عام رائے یہ ہے کہ قلعہ دم کسی خراجِ حاو سے بطور عرض کے پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ پھوڑوں میں انگوڑی بہت جلد بن جاتے ہیں جو جراثیم کو پھیلنے سے باز رکھتے ہیں۔ اس قسم میں زیادہ تر جو جراثیم پائے جاتے ہیں وہ کرب دیات عقدیدہ صدیدیہ ہیں لیکن بعض حالات میں کرب دیات غنقدیہ

م۔ پانی سیا۔

م۔ انٹری ٹنٹ نیور۔

م۔ اسٹریٹو کاکس باؤجے سن۔

م۔ اسٹریٹو کاکس باؤجے سن آفیس

م۔ ایس آف دی بور۔

م۔ سپورے ٹنگ گال ہیڈر۔

م۔ سپورے ٹنگ انڈکس۔

م۔ پانی اوریا اوی اولیہ سن۔

م۔ انٹرو انفا میشن

صدیہ یہ نارنجیہ (ذبیہ) بھی نظر آئے ہیں۔ لیکن ان سے کم کرمیات ذات الریہ۔ کرمیات سوزاک اور کرمیات حمی معویہ پائے گئے ہیں۔ یہ امر تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ اگر جراثیم کر دیہ پککاری کے ذریعہ دوران خون میں شامل کر دیے جائیں تو تیق دم کی حالت نہیں پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر یہ شمار میں قلیل ہوتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لئے مبنی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے (حمی دقیقہ) اس کے بعد بدن کی طبعی اور پریشیدہ قوتیں بیدار ہو کر ان قلیل تعداد جراثیم کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں لیکن اگر جراثیم کی تعداد بڑی ہو یا اُس شخص کے بدن میں قوت مقابلہ ضعیف ہو۔ تو اس وقت تیق دم کے عوارض نمودار نہ ہونگے۔ بلکہ تعفن دم کے علامات پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر خصوصی احوال موجد ہوں جو خراجات شبیہ (داخلہ بڑیہ) کے لئے آمادہ کر رہے ہوں۔ تو ممکن ہے کہ تیق دم پیدا ہو جائے۔ اگر یہ جراثیم ایسے مواد سے ملا دیے جائیں یا ایسے ٹکڑوں کے ساتھ جمع کر دیے جائیں جن کے ساتھ یہ جراثیم آخری شرائین صغیرہ اور عروق شریہ میں جا کر پھنس جائیں۔ تو یہ ٹکڑے جہاں رکیکے وہیں پھوٹے پیدا ہو جائیں گے۔ انسان کے اندر عروق کے ان سداں میں کثرت الزجہ یعنی جراثیم کے جھوٹے ہونگے۔ یا ٹوٹے ہوئے خون کے ٹوٹکڑوں کے عفنئی ٹکڑے ہونگے۔

سبب تیق دم کی صورت یہ ہوتی ہے کہ عفونی سدے پیدا ہو کر دوران خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ صورت عام طور پر وریدوں میں کسی سدہ کے (ٹٹ جانے سے) (التهاب وریدی عفونی سے) اور گاہے قلب میں (التهاب

۳۱ انفکٹڈ۔

۱۔ ٹرانزی انٹ پائی رکیہ۔

۳۲ انفکٹڈ فائی ٹس۔

۳۳ امبولک ایس۔

۳۴ انفکٹڈ کارڈائی ٹس۔


۳۵ زد گلیا۔

عصفونی بطن قلب واقع ہوتی ہے + بڑیوں کی بیج مشاشی ریشہ اسٹیفنی کا الہاب
 ماد عصفونی عام ہمد پر تھچ دم کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ کیونکہ دریدیں بڑیوں میں
 کثرت سے ہوتی ہیں۔ اور ان کی دیواریں ان میں باریک ہوتی ہیں۔ نیز ان میں
 تناؤ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ بڑیوں کی ساخت جو اس پر محیط ہوتی ہے یہ
 سخت ہوتی ہے + گہے تھچ دم کھوڑی کی بڑیوں کے اُس الہاب سے
 پیدا ہوتا ہے جو کان کے درمیانی حصے (جوبہ) کے مرض سے ہوا ہو۔ کیونکہ
 اس سے دماغ کی درمیانہ جانی میں سدہ پڑ جاتا ہے + گہے یہ مرض اس طرح
 پیدا ہوتا ہے کہ رحم کی بڑی بڑی رگیں بحالت نفاس بعد ولادت کھلی رہتی ہیں۔
 اور ان رگوں کے پاس متعفن مواد موجود ہوتے ہیں۔ جو عروق میں جذب ہو کر چلے
 جاتے ہیں +

جب عصفونی سدے کسی مقام میں ٹہرتے ہیں۔ تو وہاں سدہ پیدا ہو جاتا ہے
 (تشخیر) اور اس سدہ میں نہایت سرعت سے جراثیم ترقی پذیر ہو کر اور عروق
 کی دیواروں کو پھاڑ کر اس پاس کی ساختوں میں چلے جاتے ہیں۔ جہاں پہلے
 الہاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا انجام تھچ پر ہوتا ہے + اس قسم
 کے الہاب انت پھیپھروں میں عام طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ جو زیادہ تر اس کے
 پچھلے کندے میں سطح سے قریب پھیل جاتے ہیں۔ ہر ایک مقامی الہاب سرعت
 تمام محدود ہو کر اور گھبر کر ہجر کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جس کا قاعدہ یا چوڑا
 حصہ سطح محیط کی طرف اور زاویہ یا نوکیلا حصہ عصفونی گہرائی کی طرف مائل ہوتا ہے
 اسکارنگ اوائل میں انصباب دم کے باعث سرخی مائل ہوتا ہے (انصباب موی)

ملکین سلس ٹشو۔	ملک تھراس
ملک بیئرل سائنس	ملک ہمویریک انفارکٹ۔

(۱۴) تفتیح الدم کی صورت میں ایک ورید کے اندر سد کے
متفرق ریزے ہیں



اس سدہ کا سرا بڑی ورید کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جس کے اندر اب تک
دوران جاری ہے اور اسی سدہ سے متغص سدے آسانی سے
جدا ہو کر پھیل رہے ہیں۔

لیکن بہت جلد اس کا رنگ تغیر ہو کر زرد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پیپ پڑ جاتی ہے + یہ پھوٹے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور بدن کے اندر طبعی علامتیں بہت کم نمودار ہوتی ہیں + گاہے دیگر اعضائے بدن میں بھی پیپ کا جھٹکا اسی طرح دیکھا جاتا ہے۔ خواہ اس سے پہلے انقباض دوسری رات ہو یا نہیں۔ جو سبب عام بدن کی وریوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ پھیپھڑے چونکہ مریض کا کام کرتے ہیں۔ اس لئے طبعا اس میں پھیپھڑے تمام اعضائے پہلے مبتلا ہوتے ہیں۔ اور ان پھوڑوں سے بدن میں پیدا ہوتے ہیں۔ عدوی نظام شریانی میں پہونچ جاتا ہے۔ جس سے جگر۔ لہحال۔ گردے۔ دماغ۔ جوڑوں کے اندر ان کے گرد اور دیگر اعضائے نئے مراکز قلع بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر التهاب ویدی ہو جو کہ اصل سبب مرض ہے) باب الکبد میں ہو تو ابتداءً سدہ جگر میں پھرتا ہے۔ اور التهاب باب الکبد کے آثار نمایاں ہوتے ہیں + جب سبب بقا ویر زیادہ ہوتے ہیں۔ تو علامات زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ اور مستند قید تھو۔ دم تھو حاد پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ گاہے جراثیم بھی خون کے اندر نشوونما پانے لگتے ہیں۔ اس وقت اسکو تعفن دم صمدیدی کہتے ہیں۔ اس حالت میں مریض گاہے پھوڑوں (آخر جراثیم) کے پورے طور پر نکلنے سے پہلے ہی مر جاتا ہو لیکن اس کے علاوہ دیگر احوال میں جبکہ جراثیم خون کے اندر نشوونما پائے ہوں اگر عمومی عوارض بدن میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ جراثیم کی ترقی کا نتیجہ نہیں ہوتے۔ بلکہ مقامی مرض سے مواد سمیہ خون کے اندر جذب ہو کر پھیلے جاتے ہیں +

مثلاً ایکوٹ پانی سیا۔

مثلاً پاپوسپی سیسا۔

مثلاً سکندری ایس۔

مثلاً فلٹر۔

مثلاً پورٹل دین۔

مثلاً پائیکسٹک پانی ش۔

اگر سد سے تعداد میں کم ہوں اور جراثیم کی افزائش مثل خون میں بالکل نہ ہو۔ یا تھوڑی ہو۔ تو اس وقت اسکو مزمن یقیم دم (تقیع مزمن) کہتے ہیں +

علامات۔ تقیع حاد کے حملہ کی نمایاں علامت یہ ہے کہ بحالت بخار شدید لرزہ ظاہر ہوتا ہے۔ جو بے قاعدہ طور پر بار بار لوٹتا ہے۔ مگر ہر دو روزت کے درمیان علی العموم چوبیس یا اڑتالیس گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی حالت حی منقطعہ دباری کے بخار سے مشابہ ہوتی ہے۔ اس مرض کا لرزہ دوسرے امراض کے لرزوں سے اگرچہ مختلف نہیں ہوتا ہے۔ مگر اسکا لرزہ زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پسینہ بکثرت آتا ہے + ہر دو روزت کے درمیان گاہے حرارت اتر کر درجہ اعتدال پر آجاتی ہے۔ لیکن عام طور پر اس سے اوپر ہی رہتی ہے + جلد گرم ہوتی ہے۔ اور اسکا رنگ خاکستری ہو جاتا ہے۔ جس میں خون کے سرخ سرخ دبے (تقیع نزفیم) نظر آتے ہیں۔ اور ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ سانس کی نوکروہ میٹھی سی سوکے گھاس کے مانند ہوتی ہے + انخطاط قوی کے علامات ظاہر ہوتے ہیں۔ مریض بہت جلد ڈبلا ہو جاتا ہے۔ نبض (پتن دزیم) اور ضعیف ہو جاتی ہے۔ بدن سے رطوبات کا اخراج کم ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت مریض کو ہڈیاں ہوتا ہے۔ لیکن باوجود ہڈیاں کے ہوش نہیں جلتے + اگر قلب کے مقام پر غیر طبعی آواز لفظ موجود ہو تو یس امر کی علامت ہے کہ قلب کی اندرونی جھلی میں عفونی التهاب ہے۔ جو اکثر ہوا کرتا ہے + زبان کی حالت مختلف ہوتی ہے۔ اکثر یہ سرخ ہوتی ہے

۱۔ ویک پس۔

۲۔ ڈییریم

۳۔ بروٹ۔

۱۔ کرائک پانی سیا۔

۲۔ پنے چیل ہچیز

۳۔ سافٹ پس

اس کی لمبیدیاں (حلمات) خوب اُبھرتی رہتی ہے۔ پھر زبان کا رنگ بھورا اور یہ خشک ہو جاتی ہے + پہلے ہفتہ کے آخر میں پھوڑے نمودار ہوتے ہیں۔ جن کے ساتھ گاہے درد نہیں ہوتا ہے۔ اور نہ ذکاوت حس (مصناعت) ہوتی ہے۔ اور یہ جلد نکل آتے ہیں + جوڑ اکثر شریک مرض ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں پیپ بھر جاتی ہے۔ جس کے ساتھ یادرو باطل نہیں ہوتا۔ یا توڑا ہوتا ہے۔ اگر اس کا جلد علاج نہ کیا جائے۔ تو جوڑ خراب ہو جاتا ہے اور اپنی جگہ سے ٹل جاتا ہے۔ اور جوڑ طربت یہاں سے نکلتی ہے وہ صدیہ سی (پیپ کی) ہوتی ہے۔ یا رقیق و روغنی۔ جس میں جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں + پھوڑے احشام کے اندر چھوٹے چھوٹے اور متعدد ہوتے ہیں + جب یہ پھوڑے نکل دماغ جیسے اعصاب رُمید میں ہوتے ہیں۔ تو موت اس مقامی (افزائش دہوڑے) سے واقع ہوتی ہے۔ ان پھوڑوں کی خصوصیت یہ ہے کہ داخل میں اریکہ (انگوڑ زخم) بالکل نہیں ہوتا۔ جو پیپ اور اہلی ساخت کے درمیان داخل جس کے یہی وجہ ہے کہ خواہ انکو جلد کھولا جائے اور ان کے پاک رکھنے میں پوری سعی کی جائے۔ پھر بھی یہ پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ اور ان سے پیپ کا بہنا جاری رہتا ہے۔ حالانکہ معمولی پھوڑوں میں یہ بات نہیں ہوتی (وہ اگر صفائی و پاکیزگی کے ساتھ کھولے جائیں۔ تو بہت سرعت سے بھرنے لگتے ہیں) +

ان حالات میں عام طور پر جلد کے نیچے کی نیچ خلوی میں دردناک سے یا دوجے (بقدر ممکنہ) ادھر ادھر پیدا ہو جاتے ہیں۔ جس کے اندر جراثیم خون ہوتا ہے۔ اور جو چند روز میں غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ دراصل چھوٹے چھوٹے

۱۔ وٹیل آرگنیز

۲۔ مین فل پیج

۱۔ پٹی

۲۔ شذرش

عقونی سدوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جس کے زائل کرنے کے لئے مریض کی ذاتی قوت حیوانی کافی ہوتی ہے۔ اور پیپ پڑے بغیر اسکا ازالہ ہوجاتا ہے۔

تقیح دم مزمن میں بخار کی علامتیں بہت کم نمودار ہوتی ہیں۔ پھر دسے بھی تعداد میں چند ہوتے ہیں۔ نیز یہ اگر اہم اور شریعت اعضاء میں نہ ہوں تو خطرناک بھی نہیں ہوتے۔ چنانچہ اگر مریض کے دماغ کے بطون جانبہ میں پھوٹا ہو تو اسکی ہلاکت کے لئے صرف یہی کافی ہوتا ہے۔ خواہ تقیح دم کے علامات میں سے کوئی علامت سوائے بے قاعدہ طور پر اندوہ و حرارت ہو جانے کے نہ پائی جاتی ہو۔ اسی طرح گھبے اُس وقت بھی ہلاکت ہوجاتی ہے جبکہ کسی ایسے مریض میں دشکاری کی جاتی ہے۔ جبکہ تعلق گردے کے ساتھ ہو گیا ہو۔ اور اسکو خراب کر دیا ہو۔ اگر یہ مرض کسی بیرونی زخم کی وجہ سے پیدا ہوا ہو۔ تو زخم کی حالت نہایت خراب ہوتی ہے۔ یہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کی سطح خشک، چکڑا اور امثال اندمال کے لحاظ سے سست ہوتی ہے۔ اور نئی نیچ نمبی جو اس پیدا ہوتی ہے۔ وہ ٹوٹ کر خراب ہوجاتی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ زخم کے اندر انگور کا صمغ طبقہ ہی حقیقت میں ایک آڑ ہوتا ہے۔ جو جراثیم وغیرہ کو خون کے اندر جذب ہونے سے روکا کرتا ہے۔ اور تقیح دم پیدا نہیں ہونے پاتا۔ کیونکہ انگور کی ساخت میں ایسے خلیات ہوتے ہیں۔ جن میں جراثیم کے ہلاک کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ اگر یہ مرض کسی ہڈی کے تعلق سے پیدا ہو۔ تو زخم کی گہرائی میں ہڈی علی العموم ٹنگی نظر آتی ہے۔ اس کے ادھر کی جھلی فائب ہوتی ہے۔ اور اس کے استغنی خانے پیپ یا گلے ہوشے گودے سے جبرے ہوئے پائے جاتے ہیں۔

علامات بعد المات۔ موت مقام کی درمیں علی العموم بحالت التباب

ہوتی ہیں۔ ان کے طبقات ویز ہو جاتے ہیں۔ اس کی خلا میں نرم۔ زرد داٹا ہوا خون کا ٹکڑا (جلطہ) پایا جاسکے گا۔ جو دور تک پھیلا ہوا ہوگا۔ ورید کے گرد کی ساخت بھی تفتیح میں شریک ہوگی (التهاب محیط ورید) + پھوٹے بدن کے مختلف مقامات علی الخصوص پھیپھروں میں نظر آئیں گے۔ اور سداں کے دیکھنے سے یہ بھی صاف طور پر نمایاں ہوگا کہ یہ ابھی اپنے کس دور میں ہیں۔ یعنی ابھی صرف اجتماع خون ہی ہوا ہے۔ یا مکمل پھوڑا بن گیا ہے۔ یا اس کے درمیان کسی دور میں ہے + اس کے علاوہ اس میں وہ عام علامتیں بھی موجود ہونگی جو قسم دم کی دیگر حالتوں میں پائی جاتی ہیں +

تشخیص۔ عام طور پر تفتیح دم کی تشخیص دشوار نہیں ہوتی۔ لیکن اگر یہ مرض کسی ہمدانی اور نمایاں زخم سے نہ ہو۔ بلکہ کسی اندرونی پوشیدہ مرکز سے پیدا ہوا ہو۔ یا یہ کہ مقامی زخم کی اہمیت کا صحیح طور پر اندازہ نہ کیا گیا ہو تو اس کی علامتیں غلطی سے شدید مراحض مفاصل (گٹھیا) یا تپ لرزہ کی علامتوں سے مشابہ سمجھی جاتی ہیں +

انداز۔ انجام مرض کا دار و مدار مریض کی طبعی قوتوں اور مرض کی شدت پر ہے۔ چنانچہ مرض اگر شدید ہو تو انجام عام طور پر خراب ہوتا ہے۔ اور سات یا دس روز میں ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر شدید نہ ہو تو شفا نہ صرف ممکن الوقوع بلکہ طلب ہے۔ بشرطیکہ مقامی پھوڑے اچھی جگہ پر واقع ہوں +

علاج

مقامی علاج یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو دوران خون میں اور زیادہ مدد دی اور سموت کو شامل ہونے سے روکا جائے۔ کیونکہ یہ مرض عام طور پر اسی طرح ہوتا ہے

ملا پر انکوسس۔

کو متعین شدہ کسی ورید سے جدا ہو کر خون میں شامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کا ذریعہ یہ ہے کہ اگر زخم یا تھپان میں ہر تو زخم کے مقام سے بہت زیادہ اوپر عضو کو کاٹ کر الگ کر دیا جائے (تشریح)۔ اور اگر یہ مرض اس جہ سے ہو کہ بڑی کاگو داغراب ہو گیا ہو تو اس کو دے کو زخم کے ستر اگلا ہوگا) اچھی طرح کھرچ کر دور کر دیا جائے۔ اور اس کے جوف کو کسی داغ عنونت سے پاک کر دیا جائے۔ اور اگر یہ مرض اس وجہ سے ہو کہ نرم اعضاء در مثلاً عضلات امین زخم ہو تو بہتر یہی ہے کہ مہتب ورید اور اس پاس کی ساخت کو خارج کر دیا جائے یا یہ کہ ورید کو سدہ اور قلب کے درمیان باندھ کر سدہ کو دور کر دیا جائے۔ اس طریقہ علاج کی ایک فرضی مثال یہ ہے کہ اگر کان کے درمیانی حصے کے مرض کی وجہ سے دماغ کی ورید جاتی میں درم پیدا ہو جائے۔ تو پہلے دماغ عائر کو گردن میں باندھنا چاہئے۔ اس کے بعد ورید جانی کو مشتبہ منشاری رگل سی آری سے یا مجرور چھینی اسے بڑی کاٹ کر نمایاں کرنا چاہئے۔ اس کے بعد ورید مذکور کو کھول کر اس کے اندر کے سدوں کو اوپر نیچے سے دور کر دینا چاہئے۔ اس طریق علاج سے اچھے نتائج پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں یہ علاج ناممکن لعل ہو تو جراح نامہ سے زائد جو کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مقامی مرض (زخم) کو جہاں تک ممکن ہو اُسکو اچھی حالت میں رکھا جائے۔ تنافذ کو دور کیا جائے۔ اور اصلی پاکیزگی و نظیر کا پورا انتظام کیا جائے + پھوڑوں کو اگر ممکن ہو تو فوراً کھول دیا جائے۔ اور اخراج مواد کی صورت پیدا کی جائے۔ یا آلہ شافط کے ذریعہ کی رطوبت و سپ وغیرہ چسلی جائے + اس قسم کے زخم عام طور پر آسانی سے

۱۔ ٹیٹس فائن۔

۱۔ ایپوٹین۔


۲۔ بیٹرل سائنس۔

۳۔ اسپائی ریٹرو۔

۴۔ انٹرنل جوگولر وین۔

بھرنے لگتے ہیں۔ اور جو ٹرن میں کہ پیپ بھر جاتی ہے وہ بھی اس طرح شفتاب ہو جاتے ہیں کہ ان کی حرکت میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ لگاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ باوجود پوری صفائی رکھنے اور کامل تطہیر کرنے کے نتیجہ برابری رہتا ہے۔ اور لگاہے اس کے ساتھ پھوڑے کی دیواریں بھی لگتی چلی جاتی ہیں۔ ایسی حالت میں اگر عام ہر فی صحت کو درست کیا جائے۔ تو کچھ عرصہ میں زخم کے اندر انگوڑ بنکر آڑ بن سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد زخم بھر سکتا ہے۔

علاج ہر فی یا عمومی۔ اس مرض کا عمومی علاج یہ ہے کہ مریض کی قوت کو قنّا اور مقویات سے قائم رکھا جائے۔ اور اس کی نگہداشت کی جائے کہ مریض میں قروح قطعات زخم بستر یا کوئی اور مقامی زخم نہ ہونے پائے۔ کتہ کتہ صفصات آگین دیا جاسکتا ہے۔ مگر اس کا نتیجہ موہوم ہے۔ مصلّٰی صندکریات عقدہ یہ بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اور اکثر اوقات اس سے اُن احوال میں فائدہ بھی ہوتا ہے جنہیں مرض نے زیادہ طویل نہ کھینچا ہو۔ اسی طرح علاج بالقلع کی بھی آزمائش کر لینی چاہئے۔



۱۔ اینٹی اسٹریپٹوکوکک سیرم
۲۔ وکیسین ٹریٹمنٹ۔

۱۔ ڈسور
۲۔ سلی سیلٹ آف کوئین۔

باب چہارم تقرح - قرح بننا

تقرح سے مراد بنی ساخت کے ذرات کا مردہ ہو جانا ہے۔ یعنی اس حالت میں اعضاء کے سطحی اجزاء متفرق و پراگندہ ہو کر رطوبت کی شکل اختیار کر کے نیا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حالت بغیر خشک ریشہ یعنی کھرنڈ کے پیدا ہوتی ہے تقرح کی حالت غافلانہ سے بہت کچھ موافقت رکھتی ہے۔ مگر دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ غافلانہ میں بدن کا بڑا حصہ مردہ ہوتا ہے۔ اور ساخت کا وسیع حصہ و فتنہ اپنی قوت حیات کو کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن گاہے دونوں حالتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور حقیقت میں بھی یہی ہے کہ دونوں حالتیں ساخت کے مردہ اور بچان ہونے پر ولالت کرتی ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ تقرح کی حالت میں مردہ ذرات معمولی نیکی آنکھ سے واضح طور پر نظر نہیں آتے ہیں۔ لیکن غافلانہ کی حالت میں مردہ اجزاء نہایت واضح ہوتے ہیں۔ بشرطیکہ غافلانہ بدن کی زیر مٹی سطح میں ہو۔

فن جماعت میں قروح کی تین قسمیں بتائی جاتی ہیں۔

۱۔ وہ قروح جو ضربے صدمہ یا جراثیم صمدیہ غیر نوعیہ سے پیدا ہوتے ہیں مثلاً قروح ساعیہ (رپھیلنے والے قروح) قروح لمتحہ (بھرنے والے قروح) قروح مزمنہ +

مث قروح ساعیہ۔ اس پر ڈنک السر۔

مث قروح لمتحہ۔ ہیڈنگ السر۔

مث قروح مزمنہ۔ کراٹک السر۔

مث تقرح۔ السر بیٹ۔

جراثیم صمدیہ غیر نوعیہ۔ ان اس پر سے
مثک ہا پرچمک بیکٹیریا۔

۲۔ وہ تقرح جو جراثیم نوعیہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً قرحہ رخوہ۔ قرحہ قراشیہ
قرحہ دینیہ۔ قرحہ افرنجیہ

۳۔ قرحہ خبیثہ۔ مثلاً قرحہ اکالہ۔ سرطانیہ بشریہ۔ سقیروشیہ۔ اور فطریہ۔
اسباب۔ سطح بدن پر بیج بینی فراش پیدا کرنے والے سبب کے لگنے
سے قرحہ پیدا ہوتا ہے۔ بشرطیکہ وہ سبب بیج اتنا شدید ہو۔ اور اتنی دیر تک
قائم رہے کہ وہاں مقامی طور پر التهاب (سوزش) پیدا کر دے اور آخر میں
اُس مقام کی ساخت کو تلف کر دے۔ اس عمل میں ہر ایک بیج شریک ہے۔
خواہ وہ کیسا وی ہو۔ یا از قہر حرارت۔ یا سبب آبی (جسمانی) یا عفونت ہو۔ علامہ
ازیں تمام وہ عوامل و مؤثرات جو التهاب کے نئے عضویں مستعد و پیدا کر دیتے
ہیں۔ وہ تقرح کے وقوع میں سرعت پیدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ مناد الخذیہ خواہ
یہ کمی خون و فقر الدم کی وجہ سے ہو۔ یا مزمن امتلاء و موی (احتقان و موی) کی
وجہ سے۔ یہ عمل تقرح میں اصناف و سرعت پیدا کر دیتا ہے۔ علاوہ ازیں کسی عضو
کی بھی (خدر) اور مراکز غذائیہ سے اسکا منقطع ہو جانا بھی مریض کے شعور کو ہلکا
کر دیتا ہے۔ اور اُسے سبب بیج کے ثبات و قیام کا اور اُن کے احساس نہیں ہوتا
جس سے التهاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں اُس کے اجزاء تلف ہونے لگتے
ہیں۔ جیسا کہ پانچویں عصب کے کاٹ دینے کے بعد قرنیہ میں قرحہ واقع ہوتا

مثلاً سرطانیہ بشریہ۔ اپنی تیلیو سے شش۔
مثلاً سقیروشیہ۔ اسکیرس۔
مثلاً فطریہ۔ فنگل ٹنگ۔
مثلاً آبی۔ میکائیل۔
مثلاً مراکز غذائیہ۔ ٹروڈنک سنسرس۔

مثلاً قرحہ رخوہ۔ سانٹ شنگو۔
مثلاً قراشیہ۔ یو پائڈ۔
مثلاً دینیہ۔ یو برکیوس۔
مثلاً زہریہ۔ سفلی ٹک۔
مثلاً قرحہ خبیثہ۔ ملگ خینٹ اسر۔
مثلاً قرحہ اکالہ۔ روڈنٹ اسر۔

ہے۔ اور جیسا کہ مخافت بدن کی حالت میں پاؤں میں تقرح ثاقبہ مارض ہوتے ہیں + اور امراض خبیثہ میں گاہے درم کا ابھرتا بھی اس کے نتیجہ و خاش کا سبب بنتا ہے۔ لیکن تقرح کا بڑا سبب جلد یا غشاء مخاطی کے اندرونی طبقات کا فنا ہو جانا ہے۔ لیکن جب بیرونی سطح کا بشرہ بھی متغیر ہو جاتا یا مفقود ہو جاتا ہو تو پھر ان کا عوض بنانا ممکن ہوتا ہے +

۱۔ قروح عارضہ جراثیم صیدیہ غیر نوعیہ سے پیدا ہوتے ہیں

تغذیوات تاریخی :- اس قسم کے زخم جلد یا ہڈی پر اچھے ہو جاتے ہیں۔ اور ہر ایک قرحہ کے لئے تین درجات (ادوار) میں گذرنا ضروری ہے (۱) اصلی تقرح یا پھینے کا دور (۲) دور انتقال۔ اس درجہ میں قرحہ کے قلم ہونے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ یہ درجہ قرحہ کی رفتار کے مطابق چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے۔ یہ دور اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک زخم کے اندر انگور (اریکٹ) ابھر نہیں آتے ہیں (۳) دور التمام یا زمانہ شفا۔ یہ قابل توجہ امر ہے کہ اصلی تقرح کا زمانہ فوری پہلا دور ہے۔ جب پہلا دور ختم ہو جاتا ہے تو حقیقی قرحہ بھی نائل ہو جاتا ہے۔ صرف اس کے بعد سطح عضو کی وہ کمی رہ جاتی ہے جو پہلے دور میں تقرح کے نتیجہ سے پیدا ہوئی ہے + جب تمام قروح مذکورہ بالا ہر سہ ادوار میں گذرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہر بیض قرحہ ان تینوں ادوار میں سے کسی ایک دور میں ہوگا۔ لیکن بعض اوقات طبعی طور پر بڑے قرحہ میں تینوں دور ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور گاہے اندرونی یا بیرونی اسباب سے بھرا ہوا زخم دوبارہ لوٹ آتا

۱۔ اندرونی اسباب۔ انگور (اریکٹ) کا زخم۔

۲۔ بیرونی اسباب۔ اکثر زخم کا زخم۔

۳۔ قرحہ ثاقبہ۔ ہر فرد ٹینگ السر۔

۴۔ اریکٹ۔ گیسے نمونیشن۔

۵۔ اٹاکٹ۔ ڈسٹرکشن۔

ہے۔ اور دوبارہ قرعہ بنگر اس کے اجزاء تلف ہونے لگتے ہیں۔ جبکہ دور اول تلف کہا جاتا ہے +

دور اول۔ تقریر حقیقی۔ یا امتلا د یعنی پھیلنا۔ اس دور چ کی خصوصیت یہ ہے کہ ساخت کے برباد کرنے والے تغیرات سرعت یا بطؤ کے ساتھ برابر جاری رہتے ہیں۔ اور اسی دور میں بتایا جاسکتا ہے کہ قرعہ ملتبہ ہے۔ یا ساعیہ یا آکھ علامت۔ جو تنگی آنکھوں سے نظر آتی ہیں۔ زخم کی بیرونی سطح پر زرد میلہ۔ یا خاکی مادہ نظر آتا ہے جو کچھ تو کھرنڈ ہوتا ہے۔ کچھ رطوبت ہوتی ہے۔ اور کچھ عضو کے گلے ہوئے اجزاء (تاکلات) ہوتے ہیں۔ لیکن انکو راریکہ نظر نہیں آتے۔ اگر جراثیم سخت ہوں۔ یا بدنی ساخت کی قوت مقابلہ کمزور ہو تو کھرنڈ بننے کی استعداد زیادہ ہوتی ہے۔ زخم سے جو رطوبت بہتی ہے۔ وہ مقدار میں کافی۔ قوام میں رقیق ہوتی ہے۔ نیز یہ رطوبت دسمی ہوتی ہے۔ علیٰ اہم علم میں تیج رخاںش پیدا کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ اور بوقابل نفرت ہوتی ہے۔ اور شاذ و نادر صدیدی ہوتی ہے + زخموں کے کنالے موٹے اور متورم ہوتے ہیں اور ارد گرد کی ساخت میں تیج (راؤنڈیا) و ترشح رطوبت کی کیفیت نظر آتی ہے زخم کا کنارہ تیز کٹا ہوا اور نہایت متناظر طور پر گھرا ہوا ہوتا ہے + زخم کی جڑ یعنی اس کی گہرائی موٹی اور اندرونی ساخت سے چسپاں ہوتی ہے۔ دراصل یہ علامات سطحی اور پھیلنے والے التهاب کی ہیں۔ جو آخر میں ساخت کو برباد کرنے لگتا ہے +

علاج دور اول۔ اسکا علاج چند امور پر مشتمل ہے را اسبب کا ازالہ کیا جائے۔

۱۔ قرعہ آکھ۔ ہسٹنگ انسٹرو۔
۲۔ انکاف۔ ڈاکٹر کشن۔

۱۔ قرعہ ملتبہ۔ انظیمڈالسر۔
۲۔ قرعہ سامیہ۔ ہسپرنڈنگالسر۔

(۴) زخم کی سطح کو کل جہانی تیجات و خراش سے بچایا جائے۔ اور ہر آلائش و گندگی سے پاک کیا جائے۔ جس حصہ میں التہاب ہو اسے حرکت سے بچایا جائے۔ اور ایک حال پر قائم رکھا جائے۔ اور جہاں تک ممکن ہو اس حصہ کو بلند تر رکھا جائے (مثلاً پاؤں میں اگر التہاب ہو قباؤں کو نکال کر ڈھیلا بن چھوڑنا چاہئے) اسی طرح زخم کے اوپر ایسی چیزیں رکھیں جو مضاد عفونت۔ گرم اور تر ہوں۔ مثلاً ٹکمنیڈ بونی اگر زخم کے اجزاء نہایت بڑے ہوں۔ تو اسی اور کو ٹک کر لہڑا بنا اور استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح امعاء کا خیال کرنا۔ اور بدن کی عام صحت کا دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اور خفیف مشہل دینا۔ استعمال بہتر ہوتا ہے۔

۲۲ دورانیہ۔ دور استعمال۔ یہ ان تمام تغیرات پر مشتمل ہے۔ بعد ہر وقت خفیفی کے ختم ہونے کے بعد دوبار ہوتے ہیں۔ اور اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک کہ زخم بھرنے نہ لگے۔ اور اس کے اندر انگور نہ پیدا ہوں۔ غلام نظام یہ ہے کہ اس دور میں انجم کی مقدار و آمادگی حاصل ہوتی ہے۔ اسی پر اسکو استعمال و الختام کا دور کہا جاسکتا ہے۔

علامات جو معمولی آنکھوں سے نظر آتی ہیں۔ جب عمل تقرح و فساد قطع ہو جاتا ہے۔ تو زخم کی سطح صاف ہونے لگتی ہے اور اس سطح ہو جاتی ہے گویا اس پر پستیل کر دیا گیا ہے۔ کھونڈیاں ہر اپنی کے وقت دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ مقدار جذب ہو جاتا ہے۔ رطوبت کا اخراج گھٹ جاتا ہے۔ اور اس کے اندر خشیت و مصیبت برآمد ہوتی ہے۔ اور زخم کی سیاہی آمیز سرخی گلابی سرخی سے بدل جاتی ہے۔ کیونکہ خون کی آمد بڑھ جاتی ہے۔ زخم کی جڑ یعنی اس کی گہرائی (قدہ) سے بھی ترشح کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس پاس کی ساخت نیا و

تکبیر ہوتی۔ اور سے سک فوس نے شن۔ ۲۲ بخیر۔ پر ملش۔

زخم اور کم چسپیدہ ہوتی ہے۔ زخم پر استریا جھلی تدریجاً نمایاں ہوتی جاتی ہے اس کے بعد میر یا جلد حالات حاضرہ کے موافق مختلف مقامات میں سرخ سرخ نقطے نمودار ہوتے ہیں۔ یہ نقطے عدوا اور بخار بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مل جاتے ہیں کہ ساری سطح انگوروں (اریکہ) انزار (لحمیہ) سے ڈھک جاتی ہے۔ اس درجہ میں مندرجہ ذیل تین کام پورے ہوتے ہیں:-

(۱) خشک: بیشہ یعنی کھمڑا زائل ہو جاتا ہے (۲) ایسی رطوبت سے زخم کی سطح ڈھک جاتی ہے۔ جو بیج خلوی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جسکو رطوبت خلویہ نکوینہ کہاجاتا ہے (۳) نئی ساخت میں جو ابھی پیدا ہوئی ہے رگیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ انگوروں کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے کہ بیکورہ بالانقضاء تغیرات ہو۔ وقت پوری سطح میں یکساں پائے جانیں یہی وجہ ہے کہ اس کے مظاہر میں بہت کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ مگر بعض اوقات یہ صلاحی تغیرات زخم کی پوری سطح میں بیک وقت ہی پیدا ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تمام قرح مزہ نہ ہونے پھیلے ہوئے ہوں۔ اور نہ بھرنے والے ہوں اسی درجہ امتثال میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ ویدہ ہیں:- قرح غیر موملہ یا قرح غلبہ قرح موملہ (مضہ) اور قرح وندالیہ +

قرحہ غیر موملہ یا نہ موملہ

یہ عام طور پر ادھیڑ عمر کی عورتوں کی ٹانگ میں نمودار ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر بے توجہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مریضہ زخم کو کسی مشتبہ کپڑے سے لپیٹ دیتی ہے

۱۔ رطوبت غلبہ یا کوفہ۔ ریل و ریل۔ کڑو و کڑو	۲۔ قرحہ آلمہ۔ { ارسی ٹیل السز
۳۔ قرحہ غیر موملہ۔ انڈولٹ السز	۴۔ مضہ۔
۵۔ قرحہ غلبہ یا کوفہ۔ ریل و ریل۔ کڑو و کڑو	۶۔ دوالیہ۔ ویری کو زالسز

جس کے صاف ہونے کا کوئی یقین نہیں ہوتا۔ اور پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتی ہے۔ بتدریج حجم اور گہرائی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ پھیل کر عضو کی پوری سطح کو گھیر لیتا ہے + زخم کی سطح عام طور پر چکنی اور چیلی کی ہوتی ہے۔ مگر اس کا رنگ خاکستری اور زرد ہوتا ہے۔ جس میں گاہے بڑی شکل کے چند انگوڑی جی ہوتے ہیں + زخم کے کنارے سخت اور تیز کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور نمایاں طور پر سطح سے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ارد گرد کی جلد کناروں پر ابھر آتی ہے۔ اور یہ یا بشرہ سے ڈھکی ہوتی ہے۔ یا اس میں اجتماع خون ہوتا ہے۔ اس عضو کی جلد امثالہ موسیٰ مزین سے گہرے رنگ کی ہو جاتی ہے۔ یہ رنگ مختلف بلندیوں (طلمات) میں شروع ہوتا ہے۔ پھر بتدریج سب کے سب بل جاتے ہیں + رطوبت زخم صمدی یا مانی مصلیٰ مقدار میں زیادہ اور اس قدر تیز نہیج ہوتی ہے کہ آس پاس نار فارسی (چکن) پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی شکل قرعۃ فارسیہ کی سی ہو جاتی ہے + زخم کے قاعدہ میں خشک ریشہ دکھنڈ کی ساخت کم و بیش پانی جاتی ہے۔ جس کی کمی و بیشی مدت مرض پر موقوف ہے۔ یہ گاہے نہایت غلیظ ہوتا ہے۔ یہ گہری ساخت۔ لغائف (جلیوں) وغیرہ کے ساتھ چسپاں ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے زخم کے اتمام میں رکاوٹ واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ اس حالت میں انقباض ناکمل ہوتا ہے۔ اگر اس قسم کا زخم بڑی کے اوپر مثلاً پنڈلی کی بڑی بڑی پر ہو تو بڑی کی جھلی میں التهاب مزین واقع ہوتا ہے۔ اور جھلی کے نیچے بڑی میں گانٹھ پیدا ہو جاتی ہے جسکو بڑی کا درم کہا جاتا ہے جس کی مقدار زخم کے برابر اور جس کی وضع زخم کے مقابل ہوتی ہے۔ اور گھنی (فطر) کے شکل کی

۱۔ نار فارسی۔ ۲۔ قرعہ فارسیہ۔ ۳۔ زبے لک السز۔

۱۔ نار فارسی۔ ۲۔ زبے لک السز۔

بلند نی ہڈی پر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات اس درم سے ہڈی مردہ ہو جاتی ہے۔ یا ساری ہڈی اور اس کی جھلی میں التهاب واقع ہوتا ہے۔ اس قسم کے زخم میں گاہے شدت کا درد اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کسی جلدی عصب پر دباؤ پڑتا ہے۔ یا اس وجہ سے کہ مقامی طور پر بیچ خلوی میں التهاب پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کے ساتھ گاہے وریہ دل اور عروق جاوہر میں بھی التهاب ہوتا ہے اور اکثر اوقات ان دونوں قسم کی رگوں میں سدہ واقع ہوتا ہے۔ جس سے پاؤں میں اوڈیٹامز سن ہو جاتا ہے۔ جو گاہے نہایت سخت ہوتا ہے۔ اور گاہے پاؤں میں غیر حسیقی و انہیل کی شکل بن جاتی ہے +

اسی قسم کی حالت گاہے اُس وقت بھی پیدا ہو سکتی ہے جبکہ جسم کا ایک وسیع حصہ جل جائے۔ یا بدن کے کسی حصہ میں کوئی کشادہ زخم ہو۔ کیونکہ ان حالات میں گاہے ایک معین مسافت تک انتہام بڑھتا ہے۔ لیکن پھر وہ اس وجہ سے ٹک جاتا ہے کہ کھرنڈ کی ساخت جو نئی پیدا ہوتی ہے وہ غیر متمم جز کے عروق غازیہ پر دباؤ ڈال کر اُس کی قوت حیات کو باطل کر دیتی ہے۔ اور زخم کے انگوڑے کو منج غذا سے محروم کر کے خراب کر دیتی ہے +

قرحہ مؤلفہ رقرحہ نمفصہ علی العموم اسی درجہ دورانہ انتقال میں پایا جاتا ہے۔ اس کی متاز خصوصیت یہ ہے کہ یہ علی الاغلب گئے رکھنے کے اُس پاس ہوتا ہے۔ اور اس میں درد ہوتا ہے۔ قرحہ ملحقہ یا مزمنہ کی سطح کو اگر چھوا جائے۔ تو عام طور پر مریض کو درد و تکلیف کی شکایت نہیں ہوتی ہے۔ مگر عکس ان کے اس خاص قسم میں علی الخصوص شب کے وقت درد نہایت شدید ہوتا ہے۔ بعض محققین نے بتایا ہے کہ اگر مہنجر اس قسم کے زخم کی سطح پر آہٹگی سے

پھرایا جائے۔ تو یہ معلوم ہوگا کہ ایک یا زیادہ مقامات میں خصوصیت کے ساتھ درد کی شدت ہوتی ہے اور باقی سطح کے حصول میں جیسی ہے۔ اور ان مخصوص مقامات میں درد کے شدید ہونے کی وجہ غالباً یہ ہوتی ہے کہ ان مقامات میں عصبی سیٹے مکمل جاتے ہیں۔ کیونکہ درد علی العموم از قعر جمع محرق (جلائے والا) یا طلقی ہوتا ہے۔

قرح دوالیہ۔ ان مریضوں کی ٹانگ میں ہوتا ہے جن کی ٹانگ میں پہلے سے مرض دوالی ہو۔ یعنی ٹانگ کی وریدیں پھولی ہوئی ہوں۔ اسی وجہ سے اس قرح کا نام ”قرح دوالیہ“ رکھا گیا ہے۔ علی الخصوص اگر مرض خاص طور پر چھوٹی چھوٹی وریدوں میں ہو۔ چونکہ یہاں کی جلد میں وریدی استلا۔ خون جگر ہو استلا قہری کہا جاتا ہے) ہوتا ہے۔ اور اس کا تغذیہ رگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے معمولی خراش اور رگڑ بھی اس مقام میں قرح مزمنہ پیدا کر دیتا ہے۔ حالانکہ زندگی کی حالت میں ایسی خراش درگڑ خود بخود نہایت جلد چھٹی جاتی ہے۔ گا ہے یہ قسم اس نارفارشی (چھان) سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ جو کہ گرد و غبار کی رگڑ و خراش یا سخت پانچاموں کی رگڑ سے عارض ہوا ہو۔ اور گا ہے یہ رقیق جلد کی زخمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو پچھلی ہوئی وریدوں پر استریکے ہوئے ہوتی ہے۔ اور معمولی حادثے سے پھٹ کر شدید جریان غل (نزف) پیدا کرتی ہے۔ قرح دوالیہ کی خصوصیات اکثر صے میں قرح غیر مولد سے ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ یہ عام طور پر ٹانگ کے زیریں حصے میں اندر کی طرف ہوتا ہے۔ برعکس اس کے آتشک کے نغمہ عام طور پر گھٹنے کے پاس او باہر کی طرف ہوتے ہیں۔

علاج۔ اس درجہ کا علاج موجودہ حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔

اگر یہ اپنے دورہ کو تیزی کے ساتھ التیام و اصلاح میں گزار رہا ہے۔ تو اس کے علاج میں دہی باتیں و نظر رکھی جائیں جو ابتدائی درجہ میں کی جاسکتی ہیں۔ یعنی راحت و آرام سے رکھنا اور زخم کو غراش کے اسباب سے بچانا۔ اس مقصد کے لئے یہ تدبیر نہایت مفید ہے کہ مٹیوں کی رگڑ سے بچانے کے لئے اس پر کوئی محافظ شئی رکھ دی جائے۔ مثلاً ریشم کا کپڑا و عن میں ترکہ کے زخم پر رکھا جائے جو نفاثین کی ایک تہ سے ڈھکا ہوا ہو۔ اس سے فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ زخم کے بہنے والے مواد اس محافظ کے علاحدہ کرنے پر برباد نہ ہوں گے۔

قرحہ مزمنہ۔ اس کے علاج میں نہایت توجہ کی ضرورت ہے۔ بعض حالات میں دستکاری کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ بلند وضع پر قائم کر کے عضو کو آرام و راحت سے رکھنا نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے عضو کا اجتماع خون رفع ہو جاتا ہے۔ اگر زخم جوڑ کے اوپر ہو۔ تو عضو کو لازمی طور پر ہلاتے رہنا چاہئے۔ اگر زخم کی سطح برسی ہو تو بٹخہ ختم و تخم کمان استعمال کرنا چاہئے۔ یا زخم پر نل منفشی چھڑکے تکید بورتی استعمال کیا جائے۔ اور بعض حالات میں یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے قبل زخم کی سطح پر نقرہ شوریج آگین یا حجر جنم یا جہت اخضر آمیز کا محلول رقم قحہ ایک اوقیہ میں، لگایا جائے۔

اس مہم کے زخموں میں دباؤ سے بہت کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بعض حالات میں معمولی پٹی بھی کافی ہو جاتی ہے۔ جو انگلیوں سے گھٹنوں تک ہو۔

۱۔ نفاثین۔ ڈکسٹرن۔	۲۔ تکید بورتی۔ بوریک فوسفٹ شین۔
۳۔ بخہ۔ پولش۔	۴۔ حجر جنم
۵۔ خیم۔ چارکول۔	۶۔ نقرہ شوریج آگین
۷۔ نل منفشی۔ ایلوڈ فارم۔	۸۔ جہت اخضر آمیز۔ کلورائیڈ آف زنگ۔

مگر اس کے نیچے مرہم حصّ بورقی جس کے ساتھ زیادتی تنبیہ و تحریک کی غرض سے مرہم راتنج (رسل) ملا یا گیا ہو لگانا چاہئے۔ اگر وریدیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوں تو دربر کی پٹی نہایت مفید ہوتی ہے۔ ایک ماہر نے پرانے زخموں کے علاج کے لئے یہ طریقہ بتایا ہے۔ جو نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔ اس میں لیسدا نصقہ لگایا جاتا ہے جو مندرجہ ذیل اشیاء سے مرکب ہوتا ہے۔ ہلام ۵ حصّ جسٹ حصّ آمیزہ ۵ حصّ بورقی ایک حصّ۔ حلون ۵ حصّ۔ گاہے اس میں مزید فائدہ کی غرض سے شحم اہی رہ فیصدی (بھی) اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ پرے عضو کو پہلے صابون اور پانی سے دھویا جائے۔ اور پھر اسکو محلول قطرانی یا محلول سلیمانی سے ملہ کر کیا جائے۔ اس کے بعد معمولی مطہر چالی سے عضو کو لپیٹ دیا جائے۔ اس کے اوپر وہی مذکورہ بالا دوا دہنی کے طور پر شریہ رکھی (سے) لگا دی جائے۔ مگر اسے پہلے دیگ برویگ کی طرح پکا کر تپلا کر لیا جائے۔ یعنی اسے ایک ظرف (مربیان) میں ڈال کر اس ظرف کو دوسرے ظرف میں رکھ جائے۔ جس میں کھوتا ہوا پانی ہو۔

اس صفا دیا سنی کے اوپر جان کی ایک تہ اور لپیٹ دی جائے۔ اور سب کے اوپر باریک پٹی باندھ کر خشک ہونے دیا جائے۔ اگر وریدیں زیادہ پھولی ہوئی ہوں تو یہ صفا دگئے سے گھسنے تک لگایا جائے۔ اور گاہے قدم کو بھی اس میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ اگر رطوبت کا اخراج زیادہ ہو تو زخم کو پوشیدہ نہ کرنا چاہئے

۱۔ جسٹ حصّ آمیزہ ایک ڈاؤننگ
۲۔ حلون۔ گھیسرین۔
۳۔ شحم اہی۔ الکحالی اول۔
۴۔ محلول قطرانی۔ کاربولک وشن۔
۵۔ سلیمانی۔ سلیمانی بیٹ

۱۔ حصّ بورقی۔ بورک ایسڈ۔
۲۔ مرہم راتنج۔ ریزن آئسٹ منٹ
۳۔ نصقہ۔ پلاسٹر۔
۴۔ ہلام۔ جیلاٹن۔

اور پٹی روزانہ بدلنی چاہئے۔ لیکن جبکہ رطوبت مقدار میں گھٹ جائے۔ تو یہ نماز صرف زخم پر لگا کر پٹی کو ایک ہفتہ یا اس سے زیادہ عرصہ تک چھوڑا جاسکتا ہے۔ جبکہ قرعہ کے کنارے موٹے اور سخت ہوں اور اندام و التھام کے افعال بند ہوں۔ تو ایسی حالت میں مسامک کی رائے پذیر عمل کرنا مناسب ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ قرعہ کی ساری سطح اور ارد گرد کی جلد کو دوا کا دی سے جلادیا جائے۔ مگر اس بہتر یہ ہے کہ مریض کو بیکپش کر کے قرعہ کی سطح کو دھار دار نفعۃ (ملعقۃ حادۃ) سے کھرچ لیا جائے۔ اور اس کے بعد جبٹ اخضر امیز کا محلول قوی اُس پر غل دیا جائے۔ جب مغل التھام ظاہر ہو۔ تو اس کی مدد کے لئے محرکات و مہنہات استعمال کریں جیسے قرمزہ حرار جو قطران غمی یا ہارکول کا ایک مرکب ہے)۔ اسے چوبیس گھنٹے تک شکل مرہم چارے آٹھ فیصدی تک استعمال کریں (یعنی مرہم میں ۴ سے ۸ فیصدی تک شامل کریں) مگر پہلے قرعہ کو اچھی طرح پاک کر لیا جائے۔ اس کے بعد دو روز تک حائض بورقی کا مرہم استعمال کریں۔ اس کے بعد پھر اسی طرح اُسکو لٹائیں اور دوبارہ قرمزہ مذکورہ استعمال کریں۔ مکفری کا عصائرہ رطبہ لمی انگوڑ کے پیدا کرنے میں تحریک بخشتہ ہے۔ کیونکہ اس کے اندر ایک جوہر فعال تحقیق سے مشابہ ہوتا ہے۔

۱۱) مکفری ایک نبات کا نام ہے۔ مترجم۔

(۲) محققین ایک جوہر خاص ہے۔ جو عین کے پیشاب اور بعض ملوث

۱. سانس بھسن شیخ۔	۳. بورک ایسڈ۔
۲. شارپ اسپون۔	۴. مکفری (یا) سمفانی ٹم آئی سی نے لی۔
۳. کلورائیڈ آف زینک۔	۵. لیکوڈاکٹر کیٹ۔
۴. اسٹی مونٹ۔	۶. انٹوین۔
۵. اسکارٹ رڈ۔	

میں پایا جاتا ہے۔ اور قرح و جرح میں بشرہ کی پیدائش میں تحریک دینے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ مترجم۔

یہ بذات غاس بحقین کو شکل مخلول (۱۰ فیصدی) استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مذکور بالا اشیاء دراصل شفاء کو جلد لانے کے لئے ہیں۔ اگر قرح کی مندمل ہونے والی سطح چرڑی ہو تو بشرط ضرورت عمل تریق (۱۰ پیوڈلگانا) کیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ عمل اس وقت تک بیکار ہے جب تک کہ مریض ایک عرصہ تک آرام و سکون سے رہنے کا وعدہ نہ کرے۔ اسی طرح اس کے بعد لچکدار بندش در باطن مران کی ضرورت ہے۔ لیکن بڑے زخموں میں جبکہ ہاتھ پاؤں کے محیط کا بیشتر حصہ آہ ہو چکا ہو۔ یا جبکہ قرح نہایت سخت (قرحہ صلبہ) ہو۔ اور اس کی جڑ پتلی کی بڑی ہڈی رقبہ کمرئی سے لگی ہوئی ہو۔ اور غشاء عظمیٰ کے مزمن التهاب سے شب کے وقت شدید درد ہوا کرتا ہو۔ اور خصوصاً جبکہ مریض عرصہ دراز تک آرام و سکون سے نہ رہ سکتا ہو تو ان صورتوں میں اس عضو کا کاٹ کر علیحدہ کر لینا بہتر ہے۔ بہترین علاج ہے۔ اس کے لئے فارابوٹن کلریتھ بہتر زیادہ اچھا ہے جبکہ ذکر ایک خاص باب میں آئے گا)۔

جبب دریدیں پھولی ہوتی ہوتی ہیں۔ تو علاج سے اس وقت تک پورا فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ ان کے علاج میں کافی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ یعنی یا دستکاری کی جائے۔ یا عسیدہ انا استعمال کیا جائے۔ لیکن یہ مناسب نہیں ہے

۱۔ گرافٹنگ۔	۲۔ پری آسٹیم۔
۳۔ الاسٹک سپورٹ۔	۴۔ اپوسٹن۔
۵۔ کیلیس السز۔	۶۔ فارابوٹن اپوسٹن۔
۷۔ بیٹا۔	۸۔ عسیدہ انا۔ انا۔ انا۔ اپوسٹن۔

کہ زخم کے مقام پر وریڈول کو چھڑا جائے۔ ورنہ زخم متھن ہو جائے گا۔ اس لئے کہ اس کے علاج میں سکون اور ٹکیڈ (سینک) کی ضرورت ہے + وریڈول کی دستکاری یہ ہے کہ قرح سے اوپر پھولی ہوئی وریڈول کو کاٹ کر نکال دیا جائے یا تریڈ نہرگ کا عمل مناسب حالات میں اختیار کیا جائے (جبکہ ڈرگے آئیگن) قرح متولمہ کا علاج یہ ہے کہ دردناک مقامات کا کھوج لگایا جائے۔ اور ٹیک اس سے اوپر کے حصے میں چاقو سے شکاف دیا جائے۔ تاکہ اس سے آفت رسیدہ پتھ کٹ جائے۔ لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ مریض کو بیہوش کرنے کے بعد پورے طور پر زخم کو کھرج لیا جائے +

قرح فارسیہ کا علاج مذکورہ بالا اقسام سے مختلف ہے۔ تاکہ نارفازی میں ترقی نہ ہو جائے۔ وضعیات ممکنہ یعنی بیرونی استعمال کی سنگین بخش چیزیں مثلاً غسل رصاص اس میں ضروری ہیں۔ اور جب اس کی حدت و شدت کا زمانہ گزر جائے تو مرکبات قطرانہ (مثلاً سائل مخی مطہر ایک اوقیہ غسل رصاص ۳۰ تولہ) تک (یا مرہم شحم تابی دہ سے) (فیصدی تک) استعمال کیا جائے۔ اسی طرح حبث جاوی آگین اور حامض بورق کا مرہم بھی مفید چیز ہے۔ یا عسیدہ اناہراہ شحم تابی استعمال کیا جاسکتا ہے +

۱۔ فوسن ٹیشن۔	۲۔ بیڈوشن۔
۳۔ ٹریڈ نہرگ اپریشن۔	۴۔ ٹاری پرے پریشنز۔
۵۔ اورمی ٹیل السر	۶۔ لاکر کاربونس ڈی جنس۔
۷۔ اکرینے ٹک السر۔	۸۔ ۳۰ تولہ۔ ایک پائنٹ۔
۹۔ اکرینا۔	۱۰۔ اکتیول۔
۱۱۔ اپلی کیشن۔	۱۲۔ ہزدایٹ آف زینک۔
	۱۳۔ بورکس ایٹ۔

تیسرا دور۔ اس زمانہ میں چونکہ التھام کا فعل پورے طور پر ظاہر ہو جاتا ہے اس لئے اب وہ قرحہ نہیں رہتا ہے۔ اور یہیں قرحہ سلیمہ کا علاج برتنا نہیں پڑتا۔ بلکہ اب وہ تقرح کے بعد ایک جراثیم سلیمہ ہوتی ہے۔ جس کے اندر اچھے انگور ہوتے ہیں۔ جسکو ہم البتاس اشتباہ سے بچنے کے لئے قرحہ ملتحمہ کہتے ہیں +

قرحہ ملتحمہ کی خصوصیات ذاتی یہ ہیں +

اس کی سطح نرم اور چکنی اور جلد سے کسی قدر نیچے ہوتی ہے۔ اور اس پر اچھے انگور کا استر ہوتا ہے۔ انگور کا رنگ سرخ گلابی ہوتا ہے۔ ان میں درد نہیں ہوتا۔ اور چھونے سے اگرچہ خون بہتا ہے۔ مگر زیادہ آسانی سے نہیں بہتا +

اس کی سطوبت لمحاظ تماہیر و علاج کے مختلف ہوتی ہے۔ اگر قرحہ کی سطح کو راحت و آرام سے رکھا جائے۔ اور تمام مہنجات سے بچایا جائے تو رطوبت محض پانی جیسی رہائی دیتی ہے۔ لیکن اگر زخم عفونی (ملوث) ہو چکا ہو۔ یا اس میں بیج دافع عفونت چیزیں استعمال کی گئی ہوں تو زخم میں معمولی پیپ پیدا ہو جاتی ہے +

اروگرد کی جلد نرم اور ڈھیلی۔ اور البتانی حسب تاع خون سے غالی ہوتی ہے +

زخم کا قاعدہ یعنی گہرائی قابل حرکت ہوتی ہے یعنی بالکل ثابت قائم اور غیر متحرک نہیں ہوتی +

۱۔ ہینک السز

۲۔ اوری ٹینٹ

۳۔ انفکٹڈ

۱۔ ہدی السز

۲۔ ہدی دونٹ

زخم کے کنارے۔ اُبھرے ہوئے اور اندال پاتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ جس میں تین رنگین دائرے (منطقہ) دکھائی دیتے ہیں۔ اندرونی دائرہ مسرخ ہوتا ہے۔ جس میں انگور ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک باریک نرگسٹ بشریہ کا ہوتا ہے۔ جو محض اچھی روشنی میں نظر آ سکتا ہے۔ اس کے بعد باہر کی طرف دو سہارا دیکھنا دائرہ خاکی ارغوانی رنگ کا۔ یا نیلا سا ہوتا ہے۔ جہاں انگوروں پر بشرہ کے کئی طبقات ہوتے ہیں۔ یہاں دورانِ خون میں اس وجہ سے کمزوری یا رکاوٹ ہوتی ہے کہ مٹی ساختہ پیدا ہو جاتی ہے جس کے انقباض سے دباؤ ہو جاتا ہے۔ تیسرا بیرونی دائرہ سفید ہوتا ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بشرہ خراب ہو کر صحیح سے پر جمع ہو جاتا ہے۔

اس قسم کے زخموں کے اندمال کا طریقہ یہ ہے کہ انگور کے اندرونی اجزاء نیچے یعنی مٹی میں تبدیل ہوتے ہیں۔ جو بند رہتے سکتے ہیں اور اس کے اوپر بالآخر بشرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا مفصل بیان ایک مستقل باب میں آگے آئے گا۔

جب بیرونی طور پر نرم کرنے والی چیزیں ردِ ضعیفاتِ لمینہ (ایک عرصہ تک استعمال کی جاتی ہیں تو انگور رنگ میں پھیکے اُبھرے ہوئے اور تہیٰ نرم و پھولے ہوئے) ہو جاتے ہیں۔ اور وقتی طور پر نخل اندمال موقوف ہو جاتا ہے اسی قسم کی حالت اُس وقت بھی پیدا ہو جاتی ہے جبکہ مریض کے قویٰ ضعیف ہوں۔ یا درمیان پھولی ہوئی ہوں۔ ایسی حالت میں اس کے لئے قرحۃ ضعیفہ

۱۔ امرینٹ اپلی کیشنز۔

۲۔ اوڈیے ٹش۔

۳۔ ویک السر۔

۴۔ زون۔

۵۔ اپنی تھیل سار۔

۶۔ سیکٹریشل ٹشو۔

۷۔ فائبرو سیکٹریشل ٹشو۔

کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح زخم کے اُبھرے ہوئے پٹے انگور کو عام طور پر *فُحْمًا غَرَضًا* کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے انگور اس امر کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ زخم کی گہری ساخت میں نمٹی ساخت بنتی ہے۔ جو عروق پر دباؤ ڈال کر بیرونی انگور کو آجی بنا دیتی ہے۔ اس قسم کے حالات میں فعل التمام کے اندر سخت مشکلات پیش آتی ہیں۔ اور اسکو دوا کا دسی سے جلانا پڑتا ہے یا انھیں تحلیل کر دور کر دینا پڑتا ہے۔ بعض اوقات یہ صورت دیر تک قائم رہتی ہے۔ اور قرعہ مزہب من شکل ختم ہار کر لیتا ہے۔ جسکا بیان ابھی گذرا ہے۔ اس کی خصوصی علامت یہ ہے کہ بیرونی سطح کے نیچے زخم کی ساخت میں ریشے پائے جاتے ہیں +

علاج۔ حصہ مریض کو آرام و سکون سے رکھا جائے۔ اگر قرعہ ٹانگ میں ہو تو اسکو لٹکانا نہ چاہئے۔ زخم کو محفوظ رکھنے کے لئے ایسی مرہم پی استعمال کریں جس کے کھونے پر قرص کی سطح میں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ زخم کے برابر "دانی" کا ٹکڑا کاٹ کر پاک کر کے رکھ دینا چاہئے۔ اور اس کے اوپر پاک صاف خرڈہ (جالی۔ دمچی) لپیٹ دینا چاہئے +

دانی ایک روغنی ریشی کپڑا ہوتا ہے۔ جو دانی قبول نہیں کرتا۔ اور جراثیم میں استعمال کیا جاتا ہے +

خرقہ + قدیم اہلباشا ابو القاسم ابن عباسؓ ہرادی وغیرہ اس کپڑے کو جو زخم کے مرہم پی کرنے میں کام آتا ہے "خرقہ" (دمچی) یا خرقہ کتان کہتے ہیں۔ کتان ایک نہایت باریک کپڑا ہے۔ جسکو باریک مل سے بنایا اس سے زیادہ نازک سمجھنا چاہئے اس لئے ہم بھی یہی اصطلاح استعمال کریں گے۔ مترجم

۱۔ پردہ لٹکاو۔

۲۔ خرقہ۔ کتان۔

۱۔ پردہ لٹکاو۔

۲۔ اسکارشون۔

۳۔ کاسٹک۔

یا زخم پر سادہ مرہم رزمہ شیطانی لگائیں۔ مرہم کو بیج انبندہ دہا چھ مسکے
یا نالکے پر پھیلا کر زخم پر لگا دیں۔

مرہم سادہ۔ مرہم مامض برقی کو اسی کے ہموزن نازلین کے ساتھ مل کر
منفعت کریا جاسے۔

اگر انگور زیادہ اُبھرے ہوئے ہوں۔ تو اس پر نقرہ شور آگین (حجر جہنم)
خفیف ہلو پر لگانا چاہئے۔ یا کوئی غسول معتد بہ استعمال کرنا چاہئے۔ مثلاً غسول احمر
رشیخ غسول (جس کا نسخہ یہ ہے۔

نسخہ غسول احمر۔ جسٹ کبریت آگین دو تھ۔ صغ خزامی دگل مریم مرکب
میں بوند۔ روح اکلیل الجبل میں بوند۔ مامض برقی دس تھ۔ آب مقطر ایک تھ
خزامی۔ بقول صاحب اکیر غلسم ایک نبات ہے۔ جس میں خوشبو ہوتی
ہے۔ گل مریم اس کا دوسرا نام ہے۔

اکلیل الجبل ایک خوشبودار پودا ہے۔ جو مصر و سکندریہ میں بکثرت ہوتا ہے
اس کے اندر ایک خوشبودار لطیف روغن ہوتا ہے۔ مصری اطباء نے اس کا
دوسرا نام "حفصا لبان" بتایا ہے۔ مترجم۔

بڑے قرح میں سرعت اندمال کے لئے گاہے ہیر دنی مدد کی بھی ضرورت

۱۔ سہل آئٹھ منٹ۔	۱۵۔ کوشیور برا۔
۲۔ ہلکا تھ	۱۶۔ زنگ سلفیٹ
۳۔ آئٹھ منٹ۔	۱۷۔ خزامی طبع۔ بیوند یولی۔
۱۸۔ انگور زخم پھیلائی برسیانی	۱۹۔ گل مریم خزامی۔ بیوند یولی
۲۰۔ خازین مصری تھکاوری بین	۲۱۔ پاشا۔ بیوند یولی۔
۲۲۔ ناسٹریٹ آف سلور	۲۳۔ آب سہلانی۔ دہا چھ
۲۴۔ اسی موئے تنگ روشن۔	

پیش آتی ہے۔ ورنہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ بیچ مذبی پیدا ہو کر انگوڑے کے تغذیہ کو خراب کر دیتا ہے۔ جس سے نعل اندام رُک جاتا ہے۔ اس اشکال کو دور کرنے کے لیے اکثر اوقات عمل ترقیق رہبند لگانا استعمال کیا جاتا ہے + ترقیق وہ عمل ہے جس میں مختلف دبازت کی جلد کسی تندرست حصہ سے زخم کی مٹم ہونے والی سطح پر منتقل کر دی جاتی ہے۔ یہ عمل جراحیات میں ۱۸۶۹ء کے اندر ماہر ریفر وین کے ذریعہ داخل ہوا۔ اور اس وقت سے برابر اس میں ترقی ہوتی گئی۔ ذیل میں اس کے اہم طریقے درج کیے جاتے ہیں +

(۱) بشیرہ اور آدمہ کے چھوٹے ٹکڑے کا منتقل کرنا۔ ریفر وین کا اصلی طریقہ یہی تھا۔ جلدی ساخت کا چھوٹا سا ٹکڑہ نقطہ کی مدد سے یا اس کے بغیر کٹا جاتا ہے۔ اور تیز خمیدہ قینچی (مقرض منحنی) سے تراش لیا جاتا ہے۔ اس ٹکڑے میں بشیرہ کے ساتھ حقیقی جلد رادمہ کا کچھ حصہ ضرور ہونا چاہیے۔ جس سطح سے یہ نکالا جائے وہاں تندرست جلد ایک دو ہونڈ خون جمع ہو جائے۔ اس کے بعد یہ ٹکڑا زخمی کے ساتھ زخم کے انگوڑے پر بچنے کے رخ پر رکھا کر پکسی ہونی "داتی" سے ڈانک یا جاسے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں اس مٹم کے کئی ٹکڑے لگائے جائیں اور سارے زخم پر ہم پٹی کر کے اسکو محفوظ کر لیا جائے۔ اگر زخم کی سطح میں مٹم زیادہ ہوگی۔ تو یہ پیوند وہاں نہ لگ سکے گا۔ برعکس اس کے اگر زخم کی سطح اچھی ہوگی۔ تو پیوند کے ان ٹکڑوں کا لگنا اغلب ہے + عام طور پر یہ ٹکڑے دو تین دن میں غائب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اوپر کا بشیرہ نرم ہو جاتا یا بوسیدہ ہو کر گر جاتا ہے

۱۔ اسکن گرافٹنگ۔

۳۔ کیوٹیل۔

۴۔ ریفر وین

۵۔ ڈرپس

۶۔ کروڈ سمیزر

۷۔ پروڈاکٹر

۸۔ کیوٹیل۔

لیکن جلد کا نیا بشرہ بہت جلد پھیل کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ التھام کا ایک متنازعہ مرکز ہے +

(۲) بشرہ کے بڑے حصوں کا منتقل کرنا۔ یہ طریقہ فاضل ترین کا ہے۔ اس طریقہ میں بشرہ کی بڑی بڑی پٹیاں استرے سے اتاری جاتی ہیں۔ اور تازہ جراحت پر یا زخم کے انگوڑ کو کھرج کی کچی سطح بنا کر اس پر لگائی جاتی ہیں۔ لیکن پہلے دباؤ ڈال کر جریان خون کو روک لیا جاتا ہے۔ استرے سے بشرہ کے ٹکڑے میں اس امر کے ہوشیاری کی ضرورت ہے کہ جہاں تک ممکن ہو بشرہ ہاریکل تھرا جلتے + مگر جلد کے طبقات عام طور پر کٹ جایا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کسی قدر خون بھی بہ نکلتا ہے۔ پیوند کے ٹکڑوں کو اسی غنی سطح پر چھوڑ دینا چاہئے تاکہ وہ اس سے تر رہے۔ اس کے بعد استعمال کی جائے۔ یہ ٹکڑے اس طریقے سے لگائے جاتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور زخم کے کناروں پر بھی سوار ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات ان ٹکڑوں کے کنارے اندر کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ اس لئے مناسب انتظام کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اس پر پاک صاف جالی (خرقہ) سے بندش کر دی جائے۔ اگرچہ بعض جراحت اب تک اسی امر کو پسند کرتے ہیں کہ ان ٹکڑوں کو دھاتی سے۔ یا تصدیق کے چھڑے ہونے پر تھ سے یا چاندی کے ہاریکل تھ سے چھپا دینا چاہئے۔ عام طور پر زخم کو کئی روز تک کھولنے اور دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ بازو اور ران کا بیرونی حصہ ان ٹکڑوں کے نکلنے کے لئے بہترین مقام ہے۔ ان ٹکڑوں کے نکلنے کے بعد وہاں جزو زخم پیدا ہو جائیگا۔ اس پر دھاتی رکھکر سطر جالی سے باندھ دیا جائے۔ یا جالی کو حامض مریض (تیزاب) میں تر کر کے اس پر پٹیا جائے۔

نیل گاڑ مسٹر پروڈیگٹو مسٹر ن مسٹر پرکاش ایڈ

اگر استرہ جلد کے نیچے کی ساخت تک نہ پہنچا ہو تو یہ زخم بہت جلد اچھا ہو جاتا ہے۔ بیوند کے لٹم ہونے کے بعد جو ندبہ (زخم) کا نشان بھٹکتا ہے وہ عمدہ نامم اور طائع ہوتا ہے۔ اور اس میں اس قدر انقباض نہیں ہوتا۔ جتنا کہ عام طور پر زخم کے نشانات (ندبہ) میں ہوا کرتا ہے۔

(۳) جلد کی پوری دبازت کا متقل کرنا۔ یہ بعض صورتوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ناضل و لغت کا ہے۔ اس طریقہ عمل میں پیوند اس مقدار سے بڑا کیا جاتا ہے۔ جتنی کو ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ بعد کو سکا کر چھوٹا ہو جاتا ہے اور ٹکڑوں میں سے جلد کے نیچے کی پوری ساخت اور چربی دور کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد انگوڑی خم کی کچی سطح پر انگوڑوں کو چھیننے کے بعد لٹایا جاتا ہے اور پھر وضع قائم کر کے انگوڑی دیا جاتا ہے۔ یہ دستکاری کے زخموں کی کچی سطح پر بھی لگانے کا کہتے ہیں +

(۲) جراثیم نوعیہ کے قروح
عضوی قروح کی مختلف قسمیں اس کتاب کے مختلف مقامات میں مختلف عنوانوں
کی تحت میں بیان کی جائیں گی۔ جبکہ اس موقع پر بظاہر کرنا کافی ہے +
فیصلہ نہ خواہار وہی ملا کہ یہ قروح اس قسم کا ہے کہ اسکو عام قروح غصہ کشمال
کے طور پر نہیں کیا جاسکتا ہے۔ جن میں عددی اضمات، تلخ اور انحام کے
تمام درجات ظاہر ہوتے ہیں +

آتشک کے قروح

(الف) قروح اولیہ (درجہ اول کے زخم)

(ب) قروح ثنائیہ : درجہ دوم کے زخم جو عام طور پر غشیہ مخاطیہ پر ہوتے

علاوہ اس کے کہ ایک کثیرہ نمبر سافٹ مشینرنگ ایسوسی ایشن

ہیں۔ اور گاہے جلد کو بھی شریک کر لیتے ہیں +
 (ج) اقرح متوسطہ کی دونوں قسمیں فطاعی اور جادری۔
 قرح ثلثیہ جو اوتارام صغیہ سے پیدا ہوتی ہیں +
 تقرح اکال (تقرح ذرب) عام طور پر آتشک کے ساتھ ہوتے ہیں۔

مادہ سل (درن) کے قرح

(الف) قرحہ قرصیہ جو جلدی تدرن (جلد کے مادہ سل) سے پیدا ہوتا ہے
 (ب) قرحہ درنیہ (سل) جو عام طور پر زیر جلد یا زیر غشاء مخاطی کے خراج
 درنی کے پھوٹنے سے ہوتا ہے +

(ج) دوسرے مختلف تقرحات درنیہ جو جلد میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور
 ان کا نام ماہر ان امراض جلدیہ نے جلد تخریزی لکھا ہے۔ اسی طرح مرض زبان
 ریا قلوب احمراری (کیا عجب سے کہ حقیقت میں درنی ریلی ہی ہو +

(۳) اقرح خبیثہ

اس قسم کے قرح کسی الہابی اثر کا نتیجہ نہیں ہوتے ہیں۔ بلکہ حقیقت میں
 ان کی پیدائش کی وجہ جلد کا فنا ہو جانا۔ اور اس کی جگہ دوسری ساختوں کا بڑھ
 جانا ہے۔ ان کا ذکر ایک مستقل باب میں آئے گا +

~~~~~

۱۔ اسکا فوڈریا۔

۲۔ بازس ڈریز۔

۳۔ اری مائیڈریٹ۔

۴۔ مکنڈی السرز۔

۱۔ روپیل۔

۲۔ اکتی سے ش۔

۳۔ ریشی السرز۔

۴۔ گینا۔

۵۔ فبے ڈے بل السریش۔

~~~~~

باب پنجم غانغرا ناوشفا قلوبس

عضو کا گل سر جانا یا مردہ ہو جانا

تعریف۔ جب ساختہ جسم کے کسی معتد بہ حصہ کی قرب حیات مجموعی طور پر ایک ساتھ باطل ہو جاتی ہے۔ اور وہ مردہ ہو جاتا ہے تو اسکو غانغرا نا یا شفا قلوبس کہتے ہیں۔

یہ دو نسل الفاظ یونانی ہیں۔ اور بقول جالینوس دونوں باہم مترادف ہیں۔ مگر بعض لوگوں نے غانغرا نا اور شفا قلوبس میں یہ فرق بتایا ہے کہ غانغرا نا شفا قلوبس کا مقدر ہے چنانچہ غانغرا نا کی صورت میں در و کسی قدر یا زیادہ موجود ہوتا ہے۔ اور شفا قلوبس کی صورت میں عضو کا مردہ حصہ بالکل بے حس ہوتا ہے۔ غانغرا یا اگرچہ عام طور پر دی کے ساتھ مشہور ہے۔ مگر یہ دراصل کاتب کی تصحیف ہے۔ صحیح لفظ غانغرا نا دن کے ساتھ ہے۔ مترجم شفا قلوبس ریش کے بعد (یعنی اگرچہ زیادہ مشہور ہے۔ مگر یہ بھی تصحیف کا تب سے ہوا ہے۔ تحقیق و تفتیش کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ دراصل یہ لفظ شفا قلوبس ریش کے بعد ہے۔ مترجم

اگر یہ عمل فساد و مرگ جسم کی نرم ساختوں (مثلاً عضلات۔ عروق۔ رباطات۔ اعصاب) وغیرہ تک محدود رہے تو اسے عام طور پر ناکل (گل جانا۔ یا کھایا جانا) کہتے ہیں۔

ما غانغرا نا گنڈرین۔ ما مکر و سس۔ ما اسلف۔ اسلفنگ۔

اگر ہڈی کا معتد بہ حصہ مردہ ہو جائے تو اسکو برقعہ یا ریشم روپیڈ ہڈی کہتے ہیں +

مگر لفظ غائزانا کا اطلاق عام طور پر اس عمل و ساد پر کیا جاتا ہے۔ جو ہاتھ پاؤں کے نرم اور سخت دونوں اجزاء پر ایک ساتھ طاری ہوتا ہے +

غائزانا کی عمومی علامت

عضو کے موت کی علامت: کسی محدود حصہ میں قطعی اور نمایاں موت کے بعد جو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں ان کے ظہور سے پہلے مندرجہ ذیل پانچ مخصوص علامتیں پائی جاتی ہیں +

۱۔ عروق میں تڑپ (نبض) کا نہ ہونا۔

۲۔ عضویں گرمی کا نہ ہونا۔ کیونکہ اس عضو سے گرم خون کی آمد بند ہو جاتی ہے

۳۔ مردہ حصہ میں احساس کا نہ رہنا۔ رہا وہ درد شدید جو اٹلسے سنا دین ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس مقام سے اوپر کے اعصاب انکساک طور پر متاثر ہوتے ہیں +

۴۔ مردہ حصہ کے طبعی افعال کا باطل ہو جانا۔ چنانچہ یہ سنا دیتے پاؤں میں ہوتا ہے۔ تو بے حرکت ہو کر رنگ جاتا ہے +

۵۔ رنگ کا بدل جانا۔ جس کی ذیبت اور دار و مدار اس عضو کے موجودہ خون کی مقدار پر ہے۔ اگر اس وقت وہ حصہ خون سے پر ہے۔ تو اس کا رنگ ارغوانی اور دھبہ دار ہوتا ہے۔ اور اگر اس میں خون کی کمی ہے۔ تو اس کا رنگ موسمی بالائی کے مانند زردی مائل ہوتا ہے +

ذکورہ بالا پانچوں علامتیں کم و بیش اس وقت بھی موجود ہونگی جبکہ کسی عضو

میں ریشم { کسی کو نس ٹرم۔

کی قوت حیوانی دقت حیات میں شدید کمی آجاتی ہے۔ جیسا کہ اُس وقت ہر سکتا ہے جبکہ کوئی بڑی شریان پر بند لگا دیا گیا ہو۔ یا اُس کے اندر سدہ واقع ہوا ہو پھر اگر دورانِ خون کے رکاوٹ کی یہ علامتیں عرصہ تک قائم رہیں گی تو سمجھنا چاہئے کہ وہ حصہ پورے طور سے مردہ ہونے والا ہے + بعض اوقات مردہ حصہ کی شناخت میں کسی قدر دقت واقع ہوتی ہے۔ خصوصاً جبکہ وہ حصہ دریدی خون سے بھرا ہوا ہو۔ اور شریانی حرکت (نبض) غیر محسوس ہوگئی ہو۔ اس وقت اس کی شناخت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اُس کے دبانے سے رنگت میں قدرے تغیر واقع ہوتا ہو اور اُس کی سرخی کم ہو جاتی ہو۔ اور پھر دباؤ بٹانے سے رنگت بدستور گہری ہو جاتی ہو تو اسے زندہ سمجھنا چاہئے۔ اور اگر دباؤ سے رنگت بدستور قائم رہے تو سمجھنا چاہئے کہ غالباً وہ مردہ ہو گیا ہے +

تغییرات جو مردہ ساختوں میں نمودار ہو جاتے ہیں :-

ان تغیرات کا مائٹر انحصار اُن حالات پر ہے۔ جو عضو کے مردہ ہونے کے وقت طاری ہوتے ہیں۔ اور اس امر پر کہ عنونت (سٹراڈہ) موجود ہے یا نہیں +

۱۔ غانغرا نایا لیسید یا غانغرا ناجاذلہ مرث :- یہ بوست یا جفاف خشک غانغرا اُسی وقت واقع ہوتا ہے جبکہ نافذ ساخت مرزہ ہونے سے پہلے کم و بیش رطوبت و اخلاط سے خالی ہوتی ہے۔ اس کا عام سبب شریان کا انسداد مزمن ہے۔ جبکہ آخری شریانوں کے تجربہ و صلابت کی صورت میں واقع ہوتا ہے۔ جس سے بالآخر بڑی شریانیں ہی بتدریج ایک سخت بالکل بند ہو جاتی ہیں

مرث ڈرائی گائین۔

مرث ہیرکشن۔

مرث بوست۔ محلی کی نمین۔

مرث اسکلروسس۔

مردہ حصہ سخت۔ خشک اور جھری وار ہو جاتا ہے۔ اور خون کے سرخ دانوں کی حریت و مویہ کے تفرق و پراگندگی اور تحلیل سے آسکارنگ بھورا یا سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مردہ حصہ لمبی اور نرم ساخت کا ہے جیسے ٹخنہ سے اوپر کا حصہ۔ تو وہ شاید ہی خشک ہوتا ہے۔ بلکہ اکثر اُس میں التهاب ہو جاتا ہے۔ اور التهاب کے بعد۔ اگر جراثیم پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ متعفن ہو کر سخت بدبودار ہو جاتا ہے +

۲۔ غانغرا نارطوبیہ۔ (تر غانغرا) جب جسم کا وہ حصہ مردہ ہو جو رطوبات سے پر ہے۔ تو اس قسم کا غانغرا نمودار ہوتا ہے۔ غانغرا نارطوبیہ اُس وقت ظاہری ہوتا ہے جبکہ وریدوں میں سدہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح شریانیں یکایک بند ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ گاہے ضرب و سقطہ کے غانغرا میں بند و دباؤ کے باعث عضو کی بڑی شریان پھٹ جاتی یا دب جاتی ہے۔ اس صورت میں اُس حصہ کے اندر رطوبت کی کثرت اس صورت سے ہوتی ہے کہ جب قلب کی قوت دفعہ کا اثر یہاں غائب ہوتا ہے۔ تو عروق شریہ میں وریدوں کا خون لوٹ کر جمع ہو جاتا ہے و اخفان قہری + یہ ظاہر ہے کہ ان حالات میں جراثیم کے نشو و نما کے تمام ماہان موجود ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ جلد میں بکثرت جراثیم موجود رہتے ہیں۔ اس لئے اگر ان کے دفعیہ و تطہیر کی انتہائی کوشش نہ کی جائے۔ تو یہ فوراً حملہ آور ہو کر عضو کے ساتھ غانغرا پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر یہ بخوبی ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ غانغرا رطوبیہ کے ساتھ تعفن کا ہونا ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک ضمنی چیز ہے جو بوجہ جراثیم کے نمودار ہو جاتی ہے +

۳۔ غانغرا نارطوبیہ غیری عفونیہ۔ اس میں مردہ ساختیں فنا و تغیر کے

۱۔ بیرونگین۔

۲۔ موائٹ گنگرین۔

۳۔ براؤن۔

۴۔ اسپنک موائٹ گنگرین۔

باعث کم و بیش ہر رنگ ہو جاتی ہیں۔ ان کا رنگ ارغوانی، سیاہ، زرد، سبز یا سفید ہو جاتا ہے۔ اگر عددی (چھوت) کا اثر نہ ہو پچھنے پاسے تو مردہ حصہ تقریباً اسی حجم و ترکیب کا رہتا ہے جیسے کہ آغاز غانغرا میں تھا۔ اور پھر وہ بغیر کسی علامت التهاب کے نہایت سادگی اور سکون کے ساتھ آس پاس کے اجزاء سے منقطع ہو کر گر جاتا ہے۔ مگر چونکہ مردہ ساخت میں جو مختلف قسم کی رطوبتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ کسی قدر اچھی ساخت میں ضرور جذب ہوتی ہیں۔ اس لیے گاہے خفیف ستم دم کی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں +

۴۔ غانغرا نازطوبید عفونیہ۔ اس قسم میں عمل تغیر و فنا و تیزی کے ساتھ جاری ہوتا ہے۔ اور اس کی ساخت بہت جلد متفرق و پراگندہ ہو جاتی ہے۔ عضو کا رنگ سیاہ، سبز یا زرد ہو جاتا ہے۔ جلد کا باہنی طبقہ یعنی بشرہ اندرونی طبقہ یعنی اومنت سے جدا ہو کر اوپر کو اٹھ جاتا ہے۔ اور اس میں آبلے نمودار ہو جاتے ہیں۔ جن میں متعفن مصل، رائیت یا رطوبت جمع ہو جاتا ہے۔ یا اس میں نفاثات (ہوائی آبلے) بن جاتے ہیں۔ جنگو بشرہ کے نیچے ہی نیچے کچھ دور تک دبایا جاسکتا ہے۔ اگر اس حصہ کو چکی سے داب کر اٹھایا جائے تو ہوائی چٹیا کرکڑا ہٹ سکتی دینی۔ نیز وہ حصہ نرم اور پٹھنے کے لیے آمادہ ہو گا +

علامات مابعد۔ غانغرا کے علامات اس کے بعد کیا ہونگے، اس کا درود

دو باتوں پر ہے +

۱۔ کیوش دیرا۔	۱۔ سپٹل
۲۔ سیرم	۲۔ سنٹ گنگرین
۳۔ ٹیس بیز۔	۳۔ پڑڈاٹ گنگرین
۴۔ امفانی سی سے مل کر ٹیکنگ۔	۴۔ کیو ٹیکس۔

۱۔ اُس میں عدوی یا عفونت کا دخل ہو اسے یا نہیں؟

۲۔ اور اُس کی مقدار (حجم) کیسا ہے؟

(الف) اگر مردہ حصہ چھوٹا اور غیر عفونی ہے۔ تو مناسب حالات کی موجودگی میں وہ باطل جذب ہو جائیگا۔ جس طرح اعمال جراحہ میں بی کے آنتوں کے نشت (مثلاً لہر) جذب ہو پایا کرتے ہیں۔ جس سے اندرونی زخموں میں ٹانگے لگاتے ہیں اس قسم کا انجذاب اکثر اعضا کے قطع کرنے کے بعد اُن چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پایا جاتا ہے۔ جو ٹپکتے رہتے اور گل جاتے ہیں۔ اگر مردہ حصہ کو جراثیم کے تاوٹ سے پاک اور خشک رکھا جائے۔ تو وہ بتدریج جدا ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ اچھی طرح جدا ہو جاتا ہے تو ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا کھڑبڑ خود بخود گر پڑتا ہے۔ یا جراح اُسکو چھنے سے ملحدہ کر دیتا ہے۔ اور اُس کے نیچے زخم کا نشان (غزبہ) پایا جاتا ہے۔ اسی طرح مردہ ہڈی بھی جذب ہو سکتی ہے۔ بشرطیکہ وہ چھوٹی ہو بہت زیادہ ٹھوس نہ ہو۔ اور تندرست عروقی ساختوں سے متصل ہو۔ چنانچہ یہ نعل اس طرح پورا ہوتا ہے کہ پہلے مردہ حصے پر چھوٹے چھوٹے گول غلیات حملہ آور ہوتے ہیں۔ جو غائباً غن کے سفید دانے ہوتے ہیں۔ اور اُس پاس کی زندہ ساخت کے عروق جاذبہ و عروق دموئے آتے ہیں۔ یہ دانے وہاں ترشح کے طور پر جمع ہو کر بتدریج مردہ حصہ کو عمل ہضم سے جذب کر لیتے ہیں۔ اور ان کی جگہ انگور بن جاتے ہیں۔ جو بالآخر نہرہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اور نہرہ کے اوپر بشرہ کا استر ہو جاتا ہے اور اسکا مفصل بیان اب التمام میں آئے گا +

جراثیم کے باب میں هجوم بیضاوات کا بیان ہو چکا ہے۔ یہ نعل "تذب" بھی

مٹ سی کیٹ رکس۔

مٹ نیگوساتی ٹوسس

مٹ کیٹ گٹ۔

مٹ اسکیب۔

بجانبہ اسی کے مانند ہے۔

مترجم

رب (الگرم وہ حصہ غیر عفونی ہے۔ لیکن وہ حجم میں بڑا۔ یا ایسی ساختوں سے مرکب ہے جو اسکو پورے طور پر منجذب ہونے سے روکتی ہیں۔ یا اگر مریض کی قوت حیات میں کمی آگئی ہے۔ تو مذکورہ بالا صورت سے کسی قدر مختلف صورت ظہور پذیر ہوگی۔ یعنی اس وقت اس کے "کلی التجذاب" کی بجائے مردہ حصہ کا "جذبی التجذاب" ہوگا۔ اور باقی ماندہ حصہ تقریح فقری کے سادہ عمل کے ذریعہ جدا ہو جائے گا۔

"تقریح فقری" سے مراد وہ تقریح ہے جس میں فقر الدم یعنی کمی خون

ہوتی ہے۔ مترجم

مردہ حصہ جو زندہ اجزاء سے بالکل ملا ہوا ہوتا ہے۔ وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کی جگہ انگور بنتے جاتے ہیں۔ انگور کے دانے مردہ حصہ کے اندر دور تک بند رہتے ہیں۔ اور جو انگور کے پہلے بن چکا ہے وہ بند رہتے سخت ہو کر نمبہ بنتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگلے انگور سر چشمہ غذا سے دور ہو جاتے ہیں اور ان کے پیچھے جو نمبہ بنتا جاتا ہے وہ سکڑ کر اور بھی رگوں کو بند کر دیتا ہے۔ جس سے ان کی قوت طبعی کمزور ہو جاتی ہے۔ اور وہاں قلت غذا سے تقریح کا سادہ عمل جاری ہو جاتا ہے۔ اور مردہ اور زندہ ساختوں کے درمیان ایک حد فاصل پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی عمل سے مردہ حصہ جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ مردہ حصہ جو بدن سے اس طرح جدا ہوتا ہے وہ اہلی مردہ حصہ سے بالکل طور پر چھوٹا ہوتا ہے۔ اس عمل سے مقامی التباب کے علامات نہیں پیدا ہوتے


مطابق انٹرنی اہل جراحی۔

مطابق پارشل اہل جراحی۔

مطابق انیمک السریشن۔

(۱۶) پاؤں کا غائغرائی اعفونیہ رطبہ - جو شریان نخدی کے

جراحت نافذہ سے ہو ہے



اور نہ عمومی عوارض زیادہ شدید ہوتے ہیں + مندرجہ بالا عمل نہایت آہستہ آہستہ اور بتدریج عمل میں آتا ہے۔ اور اس میں اس قسم کے خطرات نہیں ہیں۔ جیسے کہ سرخ السیر عفونی غانغرائیاں ہو سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ ساخت یا مردہ حصہ جس قدر زیادہ سخت اور ٹھوس ہوگا اُسی قدر زیادہ وقت اُس کے جدا ہونے میں صرف ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ماتہ یا پاؤں پورے طور پر غانغرائی کا شکار ہوتا ہے۔ تو اکثر یہ صورت واقع ہوتی ہے کہ کڈیوں پر نمایاں اثر ہونے سے پہلے اس کے نرم حصے (مثلاً عضلات وغیرہ) جدا ہو جاتے ہیں۔ اور زخم بہت جلد مندمل ہو جاتا ہے۔ جسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نرم اجزاء میں شدید نقباض واقع ہوتا ہے۔ اور عضو کی شکل مخروطی ٹھنڈے کے مانند ہو جاتی ہے۔ جس کی نوک سے بڑی باہر نکلی رہتی ہے +

(ج) اگر غانغرائی والا حصہ عفونی ہے۔ تو اس کے جدا ہونے میں عمل الہباب ضرور شامل ہوتا ہے۔ اس الہباب میں اس پاس کی تندرست ساختیں متاثر ہوتی ہے۔ غانغرائی والا حصہ میں تغیر رنگ ہونے کی وجہ سے بے جان اور تندرست ساختوں کی دین حد فاصل یا فصل مشترک نمودار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تندرست ساخت کا رنگ بدستور قائم رہتا ہے۔ مردہ حصے میں کمیادی بھیج مرکبات پیدا ہو کر اس پاس کے تندرست حصوں میں خراش پیدا کر کے الہباب کا باعث بنتے ہیں۔ جن میں بالآخر پیپ پڑ جاتی ہے۔ اور تندرست حصے کی آخری صدر انگور کی ایک تہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح ایک آخری خط الفصاں رخد الفصاں نہائی (نمودار ہو جاتا ہے۔ علامات مرض جو اس آخری منزل میں نمایاں ہوتی

مط سہلک۔

مط فائنل لائن آف سپرین۔

مط لائن آف ڈی آر کیشن۔

میں وہ یہ ہیں کہ تندرست ساختوں کے آخری کنارہ پر اجتماع خون کی وجہ سے ایک چمکدار سرخ لکیر نظر آتی ہے۔ یہ سرخی تقریباً آٹھ دس من میں تدریج پھیل کر گہرائی میں چلی جاتی ہے۔ اس وقت اگر جلد کا بیرونی حصہ یعنی بشرہ ثابت ہے۔ تو مردہ اور تندرست حصے کے درمیان ایک باریک سفید یا زرد لکیر نظر آتی ہے یہ لکیر دراصل بشرہ کے نیچے پیپ کی ایک تر کے اجتماع سے پیدا ہوتی ہے جو بشرہ کے ہٹانے پر آشکارا ہو سکتا ہے۔ جو نہی پیپ یہاں سے خارج ہوگی ایک اٹھلی نالی ریزبٹ روح نظر آئے گی۔ جو تندرست حصے کے انگوڑی والی سطح اور غانغرا والے حصے کے درمیان حائل ہوگی۔ یہ عمل بتدریج عضو کی پوری موٹائی میں پھیل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مقامی التهاب اور بخار کی علامتیں واضح ہونگی بخار کی شدت اور اس کا درجہ اس سیت پر منحصر ہوگا جو جذب ہوتی ہے۔ علامہ ازلیہ عمل التهاب ہمیشہ صراحتاً ایسی تک محدود نہیں رہتا۔ بلکہ عروق جاؤں یا اور وہ کے ذریعہ یا عنفات اور خائف کے طبقات کی راہ سے اوپر تک پھیل کر سائے عضو میں ایک وسیع تپج بکھا جٹ ہو سکتا ہے۔

غانغرا کے عمومی علامات

ان کی تفصیل و دعوائیات کے ذیل میں ہو سکتی ہے۔

(الف) ایسے عمومی حالات کا پایا جانا جنکی موجودگی صورت غانغرا میں سہولت پیدا کر سکتی ہے۔ اور جو بالخصوص قریب میں انخطاط پیدا کر کے یا خون کی ترکیب میں تغیر پیدا کر دیتے ہیں۔ یا اعضاء کی قوت حیدائی کو کمزور کر دیتے ہیں۔ مثلاً غانغرا کے حملہ سے پہلے عام امراض کا ہونا جیسے فیا تبلیس۔ بول ٹرالی۔

معد وایا بے ٹیز

معد البہوی نوریہ

معد شیلوگر و

معد سپوتے شن

اسی طرح غلط کاریوں اور غیر محتاط اور بُری زندگی کے جسمانی نتائج۔ یا قلتِ غذا کے مقامی علامات کا پایا جانا +

(ب) ایسے علامات کا پایا جانا جو مرد و عورت کی موجودگی سے اور جن کے ساتھ اس کے اتصال کے باعث پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ستم دم کے مختلف انواع پائے جاتے ہیں۔ جن کی وجہ سے عموماً مختلف درجات کا بخار پیدا ہوتا ہے۔ یکجا عام طور پر ضعیف ہی ہوتا ہے + درودالم بھی مریض میں ضعف و نقاہت پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ عام طور پر بعض غانغرانہ میں نمایاں علامت ہوتا ہے +

علاج

غانغرانہ کا مقامی علاج اس کے اقسام کے ذیل میں الگ بیان کیا جائیگا۔ یہاں

صرف عمومی علاج لکھا جاتا ہے۔ مترجم

علاج عمومی۔ مقوی زود ہضم غذایہ اور مختلف ذرائع سے مریض کی قوت کو قائم رکھنا چاہئے۔ شدتِ درد اور بے خوابی کو مخدرات و منومات سے دور کرنا چاہئے۔ اس مقصد کے لیے ایونٹ اور ایونٹین (جو ہر امین) کافی مقدار میں دے سکتے ہیں۔ بشرطیکہ گروے تندرست ہوں۔ ذیابیطس اور بول زلالی کے لئے غذا اور دوا بطور علاج کے استعمال کرنا چاہئے (یعنی علاجِ غذائی اور علاجِ غذائی برتنا چاہئے) شکر اور زلالِ بیض (سفیدی بیضہ) کی مقدار محدود کر دینا چاہئے +

مقامی علاج کی تفصیل ذیل کے بحث میں کی جائے گی +

۱۔ ڈائی ٹیک ٹریٹ منٹ۔	۲۔ ٹائیک
۳۔ تھراپوٹک ٹریٹ منٹ۔	۴۔ اوپیم
۵۔ البروس۔	۶۔ مارفینا۔

اقسام خانقانا

خانقانا کی مندرجہ ذیل تقسیم اگرچہ اصولاً نامکمل اور ناقص ہے۔ مگر اس تقسیم میں اس کے ایسے اقسام کو یکجا کیا گیا ہے جو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ تاکہ اس تقسیم سے عملی فوائد حاصل ہوں۔

۱۔ خانقانا عارضیہ (وہ خانقانا جو کسی مرض سابق کے عرض علامت کے طور پر ہو) وہ خانقانا جس کی استعداد کسی مرض سابق (مرض عروقی یا مرض عمومی) کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہو۔ یا جس میں اگر ضرب زخم پایا بھی جاتا ہو تو وہ کوئی بڑا مؤثر نہ ہو۔

(الف) خانقانا سدیہ (جو سدیہ عروق سے عارض ہو)

(ب) خانقانا کشینو خیمہ (جو بڑا ہے سے عارض ہو)

(ج) خانقانا جو تھکریانی (وہ بڑا زین) سے لاحق ہو اور بڑا ہے کے اثر سے نہ ہو)

(د) خانقانا ذیابیطیہ (جو مرض ذیابیطس سے ہو)

(۴) خانقانا ذاتیہ مناسبہ (جو کوئی مرض یہود بھی کہتے ہیں)

(و) خانقانا شیلیہ (جو شیلیہ کے باعث ہو)

۲۔ خانقانا جرحیہ (عارضیہ) وہ جو باواسطہ یا باواسطہ نہ بڑا جراثیم کی

ملا سبب سے نکلیں۔

ملا امبوک نکلیں۔

ملا امبوک نکلیں۔

ملا سینٹ نکلیں۔

ملا آریہ نکلیں۔

ملا ڈیابیطس نکلیں۔

ملا اسپان۔ نے نیس سی نکلیں۔

ملا رینا ڈیڈین۔

ملا آرٹ نکلیں۔

ملا آرٹ۔

ملا ٹریٹ نکلیں۔

ملا ڈیڈین نکلیں۔

ملا ڈیڈین نکلیں۔

و جس سے پیدا ہو رہا ہے یعنی ضرب واصل یا ضرب غیر واصل سے پیدا ہو اور جس میں ضرب و جراح است انقطاع حیات کا فوری سبب ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔

۱ الف) غانغرا غیر واصلہ جس میں مقام غانغرا سے دور کے عروق پر ضرب صدمہ کا اثر پڑے اور اس کے باعث پیچھے کے حصص میں غانغرا واقع ہو۔

۲ ب) غانغرا واصلہ جس میں محل غانغرا محض مضروب حصہ ہی تک محدود ہو۔

۳۔ غانغرا ماعوضیہ۔ جو جراثیم کے عمل سے پیدا ہو۔ اس کے ذیل میں مندرجہ ذیل اقسام ہیں۔

۱ الف) غانغرا التہابیہ حادہ یا غانغرا جرحیہ منتشرہ۔

۲ ب) جروح آگالہ اور غانغرا تہیہ بیمارستان۔

۳ ج) آکلہ انفم اور غانغرا می انفم۔

۴ د) جمرہ رشب چراغ اور وٹل۔

۵۔ حرارت و پروت کا غانغرا ناشلاخصیہ (پارنا) حرکی (جل جانا)

۱۔ ڈائریکٹ انجری۔

۲۔ ان ڈائریکٹ انجری۔

۳۔ ان ڈائریکٹ لنگرین۔

۴۔ ڈائریکٹ لنگرین۔

۵۔ انفکٹڈ لنگرین۔

۶۔ ایکوٹ انفلاٹری لنگرین۔

۷۔ سپرینٹنگ ٹراؤسٹیک لنگرین۔

۸۔ ورنلیف ڈینا۔

۹۔ ہسپٹل لنگرین۔

۱۰۔ لنگم ایس۔

۱۱۔ فو۔

۱۲۔ کزنکل۔

۱۳۔ برائل۔

۱۴۔ فراسٹ بانٹ۔

۱۵۔ برن۔

خصوصیت سردی سے اعضاء کا متاثر ہونا۔ مختار الصراح۔

اب مندرجہ بالا اقسام میں سے ہر ایک کی تفصیل الگ الگ کی جاتی ہے

۱۔ غانغرا نا عرضیہ

والفنا غانغرا نا سدیہ

غانغرا نا سدیہ (سردی کی عام بحیث اس کے علحدہ اور مخصوص باب میں مریج ہے) جب کسی عضو کی بڑی اور مخصوص شریان معمولی سردی کی وجہ سے مسدود ہوتی ہے۔ تو اس وقت بعینہ یہی حالت پیدا ہو جاتی ہے جیسی کہ شریان کو گرہ لگا کر باندھ دینے سے ہمارا کرتی ہے (رابطہ اکثر شریان) اور معمولی حالات میں محض ایسے سردی کی وجہ سے غانغرا نا نہیں پیدا ہونا چاہئے۔ مگر جب کبھی جسم کے قوی اور عام قوت حیات یا کسی عضو کی مقامی قوت نہایت درجہ گرمی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کسی بڑی شریان کا اس طرح مسدود ہو جانا اس عضو کے کم درجہ میں غانغرا نا پیدا کر سکتا ہے۔ اس قسم کا غانغرا نا حسب ذیل صورتوں میں پیدا ہو سکتا ہے +

(۱) جب سردی بغیر تھک سے بنا ہوا ہو اور قلب کی کوثریوں (صمامات قلب) سے ٹوٹ کر اور سیلان خون میں شامل ہو کر کسی شریان تک جا پہنچا ہو۔ یہ حالت ایسے مریضوں میں واقع ہوتی ہے جن میں وجع مفاصل (گٹھیا) یا دیگر حیات کے بعد قلب کی اندرونی جھلی میں ورم و التهاب (التهاب بطانہ قلب) ہو جاتا ہو پھر یہ التهاب صمامات قلب تک پھیل کر انکو متاثر کر دیتا ہے۔ جس سے

مل سپٹوم تک گنگرین۔

مل غانغریں۔

مل اسہوک گنگرین۔

مل کارڈیک ویلوز۔

مل گچر آف وی آر ٹری۔

مل انڈو کارڈائی ٹس۔

ان میں خن کی لیضن جم جاتی ہے۔ ایسے مریض میں چونکہ پہلے بخار کی وجہ سے عام جسمانی تغذیہ ناقص ہوتا ہے۔ قلب کے حرکات بھی کمزور ہوتے ہیں۔ دوران خون میں بھی کوٹریوں کے امراض کے باعث فتور آ جاتا ہے۔ پس جب حدود مرض کے لیے ایسے مناسب حالات مل جاتے ہیں۔ تو اس وقت عضوی کسی بڑی شریان کا مسدود ہونا نو عمر مریض میں بھی غائرانا پیدا کر سکتا ہے۔

۲۔ اکثر معمر مریض میں ایسا ہوتا ہے کہ درم لٹائی رسلعہ ہلیمہ کا ایک ٹکڑا جدا ہو کر تھ پانوں کی کسی ایسی شریان میں جا پھنستا ہے جس میں پہلے ہی سے شریانی وناو کے باعث کمی خون موجود ہو۔

سدہ عموماً شریان میں اُس جگہ باعث انسداد ہوتا ہے جہاں ہر قسم کی درشاخہ ہو جاتی ہے۔ یا جہاں کسی بڑی شریان سے کوئی بڑی سی شاخ پھوٹ نکلتی ہے۔ اور وہاں اصلی شریان کا قطر یک سخت تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ سدہ مقام انقسام پر یا جہاں سے شریان پھوٹتی ہے اُس پر سوار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پنی دہنی لیضن کے تازہ طبقات اُس پر جمتے جاتے ہیں۔ اور بالآخر شریان کی دونوں شاخوں کو مسدود کر دیتا ہے۔ زیریں اطراف لٹائی میں سدہ کے رکنے کا مقام عام طور پر شریانی فخذی یا البغی کا مقام انقسام ہوتا ہے۔ اور بالائی اطراف راتھ میں سدہ کا قیام شریانی غائر علوی کے پھوٹنے کی جگہ یا شریانی عضدی کے تقسیم کی جگہ ہوتا ہے۔

علامات۔ انسداد شریانی کی ابتدائی علامت یہ ہے کہ مقام انسداد پر کیا گی

۱۔ اسی روتا۔	۲۔ پلے پیل آرٹری۔
۳۔ آرٹریل ڈی جریٹن۔	۴۔ سوہیر پر و فنڈا آرٹری۔
۵۔ فیورل آرٹری۔	۶۔ برکیل آرٹری۔

شدید درد محسوس ہوتا ہے۔ یہ درد نیچے پھیل کر شریان مخصوص کی پوری رفتار میں پایا جاتا ہے۔ شریان کی تڑپ (نبض) مقام انداؤ سے نیچے بند ہو جاتی ہے اور عضو ڈھیلا (مسترخی) اور بے حس ہو جاتا ہے۔ اس کی حرارت و فشار کم ہو جاتی ہے۔ اگر عروق تندرست و صحیح ہیں تو اور وہ۔ کے دوران خون میں رکاوٹ (رکود) واقع ہوگی۔ اور یہ بہت جلد عضو کے آخری حصہ میں امتلاء و موی اور تہج (اوذیا) پیدا کر دے گا۔ اور بالآخر فافغرانا رطوبہ (ترقانغرا) نمودار ہو جائے گا۔ لیکن اگر آخری شریانوں میں مواد ارضیہ (مواد کلیہ) کے باعث مصلابت و تھج پیدا ہو گیا ہو۔ یا ان میں ورم ہلائی ہو گیا ہو۔ اور ان وجود سے عضو میں مزمن فقر دمی ہو تو اس حالت میں خشک فافغرانا (فانغرانیا) واقع ہوگا۔ جس کا عمل عضو کے آخری حصہ سے شروع ہو کر تدریجاً اوپر کی طرف بڑھتا جائے گا۔ حتیٰ کہ وہ ایسی سطح پر پہنچ جائے گا جہاں دوران خون میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور جہاں اس قدر خون موجود ہوتا ہے کہ عضو کے اس حصہ کو زندہ رکھ سکے ایسا تندرست حصہ عام طور پر جوڑے کے قریب جارمہ پایا جاتا ہے۔ کیونکہ مفاصل کے آس پاس بہ نسبت اس حصے کے جوڑوں کے مدیان ہوتا ہے عروق کا باہمی توشل زیادہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے جوڑوں کے آس پاس قوت حیات زیادہ مستحکم اور پائدار رہتی ہے۔ مثلاً پنڈلی کا فانغراناکثر ٹخنہ کے جوڑے ذرا اوپر یا گلنے کے جوڑے ذرا نیچے پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے۔


علاج

حفظ ما نقد ۴۰۔ سب سے مقدم اور ضروری احتیاط یہ ہے کہ عضو آؤٹ میں

م۔ انیما۔
م۔ اناسٹورس۔

م۔ اسٹیک نے شن۔
م۔ اتھی ردا۔

(۱۸) سده کی تصویر جو ایک شریان کے مقام انقسام میں
پھنس گیا ہے



الف



ب

(الف) میں سده نظر آ رہا ہے۔ اور اس پر تھنر کی ابتداء ہو گئی ہے۔ مگر
ابھی تک رگ پورے طور پر بند نہیں ہوئی ہے۔ لیکن (ب) میں شریان کی
دونوں شاخیں سده کے بڑھنے سے بند ہو گئی ہیں +

علامات موت نمودار ہونے سے پہلے ہی عددی وعفونت کا اسناد کیا جائے
مریض کے ماخلول کو کاٹ کر چھوٹا کر دیا جائے۔ اور پورے عضو کو بخوبی پاک
صاف (مطہر) کر لیا جائے۔ انگلیوں اور ناخن کی جڑوں (ثنیات ہالیہ) کے
درمیان خصوصیت کے ساتھ پاک صاف کرنا چاہئے۔ پھر عضو کو پاک کی ہوئی
خشک روئی میں لپیٹ کر پٹی باندھ دی جائے۔ عضو کو تیکہ وغیرہ کے اوپر رکھ کر
قدرے اٹھا ہوا رکھنا چاہئے۔ تاکہ وریدی خون کی واپسی میں آسانی ہو دبیغیر
کہ شریانی خون کے دوران میں کوئی مزاحمت ہو اور خانقاہ تانہ ہونے پائے۔
عضو میں اچھی طرح مالش کرنا بھی مفید خیال کیا گیا ہے۔ تاکہ اس سے سدہ ریزہ
ریزہ ہو کر نیچے کے عروق میں خون کے ساتھ چلا جائے۔ بعض مرتبہ لوگوں نے
ایسا بھی کیا ہے کہ سدہ و شریان کو نشتر سے کھول کر اور سدہ کو دھو کر خارج
کر دیا۔ یا مقام ماؤف سے سر کا دیا۔ مگر اس عمل کے نتائج قرار واقعی امید افزا
نہیں پائے گئے۔

لیکن اگر خانقاہ نمودار ہو جائے۔ تو بھی لہارت دیا کیڑگی کے لیے مندرجہ
بالا احتیاط جاری رکھی جائے۔ اور حتی الامکان عددی وعفونت کے اسناد کی
کوشش کی جائے۔ یہاں تک کہ ایک قدرتی خط انفصال نمودار ہو جائے۔ پھر
مرضی میں خشک خانقرا کے علاج کے لیے عضو کے کاٹنے میں اہنی اصول کا
حکم کیا جائے جو خانقرا امشیخوخیہ میں قابل توجہ ہیں۔

مگر جوان اور نوجوان مریضوں میں خط انفصال سے ذرا اوپر تندرست حصہ میں
عضو کو قطع کرنا چاہئے۔ قطع عضو کے لیے بہترین وقت کا تعین مریض کی مقامی
اور عمومی علامات کو دیکھ کر کرنا چاہئے۔ اگر ماؤف حصہ غیر عفونی ہے۔ تو عمل قطع کو

لمتوسی رکھنا چاہئے۔ لیکن اگر التهاب شدید ہو اور وہ تیزی سے پھیلنا ہو تو عضو کو جلدی ہی کاٹ دینا ضروری ہے۔ اور خط انفصال کے نمودار ہونے کا انتظار کرنا فضول ہے +

رب غانغرا نا شینخو خیمہ۔ بڑا پے کا غانغرا نا

یہ اکثر معمر اشخاص میں ہوتا ہے۔ اور غیر مکمل ناقص تغذیہ جہانی کا نتیجہ ہوتا ہے مقام مرض۔ یہ بالخصوص پیر کے انگوٹوں میں ہوتا ہے۔ اگرچہ کمی کے ساتھ ہاتھ ناک۔ کان زبان میں بھی پایا جاتا ہے +

اسباب۔ ان اسباب کا تعلق زیادہ تر دوران خون کے اعضاء کی خرابی سے ہوتا ہے +

رالف اطراف یا اس حصہ بدن کی چھوٹی شریانوں میں مٹا دکھی ہیشیہ یا جاتا ہے یعنی اجزاء ارضیہ یا کھینکے باعث ان میں صلابت پیدا ہو جاتی ہے اور گاہے اس کے ساتھ بڑی شریانوں میں ورم ہامی بھی ہوتا ہے۔ ان مواد فیض کے جمنے سے عروق سخت نلیوں کی طرح ہو کر ان کی چمک جاتی رہتی ہے۔ اور مختلف حالات میں ان کی فضائیں جو کم و بیش ہوا کرتی ہیں ان سے یہ اس وقت عاجز ہوتی ہیں۔ اس لئے عضوا و فن میں ان سخت شرائین سے خون کی ایک معین اور نا کافی مقدار پہنچتی ہے۔ جس سے اُن عضویں ایک گونہ قلت تغذیہ اور کمی خون کی مزمن حالت طاری رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شرائین کی اندرونی استر کرنے والی جلی رطبہ بالٹہ اکثر ایسی نا ہموار اور کھردری ہو جاتی ہے کہ ذرا سے چوٹ یا ضرب سے۔ بلکہ ضرب کے بغیر بھی شریان کے اندر نہایت آسانی سے ٹخڑ ہو جاتا ہے

۱۔ اقمی رومہ۔


۲۔ ٹیونیکا انٹی۔

۳۔ قہر بوسس۔

۱۔ سینائل انگلین۔

۲۔ کیل کیمریس ڈی جزے شن۔

(۱۹) غانغراما شیخوخیه .



(ب) ضعف قلب عموماً موجود ہوتا ہے جس سے نبض کی قوت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور سخت اور تنگ شریانوں میں خون کا پھیلنا بھی دشوار ہوتا ہے اور رج (خود خون کی حالت بول زلالی یا بول سکڑی کے باعث اکثر ضرب ہوتی ہے۔

(د) جب یہ تمام اسباب معدہ موجود ہوں تو تخثر (انجماد خون شریانی) یا تو شریان کی بڑی شاخوں میں۔ یا آخری شاخوں میں یا عروق شعریہ میں پیدا ہو کر خانقرا تا کی ابتدا ہو جاتی ہے +

گاہے شریان کے اندر تخثر اسناد (کسی ایسی ضرب یا غیر معمولی ورزش سے بھی ہو سکتا ہے۔ مریض بے پرواہی سے کچھ خیال بھی نہیں کرتا۔ یا گاہے شریان کی کھردری دیواروں پر لیٹین کے طبقات کے بتدریج جھٹنے سے واقع ہوتا ہے۔

اگر جھوٹی شریانوں یا عروق شعریہ سے اسناد کی ابتدا ہو تو اکثر اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ پہلے ضیف سی چٹ لگتی ہے۔ مثلاً پاؤں کا انگوٹھا میز سے ٹکرا جاتا ہے یا انگلیوں کا گھٹکا نا جاتا ہے۔ پھر اس چٹ سے التهاب ہوتا ہے۔ جو بالآخر اسناد شریان پر ختم ہوتا ہے +

سردی کا لگنا بھی عروق کے اندر خون کے جھٹنے اور ان کے بند کرنے کا سبب محرک ہو سکتا ہے +

بہر حال انجماد خون خواہ کسی وجہ سے ہو۔ یہ کچھ فاصلہ تک پھیل جاتا ہے اور خانقرا کے پھیلنے کی بالائی حد سدہ کی وسعت پر منحصر ہوتی ہے +

علامات (۱) علامات مندرجہ اکثر اوقات خانقرا نمودار ہونے سے پہلے ہی

۱۔ بول زلالی۔ ایسے فوریا۔

۲۔ فائبرین۔

۳۔ بول سکڑی۔ گھائی کو سیوریہ۔

۴۔ کارن۔

نقص تغذیہ کے علامات نمودار ہوتے ہیں۔ مثلاً عضلات کی اینٹین (تقلص) اور ان میں درد کا محسوس ہونا۔ مکان کا جلد واقع ہونا سوئی کی سی چھن کا محسوس ہونا۔ یا خدر و بخشی کا پایا جانا۔ شریان نبضی کی حرکت اس قدر ضعیف ہو جاتی ہے کہ بشکل معلوم ہو سکتی ہے۔ پورے عضو میں جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ اور وہ سرد اور بھاری معلوم ہونے لگتا ہے۔ اکثر جلد میں فشرتی طور پر احتقان دموی ہو جاتا ہے۔ جس سے قروح اور نازخانی (چھان) نمودار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

۲۱۔ بالآخر عضو کے مخیطی حصہ کی کسی آفت کی وجہ سے جب فانقرات نمودار ہو جاتا ہے تو اس کے مقامی علامات یہ ہوتے ہیں کہ پہلے ایک دردناک شخ رقبہ ظاہر ہوتا ہے جس میں اکثر اوقات زخم بن جاتے ہیں۔ اس زخم کے مرکزی حصہ میں چند مردہ ٹکڑے دانتا نکلتے دکھائی دیتے ہیں۔ جو سوکھ کر سیاہ ہو جاتے ہیں۔ بتدریج یہ کیفیت بڑھ کر ہر طرف پھیلی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کم و بیش التباب بھی جاری رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر اسکو فانقراتنا شیخوخیہ التبابیہ (بڑا پے کا التبابی فانقرات) کے نام سے پکارتے ہیں۔

لیکن اگر فانقرات کسی بڑی شریان کے اسناد سے نمودار ہو تو مقامی التباب کی علامتیں نمودار ہونے بغیر ماؤف حصہ بچان ہو جاتا ہے۔ اور اس حالت میں صرف پاؤں کی انگلیاں شکر کر مر رہی ہو جاتی ہیں۔ اسکو فانقراتنا شیخوخیہ غیر التبابیہ (بڑا پے کا غیر التبابی فانقرات) کہتے ہیں۔ یہ کیفیت عموماً پاؤں کے انگوٹھے کی اندرونی جانب سے شروع ہو کر پاس کی انگلیوں کو یکے بعد دیگرے بچان کرتی ہوئی اندر اور اوپر کی طرف بڑھتی اور نخنہ اور پٹیلی تک جا پہنچتی ہے۔ اس عمل میں درد ایک نمایاں علامت ہوتا ہے۔

۲۲۔ انفلا سٹری سینائل انگلین۔

۲۳۔ انفلما سٹری سینائل انگلین۔

۲۴۔ کریپ۔

۲۵۔ ٹیبیل کرٹری۔

۲۶۔ سو۔

اور غانغریا کی وسعت دو باتوں پر موقوف ہوتی ہے۔ اول تو مقامی اور عمومی قوت حیات پر۔ دوم آس پاس کی ساختوں میں عروسی زکوٰۃ و عفونت کے ہونے یا نہ ہونے پر جو جوں میں بڑھتا جاتا ہے۔ مریض درد اور بیخوابی کی وجہ سے ناقص وضعیت ہوتا جاتا ہے۔ حتیٰ عفونت (عفونت کا بخار) قروح تپاۃ (زخم بستر) یا قلب شش۔ یا گردہ بستر ہر کردہ کا ہلکا غائے کر دیتے ہیں +

علاج (۱) ابتداء جب شریانی خون کافی نہ ہونے کی وجہ سے تغذیہ و حرارت میں کمی آجائے۔ عضو مازوت سرد۔ بھاری اور مضحل ہو۔ قوت حیوانیہ کے انغاش کے لیے گرم حمامات بخاریہ۔ بالمش وغیرہ کرانی جائے اور بدنی صحت کی اصلاح کی طرف توجہ کی جائے + مریض کو اس خفیف ضرب یا آفت کے دشلا گھٹے کو بے احتیاطی سے کاٹنے کے خطرات سے متنبہ کر دینا چاہئے۔ اور کیہ گرم پانی کی بوتلوں کو بے قاعدہ استعمال کرنے اور گھٹے کے بقاعدہ کاٹنے سے کیا غریب لاجت ہو سکتی ہیں +

(۲) اگر مرض ترقی پا کر غانغریا کے صحیح آثار نمایاں ہوں تو شریانی و ریدی وصل اشریان موریکو ملانے کا عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اس عمل میں مسدود شرائین کے خون کی رفتار کو صحیح اور وہ کے اندر متوجہ کر دیا جاتا ہے۔ تاکہ عضو مازوت کی قوت حیات قائم رہ سکے۔ عموماً اس عمل کا مقام مجری فخذی ہے۔ جس میں شریان فخذی ریدی فخذی۔ اور عصب صافن انسی رہتا ہے۔ اس عمل میں شریان فخذی اور ریدی فخذی کو کھول کر عرضاً کاٹ دیا جاتا ہے۔ پھر کٹی ہوئی شریان کے نچلے حصے کو

۱۔ ہاٹ ایر باٹھ	۲۔ فیورل آرٹری
۳۔ آرٹیریو وینس اناسٹوموسس	۴۔ فیورل وین
۵۔ سنٹرل کینال	۶۔ انٹرئل سنسز زو

اور کٹی ہوئی ویرید کے اوپر کے حصہ کو گرہ لگا کر باندھ دیا جاتا ہے تاکہ ان کے ہاڑوں سے جریان خون بند ہو جائے اور پھر کٹی ہوئی شریان کے اوپر والے حصے اور کٹی ہوئی ویرید کے زیریں حصہ کے درمیان نہایت احتیاط کے ساتھ توائل قائم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ان دونوں کا منہ ملا دیا جاتا ہے +

۳) جب غانغرا نا فی الحقیقت موجود ہو۔ تو علاج میں یہ امر بخوبی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر مردہ حصہ کے بتر (قطع) کے وقت زیادہ درد دھٹاکریں بچے حصہ سے نہ کاٹا گیا۔ بلکہ مردہ حصہ کے قریب ہی تندرست حصہ سے عضو کو کاٹ لیا گیا۔ تو قطع کرنے کے بعد باقی ماندہ کناروں (شراخ) میں فوراً غانغرا کا دوبارہ نمودار ہونا یقینی امر ہے۔ کیونکہ یہ اوپر درج ہو چکا ہے کہ بعض اوقات محض خفیف آفت شلا گشت کا کاٹنا مرض غانغرا کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ عمل بتر جیسے عظیم آفت سے غانغرا نا کیونکر شروع نہ ہو گا +

لہذا ضروری ہے کہ عمل بتر قطع عضو مرحلہ حصہ سے زیادہ فاصلہ پر کیا جائے۔ جہاں شراخ رکتے ہوئے سروں کے تغذیہ کے لئے خون کی کافی مقدار موجود ہو۔ لیکن یہ مقام دھڑ سے اتنا قریب بھی نہ ہو کہ اس صدمہ سے جان کا خطرہ ہو +

عمل بتر میں جہاں تک ممکن ہو دیر نہ کرنا چاہئے۔ خصوصاً جبکہ درد کی شدت ہو یا مغمو فی منتشر ہو +

عمل قطع کے وقت مناسب مقام کا انتخاب کرنے کے لئے اس بڑی شریان کو پوری لمبائی میں دیکھنا چاہئے جس مقام تک شریان بند ہو۔ وہاں تک عمل بتر نہیں کرنا

مٹا نہیں

مٹا نا سٹوموس۔

مٹا اسپریڈنگ سیلیولائیٹس۔

مٹا اپورٹیشن

چاہئے۔ یہ بھی خیال رہے کہ عضلات میں بمقابلہ اس کی جلد کے سلمان تغذیہ اچھا ہوتا ہے
الغرض جراح کو چاہئے کہ پہلے عضویٰ موجودہ حالت کا ہر صورت سے اندازہ
کرے۔ اس کے بعد فیصلہ کرے۔ اگر عضو بہت لاغر۔ جھری دار اور مرجھایا ہوا سا
ہو تو عمل بتر بہت بلند مقام پر کرنا چاہئے۔ دورانِ عمل میں ساختیں جس قدر کم
مخرج ہوں اُسی قدر بہتر ہے۔ شرائع یعنی جلد کے سرے طول میں تقریباً برابر اور کھلا
ہوں۔ کافی دبیز ہوں۔ اور عضلات کو چھپا سکیں +

اگر خانقانا صرف قدم تک محدود ہو۔ تو اس وقت مناسب یہ ہے کہ عمل بہتر
ران کی زیریں تہائی سے۔ یا گھٹنے کے جوڑے قدرے اوپر کیا جائے۔ لیکن گھٹنے
کے جوڑے کے مقابل کاٹنا اچھا نہیں ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے میں شرائع رٹکتے ہوئے
سرے کمزور اور بڑے ملتے ہیں +

اگر کسی وجہ سے عمل بتر نامناسب ہو تو عضو کو ہلکا کن پاک صاف (غیر عفونی)
رکھنا چاہئے۔ علاوہ ازیں اسے پیٹ کر گرم رکھنا اور اونچا رکھنا مناسب ہے +
مام برنی صحت کی اصلاح مناسب غذاؤں۔ مقویات اور محرکات سے کریں
رفع درد کے لیے اینیل کے مرکبات کا استعمال کریں +

(ج) خانقانا کے انسداد شریانی (غیر شیخونی)

یہ کثیر الوقوع نہیں ہے +

اسباب: گاہے اس کا باعث التهابِ بطانہ شریانی مسدود ہوتا ہے (التهاب
بطانہ شریانی مسدود) مراد یہ ہے کہ شریان کی اندرونی دیوار میں ایسا التهاب واقع

۱۔ اند آرٹرائٹس۔


آبی ٹرسینس۔

۲۔ فلیپس۔

۳۔ گنگرین فرام آرٹریل تقریباً بیکس رٹان سینائل

ہوتا ہے کہ اس سے خود شریان کا سفز بند ہو جاتا ہے (گاہے محمی معویہ کے آخری درجہ میں ہوتا ہے۔ اور گاہے خون کے قسم شدید کا نتیجہ ہوتا ہے + ان سب حالات میں اسناد و شریانی کی وجہ کچھ تو یہ ہوتی ہے کہ خون میں انجماد کی قوت بڑھ جاتی ہے اور کچھ وجہ یہ ہوتی ہے کہ سمیت کے دوران ویسلان کے اثر سے شریان کا اندرونی حصہ مہتب (متورم) ہو جاتا ہے + اس حالت میں شریان فحذی عواما مسدود ہوتی ہے مگر کبھی یہ اسناد اوپر چڑھ کر اور طی لطنی رشکم کی شریان عظم تک جا پہنچتا ہے۔ اور دونوں ٹانگوں میں غانغریا پیدا کر دیتا ہے +

علامات۔ عواما یہ غانغریا خشک ہوتا ہے۔ ہاں اگر اس میں شریان کے ساتھ ورید بھی ماؤت ہو جائے تو مہذب غانغریا بھی ہو سکتا ہے +
علاج۔ بہتر یہ ہے کہ خط فاصل کے منور ہونے تک انتظار کیا جائے۔ اس کے بعد عمل ہتر کے ذریعہ عضو کو خوب اونچے مقام سے قطع کر دیا جائے +



اسی قسم کا ایک غانغریا روس اور پومینڈ کے یہودیوں میں پایا جاتا ہے۔ جو نبا کو بہت پسندتے ہیں۔ اس غانغریا کو ایک خاص مرض کا نتیجہ خیال کیا جاتا ہے۔ جس کا نام ایک محقق نے الہتائب عرقی انجمادی منسب ذکر کیا ہے۔ یعنی اس میں خون کے انجماد اور عروق کے الہتب کے باعث رگیں بند ہو جاتی ہیں (اس میں اول تو ٹانگ کی شریان میں وسیع انجماد خون واقع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ٹانگ کی وریدوں کے خون میں بھی انجماد ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ابتداء و حقیق اور

۱۔ لائی آت ڈیمارکیشن۔	۲۔ ٹائی فائبر فور۔
۳۔ یوہرجہ۔	۴۔ فیورل آرٹری۔
۵۔ تھراپو انجمادی ٹش آرلی ٹریس۔	۶۔ ایڈاسل۔

(۳۰) ذیابیطسی فلغمونی اور غائرانا قدم اور ٹانگ میں



عضو کے تغذیہ میں نمایاں خلل واقع ہوتا ہے۔ اور آخر میں اکثر خشک غانغرا اپید
ہو جاتا ہے +

اس کے علاج کے متعلق بعض کی رائے ہے کہ شریان فیزی اور وین فیزی
کے درمیان تو اہل قائم کر دیا جائے۔ جس سے ابتدائی درجہ میں فائدہ ہونے کی
امید ہے +



گاہے ہاتھ کی ایک یا زائد انگلیوں کی نرک کا محدود خشک غانغرا اس وجہ سے
پیدا ہو جاتا ہے کہ مہلی کے نیچے کی رگوں پر گردن کی پسلی (ضلع عنقی) کا دباؤ پڑتا



غانغرا ناکی ایک عجیب قسم بعض اوقات حائض قطرائی کی پٹی کے مقامی ہستمال
سے پیدا ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات اس کے کمزور عنولات (مثلاً ایک حلیض
مذکورہ اور ۱۰ حصے پانی ابھی نفل کر گزرتے ہیں۔ اس سے عموماً ہاتھ کی انگلیاں متاثر
ہوتی ہیں۔ اس صورت میں غانغرا نا اس وجہ سے نہیں پیدا ہوتا کہ پٹی زیادہ کسی ہوئی
ہوتی ہے۔ یا یہ کہ اوپر ایسے خلافت کی پوشش ہوتی ہے۔ جس میں پانی نفوذ نہیں
کر سکتا۔ بلکہ غالباً اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حاض مذکور کے اثر سے شریان میں
دیر پا تشنج واقع ہوتا ہے۔ جس سے عضو میں خون کی کمی عارض ہو جاتی ہے۔ اور
پہی خون کی کمی غانغرا نا کا یا عضو کے مردہ ہونے کا سبب بن جاتی ہے +



مٹا ضلع عنقی (سر دائیں رتبہ)

وہ زائد پسلی جو گردن کے حصے میں پیدا
ہو جاتی ہے

مٹا کاربوئک ایسڈ۔

(۵) غانغرا نا ذیابیطیہ

اس کی خاص صفتوں کی وہ غیر معمولی حالت ہے جو ذیابیطس سے پیدا ہو کر بدن یا اعضاء کی قوت مدافعت کو ایسا کمزور کر دیتی ہے کہ وہ جب ڈائٹم کے حلوں کو نہیں روک سکتے۔

اس کے ساتھ ہی ایک حد تک شرائین کی اندرونی دیوار کا درم مصلب (سختی پیدا کرنے والا التهاب) اور اعصاب انتہائی کا التهاب (التهاب عصبی مجھی) بھی اس کا باعث ہیں۔

عموماً یہ قسم ذیابیطس والے مریضوں میں یا ایسے مریضوں میں نہیں ہوتا ہے جن کی عمر چالیس برس سے کم ہو۔

اکثر یہ قسم کی خفیف ضرب یا عفونی جراثیم سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اکثر پاؤں کے انگوٹھے یا کسی دوسری انگلی کے نیچے کی طرف سے یا سرے سے ایک چھالے کی صورت میں اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس چھالے کے آس پاس ایک سیاہی مائل اور ارغوانی رنگ کا بالہ یا حلقہ سا ہوتا ہے۔ جب چھالہ پھوٹ جاتا یا توڑ دیا جاتا ہے تو اس کے وسط میں ایک مرکزی مردہ حصہ ہوتا ہے۔ جس سے غانغرا نا چاروں طرف پھیل جاتا ہے۔ اگر ماذن حصہ کو غیر عفونی (یعنی پاک صاف) رکھا جائے۔ یا اگر پاؤں کی شرائین کی اندرونی دیوار میں قدرے التهاب موجود ہو۔ تو مردہ حصہ سکڑ کر خشک ہو جاتا ہے۔ خصوصاً جبکہ شکلی غذاؤں سے پرہیز کیا جائے۔ لیکن اگر اس قسم کی مقامی اور عمومی احتیاط نہیں برتی گئی تو نرم حصوں میں کوئچ پیمانہ پر پھیلا ہوا نتیجہ

مستہ پریفل نیورائیٹس۔
مستہ سپرے شن۔

مستہ ڈیابیطس ملگ گلوین۔
مستہ اسکیروسنگ انفلامیشن۔

ریم بننا) نمودار ہوگا۔ اور محدود غانغرائنا بھی تسم دم اور قوا پیدا کر کے مریض کی ہلاکت کا باعث ہو جائے گا۔

اکثر یوں بھی دیکھا گیا ہے کہ جلد پر تو مرض کا اثر چنداں نمایاں نہیں ہوتا۔ مگر زیر جلد ساخت میں غانغرائنا کے متعدد مراکز پیدا ہو کر پھیلتے چلے جاتے ہیں۔

علامہ۔ جب زیادہ شدید غانغرائنا نہ ہو۔ بلکہ رپاؤں کی (صرف ایک یا چند انگلیاں ماؤٹ ہوں۔ تو عضو کو غیر عفونی رپاک) اور گرم رکھنا کافی علاج ہے تاکہ وہ خود بخود طبعی قوت سے قطع ہو کر خارج ہو جائے۔ یا جراح آخری حالت میں لچکریوں کے جوڑ کی ہڈیوں کو نشتر سے علیحدہ کر دے۔

بول سگری کے لئے مناسب علاج (مثلاً اینوں کے جوہر خاص کو ڈمین کا استعمال) اور مناسب غذا کی ضرورت ہے۔

جب غانغرائنا زیادہ شدید اور پھیلا ہوا ہو تو علاج کی نوعیت کا انحصار بیشتر عروق کے مرض کی وسعت۔ اور التهاب کے موجودہ درجہ پر ہوتا ہے۔ اگر عروق خاطر صحت ہوں تو غانغرائنا کی حد سے زیادہ اوپر عضو کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ حد کے قرب ہی سے عمل بتر کیا جاسکتا ہے۔ اگر بڑی شریان تندرست نہیں ہے تو عمل بتر حد غانغرائنا سے بہت اوپر کرنا چاہئے۔ بشرطیکہ مریض کے بدن کی عمومی حالت اس کی تحمل ہو۔ اگرچہ ایسی حالت میں ذیابیطسی سببات کے پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ جب تقرح دور تک پھیلا ہوا ہو تو بعض اوقات مصلحت یہ ہوتی ہے کہ ماؤٹ حصہ کو (نشتر سے) کچھ عرصہ تک کے لئے کھول دیا جائے۔ تاکہ التهابی ترشحات و مواد وغیرہ خارج ہو جائیں۔ اس کے بعد قطع عضو کے متعلق فیصلہ کرنے میں

۳ سببات ذیابیطسی۔
ذایا بے ملک کوما۔

۴ ملٹا کیسی میا۔
۵ ملٹ کوما

آسانی ہوتی ہے + داروسے پیوستی ردو آئندہ خدر کے انتخاب کرنے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے + جب زیریں اطراف رپاؤں پر عمل کرنا ہو تو تختہ برغاسی کے بعد عمل بتر کیا جاسکتا ہے +

(۱) تختہ برغاسی: جب نفل خضر جیسے مضغعات قلب کا استعمال مریض کے ضعف قلب و شش کی وجہ سے باز نہیں ہوتا۔ تو اس وقت اکثر اسٹوڈین نامی خدر دوا کو نخاع کے اندر پکاری کے ذریعہ پہونچا دیتے ہیں۔ اس سے مراکز اعصاب متاثر ہوتے ہیں۔ اور مرکز سے نیچے کے تمام اعصاب بے حس ہو جاتے ہیں۔ اور جراحی کا عمل ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے خصوصاً شکم کے نیچے کے دھڑک اور ٹانگوں وغیرہ کے جراحی اعمال کیے جاتے ہیں +

(۲) دھڑکے بالائی حصے کے لئے تختہ رنخائی ایک خطرناک عمل ہے کیونکہ اس سے نخاع کے بالائی مراکز تنفس وغیرہ کے عین ہونے اور موت واقع ہونے کا خطرہ ہے + مترجم

غائغرانا ذاتیہ متناسبہ

یہ مرض عموماً آن جوان مستورات میں رہا سے ۳۰ سال کی عمر میں پایا جاتا ہے جو فطرتاً کی خون یا ضعف اعصاب رکھتی ہوں۔ یہ حقیقت میں محرک عروق کے تشنج کا نتیجہ ہوتا ہے جو حرام مغز کی کسی نامعلوم گہری آفت سے یا بعض اوقات

مت غائغرانا ذاتیہ متناسبہ -

ریناؤس ڈریڈ (دیا)
اسپان نے فی اس سی ڈیجیل کنڈرین -
محرک عروق - ولیو موٹ -

مت غائغرانا ذاتیہ متناسبہ -

مت تختہ رنخائی - اسپائل انالگیشیا -

مت نفل خضر کھور و فارم -

مخفی اعصاب کے التهاب سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اس مرض کے تین درجات قائم کیے گئے ہیں +

(۱) مقامی ضعف یا کمی خون جو شریانی تشنج کے باعث پیدا ہو جائے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ ماؤت حصہ زرد اور پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اور اس میں درد محسوس ہونے لگتا ہے۔
(۲) مقامی اختناق یا کثرت خون جس سے ماؤت ساختیں وریڈی خون کی بازگشت کے باعث او سے رنگ کی ہو جاتی ہیں +

(۳) ماؤت حصہ کامرودہ ہو جاتا۔ جس سے وہ خشک اور سیاہ ہو جاتا ہے۔
اس مرض کا آغاز عموماً یکایک ہو جاتا ہے۔ اور مرض کی مدت چند دنوں سے لیکر چند ماہ تک ہوتی ہے۔ اکثر ماؤت حصہ بالکل مژدہ ہو جاتا ہے (مگر ایسا مہینوں میں جا کر ہوتا ہے) لیکن ہر مریض میں عضو مردہ نہیں ہوتا۔ یہ مرض عموماً جسم کے دونوں طرف برابر ہوتا ہے (یہی وجہ ہے کہ اسکو متناصبہ کہا جاتا ہے) اور اکثر پاؤں کی انگلیوں میں عارض ہوتا ہے۔ گاہے سطحی وجوں کی شکل میں جسم کے دوسرے حصوں میں نمودار ہو جاتا ہے۔ بخار اس میں نہیں ہوتا۔ مگر اکثر درد اس میں بہت شدید ہوتا ہے۔ بعض اوقات مریض کے پیشاب میں خون کے دانے نوبت کے طور پر پائے جاتے ہیں (بلکہ احمد موسیٰ) جس کی وجہ یہ خیال کی جاتی ہے کہ گردہ کے مروج میں تشنج کے دوسرے ہوتے ہیں۔ گاہے انتہائی اعصاب کے التهاب کے باعث انگلیوں کے پورے چھوٹے چھوٹے جوڑ چمٹ جاتے ہیں (الاستقان مفاصل) مقامی وجہ پائے جاتے ہیں۔ جن میں بے حسی ہوتی ہے (بفتح حذرت) جس کے ساتھ

۱۔ بل احمد موسیٰ۔ ہیرنگھومنی نیوریا۔

۲۔ الاستقان مفاصل۔ انگلیاں ریس۔

۳۔ بفتح حذرت۔ پیچہ آف انس تیسیا۔

۴۔ التهاب اعصاب محلی۔ ہیرنگھومنی نیوریا۔

۵۔ ضعف۔ ہیرنگھومنی۔

۶۔ اختناق اسفکسیا۔

۷۔ متناصبہ۔ سی ٹریکل۔

عصبی درد شریک ہوتا ہے۔ یہ حالت پاٹا مر نے (تقیق شام) سے مشابہ ہوتی ہے لیکن چند علامات سے امتیاز ممکن ہے۔ مثلاً اس مرض میں بہ نسبت پاٹے کے عضنی رنگت زیادہ سیاہی مائل ہوتی ہے۔ درد زیادہ ہوتا ہے۔ غارش نہیں ہوتی۔ اور فٹ اعضا کے انتہائی اور کٹھے ہونے حصوں تک محدود نہیں ہوتی +

حل ارج۔ ابتدائی درجات میں غانغرائہ کے روکنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ مرگت فلاوڈ کرنین۔ اور دیگر مناسب مقویات کا استعمال کرنا چاہئے۔ ماہواری ایام کی مقدار کی اصلاح کرنی چاہئے۔ محرک ادویہ کی مالش۔ گرم پانی کا سبب مناسب ہے سردی اور ضربہ جراثیم سے حفاظت رکھنی چاہئے۔ بجلی لگانے سے بہترین فراہم حاصل ہوتے ہیں۔ گاہے بجلی کی مسلسل رد (تیار شمر) پہنچانی جاتی ہے۔ اور گاہے برقی حمام (حمام کهربائی) کی صورت میں مقامی طور پر یا سلسلے جسم میں استعمال کی جاتی ہے اور روزانہ ایک بار یا چند بار کیا جاتا ہے۔ اور جب آہلی غانغرائہ ظاہر ہو جائے۔ تو مرد حصہ کو نہ دینا (چھوت) سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ مردہ حصہ یا تو خود بخود جذب و تحلیل ہو جائے گا۔ یا خود قطع ہو کر جدا ہو جائے گا +

(۹) غانغرائہ انیشیلیہ

یہ نہایت نادر و کمیاب ہے۔ لیکن جب خراب شیلر رونی میں مغلوط ہو جاتی ہے تو یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ اس قدر کے غانغرائہ کی حالت مختلف ہے۔ گاہے اس سے محض ایک دو انگلی ضلع ہو جاتی ہے۔ اور گاہے پورا لہ یا پاؤں ضلع ہو جاتا ہے۔

عصبی درد۔ نیوریلجک پین۔	مست تیار شمر کا مش ٹیسٹ کرنا۔
مست تقیق۔ چل لین۔	مست برقی حمام۔ الکٹرک باقہ۔
مست سکوب۔ ڈوش۔	مست غانغرائہ شیلیہ۔ ٹنگرین فراہم کرنا۔

یا اس سے بھی زیادہ ترقی کر جاتا ہے +

غانغرائنا عارضیہ یا جرحیہ

(ضرب یا چوٹ کا غانغرائنا)

تعریف۔ اس سے مراد وہ غانغرائنا یا فسادان زندگی و حیات ہے جو کسی ایسی ضرب و زخم کے اثر سے عارض ہوا ہو جو خون کی بڑی رگوں کو مافوف کر دے (غانغرائنا غیر واصلہ) یا وہ ضرب براہ راست عضومافوف کی ساخت کو مافوف کر دے (غانغرائنا واصلہ) +

(الف) غانغرائنا جرحیہ غیر واصلہ

یہ مختلف اقسام کے صدمہ و آفت کے باعث لاحق ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے اقسام و علامات بھی مختلف ہیں +

(۱) بڑی شریان کا باندھنا تندرست عضومیں غانغرائنا نہیں پیدا کرتا۔ لیکن اگر اس عضومیں دیرینہ و متواتر تغذیہ ہے۔ یا کسی شریانی مرض کے باعث کمی خون ہے۔ تو اس سے کچھ حصہ مرده ہو سکتا ہے۔ اس حالت میں علامات و عوارض وہی ہونگے جو غانغرائنا سدیہ میں نمودار ہوتے ہیں + اس قسم کا غانغرائنا اکثر خشک قسم کا ہوتا ہے۔ اور باؤں کی ایک دو انگلی تک محدود رہتا ہے۔ یا مافوف عضو کے ایک محدود سطحی ٹکڑے پر عارض ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ عضو کے نرم حصوں (رحی حصوں) تک جا پہنچے۔ تو اکثر مرطوب قسم کا ہو جاتا ہے +

مثلاً غانغرائنا جرحیہ غیر واصلہ۔

ان ڈائریکٹ ٹراؤسے لمک گنگرین۔

۵۔ ونا و تغذیہ۔ بال نیوٹریشن۔

مثلاً غانغرائنا جرحیہ۔ ٹراؤسے لمک گنگرین۔

مثلاً غانغرائنا غیر واصلہ۔ ان ڈائریکٹ گنگرین۔

مثلاً غانغرائنا واصلہ۔ ڈائریکٹ گنگرین۔

علاج۔ جن حالات میں یہ ڈھ ہو کہ دور کے اعضا کی قوت تغذیہ اور قوت حیلہ معرض خطر میں ہے۔ تو قبل اس کے کہ رگیں پورے طور پر بند ہو جائیں دوران خون میں بتدریج کمی پیدا کرنے کی ایک سعی کرنی چاہئے۔ تاکہ دوسرے رگستوں سے دوران خون جاری ہو سکے۔ اور اس کے لئے وقت دینا چاہئے کہ دوران اعصابی واقع ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ شریان کو کاٹ دیا جائے۔ مگر اس سے پہلے دوران خون کو جاری رکھنے کے لئے یہ کیا جائے کہ اسکو چاندی کی باریک تلی سے رگیں کی اندرونی سطح پر افین کا پوسٹے طور پر استرموم باندھ دیا جائے۔ اور پانچ چھ روز کے بعد اس تلی کو منقطع کر کے شریان کو باندھ دیا جائے۔

اگر اصلی غانغرا ناخاہر ہو گیا ہو تو ماؤٹ حصہ کو گرم اور پاک صاف (سینٹائزڈ) رکھنا چاہئے۔ جب حد ناقابل قائم ہو جائے۔ تو طبی عمل انقطاع کو مدد دینے کے لئے عضلات کی نسوں اور ہڈیوں کو جدا کرنے میں دستکاری سے امداد لی جائے۔ لیکن اگر بہت بڑا رقبہ مردہ ہو گیا ہو۔ یا اگر مردہ حصہ مرطوب و متعفن ہو گیا ہو تو بہت اونچی سطح پر بہت جلد عمل بنریا جائے۔ یعنی عضو کو کاٹ کر منقطع کر لیا جائے۔

(۲) جراحات یا عارضوں سے متاثر شریانی۔ یعنی خون کا شریان کے اندر منجمد ہو جانا۔ یہ صرف مخصوص حالات میں غانغرا نامہ پیدا کر دیتا ہے۔

اس کے علاوہ علاج غانغرا نامہ سد سے مشابہ ہیں۔

(۳) بڑی شریان اور ورید میں انسداد کا واقع ہونا۔ اگر یہ یکایک ہو جائے تو غانغرا نامہ حادث لازمی ہوتا ہے۔ مگر بعض ایسی یعنی مثالیں بھی موجود ہیں جن میں نسل کے سرطان یا انورسٹما کے خارج کرتے وقت بڑی شریان اور ورید کو باندھ دیا گیا ہے

مت انسداد۔ آبسٹکشن۔

مت سرطان کیمنسٹر

مت انورسٹما۔ انورسٹم۔

مت ناقابل۔ لائن آف سپیریشن۔

مت متاثر شریانی۔ آرٹیریائی تمرا بکس

مت دوران اعصابی۔ کریٹیکل سرکولیشن۔

یا ان کے ٹکڑے کا ٹکڑا نکال لیے گئے ہیں۔ مگر غانغزانا نہیں پیدا ہوا۔ مگر خیال یہ ہے کہ ان ہر دو حالات میں دستکاری سے پہلے دوران خون میں رکاوٹ ضرور موجود ہوگی اور اس کی وجہ سے قدرتی دورانِ اضافی دوسری متضلعہ شاخوں کے ذریعہ ضرور قائم ہو گیا ہوگا۔ جیسا کہ عام قدرتی قاعدہ ہے کہ جب کوئی بڑی شریان بند ہو جاتی ہے۔ تو دوسری جانبی شاخیں کشادہ ہو جاتی ہیں۔ اور اس عضو میں دوران خون قائم ہو جاتا ہے +


لیکن تندرست اطراف کی شریان و ورید کا ایک تخت بند ہو جانا جیسا کہ بندش سے ہو سکتا ہے (ساخت میں یقیناً غانغزانا پیدا کر دیتا ہے + اسی طرح گاہے اعضاء میں غانغزانا اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بدن کے اندر کسی وجہ سے گھٹ جاتا یا بچ جاتا جو راہِ امتیاق اعضاء) جیسا کہ فتقِ امتیاق میں ہوتا ہے۔ یا بدن کے باہر کوئی عضو دیکر بچ جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر عضو مخصوص کی جڑ میں کسر بند لگا دیا جائے۔ یا کسی ٹوٹے ہوئے عضو کو زیادہ زور سے باندھ دیا جائے + بلکہ گاہے اس طرح بھی غانغزانا ہو جاتا ہے کہ عضو کو پٹی سے معمولی طور پر باندھ دیا گیا۔ اور اس کے بعد وہ پھول کر تنگ ہو گیا حالانکہ پہلے سے پٹی زیادہ کسی ہوتی نہ تھی +

علیٰ ہذا غانغزانا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی شریان پھٹ جائے۔ اور اس کا خون خارج ہو کر ساتھ کی ورید و وریدِ مرافق (پر دباؤ ڈالے۔ جیسا کہ اکثر کسٹرو خلع کے وقت ہوا کرتا ہے۔ یہ غانغزانا ہمیشہ مرطوب قسم کا ہوتا ہے + علاج - ان حالات کا علاج نہایت مختلف ہے +

۱۔ دورانِ اضافی۔ کریٹل سرکولیشن۔	۲۔ کسٹرو۔ فریکچر۔
۳۔ امتیاق۔ اسٹریٹنگ و شن۔	۴۔ خلع۔ ڈسٹیکشن۔
۵۔ فتقِ امتیاق۔ اسٹریٹنگ و اینڈ ہرنیا۔	

اگر عضو نہایت مجروح اور ناقابل اصلاح ہے۔ تو فوراً عمل بتر کے ذریعہ اسے قطع کر دینا چاہئے۔ تاکہ عدویٰ و عفونت کا خطرہ نہ ہے +

جب کسر و قطع کے وقت عروق و موریہ کو نقصان و آفت پہنچتی ہے تو بعض اوقات عضو کو بچانے کے لئے یہ دستور العمل اختیار کیا جاتا ہے کہ نشتر سے عروق بچا کر مقام آفت کو کاٹ کر اور اس کے اندر سے منجھ خون کے دو قطرہ مل (جلطہ) کو دھو کر خارج کر دیا جاتا ہے۔ اور مجروح عروق کو پکڑ کر (بند یا گره لگا کر) ان کے جریان خون کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹوٹی ہوئی ہڈی یا دو کھڑے ہونے جوڑ کا مناسب علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ مناسب ہے کہ عضو نہ کر کو کسی قدر بلند رکھا جائے۔ اور ٹوٹی ہوئی ہڈی کے آخری حصہ کو گرم اور پاک صاف رکھا جائے یا اینہم اگر غانغرا نا نو دار ہو جائے۔ تو عضو کو علیحدہ کرنے کے لئے عمل بتر ضروری ہوگا۔ عمل بتر کے لئے مناسب مقام کا انتخاب مقامی مسامہ و جراحت کی نوعیت پر منحصر ہے۔ یعنی اگر مقامی جراحت زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ مثلاً اگر ہڈی صفائی کے ساتھ ٹوٹی ہے۔ یا سادہ طور پر جوڑ اکھڑ گیا ہے۔ تو مد فائل کے نو دار ہونے کا انتظار کریں۔ لیکن اگر ہڈی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی ہے و کسر شفقت یا اور کسی قسم کی مقامی خطرناک حالت ہے۔ تو مقام ضرب سے اوپر بتر کرنا چاہئے +



دب (ب) غانغرا نا جرحیہ و اصلہ

تعریف :- اس سے مراد وہ غانغرا نا ہے جو ضرب زخم کے فوری اثر سے کسی عضو میں ہو جائے۔ اس کا دار و مدار آفت کی نوعیت پر منحصر ہے۔ اس لیے اس کی مختلف قسمیں ہیں +

۱۔ غانغرا نا جرحیہ اصلہ۔ ڈانکٹ ٹرائے ایک ہنگرین

۲۔ جلطہ کلاٹ

(۱) شدید مرض (کچلنا) اور شدید ضرب صدمہ۔ یہ نہایت عام سبب ہے مثلاً کوئی عضو کل کے پیسوں میں اوجھ جائے۔ یا کوئی وزنی چیز اُس پر گر جائے۔ یا کوئی گاڑی چھڑا اُس کے اوپر سے گزر جائے۔ اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے نہ صرف عضو کے اجزاء دب جاتے۔ کچل جاتے۔ اور چور چور ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ خون کی عروق بھی پھٹ کر مجروح ہو جاتی ہیں۔ اور خارج شدہ خون غانغرا کی پیدائش میں معاون ہوتا ہے + یہ غانغرا نامرطوب مٹم کا ہوتا ہے۔ اور زیادہ وضعیف القوی اشخاص میں لاحق ہوتا ہے۔ مثلاً یاؤں کا کچل جانا ایک معمر شخص میں غالباً غانغرا پیدا کر دے گا۔ مگر ایک تندرست وجوان شخص میں اس کا روکنا ممکنات سے ہے عدا جہ۔ اگر عضو ناقابل اصلاح طور پر مجروح ہو گیا ہو۔ تو عضو کے کاٹنے میں (عمل بتر میں) دیر کرنا مناسب نہیں۔ ورنہ عدوی و عفونت کا خطرہ ہے لیکن اگر عضو کے بچنے کا احتمال غالب ہو تو مجروح حصہ کو بہ احتیاط تمام مائع عفونت اورو سے خوب پاک صاف کیا جائے + اس پر بھی اگر غانغرا پیدا ہو جائے۔ تو اب عضو کو کاٹ کر الگ کر لیا جائے۔ اور کسی چیز کا انتظار نہ کیا جائے +

(۲) ضغط مستمر (دیر پا دھاؤ) بھی غانغرا پیدا کر سکتا ہے۔ چنانچہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کی غرض سے جو تختی (جسیرہ) عضو مضروب پر باندھی جاتی ہے۔ تو اکثر اُس کے دباؤ سے غانغرا پیدا ہو جاتا ہے۔ خواہ اس دباؤ کی ضرورت ہو۔ یا غلطی اور بے احتیاطی سے غیر معمولی دباؤ پہنچایا گیا ہو جب ہڈی کے ٹکڑے ٹوٹ کر اپنی طبعی وضع سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو انکو اپنی وضع پر لانے اور اصلی جگہ پر قائم رکھنے کے لئے سخت دباؤ دیکر باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ جس کے بعد ہر ممکن احتیاط کے باوجود بھی غانغرا پیدا ہو سکتا ہے + ایسی حالت میں مرلیض چند روز تک عصبی درد کی شکایت کرتا رہتا ہے۔ مگر یہ درد بھی کچھ ایسا شدید نہیں ہوتا کہ اس پر خاص توجہ

کی ضرورت پیش آئے۔ مگر کچھ عرصہ کے بعد جب سختی کم ہو کر عضو کو دیکھا جاتا ہے تو جلد کا مرؤہ حصہ سفید، زرد و پھیکے رنگ کا، اور بے حس معلوم ہوتا ہے۔ اس مرؤہ حصہ کو پاک صاف اور غیر عفونی رکھنے کے لئے نہایت سخت احتیاط برتنی لازم ہے تاکہ مقامی تکلیف اور عام نظام جسم کی خرابی مثلاً بخار وغیرہ نہ بڑھنے پائے۔

قروح الفراش یعنی زخم بستر جبکہ تقریح قطعہ اور ناقبہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش کا احتمال اُس وقت ہوتا ہے جبکہ مریض عرصہ دراز تک بستر پر پڑا رہتا ہے یا کسی ایک کروٹ یا ایک وضع پر لیٹا رہتا ہے۔ ہن اور پشت کے جن حصوں پر دباؤ زیادہ پڑتا ہے وہ بوجہ استلزام و موسی (اجتماع خون) کے سرخ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد زخم یا حقیقی خانغراٹا ہو جاتا ہے۔ قروح الفراش عموماً زیادہ گہرے۔ بڑے اور پھیلے ہوئے نہیں ہوتے۔ لیکن اگر مریض بہت ضعیف ہے۔ یا وہ مفلوج یا مریض استرخا ہے تو قروح زیادہ سے میں بہ سرعت پھیل کر جلد کے نیچے کے نفاثات (نفاثات ظاہرہ) کو صانع کر دیتے۔ اور عضلات کے غلاف کو کھول دیتے بلکہ ہڈی تک کو مرؤہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کی شدت فنا کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ گاہے اس سے خانغراٹا پیدا ہو کر مجرئی نچاچی تک کھل جاتا اور غشیہ دلخ کے التهاب عفونی سے مریض جان بحق تسلیم ہو جاتا ہے۔ ایسے قروح سے بچنے کے لئے بیمار دار کی ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ تاکہ وہ خیال رکھے کہ مریض کا بستر نرم ہو۔ چاروں طرف سے سلوٹس اور پٹیشنز نہ لڑیں۔ بستر اور کپڑوں میں مریض کے بول و برازی گندگی نہ لگنے پائے۔ اگر سپینہ بکثرت آیا ہو تو چادر بدل دی جائے۔ پشت اور کھلم کی جلد کو کسی غیر شہج صابون سے روزانہ دھویا جائے۔ اور پھر اس پر کوئی مسکن معوی اور مضبوط (سختی پیدا کرنے والی) دوا

۱۔ مجرئی نچاچی۔ اسپانل کینال۔

۲۔ قروح الفراش۔ بڑسورز۔

۳۔ نفاثات۔ فیثیا۔

۴۔ غیر شہج۔ آن اور سے ٹینٹ۔

۵۔ غلاف عضلات۔ مسکو رشیتہ۔

ریشلاندورج شراب یا کٹیاک اور سفیدی بھینہ کا مرکب (لگائی جائے) پھر اس پر
سندرجہ فیل اودیہ کا سفوف (زورور) چپکایا جائے تاکہ وہ سخت اور خشک
ہو جائے +

نسخہ ذرہ در حبث حصن آمیزہ حامض بورتی نشانہ سب کو ہون
لیکھ اور خوب باریک پس کر باہم ملائیں۔ اور بطور زورور کے استعمال میں لائیں +
اگر جلد سرخ ہو جائے تو اس پر صیغ کات ہندی۔ اور سائل رصاص خل آگین
ادنی کو ہون ملا کر اس کی پھیری لگائی جائے جس کے اثر سے جلد پر ایک شفاف
اور نازک تھلی سی بن جاتی ہے۔ اور زخم کو محفوظ رکھتی ہے) اور پھر ایک گول ٹیکہ جس کے
اندرونی بھرا ہوا ہو۔ اور پنج میں سوراخ ہو۔ لگا کر اسے دباؤ سے محفوظ کر دیا جائے
ضعیف معریاروں میں۔ یا جنگو فاج ہو گیا ہو پانی سے بھرے ہوئے بستر دھاتائی
پر رکھا جائے۔ جو کافی پھولا ہوا ہو۔ لیکن بہت زیادہ بھرا ہوا اور پھولا ہوا نہ ہو +
اگر اس قسم کے بستر میں پانی بہت کم ہو گا۔ تو جسم کا وزن پانی کو ہٹائے گا۔ اور
اسکا کچھ فائدہ حاصل ہو گا۔ اور اگر پانی ضرورت سے زیادہ ہو گا۔ تو بستر بہت سخت
اور غیر مفید ہو جائے گا +

اگر ایک کٹھا ہوا زخم پیدا ہو جائے تو اس کے ابتدائی اور شدید درجہ میں گرم
پانی کی سینک مفید ہوگی۔ اور آخری درجہ میں زخم پر مرہم حامض بورتی مخفف

۱۔ سائل رصاص خل آگین ادنی۔

۲۔ لاکر پیانی سب ایسی ٹیٹس۔

۳۔ ہادواتی۔ داڑی۔

۴۔ مرہم حامض بورتی مخفف۔

۵۔ ڈائی لیوڈ بورک ایڈ آکسٹنٹ

۱۔ روح شراب۔ اسپرٹ آف واش

۲۔ کٹیاک برانڈی۔

۳۔ آکسٹنٹ آف زنک

۴۔ بورک ایڈ

۵۔ استارچ

۶۔ صیغ کات ہندی۔ ٹیکر آف کٹے چو۔

لگایا جائے۔ یا اگر زخم بہت سست رہتا رہے مندرجہ ذیل ہو رہا ہو تو اس پر مرہم
حامض بورق اور مرہم ساج مرہم مال (مہوزن ملا کر لگائیں۔ ایسی حالت میں لگائے
جسٹ باؤی مرکب ایک حصہ روغن بید انجیر سات حصہ ملا کر لگائے سے بہت فائدہ
ہوتا ہے۔

۳) مواد کی میاویہ جو کاوشی بجلانے والے (یا اکال رکھنے والے)
ہوں۔ مقامی جراثیم پیدا کر کے مانفرا کا باعث ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ورنہ مانفرا
مقدار دو اور اس کی مدت تاثیر پر منحصر ہوگا۔
علاج۔ ماؤن حصہ بہت زیادہ پاک صاف رکھا جائے۔ اور مردہ حصہ کو قدرتی
طور پر جذب یا جدا ہونے کا موقعہ دیا جائے۔

۳) مانفرا نا نو عیمہ ریہ اعفونیہ

مانفرا نا حادہ ساعیمہ ریہ مانفرا نا ریکیہ حادہ ریہ مانفرا نا جریہ ساعیمہ۔
یہ مرض جراثیمات میں شہیر ترین اور بایتہ جلد ہاک کرنے والا ہے۔

اسباب۔ ۱) یہ مرض عموماً سیسہ اشخاص میں واقع ہوتا ہے جو پہلے ہی سے
بوجہ کثرت شراب خواری۔ معشرت بد۔ بڑی زندگی یا فساد تغذیہ کے ضعیف و

۱) مانفرا نا حادہ ساعیمہ۔ ایکوٹ سپر ٹینگ
گنگرین۔

۲) مانفرا نا ریکیہ حادہ۔ ایکوٹ
امفی سی میٹل گنگرین۔

۳) مانفرا نا جریہ ساعیمہ سپر ٹینگ
ٹراؤس ملک گنگرین۔

۱) سینہ حادی مرکب۔ فزائی ارس باسم
مے کاوشی۔ کاسٹک۔

۲) اکال۔ کاروبوز۔

۳) مانفرا نا نو عیمہ ریہ اعفونیہ۔

اپسے ٹک (یا) انفکونگ گنگرین۔

مستعد ہوتے ہیں۔ لیکن باطل صحیح اشخاص میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ جراثیمی سمیت شدید اور تیز ہو۔ کبھی کبھی فی باہٹیس کے مریضوں میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح خود اس مرض کے دوران میں اکثر بول سگری شکل کا پیشاب (عارض ہو جاتا ہے +

(۲) عام طور پر وہ آفت جو اسکا سبب ہوتی ہے۔ ہنایت سخت اور شدید درجہ

کی ہوتی ہے۔ مثلاً کسر مرکب یا خلع مرکب (خصوصاً جبکہ نرم اجڑا شدت کے ساتھ

کچل گئے ہوں۔ یا ہنایت گندہ زلوٹ) ہو گئے ہوں۔ اگر اس قسم کے کچلے ہوئے

اور گندہ اجزاء کی صفائی و تطہیر نامکمل رہ جائے۔ یا ٹانگے برابر لگا کر انکو بالکل بند

کرنے کی کوشش کی جائے۔ جس سے اخراج مواد کا راستہ نہ ہے۔ یا مجروح حصہ

کو خواہ مخواہ جوڑ کر اس کے پکانے کی سعی لا حاصل کی جائے۔ تو یہ سب امور عافیت

کے فوری سبب ہو جاتے ہیں۔ مگر شاذ و نادر ایسا بھی ہوتا ہے کہ خفیف زخم مثلاً رگڑ

خراش۔ کسی چیز کا چبھ جانا (ہنایت زہریلے اور شدید جراثیم سے آلودہ ہو کر اس مرض

کو پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ عموماً یہ صورت لاشوں کے اٹھانے والوں۔ تیار داروں

اور علم الامراض کے معلمین (جو علی طور پر امراض کی تعلیم دیتے ہیں) میں واقع

ہوتی ہے +

(۳) اس مرض میں جو جراثیم عموماً پائے جاتے ہیں وہ عصا اور ذیباویہ خمیشہ

ہیں۔ جو بائوٹور کے حوزوئیات عفنے سے مشابہ ہوتے ہیں۔ یہ جراثیم شکل عصا اور ذیباویہ

جرم خمیشہ کے عصا سے مشابہ اور ابتداً غیر جرم معنی ہوتے ہیں (یعنی طریقہ جرم سے

متلون نہیں ہوتے ہیں) لیکن بے بے ڈوروں کی شکل میں بڑھنے کے لیے بہت زیادہ

عصا اور ذیباویہ خمیشہ۔ میس میس میس
سے گٹائی۔

عصا بائوٹور۔ پا پکڑ۔

عصا حوزوئیات عفنے۔ ویرین سپٹیک۔

عصا بول سگری۔ گٹائی کو سوریہ۔

عصا کسر مرکب۔ کپڑہ ڈفر کچر

عصا خلع مرکب۔ کپڑہ ڈسلو کشن۔

میلان رکھتے ہیں۔ تیزی سے حرکت کرتے ہیں۔ ان کے ہذر بیضوی شکل کے عصا کے وسط میں یا کسی ایک طرف کنارہ میں پائے جاتے ہیں۔ یہ غیر ہوائی حالات میں افزائش پاتے ہیں۔ اور کاشت کی زمین میں انگوری شکر رسکرنسٹ کی آمیزش کی جاسے۔ تو خمیر پیدا ہو کر بدبودار بخارات وریاح بکثرت پیدا ہو جاتے ہیں۔ انکی نتیجے سے چھوٹے چھوٹے چوہے اور مصری خرگوش جو میں گھسنے کے اندر جاتے ہیں ان میں نتیجے کے بعد مقامی طور پر پھیلنے والا اودیہارا اودیہا موضعہ ساعیہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بیج داخل کی غلائین فاسد رطوبات وریاح سے پھول جاتی ہیں جن میں عصا پائے جاتے ہیں۔ ان مردہ حیوانات کے خون۔ یا ان کے وہ مواد جو احشاء کی غشیہ مائے سے خارج ہوتے ہوں (جو اس مرض کا شکار ہوئے ہیں۔ یا جو عصا اودیہا موضعہ خبیثہ کی نتیجے کے بعد ہلاک ہوئے ہیں) عصا اودیہا موضعہ مذکورہ سے لبریز پائے جاتے ہیں یہی جراثیم بڑے بڑے عصا کی بیج خلوی میں ہی پائے جاتے ہیں۔ اور مرنے کے بعد کچے ویر تک رہتے ہیں * مذکورہ

گا ہے عصا ٹیکسیج مغلف سے بھی غانغرا ساعیہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر اس میں اور عصا اودیہا موضعہ میں چند متاخر فرق ہیں۔ مثلاً عصا یا جیہ مغلفہ غیر ہوائی ہوتا ہے اگرچہ انگورشی شکر میں اس سے تخمیر پیدا ہو سکتی ہیں۔ نیز یہ غیر متحرک اور عموماً بذر سے خالی ہوتا ہے۔ نیز یہ جراثیم مثبت ہوتا اور اس کے گرد ایک باریک غلاف محیط ہوتا ہے۔ اس عصا کے غانغرا میں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بخارات وریاح بکثرت

۱۔ عصا مؤلفہ ٹیکسیج مغلف۔

۲۔ بیس ایرو بیس کیپشولس۔

۳۔ غیر ہوائی۔ ان ایرو بیس۔

۴۔ انگوری شکر۔ گلوکوز۔

۵۔ جراثیم مثبت۔ گرام ہائیڈ۔

۱۔ سکرمنٹ۔ گلوکوز۔

۲۔ نتیجہ۔ انکریٹین۔

۳۔ مصری خرگوش گینی پگ۔

۴۔ اودیہا موضعہ ساعیہ

۵۔ مکمل اسپرڈنگ اودیہا۔

پانی جانی ہے۔ حتیٰ کہ امتحان بعد الموت کے وقت بھی جگر اور عروق میں بخارات ملتے ہیں۔ غانغرا ناریا حیحہ کے پچاس مریضوں میں جراثیم کا امتحان کیا گیا جس سے معلوم ہوا کہ صرف چودہ مریضوں میں خالص غیر ہوائی جراثیم کے باعث عدویٰ واقع ہوا تھا۔ جن میں عصا ناریا حیحہ مغلطہ بہ نسبت عصا اوزیادہ خبیثہ کے زیادہ مرضی میں پائے گئے۔

علامات۔ دو تین روز تک یہ مرض پوشیدہ ہی رہتا ہے۔ اس اثناء میں درد کی شدت کسی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ مگر اس کے علاوہ اور کوئی علامت پیدا ہونے والے مرض کی نمایاں نہیں ہوتی۔ بالابہمہ اندر ہی اندر زہر اثر کرتا رہتا ہے۔ اور اکثر پیپ وغیرہ بھی نمودار نہیں ہوتی۔ پیپ کا نہ ظاہر ہونا نہایت خطرناک علامت ہے۔ بعض مرضی میں مدتِ حضانہ اور بھی کم ہوتی ہے۔ اور کایک بلا کسی علامت انداز کے مرض شدید ہو جاتا ہے۔ اور نہایت شدید التهاب خلوی دورم غلغوفی پیدا ہو کر عام شتم الدم ظاہر ہو جاتا ہے۔ زخم کھولنے اور چیرنے پر نہایت گندہ نظر آتا ہے۔ اس کی سطح پر تا نکلات کے ٹکڑے دکھائی دیتے ہیں۔ اور رطوبت مانی یا مانی صیدیہ یعنی مائیت اور پیپ ملی ہوئی اپنے لگتی ہے۔ عضواؤں کی نیچ واصل کی سطحوں میں التهاب بہ سرعت پھیل جاتا ہے۔ اور دورم دورم کے باعث عضو پھول کر تن جاتا ہے۔ ایک مریض میں تو اس قسم کا غانغرا صرف بارہ گھنٹے میں پھیل گیا تھا۔ پہلے تو حصہ ماؤنڈیں شوخ سی سُرخی پیدا ہوتی ہے۔ پھر بہت جلد متغیر ہو کر گہرا ارغوانی ہوتا۔ اور غانغرا ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسکو دبانے سے ریا ح کی حرکت کی آواز (لفظ) سنائی دیتی ہے۔ انتفاخ بہ سرعت طولِ عرض میں پھیل

۱۔ نقطہ کری بی ٹیشن۔

۲۔ انتفاخ۔ امفانی سیمپا۔

۱۔ مدتِ حضانہ۔

۲۔ ہیرڈ آف انگیو بے شن

جاتا ہے۔ اور ابتدائے اور کوئی دوسری بڑی علامت نمودار نہیں ہوتی ہے لیکن اگر مریض زندہ رہا تو بعد میں عضو مردہ ہونے لگتا ہے۔

شدید تسم الدم کی علامتیں بھی مثلاً بخار، ہزیان وغیرہ جلد ظاہر ہوتی ہیں۔ مگر گاہے ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ حرارت مطلق نہیں بڑھتی۔ اور بدن معمول سے زیادہ سرد ہو جاتا اور مریض پر سبات کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ انجام مرض کے خطرات بہت شدید ہوتے ہیں۔ اور مریض عموماً دو تین دن کے اندر جان بحق تسلیم ہو جاتا ہے۔

علاج۔ رگڑ اور ضرب کے تاہم اور کچے ہونے سے ریزوں کو دھو کر عموماً ریل گاڑی وغیرہ کے حادثات میں ہوتے ہیں۔ ہرگز ٹانگے الگا کر ایک دم بند نہ کرنا چاہئے۔ اگر ایسے زخموں کو خوب ٹاؤٹا کھوں سے بند کر دیا گیا۔ تو زخم کی سطحات اور پیپ وغیرہ کے باہر بہنے کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اور چونکہ ایسے حادثات میں عموماً زمین اور گرد و غبار کی گندگی سے عدوی و فکوت کا ہونا اغلب اور ناگزیر ہے اس لئے زخم کے بند کرنے میں جراثیم اور ان کی سمیت اندھی بند ہو کر شدید تسم واقع ہو گا۔ خاک اور گرد و غبار کے اندر نہایت مہلک اور خطرناک قسم کے غیر ہونی جراثیم ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ اگر یہ زخم کے اندر بند ہو گئے۔ تو اندر ہی اندر انکے بڑھنے اور پھیلنے کا نہایت موزوں سامان مل جائے گا۔ اور یہ خوفناک نتائج بہت جلد پیدا کر دیں گے۔

ان خطرات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بھرپور حصہ کو نہایت فکر و احتیاط کے ساتھ بخوبی قائل جراثیم اور دیہ اور عنومات مطہرہ کے استعمال سے پاک و صاف کر لیا جائے۔ اور اس مقصد کے لیے ایسے عوامل زیادہ مفید ہوتے ہیں جو حصین کے ساتھ ملکر حموں آمیز مرکبات بناتے ہیں۔ اور جنکو عوامل مخربہ کہتے ہیں

۱۔ حصین۔ ۲۔ کسی جن ۳۔ حموں آمیز۔ ۴۔ کسی ۵۔ عوامل مخربہ۔ ۶۔ کسی ۷۔ ارننگ۔ ۸۔ خدش۔

مثلاً نامہ مخضین رہائین حمض آمیز اعلیٰ اور سٹافی ٹاس + مجروح حصوں کے جوڑنے میں ٹاس کے ڈھیلے اور ہلکے لگائے جائیں۔ اور مواد درطوبات کے خروج کے لیے کافی راستہ رکھا جائے۔ اس مقصد کے لئے گاسے ٹانگوں کے درمیان برکی نیلا رکھ دیا کرتے ہیں + لیکن با اینہمہ اگر التهاب کی علامتیں نمایاں ہوں تو زخم کو پورے طور پر فوراً کھول دیا جائے۔ اور مٹ حصوں کو آزادی کے ساتھ خوب چیر دیا جائے اور پھر عضو کو مطہر اور قاتل جراثیم گرم عنومات میں ڈبو کر رکھا جائے۔ مثلاً سائل کونڈی رجا ایک دافع عضو سیال ہے جس میں ریٹھیہ اور شکاریہ سفینس آگین اعلیٰ ہوتے ہیں (یا سٹافی ٹاس +

اگر ان تباہی کے بعد بھی مرض پھیلتا چلا جائے۔ تو مریض کی جان بچنے کی امید صرف عضو کے کاٹ دینے میں ہو سکتی ہے۔ عمل تبرع علیل حصہ سے بہت بلند کاٹ پر کیا جائے۔ یعنی غانغرا کی حد سے بہت اوپر عضو کو کاٹا جائے۔ مثلاً اگر پاؤں میں غانغرا ہے۔ تو پوری ٹانگ کو کچڑان کے پاس جدا کیا جائے۔ اور اگر ہاتھ میں مرض ہے۔ تو عضو کو کندھے کے جوڑے کے پاس سے جدا کیا جائے۔

رب غانغرانائے بیمارستان یا غانغرانائے مستشفی

یہ اکثر گزشتہ زمانہ میں جبکہ غیر عفونی عملیات کا علاج نہ تھا واقع ہوا کرتا تھا۔ اور

۱۔ رہائین حمض آمیز اعلیٰ	۲۔ رہائین سفینس آگین اعلیٰ
۳۔ اندر دھن پر آکسائیڈ	۴۔ سوڈیم پرمینگنیٹ
۵۔ سٹافی ٹاس ایک دافع عضو دوا ہے۔ جو تارپین سے تیار کی جاتی ہے +	۶۔ شکاریہ سفینس آگین اعلیٰ
۷۔ سائل کونڈی۔ کانڈریز فلور۔	۸۔ پٹاسیم پرمینگنیٹ
	۹۔ غانغرانائے بیمارستان
	۱۰۔ ہسپٹل گنارین

جدید جراحی کے اصول تکبیر کے زمانہ میں یہ تقریباً پید ہے + عموماً دورانِ اعمال جراحیہ میں جب کبھی کوئی زخم اتفاقاً جراح کو لگ جاتا تھا۔ تو اس کے چند روز بعد بہرِ عت پھیلنے والے جروح و قروح مقامِ زخم پر نمودار ہو جاتے تھے۔ اور اس کے بعد زیادہ پھیلکر خانقانا پیدا کر دیتے تھے + اس قسم کے اکثر زخم باعثِ ہلاکت ہوتے ہیں اور اب بھی ایسے ایسے حادثات گھسے واقع ہو جاتے ہیں جس کی مثالیں بل جاتی ہیں +

(ج) آکلۃ النغم۔ خانقانا مے و من

یہ منہ کا ایک عفونی البتاب ہے جو عموماً شہروں کے گندہ۔ تاریک اور گنجان مقامات کے رکوں میں حادث ہوتا ہے + ایسے بچے عموماً خراب صحت رکھتے۔ دبے اور کمزور ہوتے ہیں۔ اور اکثر حیمات طغنیہ اور خصوصاً حصبہ (خسرہ) کے بعد بحالتِ نقاہت اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں +

مرض کی ابتدا سکونایوں مرقی ہے کہ و من کی عشاء منی طلی چھل جاتی ہے۔ پھر اس میں کسی گندہ یا سرے ہوئے دانت کے باعث جراثیمی عدوی پہونچتا ہے جس سے اول البتاب اور اس کے بعد خانقانا ہو جاتا ہے۔ گال کی اندرونی سطح پر ایک گندہ۔ ہر بودار۔ بھورے رنگ کا پھیلا سا مکمل (مزدہ حصہ) بن جاتا ہے۔ جن سے نہایت تنفس اور بدبودار رطوبت خارج ہوتی ہے۔ اور یہ رطوبت منہ سے طلق تک فرو ہو کر نگل لی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے تنفس میں بھی گندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ بتدریج عفونت اور خانقانا گال کی سطح پر اور گہرائی میں پھیلتا جاتا ہے۔ رخسارہ پھول جاتا ہے۔ اور تنکر چکدار ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کیفیت گال کی

۱۰۰ حصہ۔ میزس۔

۱۰۰ آکلۃ النغم۔ کنکرم اؤ کرس۔

۱۰۰ مکمل۔ املف۔

۱۰۰ حیمات طغنیہ۔ اگزنتے میا۔

پوری دہانت میں سرایت کر جائے تو ایک سیارنگ کا مردہ حصہ (تاکل) بیرونی سطح پر بھی نمودار ہو جاتا ہے +

شدید مرض میں چہرہ کی متصلہ ہڈیاں بھی متاثر ہو کر سڑ جاتی ہیں۔ اور زبان۔ نالہ اور بزخ حلق پر بھی یہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے +

منظاہر عمومیہ۔ اس مرض میں یہ قسم دم کی علامتیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ صرٹ بھی نہیں ہے کہ فاسد مواد حلق سے فرو ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اس وجہ سے بھی کہ یہ زہر ہشی رطوبتیں عروق نافذہ کی راہ سے بھی جذب ہوتی رہتی ہیں۔ اور تنفس کی راہ سے بھی سونگھی جاتی۔ اور اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ جس سے ذات الریہ عفونیہ پیدا ہو جاتا ہے + علاوہ ازیں چہرہ اور منہ وغیرہ کی درمیں بھی قرب و انفصال کے باعث متاثر ہو کر اکثر آنت میں مہلتا ہو جاتی ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قیچہ الدم پیدا ہونے کا سخت خطرہ رہتا ہے۔ نیز گاہے عددی و عفونی سے قسم عفونی پیدا ہو جاتا ہے + ہاڑا اور بخار تو ابتداء مرض ہی سے ہوتے ہیں۔ مگر مرض کے آخری درجات میں اور ہلاکت سے قبل اضمحلال قوی (عشی) اور سہات طاری ہو جاتا۔ اور جہم کی حرارت درجہ اعتدال سے گر جاتی ہے -

جراثیمی کجیت۔ اس مرض کی جراثیمی کجیت قدرے مشتبہ ہے۔ لیکن غالباً اس مرض کا باعث جراثیم عفونیہ صدیدیہ ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ بعض دیگر جراثیم بھی مخلوط ہو جاتے ہیں۔ جو ہمیشہ مند میں موجود رہتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایک مخصوص قسم کے جراثیم اور بھی پاسے جاتے ہیں۔ جنکو حلقہ و نیلہ ذبحہ و سننٹ۔

۱۔ جراثیم عفونیہ صدیدیہ اسٹریپٹوکوکس
پایوسجنس۔

۲۔ عفونیہ ذبحہ و سننٹ۔ اسپائی رملٹ
و سنشس انجائنا۔

۳۔ بزخ حلق۔ قادمز

۴۔ ذات الریہ عفونیہ سپیکٹونیا۔

۵۔ قیچہ الدم۔ پانی سیا۔

۶۔ قسم عفونی سپیٹنیا۔

رخصتا مغزلیہ) کہتے ہیں +

علاج۔ اگر بچہ کی جان بچانی ہے تو علاج میں نہایت مستعدی اور بجاہت کی ضرورت ہے۔ مریض کو ہیکش کر کے تمام نرم اور سڑے گلے کو قطع کر دیں۔ یا کھرچ کر جدا کر دیں۔ حتیٰ کہ تندرست حصہ میں سے خون اچھی طرح نکلنے لگے + کھرچنے کے بعد منکشف حصہ پر تیز اور مٹھرتیزاب (مثلاً حامض قطرائی) یا حامض کبریتی (خوب مل دیا جائے۔ مگر اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ حلق وغیرہ کو تیزاب کے اثر سے بچنی محفوظ رکھا جائے) + اگر حامض قطرائی استعمال کیا گیا ہے تو غیر ضروری حصہ کو (جو دوسری جگہ لگ گیا ہے) روئح لگا کر مل کر کے بے ضرر کر دینا چاہئے + اور اگر تیزاب گندھا لگایا گیا ہے تو تندرست حصہ سے اس کی زیادتی اور شدت کو بے اثر کرنے کے لیے ریسیہ فم آگین کا سیال استعمال کرنا چاہئے +

اگر چہرہ کی ہڈیاں سڑ کر مڑو ہو گئی ہیں۔ تو ان کو اور سڑے ہونے والے دانت کو جو اکثر باعث مرض ہوا کرتا ہے ابھی نکال دینا چاہئے +

مندرجہ بالا عمل جراحی کے بعد دہن کو مٹھر عنولات سے بار بار دھوئے رہنا چاہئے۔ مثلاً آٹھ محضین (ایک حصہ دس حصہ پانی میں) سانی ٹاس (ایک حصہ دس حصے پانی میں) + شوق حلون آمیز (ایک حصہ حامض ٹیو رتی دس حصے حلون میں) اور ریسیہ منغنیس آگین ملی میں سے کسی کا استعمال کیا جائے +

۱۔ محضین۔ ہائیڈروجن پر آکسائیڈ۔

۲۔ بورق حلون آمیز۔ بورو گلیسرائیڈ۔

۳۔ حامض ہورقی۔ بورک ایسڈ۔

۴۔ حلون۔ گلیسرین۔

۵۔ ریسیہ منغنیس آگین (محض)۔

۶۔ ہرینگی نیٹ آف پوٹاس۔

۱۔ عصا مغزلیہ۔ فمیری فارم بی سی۔

۲۔ حامض قطرائی۔ کاربونک ایسڈ۔

۳۔ حامض کبریتی۔ سلفیورک ایسڈ۔

۴۔ روح اسپرٹ۔

۵۔ ریسیہ فم آگین۔ سوڈیم کاربونیٹ۔

۶۔ مٹھر عنول۔ (نیٹی سپنگ لوشن)۔

بچہ کو مقوی اور رستین غذا میں دی جائیں۔ اور ضرورت ہو تو محرکات دیئے جاسکتے ہیں۔

نہایت شدید حالت میں گال کی پوری دہانت کو کاٹ کر جدا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس عمل سے جو نشیب اور غلا پیدا ہو جاتا ہے اسکو ایک جدا گانہ عمل کھینچ (ہیوند لگانے) کے ذریعہ تازہ جلد سے ڈھانک دیا جاتا ہے۔

ایسے شدید عمل سے بوجہ انتہام جلد کے لازمی طور پر بہت بڑا اور کریہ النظر ندبہ (مٹان زخم) پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جبرئیل کی حرکت میں مرقع واقع ہوتی ہے۔

غانغرا نامی شقر۔ یہ مہتمم رگیوں کے اعضائے متاسل خصوصاً شفر میں اکثر ہوتی ہے۔ اسکو غانغرا نامی فرج بھی کہتے ہیں۔

علاج۔ اس کا اکلہ انجم کے مانند ہے۔ البتہ اس میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ مرقع حصہ کو قطع کرنے کے بعد مرصعہ کو دافع تعفن عنوسل کے اندر بخوبی بیٹھا سکتے ہیں۔

(۵) جمرہ اور دمل گلیان امراض جلد میں آئے گا۔

(۴) غانغرا نامی حر و برد

سری گرمی کا غانغرا

(۱) غانغرا نامی برودت (خضر و یقین) یہ عارضہ اس ملک (انگلستان) میں

۱۔ حر و برد۔ اصل مرقع	۲۔ غانغرا نامی شقر۔ زما	۳۔ جمرہ۔ کاربیل
۴۔ علی رقیق۔ پلاسٹک تھریٹن	۵۔ شقر۔ بیبا۔	۶۔ دمل۔ برمانس
	۷۔ لنگرین آت دوار	۸۔ خضر و یقین۔ فرسٹ با

عام طور پر کیا ہے۔ مگر سرد ممالک میں جہاں سرد اور تیز ہوا بدنی حرارت کو کم کرتی ہے یہ بہت عام ہے +

اس میں جراحی کی نسبت بچے اور بوڑھے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کے بدنی قوی کمزور ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت مندرجہ ذیل دو صورتوں میں سے ایک سے پیدا ہوتی ہے۔ (۱) براہ راست سردی کے اثر سے۔ یا اس کے بعد کے التہاب سے +

(الف) براہ راست سردی کے اثر سے بدن کی ساختیں سکڑ کر سخت ہو جاتی ہیں۔ اُن کا رنگ ہلکا مٹی ہو جاتا ہے + پائے کی اس صورت میں درد نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مریض سے زیادہ دوسرے دیکھنے والے اسے پہچان سکتے ہیں + جسم کے درد کے اعضاء جہاں دوران خون ضعیف ہو کر پہنچتا ہے + کھلے ہوئے حصے (مثلاً ناک، کان، وغیرہ) بالخصوص اس حالت میں متاثر ہوتے ہیں + ماذن سے تدریج خشک بھر پور ہو کر سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ اور پھر یا جذب تحلیل ہو جاتے یا عمل تفرج سے جدا ہو جاتے ہیں + سردی کے خانغرا کی ایک خاص کیفیت یہ ہے کہ اس میں سطحی انجو بوج کھلے مرنے کے زیادہ متاثر ہوتے ہیں +

(ب) برد و دت کے التہاب سے + یعنی وہ خانغرا جو براہ راست سردی سے نہ ہو۔ بلکہ یہ صورت ہو کہ سردی کے اثر سے اعضاء فوراً مژدہ ہو جائیں۔ بلکہ ان میں التہاب لاحق ہو جائے اور التہاب سے خانغرا تپا پیدا ہو جائے + اس حالت میں نیت شدید ہوتی ہے۔ اور ایک عرصہ تک خون کا کم پہنچنا عروق کی دیواروں کی قوت جیٹا کو اس قدر پست و کمزور کر دیتی ہے کہ دوران خون کی رجعت سے اُن میں التہاب عادی پیدا ہو جاتا ہے جس سے رطوبات کا ترشح زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور ان طوبات کے دباؤ سے بالآخر خانغرا ناسودار ہو جاتا ہے + اگر اعضاء پورے طور پر مژدہ نہ ہوں

تو بھی ماذن حصہ کچھ عرصہ تک سٹخ رہتا ہے + امتلاء و موی کے ساتھ درد پیدا ہوتا ہے۔ اور سطحی قرح بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ بالآخر تندرست ہو جاتا ہے +

علامہ + سردی کھائے ہوئے حصوں کو نہایت ہستنگی کے ساتھ اور بتدریج گرم کیا جائے۔ اور دوران خون کو بتدریج دوبارہ لوٹایا جائے۔ ورنہ انتہاب۔ اور انتہاب کے بعد غانغرا کا نمودار ہونا ضروری ہے + پہلے توان اجزاء کو برف یا سرد پانی کے ساتھ ہلکے ہاتھ سے ملا جائے۔ اور معالج کے ہاتھ کی گرمی پہنچانی جائے مریض کو سرد کرے میں رکھا جائے۔ پھر دماں کی حرارت بتدریج بڑھانی جائے + جو ہی قدر سے اثر نمودار ہو کہ مریض کو نہایت احتیاط کے ساتھ کوئی گرم سیال قلیل مقدار میں پلایا جائے + اگر درد کی شدت ہو۔ یا ادویہ اختفانیہ نمودار ہو تو ماذن حصہ کو ادھیچ رکھا جائے + اگر حقیقی غانغرا نمودار ہو جائے تو مردہ حصے کو مٹھ کر کیا جائے۔ اور مٹھ کر رکھا جائے۔ اور پھر فکر احتیاط کے ساتھ مریض کی نگہانی کی جائے۔ یہاں تک کہ خط انفصال پیدا ہو جائے +

شمالی امریکہ و شمال مغربی کینیڈا کے اصلی باشندے، مزدور و محققان طبقات الارض جو اکثر سردی میں کام کرتے ہیں اور کثرت پالے کے شکار ہوتے ہیں روغن تارپین (ترپینین) ہر درجہ میں استعمال کرتے۔ اور مضید پاتے ہیں + طریقہ استعمال یہ ہے کہ مردہ حصوں کو تارپین کے روغن سے تر رکھا جاتا ہے +

(۲) خرقہ (آگ سے جلنا) سلق (گرم پانی وغیرہ سے جلنا) +

روغن تارپین۔
آئل آف ٹرپٹائن۔

ادویہ اختفانیہ
کچھٹو اڈمیا۔

انہیں زخموں رجح اک ایک مخصوص گروہ (نوع خاص) خیال کیا جاتا ہے اور ان سے غانغرانہ کا ہونا ہر صورت میں لازمی نہیں + حرق و سلق میں فرق یہ ہے کہ حرق آگ کے شعلہ یا سخت اور گرم جسم کے لگنے سے ہوتا ہے۔ اور سلق گرم پانی اگر گرم بھاپ یا دوسری گرم رقیق شئی یا گرم ہوا و بخار کے اثر سے پیدا ہوتا ہے +

ان دونوں کے اثر میں ہی نسبت ہے جو بھونٹنے (بریان کرنے) اور اوبالنے کے درمیان ہے + روغنی سیالات (تیل گھی وغیرہ) جراثیمی کی نسبت زیادہ درجہ کی حرارت سے گرم ہوتے ہیں وہ قدرتنا زیادہ شدید زخم پیدا کرتے ہیں + عرصہ دراز ہوا کہ ایک محقق نے حرق کے چھ درجے بیان کیے ہیں۔ جو اب تک مانے جاتے ہیں +

درجہ اول۔ معمولی طور پر جلنا یا آگ کی سپٹ کا ہلکے طور پر لگنا جس سے محض سطحی استقاء دومی پیدا ہو جائے۔ اور اس سے جسم کی ساخت ضائع نہ ہو۔ صرف اس سے عضو مائٹ میں سُرخی اور درد پیدا ہو جائے۔ اور قروح پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔ لیکن اگر کوئی خاص مقام بار بار جھلے۔ جیسا کہ بعض اشخاص کی ناگوں پر آگ سے تپنے میں ہوتا ہے۔ تو چرارنگ بدل کر دھارا اور سخت ہو جاتا ہے۔ جلد کی اس حالت کو احمرارِ ثانی کہتے ہیں +

درجہ دوم میں بشرہ (جلد کا بیرونی طبقہ) اومہ (جلد کا اندرونی طبقہ) سے جدا ہو کر اوپر اٹھ آتا ہے۔ اور چھالہ یا آبلہ (نفاظہ۔ نفاخہ) بن جاتا ہے۔ جب یہ چھالہ پھوٹ کر بشرہ کا چھنکا جدا ہو جاتا ہے (یا جدا کیا جاتا ہے) تو اس کے نیچے سے اومہ سُرخ اور دردناک نمودار ہو جاتا ہے + اس کے اثر سے ایک مستقل بد رنگ داغ

رہ جانے کا احتمال ہو سکتا ہے +

درجہ سویم میں بشرہ تلف ہو جاتا ہے۔ اور اُس کے ساتھ ہی اومہ کا کچھ حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ گمراہ کے اوبھاروں و حملات کے درمیان کے زوائد میں اچلیات بشرہ کے نوکارا و بھارہ اومہ کے حملات کے درمیان گھے ہوئے ہوتے ہیں جن کی حسی اعصاب کے آخری ریشے ختم ہوتے ہیں۔ تلف نہیں ہونے پاتے۔ اور اُن کے نوکارے عریاں ہو جاتے ہیں + اسی وجہ سے درجہ سویم میں درونہایت شدید ہوتا ہے + جلد اور اومہ کے گہرے حصے جن میں پسینہ کی گلیاں (غدد عرقیہ) شحمی یا صنی گلیاں (غدد وحنیہ) اور اجربہ شعریہ ربال کی جڑیں یا اس کی تھیلیاں (دغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ سب بے ضرر رہتے ہیں + لہذا اگرچہ جلد کی سطح اریکہ (انگو رزخم) سے ڈھک جاتی ہے۔ نئی جلد بہت جلد بن جاتی ہے۔ کیونکہ بشرہ کے دوبارہ پیدا کرنے والے خلیات کے اجزاء موجود رہتے ہیں + جب بشرہ تمام وکمال تلف ہو جاتا ہے تو زخم کے کناروں سے (جہاں بشرہ باقی ہے) نئی جلد بن جاتی ہے + اور جب بشرہ کی پوری سطح مسلسل نہ جلی ہو تو زخم کے درمیان میں بھی بشرہ کے چھوٹے جزیرے (حصے) جو صحیح و سلامت رہ جاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے زخم کے درمیان سے بھی عمل اندال جا بجا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کناروں سے آنے والے نئے خلیات بشرہ کے ساتھ ملکر پوری سطح کو ڈھانپ دیتا ہے + لہذا درجہ سویم کے اندمال سے جو نو ساختہ جلد کا داغ رہنمائی نشان زخم پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اگرچہ اکثر سفید رنگ کا ہوتا اور آنکھوں میں کھٹکناؤ مگر اس میں حقیقی جلد کے تمام اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ وہ چکنا اور چکدار ہوتا ہے۔ اور

۱۔ حملات۔ پہلی۔

۲۔ غدد وحنیہ۔ بے شیش گلیڈنڈز۔

۳۔ زوائد میں اچلیات۔ انٹر پیڈری پراس

۴۔ اجربہ شعریہ۔ ہیر فالیکلز۔

۵۔ غدد عرقیہ۔ سویٹ گلیڈنڈز۔

۶۔ زہرہ۔ اسکار۔

اُس میں اقباض ہو سکیں نہیں ہوتا +

درجہ چہارم - میں جلد کی پوری بابت تلف ہلاک ہو جاتی ہے۔ اور جلد کے نیچے کا کچھ حصہ ہی ضائع ہو جاتا ہے +

درجہ پنجم میں تمام دکان بھلا اور جلد کے نیچے کی سب خلیا تلف ہونے کے علاوہ عضلات پر رگ کا اثر پہنچتا ہے +

درجہ ششتم میں عضو تمام دکان جلد اور کلی فنا ہو کر بیکار ہو جاتا ہے۔ مقامی کیفیت یا مقامی تاریخ: حرق کی مقامی تاریخ تین درجات میں بیان کی جاتی ہے۔ یہ تینوں درجات قرط کے یا پچھے ہوئے زخم (جراحات قرضی) کے مانند ہیں +

(۱) پھلادور بخند یا تلف ہونے کا جس کے فتنہ، راج اور بیان ہو چکے ہیں +

(۲) دوسرا دور التباب اور فائز اور مکمل کا جس سے مردہ حصہ خارج ہو کر زخم میں ایک لہر لگور بن جاتا ہے +

(۳) تیسرا دور اتمام و اندمال کا +

ان درجہ دار دور کی کیفیت میں کوئی خصوصیت قابل تذکرہ نہیں۔ سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ ساتھ اکثر خسروما جبکہ وسیع حصہ جل گیا ہو + عدوی جی عارض ہو جاتا ہے + عام طور پر واقعہ اس سے پہلے ہی جلد بدن جی نقطہ نیابت گندہ اور سی ہوتی ہے۔ یا مہیض کے سبب لباس سے جلد ٹوٹ اور عفونی ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں جھٹنے کے بعد فوراً عدوی و ٹوٹ کا دفعہ ممکن نہیں ہوتا + علاوہ ان میں جھٹنے کے بعد دور اور شدت تکلیف اس قدر ہوتی ہے کہ زخم کی پوری طبابت

دیا کیڑگی علما نامکن ہو جاتی ہے +

ہر فی یا عمومی علامات جو مندرجہ بالا تینوں ادوار میں ہوتی ہیں تشریح طلب ہیں جو ذیل میں درج کی جاتی ہیں +

(۱) ابتدائی درج میں مسئلہ عموماً پایا جاتا ہے۔ جس کی شدت و خفت کا انحصار جملے ہوئے حصے کی وسعت و گہرائی پر ہوتا ہے + کسی عضو کا تمام مکال جلتا نظام بدن میں اتنا صدمہ و ضعف نہیں پیدا کر سکتا۔ جتنا کہ ایک وسیع حصہ کا محض سطحی طور پر جھنڈنا۔ خصوصاً جبکہ یہ سطحی احتراق شکم۔ سر یا گردن میں واقع ہو گئے یہ صدمہ بڑھ کر عیشی رہبوط قویٰ تک پیدا کر دیتا ہے۔ جس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جلی ہوئی ساختوں سے سمیات اور فاسد مواد جذب ہوتے رہتے ہیں +

(۲) اس کے بعد خمی الہتابیہ نمودار ہو جاتا ہے جو عموماً جراثیمی عدوی و عفونت کے باعث ہو جاتا ہے اور یہ چار سے چودہ دن تک جاری رہتا ہے۔ اندرونی اعضا (احشاء) خصوصاً مجرای غذائی (معده و امعاء) جگر شش و مغ میں استلاء و دم ہو جاتا ہے۔ جس کے باعث مختلف اقسام کے عوارض نمودار ہو جاتے ہیں +

حرق کے نتائج میں ایک نہایت اہم اور دلچسپ نتیجہ تغیر اشاعہ عشری ہے۔ اگرچہ فی زمانہ یہ شاذ و نادر ہی پیدا ہوتا ہے + یہ قرعہ معمولی قروح اشاعہ عشریہ کے صفات و خصائص رکھتا ہے۔ اور مجرای صفراء کے دانہ کے پاس واقع ہوتا ہے نابینا اس قرعہ کی پیدائش ان سمیات لازماً رخاوش و ہیجان پیدا کرنے والی اسے

مسئلہ صدمہ۔ خاک۔

مسئلہ بھوط قوی۔ کہ لہیں۔

مسئلہ اشاعہ عشری۔ اشاعہ عشری۔ اشاعہ عشری۔

مسئلہ لازع۔ لازع۔ لازع۔

ہوتی ہے جو جلی ہوئی ساختوں میں عفونی تغیرات سے پیدا ہو کر جگر کی راہ سے خارج ہوتی ہیں۔ اور جن کے بڑے اثر سے انجاء و خون و تخثر^۱ یا تقرح پیدا ہو جاتا ہے۔ حرق کے ایک مریض کی لاش کو چیر کر اسٹکان کیا گیا تو اثناعشری کی عشاء و عظمیٰ میں وائہ مجرائی صفر کے مقابل دکھایا گیا کہ عشاء کے نیچے خون نکل کر جمع ہو گیا تھا و زرق^۲ تحت الجلد^۳ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس جگہ پر خون کا یہ انصباب^۴ قرح بننے کا ابتدائی درجہ تھا اور اگر مریض جلد فوت نہ ہو جاتا تو ضرور اس انصباب کے بعد مکمل طور پر قرح بن جاتا۔ و تقرح اثناعشری کے علامات امراض اثناعشری کے ذیل میں باب امراض شکم کے تحت درج ہونگے۔

(۳) جب طے ہونے سے حصہ کو بخوبی غیر عفونی اور طہر رکھا جاتا ہے۔ اور عمل الحتام واقع ہوتا ہے۔ تو اس وقت کوئی غیر معمولی بدنی علامت نمودار نہیں ہوتی ہے۔ اگرچہ اس وقت بھی قدرے ضعف یا کمی خون کا موجود ہونا ممکن ہے۔ لیکن اگر زخم میں عفونت و وعدوی موجود ہیں۔ اور سپ خوب بن رہی ہے۔ تو ضعف اور کمی خون بہت نمایاں ہوگی۔ اور مریض کو حمی و ق کی طرح روزانہ بخار آنے لگا۔ احتشاد میں منشاء نشانی نمودار ہو جائے گا۔ اور بالآخر غایت اضمحلال و کمال ضعف کے باعث موت آجائے گی۔

جلنے سے موت کیونکر واقع ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص تادم آخر جلایا جائے۔ تو موت کی وجہ اکثر اشتقاق^۵ روم گھٹنا ہوتا ہے۔ جو و صومش اور آگ کے زہریلے بخارات و مسمومات کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ صدمہ^۶ یا غشی بھی

۱۔ تخثر۔

۲۔ زرق تحت الجلد۔

۳۔ صدمہ۔

۴۔ تقریباً۔

۵۔ اشتقاق۔

۶۔ صدمہ۔

اختناق کے ساتھ ہلاکت کے مددگار ہو سکتے ہیں۔ خصوصی اُن مرضی میں جن کا کلب پہلے ہی سے ضعیف و علیل ہو،

اگر جلنے سے چند روز بعد موت واقع ہو تو اُس کا باعث سدسہ یا مہبوط قوی ہوتا ہے جو قسم الدم سے پیدا ہو جاتا ہے،

اگر موت درجہ دوم (دور دوم) میں واقع ہو تو اس کی وجہ سدوی یا اندرونی احتشاء کے دیگر اندرونی عوارض۔ یا تقرح اثنا عشری ہو سکتی ہے،

اور اگر درجہ سوم (دور سوم) میں موت واقع ہو تو اس کی وجہ کمال تکان و مقاسات مرضی یا اندرونی امراض ہو سکتی ہے،

بچوں میں جلنے کے بعد علامات اندازہت بلد جانوں کے ہمیشہ برے ہوتے ہیں +



علاجہ۔ آگے اگر صرف جلد کی بیرونی سطح اوپر اوپر سے جل گئی ہے۔ اور آبلہ وغیرہ نہیں اُٹھتا ہے۔ تو اس میں صرت اسی قدر کافی ہے کہ جلے ہوئے حصہ کو محفوظ رکھا جائے۔ مثلاً حائل بورقی مسفون کے ساتھ نشاستہ مسفون ملا کر زخم پر چھڑک دیا جائے۔ یا جلے ہوئے حصہ پر لاصوق کے سیال کو پھر پری سے لگا دیا جائے +

اگر آبلہ نمودار ہو تو پہلے اُسکو دافع عفونت غسل سے دھو کر بھوڑ دیا جائے اور اُس کے اندر کا پانی۔ جس میں جراثیم ہمیشہ مخلوط ہوتے ہیں۔ خارج کر دیا جائے آبلہ کے اوپر کا مردہ چڑا دبثرہ (مطہر اور صاف کی ہوئی تپنی سے تراش دیا جائے۔

۱۔ استسراج۔

۲۔ لاصوق۔ کلڈین۔

۱۔ مہبوط قوی۔ کوئیں۔

۲۔ حائل بورقی۔ بورک ایڈ۔

اور پھر اگر جلی ہوئی جگہ زیادہ وسیع نہ ہو تو حامض مرکبی پٹی باندھ دی جائے + جالی کی پٹی یا نٹا کہ حامض مرسیاں مٹھ رہا مضمحل ہو قحط پانی ایک اوقیہ میں بھگو کر اور پھر اسکو پھونک کر جلی ہوئی سطح پر رکھ دیا جائے۔ اور اس کے اوپر پاک صاف نرم ردی کی گدی رکھ کر باندھ دیا جائے + اس طرح خشک پٹی (اسادۃ یا سبہ) ہو جاتی ہے جو کئی دن تک کھولی نہ جائے + چند روز بعد اسے تبدیل کر دینا چاہئے + اس طرح پٹی لگانے سے بہت مفید نتائج پیدا ہوتے ہیں +

جب گہری ساختیں جل گئی ہوں تو مریض کے کپڑوں کو نہایت ہلکے ہاتھ سے اترے جائے۔ یا کپڑوں کو کاٹ دیا جائے۔ تاکہ رگڑ نہ لگنے پڑے + پھر جلی ہوئی ساختوں کو دافع عفونت عنولات سے دھویا جائے۔ مثلاً غسول سیلانی (ایک حصہ سیلانی دو ہزار حصے مٹھریانی میں) اسے دھو کر فوراً نرم کپڑے یا باریک جالی سے ڈھانک کر پٹی باندھ دی جائے۔ مگر کپڑے یا جالی کو روغن بیک کربوٹوس میں یا روغن قطرانے مخفف (حامض قطرانے ایک حصہ۔ روغن۔ م حصہ) میں نر کر دیا جائے +

جبکہ حرق شدید ہو اور جلد کی سطح بہت گندہ ہو تو نہ سبب ہے کہ مریض کو بیہوش کر کے مردہ سے ہونے حصوں کو جن کے سرے (غائفران ہو جانے) کا گمان غالب ہے۔ قطع کر کے خارج کر دیا جائے۔ زخم کو بخوبی پاک صاف کر دیا جائے اور دوائی (رمی فظ جلد روغن) کا غلغلہ جلی جیسا ہوتا ہے (رکھ کر اس پر سیلاب سم آمیز

۱۔ حامض مر۔ چرک ایسڈ	۱۔ غسول سیلانی
۲۔ جالی۔ گار۔	۲۔ سب لانی میٹ آف مرکری نوسٹن
۳۔ مٹ۔ لنت۔	۳۔ روغن بیک کربوٹوس۔ یو کے پش آئل۔
۴۔ گرین۔	۴۔ روغن قطرانے۔ کار بولک آئل۔
۵۔ اونس۔	۵۔ دوائی۔ پریٹکٹو۔
۶۔ اسادۃ یا سبہ۔ ڈرائی فڈرنگ	۶۔ سیلاب دم آمیز سیلانی غلغلہ مرکری۔

یا اور گرمی دافع جراثیم دوا ملی ہوئی روئی۔ یا کپڑا وغیرہ رکھ کر باندھ دیا جائے +
جب بہت وسیع حصہ جل گیا ہو تو زہریلے مطہرات مثلاً حامض قطرائی اور سیلیکا
وغیرہ کے استعمال میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ورنہ خطرناک علامات تسمم
نمودار ہو جانے کا اندیشہ ہے +

اگر مریض صدمہ کی حالت میں ہو تو اسکو فوراً بستر پر رک کر گرم رضائی یا بکسل
وغیرہ سے ڈھانک دینا چاہئے۔ اور کوئی مناسب محرک گرمی پہنچانے والی دوا
مثلاً شراب۔ نوشادیرہ سیال (پانی چاہئے۔ اس کے بعد جو ہر ایضوں (رافیوٹین)
کی زیر جبہ پکاری دیدی جائے۔ تاکہ درد میں افادہ ہو۔ اور نیند آکر آرام و قوت
حاصل ہو +


اگر صدمہ کی حالت نہایت شدید ہو تو گرم سیال نکلین کی وریہی پکاری حسب ضرورت
بار بار دے سکتے ہیں +


اگر مریض بچہ ہو۔ اور وسیع حصہ جل گیا ہو تو مناسب ہے کہ اسکو فوراً گرم پانی کے
ظرف میں قدرے روغن یوکالبتوس یا سائل کوئڈی لاکر بٹھا دیا جائے (حمام گرم) اس کے
بعد بچے کے کپڑے کا ٹکڑا تار لٹے جائیں۔ اور پھر اسکو کچھ دیر تک گرم پانی میں بٹھایا
جائے (گرم پانی کو ہر بار بدلنا چاہئے) جب ضعف کم ہو جائے تو بچہ کو اٹھا کر زخموں
کی مرہم پٹی مندرجہ بالا طریق پر کر کے اسکو بستر پر آرام سے رکھ دیا جائے + اگر ضعف
زیادہ ہو تو مریض کو گرم پانی کی بوتلوں۔ گرم کی ہوئی اینسٹ یا بجلی کی روشنی کی بتیاں
رضائی یا بکسل کے اندر رکھ کر اس کی حرارت بدنی کو قائم رکھیں + بسا اوقات چند روز
تک پٹی بدلنے سے پہلے مریض کو مندرجہ بالا طریقے سے گرم پانی میں بٹھانے کی ضرورت
پیش آتی ہے +

جب عضو بڑی تک جمل جائے تو اُسکو قائم رکھنا فضول ہے۔ لہذا جمل قدر جلد ہو سکے اُسے کا ٹکرا لگ کر دینا چاہئے + جلے ہوئے حصہ سے ٹیکہ اوپر قریب کے تندرست حصہ میں یہ عمل رستہ کرنا چاہئے +

دور التهاب و غانغرا نامی محض حصہ ماذت کو غیر عفونی اور جراثیم سے پاک رکھنا کافی ہے + ساتھ ہی عمل اندام میں گرم عنوانات سے مدد دینی چاہئے۔ اور اُن مردہ ٹکڑوں کو کاٹ کر الگ کر دینا چاہئے جو ڈھیسے ہو کر ٹنگ رہے ہوں + اس کے بعد زخم کا علاج عام اصول کے مطابق کرنا چاہئے + بعض اوقات زخم کے اوپر اریکہ (انگور) بہت نمایاں اور بڑے ہو جاتے ہیں۔ لہذا اُن کو کم کرنے کے لئے محرک ادویہ کی پھریری مثلاً حجر جہنم، نقرہ، شور آگین کی ضرورت پیش آتی ہے +

جب زخم بہت بڑا ہو۔ اور سستی کے ساتھ اس پر جلد بن رہی ہو تو دوسری جگہ یا غیر مریض سے پکڑا اتار کر زخم پر علامہ تیریش کے مطابق پیوند لگا دیا جائے (عمل ترقیع) اس سے زخم سہل ہو کر ڈھک جاتا ہے۔ اور مزمن نہیں ہونے پاتا + اسی طرح عمل ترقیع اُس وقت بھی مناسب ہے جبکہ کسی مفصل کے عضلات قابضہ پر جتنے کا اثر پڑا ہو۔ اور زخم کے سکرٹس جوڑنے میں وقت واقع ہونے کا اندیشہ ہو + پیوند لگانے کے بعد جلد میں انقباض نہ واقع ہو گا اور جوڑ بے آسانی مڑ سکے گا +





تصویر ۲- جی معویہ کے معلیٰ مع ادباب کے (۲۲) دن اسل کے معی مرکب میں (۲۳) کرانے
 معلیٰ مع بنیاد کے (۲۴) جزیو نیچ کے معلیٰ خول میں (۲۵) بنام کے معلیٰ حوال کے حوالہ میں (۲۶) معی
 قورنی ہیشہ میں سے پیچے کا فرق

باب ششم

امراض زعمیہ عفونیہ

حمزہ سرخ بادہ

حمزہ یا سرخ بادہ ایک متعدی زہمت سے لگنے والا اور عفونی مرض ہے، جو جلد کے اور گاہے آنشہ مخاطیہ کے چھوٹے عروق جاذبہ میں کثریات عقدیہ صدیدیہ کے نمو پانے کے باعث پیدا ہو جاتا ہے + یہ مرض پھیلنے کے لئے ناکل رہتا ہے اور ساختوں کو تلف کیے بغیر اچھا ہو جاتا ہے + اس کے سینہ جرمی طور پر بنتے ہیں جذب ہو کر عام ہفتی علامات پیدا کر دیتے ہیں + گاہے اس سے جلد کے نیچے کانچ و اہل بھی متاثر ہو جاتا ہے اور اس مرض کی وہ قسم پیدا ہو جاتی ہے جسے حمزہ خلویہ جلدیہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے +

۱۔ عفونی - انگلیٹو - ساری - سرانچی
۲۔ اسٹریٹو کوکس پاروے نس -
۳۔ سیلینو کوکس نیس ایری سپلس -

۱۔ امراض زعمیہ عفونیہ - آپسے مکمل انگلیٹو
۲۔ حمزہ سرخ بادہ - اری سپلس -
۳۔ متعدی - کنٹھیں

۱۔ آج کل کے خیال کے مطابق یہ امر سخت مشتبہ ہے کہ حمزہ کو ایک خصوصی زعمی مرض شمار کیا جائے۔ بہر ان علم ہمہ راٹیم کی باریک تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حمزہ کے اسباب محرک میں علاوہ کدیات عقدیہ مسدیدیہ کے دیگر جراثیم مسدیدیہ بھی پائے جاتے ہیں۔ اس تحقیقات کی بنا پر اب گمان غالب یہ ہے کہ آئندہ حمزہ کو ایک غیر زعمی و غیر خصوصی متعدی مرض تسلیم کر کے اسے غیر زعمی متعدی امراض کے تحت میں ہی درج کیا جائے گا +

اس امر کے متعلق بہت کچھ اختلاف رہا ہے کہ آیا جراثیم حمزہ اور معمولی کڑویات عقدیہ صدیہ یہ جو تفتیح ساعی میں پائے جاتے ہیں، ان دونوں میں کچھ فرق ہے یا نہیں ؟ +

لیکن اب عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں تشابہ و تنجاس ہیں، حمزہ اور وہ دیگر عوارض جو کڑویات عقدیہ صدیہ کے باعث پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی علامات و ظواہر مرضیہ میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کی توجیہ غالباً یوں ہو سکتی ہے کہ ان دونوں کا حملہ جدا جدا طریقہ سے ہوتا ہے اور ان جراثیم کی سمیت مختلف خاندان کے کاغذ سے مختلف و متغیر ہوتی ہے، بہر حال یہ بحث ابھی مستقل طور پر حل نہیں ہوئی ہے اور مزید تشریح و تحقیق کی طالب ہے +

اسباب۔ مندرجہ ذیل چار اسباب اس مرض کے پیدا کرنے میں مدد ہوتے ہیں۔
(۱) بیشتر حالات میں کسی زخم یا رگڑ کی موجودگی اور خاصہ اس زخم جو میلا اور کھلا ہوا (غیر محفوظ) ہو حمزہ کا باعث ہوتا ہے مثلاً عام طور سے حمزہ سر کی جلد کے زخم سے جس میں احتیاط نہ برتی گئی ہو یا منہ میں کھلنے والے زخم سے دبا ہوا ہوتا ہے +

بظاہر اسباب جس حمزہ کو ”حمزہ ذاتیہ“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دراصل وہ بھی کسی خفیف سے زخم مثلاً کسی نوکدار چیز کے چمکنے یا کسی رگڑ یا خراش سے پیدا ہوتا ہے۔ گلاب کوئی ظاہری جراحت یا زخم بھی موجود نہیں ہوتا ہے اور زندگی جلد کے اندر اجربہ شعریہ (بال کی جڑ) سے عدوی پہونچ سکتا ہے +
(۲) ہڈی قوی کی کمزوری جو کثرت شراب نوشی، خراب یا کافی غذا، نا پختہ کاری

۱۰۰ اجربہ شعریہ۔ میرزا یحییٰ علی

۱۰۰ حمزہ ذاتیہ۔ ایڈیو پے ٹیک اری سپلس

اور عیاشی کی زندگی، ذیابیطس، بول زلالی وغیرہ کے باعث پیدا ہو گئی ہو، علاوہ ان میں بعض اشخاص طبعی طور پر اس مرض سے متاثر ہونے کی قابلیت رکھتے ہیں، خصوصاً دُمئی اور فقرتی مزاج کے اشخاص۔ اور اگر ایک مرتبہ یہ مرض ہو جائے تو اس شخص میں عارضی مناعت حاصل ہو کر پھر دوبارہ اس مرض سے متاثر ہونے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے +

(۳) اگر دونوں احکام اصول صحت و صفائی کے خلاف واقع ہوں یا مخصوص شفا خانہ میں مریضوں کا کثرت جمع ہو جائے، یا ہوا اور روشنی کا کافی دباؤ نقص ہو، یا یہ سب اسباب حرہ کے لئے نہایت اہم ہیں +

حالات و اسباب مندرجہ بالا محض اسباب متعدّد ہیں جن سے صرف استعداد پیدا ہو جاتی ہے +

(۴) لیکن حرہ کا اصلی سبب محرک وہ خاص جرثومہ ہے جس کے عدوی سے یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے +

علامات۔ مرض کی ابتداء عموماً در دہر اور ضخم مال و ماندگی کے ساتھ ہوتی ہے جو تقریباً چوبیس گھنٹہ تک رہتے ہیں۔ اس کے بعد قدرے جاڑا اور لرزہ ہو کر تیز بخار چلہ آتا ہے، اور صفحہ رد و ورثہ (یا تو زخم کے کنارے سے پھیلنا شروع ہوتا ہے یا بالکل تندرست جلد پر) بلا کسی قسم کی جراحت کی موجودگی کے نمودار ہو جاتا ہے (جبکہ حرقہ ذاتی کہتے ہیں) اگر کوئی زخم پہلے سے موجود ہے تو اس کی سطح زردی یا لیلے رنگ کی اور غیر طبعی نظر آتی ہے جس میں اندام کے آثار نہیں پائے جاتے۔ اگر عدوی غیر مخلوط ہے تو جراحت کے بعد زخم میں عمل اندام

۱۔ بقری۔ گاؤنی۔
۲۔ طبع۔ ریش۔

۱۔ بول زلالی۔ ایسوی نیوریا۔
۲۔ دُمئی۔ پٹے متورک۔

تین چار دن تک تو جاری رہتا ہے پھر طغ رُو دھٹا) نمودار ہوتا ہے اور زخم کا دوسرا ختہ مذہب دوبارہ پھوٹ جاتا ہے اور اس کے نیچے سے ایک خشک اور سخت شخ ظاہر ہو جاتی ہے جسکا کنارہ موٹا ہوتا ہے +

طغ جلدی ایک خاص قسم کی تیز گلابی سرخ رنگت کا ہوتا ہے جو دبانے سے غائب ہو جاتا ہے اور اسکو دبانے سے مریض ملن محسوس کرتا ہے۔ یہ علن اتنی تیز نہیں ہوتی کہ درد کی حد تک ہو سکن اگر کسی دبیز ساخت مثلاً سر کی چند میں مرض ہے تو سخت درد محسوس ہو سکتا ہے۔ درم نمایاں نہیں ہوتا ہے، البتہ اگر مرض شیخ خلوی (جس میں خلاصین بہت ہوتی ہیں) میں ہو تو درم نمایاں ہوتا ہے جیسے کہ خضیوں کی پتیلی (صفن) اور پوٹوں میں، ایسی حالت میں شیخ بھی غیر معمولی طور پر نمایاں ہو جاتا ہے۔ طغ جلدی کم دبیش سرعت کے ساتھ پھیلتا جاتا ہے اور دنگا حاشیہ مسلسل اور قدرے اونٹا ہوا ہوتا ہے۔ جن جن دو نئے نئے حصوں میں پھیلتا اور بڑھتا جاتا ہے اور ان پچھلے مقامات سے جہاں وہ پہلے ہوا تھا کم ہوتا جاتا ہے مگر وہاں ایک ہلکا بھورے رنگ کا داغ چھوڑتا جاتا ہے اور ان مقامات سے گہروں کی بھوس کی طرح پھلکے سے نکل آتے ہیں + بعض حالات میں طغ جلدی مسلسل نہیں پھیلتا اور کچھ حصہ چھوڑ کر دوسرے مقام پر کو د جاتا ہے اگر اس قسم کے درمیانی حصص کے عروق جاذبہ موٹے ہو جاتے ہیں + سچے پر چھوٹے چھوٹے دانے اور آبے (لغاطات) بن جاتے ہیں جن میں منسل (مذہبیت) بھر جاتا ہے یہ منسل بہ سرعت گدلا ہو جاتا ہے مگر عموماً پیپ نہیں پیدا ہوتی + البتہ ڈیملی تہنجی ساخت میں (مثلاً پوٹوں میں) پیپ ہی پڑ جاتی ہے + گاسے التهاب کی شدت سے یا ساختوں کی قوت حیوانیہ میں کمی ہو جانے کے باعث، جلد میں

غانغرائنا اور شفا ٹکوس (رمدارنگٹس) پیدا ہو جاتے ہیں + عموماً ایسا چھوٹے بچوں میں نائٹ اور اعضائے تناسل کے قرب جدار میں ہوتا ہے۔ حصہ ماؤف کے قرب وجدار کی جلد جاذبہ ہمیشہ بڑی ہو جاتی ہیں۔ اور ان میں دروبہی محسوس ہونا اور یہ اس وقت سے ہی ہو جاتا ہے جبکہ طغ جلدی نمودار ہی نہیں ہو سکتے۔ اور وہ کی مٹھی ساخت میں ہی التهاب پیدا ہو سکتا ہے جس سے عوارض تھنق الدم لاحق ہو جاتے ہیں + جب تک طغ جلدی موجود رہتا ہے بخار بھی جاری رہتا ہے اور اس میں صبح و شام کے وقت خفیف کمی و بیشی ہوتی ہے + عموماً بخار ۴۰ درجہ تک پہنچتا ہے، مگر جب اس سے زیادہ ہو تو سخت خطرہ کا اندیشہ ہو جاتا ہے ابتداء بخار شدید و قوی متم کا ہوتا ہے، نبض بھری ہوئی رُمُتلی (ہوتی ہے) اور ہڈیاں تیز اور شور کے ساتھ ہوتے ہیں + لیکن اس کے بعد نبض متواتر اور کمزور ہو جاتی ہے اور ہڈیاں ضعیف کے ساتھ ہوتے ہیں جس میں مریض آہستہ آہستہ بڑا ہوتا رہتا ہے اور شدید درجہ کا اضمحلال ہو کر قوی حیوانیہ نہایت کمزور پڑ جاتے ہیں + سر کی جلد کے حمزہ میں ہڈیاں ایک نمایاں خصوصیت ہے، مگر اس کی موجودگی زیادہ تر عام ہڈی حالت کے باعث ہوتی ہے نہ کہ مقامی مرض کی شدت سے البتہ اگر سر کی جلد کے حمزہ کے بعد سر سام غشائی پیدا ہو جائے تو ہڈیاں کی موجودگی اغشیۃ دماغ کی مقامی حالت (التهاب) کے باعث ہو سکتی ہے +

خون میں کثرت بیضادات اوسط درجہ کی ہوتی ہے (۱۵۰۰ سے ۲۰۰۰ تک سفید دانے ایک کعب ملی میٹر خون میں) +

مدت مرض۔ عموماً ایک ہفتہ سے تین ہفتے تک ہوتی ہے، مگر اس میں بہت

۱۔ قوی حیوانیہ۔ وٹیل پاورز۔

۲۔ ایک فی میٹر ۱۰۰ قیراط۔

۱۔ التهاب محیط اوردہ۔ ہری فلائی ش۔

۲۔ نبض رُمُتلی۔ فل میس۔

کی دیشی ہو جاتی ہے، علاوہ انہیں اعادہ مرض (رکس) کا ہونا بھی غیر معمولی بات نہیں ہے + گاہے حصہ نافذ کا درم تمام وکال اچھا نہیں ہوتا کیونکہ عروق جاذبہ مستقامسد و دہو جلتے ہیں، اور اگر اعادہ مرض بار بار ہوا ہو تو یہ درم اس قدر نمایاں رہ جاتا ہے کہ ایک ستر کا دائرہ انہیں بن جاتا ہے +

حمزہ ذاتیمہ - حمزہ جو اسنام سے مشہور ہے، بالخصوص سر میں ہوتا ہے اور عمدان اشخاص کو ہوتا ہے جن میں مرض کی استعداد پہلے سے موجود ہو۔ اور اکثر اس مرض کا اعادہ ہر سال ایک ہی وقت پر ہوتا ہے +

درد اور بنیان اس کی نمایاں علامات ہیں اور چہرہ کی زیر جلد ساخت میں ہتھکڑی شدہ درم ہو جاتا ہے کہ بعض کی صورت پہنی نہ سکتی۔ بڑے بڑے چھالے بن جاتے ہیں، اور اکثر پوٹوں کی جگہ پھوٹے بھی ہو جاتے ہیں +

حمزہ جلدیہ ضغویہ - اس میں حمزہ کی خصوصی ہیئت کا عددی جلد اور زیر جلد ساختوں میں سرایت کر جاتا ہے اور اس کے اثر سے جلد اور اس کے گرد و پیش کی بیج غلوی میں پیپ اور ناکل پیدا ہو جاتا ہے + حمزہ کے معمولی ظواہر کے ساتھ زیر جلد ساختوں میں وسیع اجتماع رطوبات ہو جاتا ہے۔

اور وہ شروع میں تو درم سخت اور تنہا ہوا کہ بعد میں نرم ہو کر پھیلا ہو جاتا ہے + بالآخر جلد پھوٹ جاتی ہے۔ اور اندر سے پیپ اور سٹے ہونے کا رنے نکل جاتے ہیں، عمومی علامات نسبتاً زیادہ سخت ہوتی ہیں اور تھک دم بھی پیدا ہو سکتا ہے، معمولی حمزوں اور اس میں امتیازی علامات یہ ہیں کہ اس میں سرخی و طغ جلدی کا عاشرہ چنداں نمایاں نہیں

علیہ انہیں، ایلنٹانی سس۔

علیہ حمزہ ذاتیمہ - ایڈیوپہ ٹھکاندی پلس۔

حمزہ جلدیہ ضغویہ۔

علیہ سیلور ویکرٹے نس ایری سپلس۔

ہوتا اور غدہ بھی کسی قدر کم متورم ہوتے ہیں۔

حمرہ صفینہ (خصیہ کی پتیلی کا ٹیخ بادہ) اسے گاہے۔ تھپتھپا لگتا ہی حادہ
بھی کہتے ہیں + اس میں خصیہ کی پتیلی جتنا مع منصل کے باعث تنگ بہت پھول
جاتی ہے مگر سرنخی چنداں نمایاں نہیں ہوتی۔ پیپ اور سڑے ہوئے ٹکڑے بھی
نیچتہ اکثر پیدا ہو سکتے ہیں۔ بریخہ اس کی ظاہری صورت اس حالت سے مشابہ
ہو جاتی ہے جس میں پیٹاب مشاندہ سے نکل کر خصیہ کی پتیلی میں جمع ہو جائے۔ مگر اسکی
تفتیخیں ہوں ہو سکتی ہے کہ اس میں پیٹاب کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں پائی جاتی۔
اور درم و انتفاخ کے حدود اس طرح محدود نہیں ہوتے جیسے کہ وہ خرد برج بول
کی حالت میں ہوتے ہیں +

تشریح مرضی حصہ اذت کی جلد کو قطع کر کے اگر خوردبین سے امتحان
کیا جاوے تو حسب ذیل نظر پیش نظر ہوگا +

طح جلدی کے پھیلے ہوئے حاشیہ سے قدرے باہر گول جراثیم زنجیر کی شکل
میں مترتب ہو کر عروق جاذبہ پر حملہ آور نظر آتے ہیں + التباہی حصہ میں بکثرت سفید
دانے (رہیضات) نظر آتے ہیں۔ جو عروق جاذبہ کے اندر اسناد پیدا کر دیتے ہیں
یہ دانے بظاہر کردیات مذکورہ کو کھانے اور مضغ کرنے میں مصروف ہوتے ہیں +
سفید دانوں کے اندر اکثر یہ جراثیم مقید ہی نظر آتے ہیں جس سے انکے جھوم و مضغ
کے عمل کا پتہ چلتا ہے۔ غدہ جاذبہ ہی احتقان دموی کے باعث متورم اور بڑھے
ہوئے ہوتے ہیں + حمرہ کے باعث جو مریض ہلاک ہو جاتے ہیں انکی لاش کے
استحان بعد الموت میں وہی معمولی ظواہر نظر آتے ہیں جو عموماً عمومی شتم الدم کے

حمرہ صفینہ۔ اسکر وٹل اری سپلس
تھپتھپا لگتا ہی حادہ۔ ایکوٹ انفلاٹری ایڈیا

تشریح مرضی۔ پیتھالوجیکل اتانی۔

باعث لاش میں پائے جاتے ہیں اور ان ظواہر کی مفصل کیفیت قسم الدم کے

باب میں درج ہے +

تشخیص - حمہ کی حالت بلا وقت اس کی امتیازی خصوصیات علامات سے شناخت کی جاسکتی ہے + وہ نشانات امتیازی یہ ہیں :- اس کے پھلنے کا مخصوص طریقہ یہ ہے کہ یہ پھیلتا جاتا ہے جس کے کنارے چوڑے سرخ - محدود کسی قدر سطح سے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں + اس کے ساتھ ہی تقریباً ہمیشہ سلی دانے اور آبنے ہوتے ہیں جو شاید عدسہ نامی شیشہ سے دیکھنے پر ہی نظر آویں یا صاف پھنسیاں اور آبنے موجود ہوتے ہیں + بعض اوقات عضنی زخم جس کے اندر پیپ بھری ہوا حمہ سے مشابہ نظر آتا ہے، مگر ایسے زخم کی سرخی کا حاشیہ حمہ کے حاشیہ کی طرح صاف نہیں ہوتا اور اس کی سرخی زخم کے متصل حصہ سے زیادہ دور تک نہیں پھیلتی + علاوہ ازیں معمولی حالت عفونت میں جلدی آبنے عموماً نہیں موجود ہوتے اور متورم اور بڑھے ہوئے غدود تشافی پائے جاتے ہیں + التهاب خلوی کا ٹکڑا ہی حمہ سے انھیں خصوصیات کے باعث پہچانا جاسکتا ہے -

انتذار - حمہ بذاتہ خطرناک نہیں ہے مگر دیگر عوارض کی موجودگی سے یہ مہلک ہو سکتا ہے + زیادہ اہم عوارض یہ ہیں :-

سرام (التهاب دماغ) ذات الریه (التهاب شش) دیگر اعضائے باطنی کا التهاب جن میں بالخصوص گردہ کا ورم زیادہ اہم و مہلک ہے +

معتز مینوں، نشہ بازوں (شراب خواروں) اور دوپیتے بچوں میں، حمہ

معدہ - لہذا مجرباً طریقہ شیشہ جو سور

معدہ - انتذار - پراگنوسس

معدہ - بقل اُزرا اسلر اس سے شفا خانوں

میں، فیصدی موت واقع ہوتی ہے

کی طرح دونوں طرف سے مجرب ہوتا ہے -

سے نجان کا شدید خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ ان حالتوں میں مریض کے قوی حیوانیت میں بہت سرعت کے ساتھ ضعف پیدا ہو جاتا ہے +

یہاں ایک بات نہایت دلچسپ اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حمہ کا ایک دورہ گزر جانے کے بعد جراحات و زخم (غواہ وہ پہلے سے نہایت مزمن اور ناقابل انداز ہوں) نہایت سرعت کے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں، بشرطیکہ کوئی دوسرا عارضہ موجود نہ ہو + حمہ کے اثر سے انتہائی قوت کو ایسی معجزانہ تحریک بخاتی ہے، کہ اس سے نہایت دیر پا اور مزمن قروح و قراضیہ و قروح آتشک ہی نہایت جلد مندمل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض قروح خبیثہ، خصوصاً سلحہ لحمیہ بھی گہے اس کے بعد شفا یاب ہو گئے ہیں +

ع (الج)۔ انگلستان میں قانون امراض معدنیہ بابت ۱۹۰۹ء اور ۱۹۱۰ء کے رُو سے حمہ ایک قابلِ اطلاع مرض ہے + اس کے مریضوں کو عام آبادی سے اور حتیٰ الامکان دلائل الجرجی سے ہی ہٹا کر رکھنا چاہئے + اگر بد قسمتی سے اس طرح ملتحدگی غیر ممکن ہو تو کم از کم مریض کو جس قدر ہوسکے دوسروں سے فاصلہ پر رکھا جاوے اور خصوصاً ایسے مریضوں سے جنکے زخم کھلے ہوئے ہوں اور جنکا ڈھانکنا دشوار ہو (مثلاً جبکہ سُنہ میں زخم ہو) + ان حالات میں یہ بھی مناسب ہے کہ تمام اعمال جراحیہ (خصوصاً وہ جنکا ملتوی کرنا خطرناک نہ ہو) ملتوی کر دیئے جائیں + مریض کے بستر کے گرد غُسلِ قطرائی میں ترکی ہونی چادریں ٹانگ دی جائیں اور

نکلتہ حفظانِ صحت کو دینا چاہیے، مالک مکان کا فرض ہے +

مل قروح قراضیہ۔ یوپانڈ و ونڈرز۔

مل سلحہ لحمیہ۔ سارکوبا۔

مل دار الجرجی۔ سر جیکل آر۔ مچرسن کی قیام گاہ
مل غُسلِ قطرائی۔ کاربوئک لوشن۔

مل تقریح خبیثہ۔ (سرطان سلحہ لحمیہ وغیرہ)

مل ایسا مرض جس کے حدوث کی اطلاع

یہی عمل مریض کے آس پاس کے فرش و زمین پر خوب چھڑک دیا جائے + اس مریض کی مرہم پٹی اور تیار داری وغیرہ کے لئے مخصوص اور علیحدہ مٹیغیر اور تیار داری مقرر کر دیئے جائیں۔ اور بغیر ہاتھوں میں ربر کا پاک مستانہ پہنے کبھی مریض کی کپٹی نہ ہلی جائے +

دالہ مقامی علل و مقصد سے کیا جاتا ہے۔ یعنی اول تو اس لئے کہ مرض پھیلنے سے رک جائے۔ دویم اس لیے کہ مقامی سقم کو اچھا کر دیا جائے + (۱) مرض کی وسعت اور پیش قدمی روکنے کے لئے ہر وہ شے مفید ہو سکتی ہے جو مقامی طور سے بڑھنے والے حاشیہ سے آگے کی جلد میں سفید دانوں کی کثرت پیدا کر دے + اس مطلب کے لیے نہایت سادہ اور کارگر طریقہ یہ ہے کہ تندرست جلد پر تیز صابن و ہنیشین کی پھریری تین چار دفعہ لگائی جائے۔ اس طرح یہ روزانہ کیا جائے حتیٰ کہ مرض غائب ہو جائے + ایک اور طریقہ مقامی کثرت سیفادات پیدا کرنے کے لئے اختیار کیا جاسکتا ہے + وہ یہ ہے کہ پھیلے ہوئے حاشیہ سے ایک یا دو قیراط کے فاصلہ پر جلد کے گرد چھوٹے چھوٹے پچھنے صرف اتنے گہرے لگائے جائیں کہ جس سے خون نکل آئے (تشمیٹ) + اگرچہ یہ بھی مفید ہے مگر دردناک ہے اور اس میں ذرا دیر لے بیہوشی کی ضرورت پڑتی ہے +

(۲) جہاں تناؤ اور درد شدید ہو، ایفون یا الفارج کے ساتھ تکبید کی جاوے (مثلاً صغ ایفون ایک ادقیہ غسل رصاص تقریباً ۴۵ تولر میں ملا کر سینک کے ساتھ

۱۔ صابن ڈسٹر۔	۲۔ طریقہ کراسے
۳۔ مرخ ہنیشین۔ ہنی سنٹ آف آیوڈین۔	۴۔ شریٹ۔ پچھنے لگانا۔ سگری فیکیشن۔
۵۔ مرخ ہنیشین کی طاقت مرخ کے برابر نہیں ہوتی +	۶۔ الفارج۔ بلاڈنہ۔
	۷۔ غسل رصاص۔ نوٹش و ہپانی۔

لگایا جائے) مگر بہترین مقامی ضماد شحم ہائی راکتیول (اور کبریت مہین رتیل) کا ہے (رتیل گندک کا ایک مصنوعی مرکب ہے جو اکتیول سے مشابہ ہوتا ہے مگر اس میں بدبو نہیں ہوتی) طریقہ استعمال یہ ہے کہ ۲۰ سے ۴۰ فی صدی کا محلول آبی حصہ ماؤف پر دن میں کئی مرتبہ طلا کر دیا جائے، حتیٰ کہ بخار دفع ہو جائے + اس علاج کا ایک ضمنی فائدہ یہ بھی ہے کہ اس طلا کے لیس کے باعث مرض کی سیرت رجائیم (پھیلنے نہیں پاتی) +

حرۃ غلوۃ بندہ میں تناؤ کم کرنے اور اگر ممکن ہو تو قلعہ گوردکنے کی غرض سے گہرا شکاف جلد دینا چاہئے + شکاف دینے کے بعد شیخ کی موجودگی کے عہد ساخت ماؤف ہائی نظر آتی ہیں اور رقیق مائی پیپ (مردۃ مائیہ) بہت نکلتی ہے + شکاف کے بعد مطہر عنولات کے ساتھ کمید جاری رکھی جاوے، حتیٰ کہ انکور نمودا ہو جاوے +

(ب) ابتدائی علاج - مقویات اور اغذیہ سے مریض کی طاقت قائم رکھی جائے + زود مضم وعمدہ غذا، اور کنگنہ رکونین + بہ افراط دی جائے۔ - بسغ ضعیفہ خضر آیزر اعلیٰ نصف درہم کی مقدار میں روزانہ تین چار بار دیا جاوے + یہ دورا ابتک اس مرض کے لیے ایک قسم کی تریاق خصوصی سمجھی جاتی ہے + اس دورا کے ساتھ نکلیات اور دیگر مہملات مادیہ جائیں تاکہ قبض نہ ہو + مفصل دفع کرویات عقدہ کی کثیر الاذراع ۱۰ سے ۱۵ مکعب سنتی میٹر کی مقدار میں زیر جلد پیکاری کے ذریعہ

۱۔ صمغ صیدہ، طعنہ آیزر اعلیٰ، ٹنگر فزانی، پیکوڈاؤٹو
۲۔ انٹی اسٹریپٹوکوک سیرم۔

۳۔ کثیر الاذراع - پالی ولسٹ - جس میں بہت سے اقسام جلد شیم کے شامل ہیں۔

۱۔ شحم ہائی راکتیول

۲۔ کبریت مہین رتیل۔

۳۔ محلول آبی - ایکو اس سویڈیشن

۴۔ ہائی جیٹلٹنس۔

جس قدر جلد ممکن ہو استعمال کیا جاوے۔ اور یہ مقدار دن میں ایک دو مرتبہ لگائی جائے۔ لیکن علاج بالفضل کے نتائج خلاف امید چنداں یقینی نہیں ثابت ہوئے +

خناق وبائی

خناق (خناق کلی) ایک متعدی مرض ہے جس میں یہ خصوصیت ہے کہ ایک قسم کی رطوبت یعنی مترشح ہوتی ہے جو مقام ماذت کے سطحی طباقوں کے ساتھ پیوستہ ہو جاتی ہے، اور جو ایک مخصوص قسم کے ستم الدم کا نتیجہ ہوتی ہے + عموماً اس مرض سے انشیہ مخاطیہ اور خصوصاً حلق و جگرہ اور جوف الفک کی جھلیاں متاثر ہو کر مبتلائے مرض ہوتی ہیں + گھسے اسکا حملہ کھلے ہوئے زخموں، جلد بدن، لحمہ چشم اور اعصاب تناسل پر بھی ہو جاتا ہے + یہ مرض "عصی خناق وبائی" سے پیدا ہوتا ہے، جو ایک غیر متحرک خوردبینی جراثیم ہے، جسکا طول تین صفیرہ (مائکرون) ہوتا ہے + یہ تمام معمولی زمینوں میں اگایا جاسکتا ہے، مگر مصل دم میں بہ سرعت اگتا ہے۔ نیزہ جراثیم مثبت ہے اور اکثر اہم ہمارے رنگ قبول کرتا ہے +

معطل میں خناق کی تشخیص بالخصوص اس بات پر منحصر ہے کہ مثبتہ رطوبت سے عصی خناق کی کشت اگائی جاسکے اور اس کشت میں اس مرض کے جراثیم خصوصی پائے جائیں + طریقہ امتحان جو عموماً مستعمل ہے حسب ذیل ہے۔

امتحان کے لئے ضروری سامان یہ ہے + اٹیوہ زرعیہ (کشیہ کی) جس میں

۱۔ خناق وبائی - ذنفیرہ۔	۱۔ ایک صفیرہ (مائکرون) فی میٹر کا ہزارواں حصہ
۲۔ عصی خناق وبائی - برسیس ذنفیری۔	۲۔ جراثیم مثبت - گرام پازیٹو۔
۳۔ اسکو عصی بکس (غریبی کہتے ہیں)	۳۔ معطل - سپورڈی۔
	۴۔ انڈوز زرعیہ - کلچر ٹیوب۔

مصل دم موجود ہو + عقیم یعنی پاک صاف رونی کا چھایا۔ ایک شیشہ کی استکانی نلی کے اندر رکھا ہوا + اگر حلق کا امتحان کرنا مقصود ہے تو مریض کو تیز روشنی میں پہنانا چاہئے + اگر مریض بچہ ہے تو اس کو مضبوط پکڑ لینا چاہئے + پہلے مریض کی زبان کو چیمہ یا زبان دبائے کے مخصوص آلہ رضا غلطہ لسان سے دبا کر رکھا جائے تاکہ حلق بخوبی نمایاں ہو جائے + پھر قبضہ مطہر کو بہ احتیاط و صفائی شیشہ کی نلی سے باہر نکال کر حلق کی کوئی نمایاں جھلی پر راگر موجود ہو + آہستہ سے نل دیا جائے + اب انبوبہ زرعیہ کی ڈاٹ کھو لکر اسی قبضہ کو در حلق کی جھلی کی رطوبت سے آلودہ کیا گیا ہے + انبوبہ کے اندر کے مصل دم کی سطح پر لکے سے پھر دیا جائے (تلیق) + پھر دونوں نلیوں میں ڈاٹ لگا دی جائے + اس کے بعد تلیق کردہ انبوبہ زرعیہ کو بارہ گھنٹہ تک آلودہ کر کے ۳۴ درجہ کی حرارت (صد درجائی) میں پیدا ہونے اور منہ پانے کے لئے رکھ دیا جائے + اور بارہ گھنٹہ کے بعد نکال کر اس کا امتحان کیا جائے + اگر عصی خانیہ موجود ہیں تو مصل دم کی سطح پر چھوٹی چھوٹی دھندلی سفید رنگ کی ذرا باریاں سطح سے جدا ادھری ہوتی نظر آئیں گی + قبضہ مطہر کو حلق کی رطوبت سے آلودہ کرنے کے بعد فوراً ہی اوس کی پرتیں خشاوہ شفاف کانچ کے ٹکڑے (صفیحہ مجہریہ) پر براہ راست لیکر اور اذکورہ رنگ کر ہی خوردبینی امتحان کر سکتے ہیں + چونکہ یہ مرض نہایت متعدی خطرناک ہے لہذا مریض کے حلق کے امتحان وغیرہ کے وقت طبیب کو لازم ہے کہ سخت احتیاط برتے اور ہوشیار رہے کہ دوران امتحان میں مریض اوس کے منہ پر نہ کھائے اور مریض کے حلق کی رطوبت اور جھلی اوس کو آلودہ نہ کر دے +

۳۴ آلودہ صاف۔ اکیو بیٹ

۳۵ صد درجائی بسنی گریڈ

۳۶ عشاوہ۔ فلم

۳۷ صفیحہ مجہریہ۔ اسکاٹلڈ

۳۸ مصل دم۔ بلڈ سیرم

۳۹ شیشہ کی استکانی نلی۔ ٹسٹ ٹیوب

۴۰ رضا غلطہ لسان۔ ٹنگ ڈپر سر

مرغن خناق کی خطرناک خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ اس کے جراثیم تقریباً ہمیشہ ایک خاص مقام پر محدود رہتے ہیں لیکن خناتی ٹمپن غلن میں جذب ہو جاتے ہیں یہ سمین غیر قلوی رخارج از خلیۃ ہوتے ہیں، اور نہ صرف بجا پیدا کرتے ہیں بلکہ اعصاب محرکہ پر شدید دنیاں اثر کر کے استرخاء پیدا کر دیتے ہیں + استرخاء کا اثر علی العموم تالو خانہ چشم و آنکھ کے عضلات پر نمایاں ہوتا ہے، مگر دھڑ اور اطراف کے عضلات بھی گاہے متاثر ہو جاتے ہیں + ضعف قلب ہی عام غور سے پیدا ہو جاتا ہے جبکہ باعث کچھ تو عضلات قلب کا تحلیل و ناسد ہے اور کچھ اعصاب راجع کا متاثر ہونے سے سمین خناق گردوں پر بہی بڑا اثر رکھتے ہیں جس سے عموماً بول زلانی کی شکایت ہو جاتی ہے +

خنات خلق
خنات حجرہ

کا بیان امر اصل خلق و حجرہ کے باب میں درج ہوگا +

علاج - نہایت ضروری بات یہ ہے کہ خنات کے متصل عند سمین کو ۲۰۰۰ سے ۵۰۰۰۰ آٹھاؤ کی مقدار میں استعمال کیا جائے + اس کا راجع آحاد و ضد سمین کی اس مقدار کا نام ہے جو ۲۵۰ گرام وزن کے مصرعی خرگوش میں بطور پیکاری کے داخل کی جائے۔ تو معینہ معیاد کے سمین کی جس قبیل ترین خداک سے حیوان مذکور پاک ہو سکتا ہے۔ اس سے سو گنی مقدار کو دبے ضرب بنا دے +

علاوہ مذکورہ بالا متصل عند سمین ارتیا قین کے استعمال کے، مقامی طہرات

۱ مل آحاد - یونیش	۱ مل خناتی سمین - ذوقیہ یا کسین
۱ مل گرام تقریباً ۱۰۰ رقی یا سولہ قحہ ۱۵۰	۱ مل غیر قلوی غلیظہ سے باہر از ذاکسین
گرام - تقریباً ۲۱ ذر	۱ مل عصب راجع - وگیس زرد
۱ مل خرگوش مصری - گیسوئی پگ	۱ مل بول زلانی - ابوی خریا

اور ذائقہ تفتن ادویہ کا استعمال کرنا چاہئے۔ خناق جھجھہ میں جبکہ خناتی حلی کے باعث اسناد ہو کر وقت تفتن واقع ہو جائے تو عمل جراحی کے ذریعہ قصبہ ریبہ کو کھول کر اس کے اندر تالی رکھی جاتی ہے تاکہ سانس جاری رہے۔ اور اس کے اسناد سے دم نہ گھٹ جائے۔

کزاز۔ طاطاش

کزاز یا طاطاش ایک مقامی متعدی مرض ہے، جو عصی کزازیدہ کے باعث پیدا ہو جاتا ہے اور جس کے ساتھ ایک مخصوص قسم کا تسم الدم بھی ہوتا ہے۔ عصی مذکورہ اور اونکے ابزار نہایت وسعت رکھتے ہیں اور اس قدر عام ہیں کہ تقریباً ہر قسم کی مرز و عنہ زمین، کھیتوں اور باغوں کی مٹی میں پائے جاتے ہیں۔ یہ مزدوروں اور ہاتھ سے کام کرنے والوں کے ہاتھ کے میل اور گندگی میں، اور سیسے آلات جراحیہ میں بھی پائے گئے ہیں۔ انکو جدا کرنے میں بہت سخت مشکلات کا سامنا ہوا، مگر بالآخر دو محققوں نے عصی کزازیدہ کو پیپ کے اندر سے اس طرح جدا کر لیا کہ عصفی زخم کے اندر سے پہلے پیپ نکال کر اسکو ایک گھنٹہ تک ۸۰ درجہ رصد درجاتی کی حرارت پہنچائی جس سے تمام معمولی جراثیم صمد یہ ہلاک ہو گئے اور صرف یہ جراثیم باقی رہ گئے (کیونکہ یہ اتنی کم حرارت سے متاثر نہیں ہوتے)۔ یہ سید سے نازک فندوں کی صورت میں ہوتے ہیں، جب کبھی کبھی لمبے تاگوں کی وضع میں برعکس ہوتے ہیں۔ یہ جراثیم نہایت کچے لائوئی مزاج کے ہوتے ہیں۔ اور اگر ذرا سیٹیم (حمضین) ہی موجود ہو تو یہ بڑھنا بند کر دیتے ہیں، عموماً انکی مصنوعی کشتیں

۱۔ طاطاش رٹے (نس) نقطہ طاطاش بڑی اہل

۲۔ محقق کو لیور اور محقق کتا سیتو۔

۳۔ لائوئی۔ ان ایرومیز

۴۔ جلا استعمال ملی چین جیلانی نے شرح قانون میں لکھا ہے۔

۵۔ حمضین۔ ایکسی جن۔

۶۔ عصی کزازیدہ۔ بیسیس رٹے نس۔

ایسی ہوا میں آگائی جاتی ہیں جس میں ماین یا شورین کے بخارات شامل ہوں + ان جراثیم کے بڑھنے سے ریح و بخارات نہیں پیدا ہوتے + انکے اندر (بذر) مخصوص صورت کے، تقریباً گول ہوتے ہیں جو عصی کے ایک کنارہ پر رہتے ہیں + اسی وجہ سے کرازی عصی کی صورت مرقۃ البطیل (دھنسل کے ڈنڈے) سے مشابہ ہوتی ہے۔ اور یہ زخموں کی پیپ اور مصنوعی کاشتوں (ردوئوں) میں دکھائی دیتے ہیں + یہ جراثیم طریقہ جراثیم سے رنگ قبول کر لیتے ہیں اور ان میں بکثرت اہانت ہوتے ہیں + یہ جراثیم بذاتہ زبردست طبعی نہیں ہوتے، اور جب انھیں انکے سین سے ہتھامہ جدا کر لیا جائے تو اکثر یہ غذائی پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوتے، حتیٰ کہ اگر انھیں اسی خالص صورت میں ذی استعداد حیوانات کے اندر بکپکاری سے داخل کر دیا جائے تو یہی اکثر لے کر ماری نہیں پیدا ہوتا + مگر سین کی نہایت خفیف ترین مقدار بھی موجود ہو تو اس کے اثر سے گرد و پیش کی ساختوں کی قوت حیوانیہ اس قدر پست ہو جاتی ہے کہ جراثیم اپنی افزائش و پیدائش جاری کر دیتے ہیں اور مزید سمین بناتے جلتے ہیں +

اسباب - عصی کماذیہ جو مرض طاعان (کرازی) کا خاص سبب ہے، از قسم جراثیم عفتہ اختیاریہ ہے، یعنی وہ خارج از جسم نشوونما کی قابلیت رکھتا ہے، اور تقریباً ہمیشہ باغوں کی زمین - مہبل کے کچرے اور دیگر امتام کی گندگی، اور خاک وصول میں پایا جاتا ہے + لہذا وہ اشخاص جو زمین اور گرد و غبار سے دوچار ہوتے رہتے ہیں مثلاً کھیتوں میں کام کرنے والے مزدور، اور حبشی وغیرہ، ان سب کو یہ مرض لاحق ہو جانے کا بہت امکان ہے، کیونکہ یہ لوگ اس مرض کی سمیت سے ہمیشہ متصل رکھتے ہیں + گھوڑے ہی اس مرض سے متاثر ہونے کی مخصوص استعداد رکھتے

۱۔ لائڈر دجن ۲۔ اسٹروجن -

۳۔ فنیسی - پیراسانک -

۴۔ طریقہ جراثیم مگر ام سے عفتہ مسئلہ باب غلام

۵۔ جراثیم عفتہ اختیاریہ - ٹیکٹک ٹوپہ و فاسٹ -

ہیں اور عصی کرازیہ گھوڑوں کی پید میں عموماً موجود رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسٹبل کے ملازمین اور دیگر اشخاص جنگو گھوڑوں سے واسطہ نہ رہتا ہے طاعان کے مرض سے نسبتاً زیادہ تعداد میں دیکھے جاتے ہیں + یہ مرض ہندوستان جیسے ممالک حارہ میں بہ نسبت دیگر ممالک کے زیادہ پایا جاتا ہے + اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ حرارت انکی افزائش و پیدائش اور ازادیا و سمیت میں معاون ہوتی ہے +

کسی قسم کے زخم و جراحہ کی موجودگی (مریض کرازیں) تقریباً ہمیشہ پائی جاتی ہے اور یہ زخم عموماً میلا پٹا ہوا نامہوار کناروں کا یا چھدا ہوا دونوں اراکے سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اس میں عموماً پیپ موجود ہوتی ہے + خواہ زخم بے کسی حصہ میں ہو، مگر غالباً وہ حصہ جو زمین سے گتے رہتے ہیں (مثلاً پاؤں کے ٹوے، ہاتھوں کی پٹلی) اکثر اس سے متاثر ہوا کرتے ہیں + شاہراہ عام کے خطرناک حادثات (خصوصاً سڑکوں پر گاڑی اور گھوڑے کے حادثات) کے بعد اس مرض کے پیدا ہوجانے کا بہت اندیشہ ہوا کرتا ہے +

جراحہ کے باعث ساختوں کے چھلنے پھٹنے اور کھل جانے کے باعث اونکی قوت حیوانیہ کا پست ہوجانا، پھر جراثیم صدیدیہ کی پیدائش کے بعد ساختوں میں لٹخ کا پیدا ہونا، اور جراثیم صدیدیہ کا حمضین کی موجودہ مقدار کو جذب کر لینا اور اونکے اس عمل سے مقام مافوف میں ایک کیفیت لاہوائی کا طاری ہوجانا، یہ سب اسباب بالا جتمع عصی کرازیہ کے نشوونما کا باعث ہوجاتے ہیں + چنانچہ جب کبھی زخموں اور جراحات کو مظہر حالت میں رکھا گیا ہو اور جبکہ عمل انتقام بہ سرعت درجہ تکمیل پہنچا تو طاعان ایسے زخموں پر اثر نہیں کرتا + اسی طرح یہ مرض اور وقت ہی عموماً پیدا نہیں ہو سکتا (اگرچہ شافو نادہ ہی ہو سکتا ہے) جبکہ چوٹ کے بعد جلد بن صحیح و سالم ہو

علم لذخ - اری ٹیشن -

جیسے کہ رض (کچلنا) اور کمٹم کے بعد + ہندوق کے زخم جو بغیر گولی کے محض خالی کارتوس (فشکہ) کے باعث ہوں، انکے بعد بھی اکثر طاعان (دکان) نمودار ہو جاتا ہے + اسکا سبب یہ ہے کہ خالی کارتوس کا زخم زیادہ تر کارتوس کے بھراؤ (حشو) سے پیدا ہوتا ہے اور یہ بھراؤ گھوٹے کے سخت بالوں کے منہ سے بنا ہوا ہوتا ہے جس میں عصی کرازیہ کے اندے موجود رہنے کا امکان ہوتا ہے + تجارتی معنی بازاری سریش (غری) جو گھوٹے وغیرہ کے کپڑوں سے نکالا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی اکثر عصی کرازیہ ہوتے ہیں اور جب اسکا استعمال پکاری کے ذریعہ مرض اُورسٹما میں کیا جاتا ہے تو اس مریض میں طاعان کے نمودار ہو جانے کا احتمال ہوتا ہے +

ماہیت مرض۔ علم الامراض میں مرض طاعان اس مقامی مذدی کی بہترین مثال ہے جس میں عام ستم الدم ہی ساتھ ساتھ موجود ہوتا ہے + عصی طاعانیہ (کرازیہ) خود تو زخم کے گرد و نواح میں مستحکم ہو کر محدود رہتے ہیں اور سیلان خون کے اندر داخل نہیں ہوتے، نہ دور دراز کے مقامات تک پہنچتے ہیں + لیکن سین جو مقام اُورسٹما میں بنجاستے ہیں ایک مخصوص طریقہ سے عصی مراکز کے خلیات پر اثر کرتے ہیں جو ہر کچلے (اشے) سے مشابہ ہوتا ہے + لیکن سین طاعانی (کرازی) کی جو ایک نہایت غیر معمولی اور درخصو صیت ہے اور جو دیگر اقسام کے مددی میں نہیں پائی جاتی وہ یہ ہے کہ طاعان کے سین مقام مرض (زخم وغیرہ) سے داغ

ملا رض۔ بلو۔	ملا اور سما۔ ام الدم (اور زخم)
ملا کمٹم (دود) مادی چٹ بغیر جلدی تفرق اقبال	اور سما بر نانی تفرق ملاح ہے جو تمام کتب طبیہ میں موجود ہے۔
ملا فشکہ۔ کارتوس۔ کار بروج۔	ملا جہر کچل (انداماتین) اسٹرکٹین۔
ملا غری۔ سرین۔ جیلاٹین۔	

دشخاع تک خون کی راہ سے نہیں بلکہ ایک عجیب و غریب طریقہ سے پہنچتے ہیں یعنی وہ خود اعصاب میں سے گزر کر دماغ دشخاع تک پہنچ جاتے ہیں جیسا کہ اندازہ کیا گیا ہے۔ اس نظریہ کے ثبوت میں ایک دو شہادتیں پیش کی گئی ہیں جو درج کی جاتی ہیں:-

(۱) سین طاطاشی (کرازی) کی ایک نہایت خفیف مقدار بھی اگر براہ راست کسی حیوان کے عصب میں پکپکاری سے داخل کر دی جاوے تو طاطاش کامرض اوس حیوان میں پیدا ہو جاتا ہے، دراصل ایک اگر سین کی اوس سے چار یا پانچ گنی مقدار بھی کسی عضلہ کے اندر لگائی جاوے تو اوس حیوان میں یہ مرض نہیں پیدا ہو سکتا (۲) لیکن اگر عصب کو پکپکاری (تقیق) کے مقام اور مرکز عصبیہ کے درمیان میں کہیں سے قطع کر دیا جاوے تو تشنج رک جاتا ہے یا بالکل پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اس بات سے یہ بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ طاطاش (کرازی) کے لئے گذشتہ زمانہ میں عصب کو کھینچنے یا قطع کرنے کا جو عمل رائج تھا اوس سے کیونکر بعض اوقات مفید نتائج حاصل ہو جاتے تھے۔ (۳) مزید برآں، سین کی موجودگی خود اعصاب میں دیکھی جاسکتی ہے کیونکہ اگر اس سین کو کسی ذی استعداد حیوان میں پکپکاری کے ذریعہ داخل کیا جاوے تو اوس میں طاطاش کا مرض پیدا ہو جاتا ہے بعد الموت تشریحی تغیرات کوئی خاص امتیازی خصوصیت نہیں رکھتے۔ عضلات اکثر زرد پڑ جاتے ہیں، یا ان میں ترقق (روٹ جلنے) یا رگوں سے خون باہر پھوٹ پڑنے کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ انتہائی اعصاب جو زخم سے باہر پھپھتے ہیں، کچھ فاصلہ تک سرخ اور متلی (خون سے بھرے ہوئے) ہوتے ہیں۔ اسکا باعث التهاب صمدی ہو سکتا ہے کیونکہ کرازی سین عصب

پر کوئی میچ اثر نہیں رکھتے اور عصب میں کوئی نمایاں اثر نہیں پیدا کرتے۔
مراکز اعصاب میں اکثر مقامات پر لیونٹ (نرعی) پانی جاتی ہے، عروق کے
گرد شش خلیات سے جہتاً مراد ہوتا ہے، اور قدرے احتقان دموی ہی
دخصوصاً اوسط دماغ اور مبداء النخاع میں پایا جاتا ہے۔ نیز تغیرات فساد نخاع
کے خلیات عقدیہ میں نظر آتے ہیں۔

علامات مرضیہ

(الف) طاطائش حادہ (کرنز حاد) یہ مرض انگلستان میں اکثر مدوی کے بعد دو
یا تین ہفتے میں نمودار ہو جاتا ہے، اگر دیگر مالک میں مدوی کے چند دنوں یا گھنٹوں
میں پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ زخم جس کے باعث مرض طاطائش پیدا ہو جاتا ہے
اکثر پیپ دار ہوتا ہے اور گندہ اور غیر مندل دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر مدوی
تاخیر کے ساتھ پیدا ہو تو یہ زخم مندل ہی ہو جاتا ہے۔ شروع میں مریض عموماً است
کی شکایت کرتا ہے کہ منہ کھولنے میں دقت ہوتی ہے، جس کے ساتھ گردن اور
چبانے کے عضلات (عضلات مضغیہ) میں دردناک اینٹن محسوس ہوتی ہے۔
جلدی یہ اینٹن اس قدر شدید اور نمایاں ہو جاتی ہے (اور جبڑوں میں اس قدر سخت
کھینچاؤ ہو جاتا ہے) کہ دو انتوں کے درمیان پتلا کاغذ کاٹنے کا چاقو تک نہیں سلیا
جاسکتا۔ جبڑا بیٹھ جانا، کھانا، آشامک (اور کھانا کھانے میں سخت تکلیف ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ گردن کی پشت (گڈی) اور چہرہ کے عضلات بھی اینٹہ کر جکڑ جاتے
ہیں جس کے باعث چہرہ میں ہنسی کی سی ایک عجیب ہیئت (حالتِ خنک) نظر

علامت مراکز اعصاب۔ زرد سنہرز۔	علامت خلیات عقدیہ۔ گنگھیں سیلا
علامت شش خلیات۔ سیلوراز گرد ویش۔	علامت طاطائش حادہ۔ کیوٹ ٹے ٹے۔
علامت اوسط دماغ۔ پائز۔	علامت کراز الفک۔ ٹرسس۔
علامت مبداء النخاع۔ میڈلا۔	علامت حالت خنک۔ سلیا مسسار ڈوئی کس

آئے لگتی ہے + طلق کے عضلات میں تشنج ہونے کے باعث ننگے میں اکثر تکلیف ہوتی ہے (عشر بلج) + عموماً بخار بہت تیز ہوتا ہے، مگر بعض مریضوں میں تقریباً آخر دم تک بخار نہیں ہوتا + جلد ہی دھڑ اور اطراف (بنا تھپانوس) تک تشنج کا اثر ہو جاتا ہے اور درد اور انہیٹن پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ تشنج کے نہایت شدید اور دردناک دورے آنے لگتے ہیں اور اونکا درمیانی وقفہ محض عارضی اور ادھورا ہو جاتا ہے + اس مرض میں عضلات تنفس ہی اکثر گرفتار رہتا ہے تشنج ہو جاتے ہیں۔ مگر خوش قسمتی سے یہ حالت مرض کی انتہائی حالت میں پیدا ہوتی ہے + شدید تشنج کے دورے خفیف اور ہر دم کی تحریک متنبہ سے پیدا ہونے لگتے ہیں، مثلاً دروازہ کا پٹ بند ہونا، سر دھوا کا جھونکا لگنا، یا کوئی اختیاری حرکت کن + یہ تشنج ہمیشہ مستوی شدت کا ہوتا ہے یعنی عضلات اکڑ جاتے ہیں اور پھر ڈھیلے نہیں ہوتے (تشنج مستمر) + بدن سکڑ کر مختلف وضع میں اکڑ جاتا ہے، اور سینہ اکڑ جانے کے باعث تنفس میں رکاؤ پیش آتی ہے + گاہے جسم اکڑ کر بصورت کمان پشت کے جانب خمیدہ ہو جاتا ہے رکنائڈ خلفی (اسکا باعث یہ ہے کہ پشت کے عضلات اکڑ کر کچ جاتے ہیں اور شکم کے دونوں عضلات مستقیمہ میں تناؤ ہو کر وہ تختہ کے مانند سخت ہو جاتے ہیں) گاہے جسم سامنے کی طرف خمیدہ ہو جاتا ہے (رکنائڈ مقدم) اور شاذ و نادر جسم دائیں یا بائیں جانب کو بھی خمیدہ ہوتا ہے (رکنائڈ جانبی) + کبھی عضلات مستقیمہ منحنی کے ساتھ سکڑتے ہیں کہ اونکی لمبی ساخت ٹوٹ جاتی ہے (رکنائڈ لیٹی)

۱۔ کراڑ مقدم۔ امپر استھوٹوس

۲۔ کراڑ جانبی۔ پلیورک استھوٹوس

۳۔ تشنج مستمر ٹائیک کنٹرکشن۔

۴۔ کراڑ خلفی۔ ادپر استھوٹوس۔

۵۔ عضلات مستقیمہ رکنائی ایلو می نس۔

اور دانت ٹٹ جاتے ہیں اور زبان کٹ کر قریب قریب الگ ہو جاتی ہے +
 شعور و قوی ذہنیہ آخر تک صحیح رہتے ہیں + ہلاکت عموماً تشنج کے دوروں کے تھکان
 + ضعف قوی سے یا شاذ و نادر انقباض عضلات سینہ کے باعث اعتناق روم گھٹنے
 سے ہوتی ہے + موت سے پہلے کبھی حرارت ۱۰۸ یا ۱۱۲ درجہ درمقیاس مروج ایک
 چورچ جاتی ہے اور اکثر مرنے کے بعد ہی ایک یا دو درجہ زیادہ تک اور بڑھتی
 رہتی ہے + اس قسم کی شدت حرارت بالخصوص مسلسل انقباض عضلات کے
 باعث ہو جاتی ہے + بدن پسینہ سے شرابور ہو جاتا ہے، پیشاب کم مقدار میں
 آتا ہے اور گاہے بول زلالی ہوتا ہے + موت ابتداء مرض سے چوبیس گھنٹے
 کے اندر یا چار پانچ دن کے وقفہ کے بعد ہی ہو سکتی ہے +

(دب) طاطانس (کرزاز) مرنے سے بعد دوئی کے بعد بتا زیادہ وقفہ کے
 بعد نمودار ہوتا ہے، اس کی علامات نسبتاً لمبی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد شفا کا
 امکان ہی زیادہ ہوتا ہے + دوران مرض میں عموماً بخار ہوتا ہے اور تشنج کے دورے
 ادنیٰ عضوں میں محدود رہتے ہیں جہاں سے عدوی پیدا ہوا ہے مگر یہ دورے مام
 اعضاء جسم میں ہی ہو سکتے ہیں + گاہے جبکہ مریض مرت صاحب فراش ہوتا ہے
 اور اس کے جڑے تمام تر نہیں بلکہ جزوی طور سے ٹٹ جاتے ہیں اور گردن، پشت،
 اور شکم کے عضلات میں ٹھنک سختی (صلابت) ہوتی ہے مگر اندر اس مرض کا خصری
 تشنج نہیں پایا جاتا +

(ج) طاطانس اسی یا طاطانس شتر خانی۔ یہ ایک مخصوص غیر معمولی قسم ہے
 جو ان حصص جسم کی جراحات کے بعد پیدا ہو جاتی ہے جن میں اعصاب دماغیہ

۱۔ طاطانس راسی۔ کیفیلوٹے ٹٹے۔
 ۲۔ طاطانس شتر خانی۔ پیرالائی ٹٹے۔

۱۔ مقیاس مروج۔ خاں انٹ ترمیمز۔
 ۲۔ صلابت۔ ری جی ڈیٹی۔

قاعدۃ الاراس کے سوراخوں سے باہر نکلنے کے بعد پھیلنے اور منتشر ہوتے ہیں خصوصاً چشم خانہ کے بالائی حاشیہ کے آس پاس کی جراحت کے بعد یہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے + اس کے نمایاں خصائص یہ ہیں کہ عضلات ماضغہ کے تشنج کے ساتھ جس طرف جراحت پہنچی ہے اس جانب چہرہ میں استرخاء (لغوه) بھی ہو جاتا ہے + ابتداءً تو مرض کی تصویر صرف اسی قدر نمایاں ہوتی ہے اور مریض اس قابل ہوتا ہے کہ خود چکر طیب کے پاس جاسکتا ہے + لیکن بعد ازاں جسم کے دیگر اعضاء اور حصوں میں بھی ذہنی معمولی تشنج کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور دیگر اعصاب دماغیہ میں بھی استرخاء ہو جاتا ہے اور خصوصاً عصب سیم رنجرک (مقلد) متاثر ہو جاتا ہے جس کے باعث غل ٹنودار ہو جاتا ہے + بعض اوقات عضلات بلع رنگنے کے عضلات) میں تشنج ہو جاتا ہے اور ہنایت جوش کے ساتھ جنون و شور یہ دوسری کے دورے آنے لگتے ہیں + اسی باعث اکثر اس مرض کو کڑا زکلی ہی کہا کرتے ہیں +

تشخیص۔ ابتدائی درجوں میں طاطانس (کرناڑ) کو ایسے کرناڑ کی (جبرائیلینا) سے
فرق کرنا چاہئے، جو دانتوں کے اندر ورتیج رشتہ ہاٹھل اسنان وغیرہ سے) یا کپٹی
اور جبرے کے جڑ جانے سے، پیدا ہو گئی ہو۔ یہ شناخت نہایت آسانی سے یوں
ہو سکتی ہے کہ طاطانس کی حالت میں گردن کے عضلات میں بھی صلابت ہوتی ہے۔
سمیت کچھلے سے ہی ایک سلسلہ علامات پیدا ہو جاتا ہے جو طاطانس سے بہت
مشابہ ہوتا ہے، مگر اس میں انقباض نسبتاً زیادہ ناگہانی اور تند ہوتا ہے، اور
انقباضی دوروں (رتیج) کے درمیانی وقفہ میں عضلات اسقدر پورے طور پر ڈھیلے

مگ جنوں سے نپا۔

ملا کر از کبھی ٹٹے ٹٹے نس اینیڈ مد فوبی ہں۔

۱۰ تنخ ستر. تاک اسپیزم۔

مط. حوال. اسٹریٹس بمیں۔

اور ملائم ہو جاتے ہیں کہ سُنہ نہایت آسانی سے کھل سکتا ہے + علاوہ ازیں ہاتھ
بھی تشنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو کہ طاعان میں نہایت غیر معمولی بات ہے +
اسی طرح چبھنے کے فعل میں جو عضلات کام میں آتے ہیں وہ اکثر تشنج میں مبتلا نہیں
ہوتے در آنحالیکہ طاعان میں ان پر خصوصی اثر ہوتا ہے +

کَلْبُ (فَرْغُ اَمَاء) سے طاعان رکناز (کو تیز کرنے میں کچھ ہی وقت نہیں
ہوتی چاہئے، کیونکہ کلب میں انقباض (تشنج) بالکل متعادل نوعیت کا یعنی ارتجائی
ہوتا ہے تشنج ارتجائی میں عضلات انقباض کے بعد بالکل ڈھیلے اور ملائم پڑ جاتے
ہیں، پہر کسی وقفہ کے بعد شکر آتے ہیں) در آنحالیکہ طاعان میں عضلات کا
انقباض مسلسل قائم رہتا ہے اور در میان میں ڈھیلپن نہیں ہوتا + علاوہ ازیں
کلب کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس میں عضلات تنفس اور عضلات ازد وادیہ میں
تشنج و انقباض ہوتا ہے، نیز پیدائشِ مرض کا واضح اور مخصوص سبب رکھتا ہے
یا جانور کا کائنا (ہوتا ہے) علاوہ ازیں دماغی خلل (ادھام) اور خیالاتِ باطلہ
بہت ابتداء میں پیدا ہو جاتے ہیں اور عضلات کا انقباض مسلسل نہیں
رہتا +

تجربہ گاہ (محل) میں مخصوص طریقوں کے ذریعہ سے طاعان کی تشخیص کی
ضرورت اس وقت تو عموماً لاحق نہیں ہوتی جبکہ مرض صاف طور پر نمایاں ہو گیا ہو
لیکن جب کہی تشخیص میں شبہ ہو تو امتحان کا بہترین طریقہ وہی ہے جو درج
ذیل ہے :-

زخم کے گہرے حصہ میں سے قدرے مواد درطوبت لیکر اسے شوربہ رنگینی (ملاکر

ملے تشنج ارتجائی - کلونک کنولوشن
ملے خیالاتِ باطلہ سے یورسی نے شون -

ملے شوربہ - بخنی - براتھ

رقيق کرلو + پھر اسکو دو حصوں میں تقسیم کر دو + اس میں کا ایک حصہ تو کسی چوبے یا آرنب مصری کے جسم میں (تلیق کے ذریعہ) داخل کر دو، اور دوسرے حصے میں مصل دافع طامانس (تریاقین کرازی) بقدر عابوند کے ملا کر اس مخلوط سیال کو ایک دوسرے جانور کے جسم میں تلیق کر دو + اگر پہلے جانور میں تلیق کے بغیر طامانس کا مرض پیدا ہو جاوے اور دوسرا جانور صحیح و سالم اور محفوظ رہے تو مریض میں طامانس کا ہونا متیقن طور پر ثابت ہوگا +

(نذر - ہر حالت میں نتیجہ خراب (مہلک) ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اگر حقد زیادہ مدت تک طامانس رہے اور حرارت جتنی کم ہو - اوسقدر امکان شفاء متاثر لیکن اگر ابتداء مرض شدید (حاد) علامات کے ساتھ ہوتی ہو، بخار بہت شدت کا ہو بے خرابی ہو، اور ہیزان اور رخل (بھینگا پن) موجود ہو تو یہ علامات خطرناک ہیں + عرووی ہونے کے بعد مرض کے ظاہر ہونے کی مدت (زمنانہ حضانہ) کا طول ہی ایک بنایت اہم اثر رکھتا ہے، کیونکہ جن مریضوں میں مصل دافع کرازی (تریاقین طامانس) کی تلیق ہی کر دی گئی ہو اور ان کی مدت حضانہ دس دن سے کم ہو، تو یہی ان میں اموات کا اوسط، ان مریضوں کے نسبت جن میں مرض زیادہ عرصہ کے بعد ظاہر ہوا ہو، کم از کم ۲۰ فی صدی زیادہ ہوتا ہے + یعنی جس قدمت حضانہ کم ہوگی اوسقدر مرض کا نتیجہ زیادہ خطرناک ہونے کا اندیشہ ہے +

علاج - حفظ ماتقدم - جن مقامات میں طامانس (کرازی) کا زیادہ زور پایا جاتا وہاں مناسب ہے کہ جب زخموں میں عرووی کا لگان ہو تو فوراً بغرض احتیاط تریاقین طامانس کی تلیق حفظ ماتقدم کی غرض سے کر دی جائے + خصوصاً جبکہ

علاج مصل دافع طامانس - اینٹی ٹیٹیک سیرم + تریاقین کرازی - ٹیٹیک - اینٹی ٹاکسین
ماتر حضانہ (مدت تغریخ) پیرڈ آف انکیوبیشن۔

شاہراہ عام پر کسی حادثہ کے باعث چوٹ پہونچی ہو یا جب زخم کے گہرے حصوں کے مواد اور کھرجن (حکا کہ) کا غد دہنی امتحان کرنے سے مشتبہ مٹم کے جراثیم دیکھے جائیں، تو تریاقین (ضد سین کزازی) کی تبلیغ کر دینا عین مصلحت ہے۔ تریاقین کی مقدار ایک سے پانچ سنتی میٹر سے زائد دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مرض ظاہر ہو گیا ہو تو اصلی زخم دہاں سے عدویٰ ہوا ہو) کو آزادی کے ساتھ کاٹ کر نکال دیا جائے اور پھر تیز جلانے والی ادویہ لگا دی جائیں۔ یا پورے عضو کو قطع کر دینا چاہئے۔ لیکن بائینہ ممکن ہے کہ تشنج کے دورے جاری رہیں اور ہلاکت پیدا کر دیں۔ کیونکہ سین کی خاصی مقدار نظام جسم میں پہلے ہی سے داخل ہو چکی ہے۔

مندرجہ بالا مقامی علاج کے علاوہ طاطانس کی نوعی تریاقین کسی مینع و مضع (مناعت پیدا کردہ) جانور کے مصل دم سے طیار کی ہوئی) جبکہ مفصل بیان علم الجراثیم کے باب میں درج ہو چکا ہے) پچکاری کے ذریعہ مریض کے جسم میں داخل کی جائے۔ یہ تریاقین محض خالص دافع سین ہے اور عصی کزازیہ کے نشور نما کو نہیں روک سکتی ہے۔ لہذا عصی کزازیہ کے دافعہ ہلاکت کے لیے مقامی ہجوم بیضیات یا دوسری مٹم کے مناعت پیدا کرنے والے عملیات سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ تریاقین کے استعمال سے وہی سین جو دوران خون میں موجود ہیں فوراً بے ضرر یا ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ سین طاطانس، اعصاب کی راہ سے پھیلتے ہیں اور مراکز اعصاب کے مادہ حیات سے فوراً ملحق ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اکثر

مٹا کھرجن۔ اسکو پنگ۔

مٹا مینع۔ امیونائزڈ۔

مٹا نوعی تریاقین۔ اسے سے نکم
اینٹی ٹاکسین

مٹا ہجوم بیضیات۔ فیکورسانی ٹوکس

تربا قین طاطاس کا قائمہ یقینی اور اُمید افزا نہیں پایا جاتا + ابتداً تربا قین ہمیشہ بہت زیادہ مقدار میں دینا چاہئے، بعد ازاں کم مقدار کی پککاریاں ہر روز ایک یا دو مرتبہ لگانا چاہئے + جس قدر مرض کی علامات زیادہ شدید ہوں اسی قدر تربا قین زیادہ مقدار میں دینا چاہئے + بہتر ہے کہ پہلی پککاری کی مقدار ۲۰ سے ۳۰ مکعب سنتی میٹر کی ہو جو تحت الجلد دی جائے، اس کے بعد اسے ۱۵ دن میں دو مرتبہ دی جائے + مگر اس سے بھی بہتر یہ طریقہ ہے کہ نسبتاً کچھ مقدار کی پککاری دریدی دی جائے یا کمر میں چھید کر آم جافیہ کی نیچے کی خلا میں داخل کی جاوے، اندرون دماغ کی پککاری جو پہلے رانج تھی اس کے خطرات کے باعث اب ترک ہے، لیکن احشاکل عصبی (عصب کے اندر پککاری) کے ذریعہ تربا قین دیگر سین کے اوپر جانے کا راستہ مسدود کر دینا کسی طرح قابلِ اِزام نہیں ہے +

ایک اور طریقہ علاج ایک محقق نے بتایا ہے جس کے نتائج علاج تربا قین کے نسبت یقینی طور پر بہتر معلوم ہوئے ہیں + وہ یہ ہے کہ حامض قطرائی کا پتال (۲ فیصدی) اسے ۵۰ قطرے تحت الجلد پککاری سے دن میں دو یا تین مرتبہ داخل کیا جائے + اس دوا کا طریقہ عمل اگرچہ نامعلوم ہے، مگر مفید نتائج ضرور ظاہر ہوئے ہیں +

مریض کو بالکل آرام و سکون کے ساتھ اندھیرے کمرے میں لگا جائے اور التیج و انتظار اور ہر قسم کی تحریک و توجہ کو جس سے کہ تشنج پیدا ہو سکتا ہے) مسدود کر دیا جائے +

تشیج کے دورے کم کرنے یا قطعی روکنے کے لئے مہتر مغلل مغنیس کبریت گہن مفید ہے، جو تحت الجلد پککاری سے یا بزل قطنی کے ذریعہ اندرونِ فضا میں آم جافیہ

علیٰ زرد و مکشکین علیٰ محقق باسیلی
مغنیس کبریت گہن سینٹر لیفٹ

مغلل قطنی - سبر پکچر

میں دیا جاسکتا ہے + اس کے اثر سے اعصاب کے خلیات محرک کا انتشار و بھجان کم ہو جاتا ہے مگر سینکڑاں لٹی پر خواہ یہ خلیات کے اندر جو یا آزاد ہو کئی اثر نہیں ہوتا + مقدار زیر جلد پھکاسی کے لئے ۱۰ فی صدی محلول کی ۱۰ سے ۲۰ مکعب سنتی میٹر ہر چار گھنٹہ کے بعد + لیکن احتقان اندرون شام کے لئے ۲۵ فی صدی محلول ۲ سے ۴ مکعب سنتی میٹر روزانہ دینی چاہئے جس سے کسی قسم کا مضراثر نہیں پیدا ہوتا + تشنج روکنے کے لئے نل اختر بھی لگھا سکتے ہیں + اینون + اخضرال + مگین + شکاریہ + عن آمیز + اختر خلون + لوبیہ کالا یا کورارا وغیرہ بھی معینہ ظاہر کی گئی ہیں + مگر ان کے استعمال سے جن مریضوں میں قائمہ پہونچا ہے غالباً وہ بغیر ان دواؤں کے ہی شفا پاتا ہو جاتے +

غذا سادہ، رفیق، طاقہ بخش، اور مسکن دینی چاہئے + چونکہ تشنج کے باعث خوراک کا فرد ہونا مشکل ہوتا ہے + لہذا یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ مریض کو روزانہ دو بار دوا دے یہوشی لگھانے کے بعد انبوہ معدیہ منہ کی راہ سے پیسٹ میں نل کر کے غذا پہونچائی جائے + یا نرم ربکی نل دقا نا طیر ناک کی راہ سے پیسٹ میں پہونچا + اس سے فائدہ دیا جائے + مگر مہر زکی راہ سے ہی غذا آب فی پہونچائی جاسکتی ہے + غذا کے علاوہ معمولی سیال ٹینکین کی مقدار کثیر مہر زکی راہ سے دیتے رہنا چاہئے تاکہ سینکین کے اخراج میں مدد ملتی رہے اور مریض کی پیاس بھی بجھتی رہے +

۱۔ اختر خلون - کادرے ٹون -	۲۔ سینکڑاں لٹی - سٹے ڈونگین -
۳۔ لوبیہ کالا - ریز اسٹنگ - کالا بارین -	۴۔ مکعب سنتی میٹر دیکوبک سنتی میٹر تقریباً + بوند
۵۔ کورارا - جنینی امریکہ کا زہر پیکان ہے -	۶۔ نل اختر - کوراکرم -
۷۔ انبوہ معدیہ - اسٹاک پیپ -	۸۔ اخترال + مگین + دکلورل + میڈریت +
۹۔ قانا طیر - کیتھ ٹر -	۱۰۔ اخترال (اخضرین - انول) +
	۱۱۔ شکاریہ عن آمیز + پراسیم برومانڈ -

الکلب فرع الماء

الکلب ایک عام و عمومی مُعَذِّبِی مرض ہے، جو حیوانات کے ذریعہ سے منتقل ہو کر انسان تک پہنچتا ہے، اور خصوصاً پاگل کنٹوں، بلیوں اور بھیریوں کے ذریعہ سے پہنچتا ہے۔ اس میں تنہا عصبی مرکزی بستل سے مرض ہو جاتا ہے، اس کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس کی مدتِ حیات نہایت طویل و متغیر و غیر متعین اسے، حیوانات یا انسان میں یہ مرض ذاتی طور پر (خود بخود) کبھی نہیں پیدا ہوتا بلکہ عموماً پاگل جانور کے کانٹے کے بعد نمودار ہو جاتا ہے، لیکن اگر کانٹے وقت، دانت کپڑوں، لباس کے اندر سے گھسیں، تو ممکن ہے کہ اس کا زہر پہنچ کر کپڑوں میں لگ جائے۔ اور مرض پیدا نہ ہو، یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ اگر عددی و لا جانور، بدن کے کسی چھلے ہوئے حصہ کو محض چاٹ لے، تو بھی یہ مرض منتقل ہو سکتا ہے، گو چاٹنے والے جانور میں اس وقت پاگل ہونے کی کوئی خصوصی علامت موجود بھی نہ ہو۔

کلب الکلب رکتے کا پاگل پن) یہ عددی کے تین سے پانچ ہفتہ کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن یہ مدت بہت مختلف ہوتی ہے، اس کا اصلی و ابتدائی زخم عموماً متاثر بخوبی اچھا ہو جاتا ہے یا اس میں کچھ الجہانی و بازت آس پاس پیدا ہو جاتی ہے، مرض کا ابتدائی درجہ ضعف و تنگی تنفس کا ہوتا ہے جس میں جانور کا جھلانا

۱۔ الکلب (ڈائیڈروفوبیا) فرع الماء کی اصطلاح جدید نہیں ہے، بلکہ لافیس نے بھی

شرح مرید میں اس کا استعمال کیا ہے۔

۲۔ کلب الکلب سے مراد

ہر وقت کاٹ کھانے کو طیار رہنا، چڑھنا، اور بد مزہ ہونا اور اسی قسم کے دیگر علامات ظاہر ہوتے ہیں یہ باتیں خصوصاً دوسرے کتے کو دیکھ کر اس کے سنانے زیادہ ظاہر ہوتی ہیں)۔ بے چینی زیادہ ہوتی ہے۔ کتا تاریک گوشوں میں سست پڑا رہتا ہے یا اونگھتا رہتا ہے، بہوک فاسد قسم کی پیدا ہو جاتی ہے اور جلتانیر ہر قسم کی گندگی اور غلاظت حتیٰ کہ خود اپنے پانچانہ کو کھانے لگتا ہے + یا بتلی جات + دو یا تین دن رہتی ہے، اور دراصل یہ مدت نہایت خطرناک ہوتی ہے کیونکہ ان علامات میں کوئی خاص بات غیر معمولی نہیں معلوم ہوتی جو فوراً عمل میں لکھا جاسکے + اس کے بعد دوسرا درجہ استسرفہ (دفاع) کا ہوتا ہے جس کے بعد موت آجاتی ہے۔ دوران مرض میں راجد اسے انتہائی جانور کا منہ گٹھے نیسا + رعب سے بہا رہتا ہے جسے وہ ہونچکرا علیحدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر کامیاب نہیں ہوتا + عام کنوں کے بہونے میں جو مخصوص گنگناہٹ ہوا کرتی ہے وہ پاگل کتے میں جاتی رہتی ہے اور گلابیٹہ جاتا ہے + جن جن مرض بڑھتا ہے۔ نیچے کا جڑہ مفلوج ہوتا جاتا ہے + آخر میں کچھ حصہ میں یا عمومی تشنج کے دورے آتے ہیں، اور جانور مرض شروع ہونے کے پانچ یا چھ دن کے بعد مر جاتا ہے + بعض جانوروں میں ایک درجہ دیوانگی و جنون کا ہوتا ہے جس میں نہایت جوش و غروش پیدا ہو جاتا ہے اور جانور حالت وحشت میں دیوانہ وار دوڑتا اور پکنا پھرتا ہے اور جس چیز کو دیکھتا ہے اسکو کاٹ کھاتا ہے +

گلاب (انسان میں) مدت حصانت بہت مختلف ہوتی ہے، جو چند مہینوں سے یکد برس تک ہو سکتی ہے، لیکن عموماً چھ مہنت سے زائد مدت حصانت نہیں ہوتی + اس مدت کے اندر زخم رکھنے کے کائنات کا اچھا ہو جاتا ہے، اگر چہ نشان زخم چھونے سے دکھتا ہے اور اس میں غصی درو ہوتا ہے + ابتدا مرض

ایک نموہوم خوف اور تخیلِ باطل سے ہوتی ہے، جس میں تخیلاتِ شاذہ (انگھوٹوں کے سامنے جھوٹی شکلیں) اور انتشارِ حواس اور اختلالِ عقل پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ حالت تقریباً چوبیس گھنٹہ تک طاری رہتی ہے، پھر بے چینی، بے خوابی، عدم اشتہارِ طعام کے ساتھ ساتھ پانی یا رتین چیزوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور شاید کچھ حرارت ہی ہوتی ہے۔ پھر اس مرض کی مخصوص و ممتاز علامات اس طرح نمودار ہوتی ہیں کہ زبان، گردن اور خصوصاً عضلاتِ لمبیۃ (عضلاتِ ازدرادیہ) اور عضلاتِ تنفس میں تشنج کے ساتھ سختی اور انہین پیدا ہو جاتی ہے، اور جب کسی چیز کو نگھنے کا ارادہ کیا جاتا ہے تو یہ تشنج اور یہی تیز دنیاں ہونے لگتا ہے۔ اس مرض کے تشنج کی ممتاز خصوصیت یہ ہے کہ اس کے دوسرے ارتجاعی مہم کے ہوتے ہیں اور یہ کہ از (طالاس) کے دوروں سے یوں مختلف ہوتے ہیں کہ مسلسل (مستمر) نہیں ہوتے بلکہ ان میں درمیانی وقفہ ہوتا ہے جس میں کچھ دیر کے لئے عضلات نرم اور ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ تشنج کے دوسرے بتدریج سارے بدن میں پھیل جاتے ہیں اور تھوڑے ہی وقفہ کے بعد ہر خفیف ترین حتیٰ تحرک اور ادنیٰ ترین تنبیہ (مثلاً سرد ہوا کا چھونکا، روشنی کی چمک، کوئی ناگہانی آواز، خصوصاً وہ آواز جو رتین چیزوں کے بہننے سے پیدا ہوتی ہے) سے تشنج پیدا ہو جاتا ہے اور نگھنا باطل غیر ممکن ہو جاتا ہے۔ عموماً دھن لیدار گاڑے لعاب سے پُر رہتا ہے جسکو خارج کرنے میں بہت وقت ہوتی ہے۔ تنفس رک رک کے آنے لگتا ہے۔ زکوا دم گھٹنے لگتا ہے (اور اکثر ایک زوردار ہچکی جیسی آواز پیدا ہوتی ہے جو بعض اوقات کھٹکے کے بہننے سے مشابہ خیال کی جاتی ہے، مگر یہ دراصل حجابِ حاجز

۱۔ تشنج ارتجاعی۔ کلونک کنوشن کم و بیش ہونے والا تشنج جو مسلسل بڑھتا ہوا نہ چلا جائے۔

کے تشنج کے باعث ہوتا ہے + بالآخر تشنج کے دورے اہل بند ہو جاتے ہیں اور
مریض مر جاتا ہے مگر اس کے ہوش و حواس آخر دم تک صحیح و بجا رہتے ہیں +
ہلاکت کا باعث یہ ہے کہ مبداء النخاع میں فاسد تغیرات نمایاں ہو جاتے ہیں یا
ہلاکت انتہائی صنعت و مہبوط قوی سے ہو سکتی ہے + یا مریض یعنی خضرہ کے تشنج سے
موت بہت جلد واقع ہو سکتی ہے + یہ مرض تقریباً ایک ہفتہ تک رہتا ہے مگر
اس سے بھی کم مدت کا ہو سکتا ہے اور دوی دن کے اندر ہلاک کر سکتا ہے +
تغیرات بعد الموت - خاصکر منفی قسم کے ہوتے ہیں + خوردبینی امتحان دھس
مجھری سے اہتباب حاد کے علامات مبداء النخاع کے زیریں حصہ میں پائے جاتے
ہیں جس میں اعصاب کے زور و نہم، دہم، اور شا و دہم کے مراکز ہی مخلوط ہوتے
ہیں + یہاں کے عروق میں انجا و خون اور نسج و حل میں سفید دانوں کی ریزش ہوتی
ہے + اعصاب کے ریشتے اور عصبی عقد کے خلیات میں ہی تغیر و فنا دہوتا ہے +
غذ و لحا یہ ہمیشہ کم و بیش بڑے ہوئے پائے جاتے ہیں + ادنیٰ درجہ کے حیوانات
میں اس مرض کی تشخیص یوں ہو سکتی ہے کہ اس مرض کے اثر سے اونکے دماغ کے
بلطن مقدم کے قرن کثیفی اکبر اور جوہر بحلی رقیق و نازک میں اجسام کلیہہ و اجسام نجویہ
پائے جاتے ہیں جو شاخت کیے جاسکتے ہیں + یہ چھوٹے چھوٹے اجسام ہیں جو
خلیات سے مشابہ ہوتے ہیں، انکے وسط میں ایک چھوٹا بڑا لکڑہ حصہ (حصہ) ہوتا ہے
یا چھوٹے چھوٹے جراثیم کروید کے جھنڈ ہوتے ہیں جن کے گرد ایک شفاف مشابہ
الاجزاء بحلی طبقہ ہوتا ہے اور پھر اس طبقہ کے گرد ایک رقیق و نازک (بھٹی) ہوتی جو
اجسام کلیہہ تقریباً ہر مریض میں پائے جاتے ہیں اور قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ اس

سطح مخصوص مجھری، مائیکروسکوپ اگزیٹیشن۔

سطح قشر دماغ، سیربرل کارٹکس۔

سطح قرن کثیفی اکبر، پوپا کپس مجھری۔

سطح اجسام کلیہہ، بگڑی باؤریز۔

مرض کے حیاتیات کے دور زندگی میں ایک مخصوص زینہ (زینہ حیات) ہیں یہ اجسام چند گھنٹوں کے اندر معائنہ کیے جاسکتے ہیں اور ان سے ثابت ہو سکتا ہے کہ کتنے میں کلبہ پہاگل ہیں) کا مرض موجود تھا یا نہیں + اگر انسان کو کتنے کاٹا ہے اور تحقیقی طور پر یہ جاننا مقصود ہے کہ کتنے پاگل بچا یا نہیں، تو کتنے کو مارکر اس کے دماغ میں اجسام کلیبیہ ملاحظہ کرنے سے فوراً تشخیص مرض متیقن طور پر ہو سکتی ہے (اجسام مذکورہ کے امتحان نے یہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ تلیق کر کے نتائج کے انتظار کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی + اجسام کلیبیہ انسان کے دماغ میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور بعض تحقیقین نے انکو مصنوعی طور سے کاشت کے ذریعہ اُگایا بھی ہے +

حفظ با تقدم کے لئے ضروری وسائل فوراً ہر حالت میں اختیار کرنا چاہئے جبکہ کتنے پاگل ہو یا اس کے پاگل ہو جانے کا اندیشہ ہو + جس جگہ کتنے کاٹا ہو اس سے اوپر رستی یا پٹی مضبوط باندھ کر دوران غلن کو بند کر دینا چاہئے تاکہ زہر سرایت نہ کر سکے اور زخم میں خون خوب بہنا چاہئے رشتہ یا چاقو سے زخم کو بڑا کر کے خون خارج کر دیا جائے) اور کسی تیز دوا سے رشتہ مائل حاصل حاصل قطراتی سے) جس قدر جلد ممکن ہو زخم کو جلا دینا چاہئے + مگر مناسب تریہ ہے کہ عضو اوٹ کو ریا مقام زخم کو فوراً خوب کاٹ دیا جائے یا قطع کر کے خارج کر دیا جائے +

حفظ با تقدم کے لئے طریقہ دستور - اس کا بنیادی اصول اس تحقیق پر مبنی ہے کہ اگر تخفیف کردہ سمیت، بتدریج بڑھتی ہوئی مقدار اور بڑھتی ہوئی طاقت میں پیکاری کی جاوے تو تلیق کردہ حیوان یا انسان کو مرض سے محفوظ کر دیتی ہے +

مصلحہ معن قطراتی - کاربوئک ایسڈ۔

مصلحہ استمد - پانچو۔

مصلحہ حویات - ہرٹوزوا۔

مصلحہ محقق - مغربی۔

ماۃ تلیق کا یہ اثر ہے کہ پہلے سے جو زہر موجود ہوگا اسے گرفت میں لے لیا
اگر مرض کو زیادہ بڑھنے کا موقعہ نہیں دیا گیا ہے تو آئندہ زہر کو بڑھنے نہ دیگا
اور مرض کا ظہور نہ ہو سکے گا۔ اس کا طریقہ استعمال درج ذیل ہے:-

پہلے کتے کے اندر سے مرض کا زہر نکال کر اس زہر کو کئی خرگوشوں میں یکے
بعد دیگرے داخل کر کے (زہر کو) ایک مستقل ترکیب اور شدید ترین تیزی میں یعنی
ایسی صورت و ساخت میں حاصل کر لیا جاتا ہے کہ جس کی پچکاری لگانے کے بعد
جانور (خرگوش) برابر ساتویں دن مرتا رہتا ہے اور اس کے نخاع کا ہر حصہ
شدتِ سمیت میں کیاں پایا جاتا ہے۔ زہر (ماۃ تلیق) اس ترکیب سے حاصل
کیا جاتا ہے کہ پہلے مریض (رپاگل) کتے کے نخاع یا سہدا نخاع کو نکال کر مٹھہ شوریہ
کے اندر خوب گوندہ کر آمیز کر لیا جاتا ہے + پھر خرگوش کی کہو پری کا ایک ٹکڑا شقیہ
منشاری کے ذریعہ قطع کر کے اس ٹکڑے شوریہ کی پچکاری اس کے دماغ کی
عشائے عنکبوتی کے نیچے لگا دی جاتی ہے۔ اس پچکاری کے اثر سے تلیق خرگوش
جانور کا نخاع سخی ہو جاتا ہے۔ پس اب اس قسم کے کئی سخی نخاع مین نکال کر اوکو
خشک کرنے کے لئے کئی جرسی شکل شیشہ زجاجی کے اند مختلف ہت
تک ٹکا دیا جائے اور شیشوں کے پندے میں قدرے ریہ کا دھبی بھی رکھ دیا جائے
اس ترکیب سے سمیت کی تیزی میں تخفیف بتدریج ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ چودہ
دن تک رکھنے سے وہ بالکل ضائع ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے تخفیف کردہ نخاع
کے ٹکڑوں کو مٹھہ شوریہ کے اندر خوب مل کر کے (انسان میں) اس کی پچکاری لگائی
جاتی ہے + اس کی ابتداء نخاع کے خفیف ترین طاقت کے محلول سے کی جائے

ملہ متعاب منشاری۔ شقیہ ش۔

ملہ جرسی شکل شیشہ زجاجی
ملہ ریہ کا دھبی کا شقیہ پوٹاش۔

ملہ عشائے عنکبوتی۔ ارکن نمبرین۔

اور بند رتج زیادہ طاقت کی پچکاریاں دی جائیں، یہاں تک کہ ایسے نخاع کا محلول دیا جاوے جو صرف ایک ہی دن کے لیے خشک کیا گیا ہو۔ یہ طریقہ علاج مستند میں ایجاد ہوا تھا، اور اب تک اس کے استعمال سے جو نتائج مستند ہوئے ہیں وہ اس قدر یقینی ثابت ہوئے ہیں کہ ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مرض قلب (ذرع الام) کے حفظ و تقدم کے لیے ہمارے پاس ایک کارگر حربہ موجود ہے مگر شرط یہ ہے کہ کتے کے کاٹنے کے بعد مرض کو نشوونما کے لیے زیادہ ڈھیل اور طویل مدت نہ دی گئی ہو۔

اگر یہ مرض انسان میں نمودار ہو گیا ہو تو علامات کی شدت کم کرنے کے لیے محض علاج بالتحقیف اختیار کیا جاسکتا ہے۔ مریض کو قطعی آرام و سکون میں رکھنا چاہئے اور تحریک و تنبیہ کے تمام اسباب کو سدود کر دینا چاہئے۔ تشج کے دورے کم کرنے کے لیے اخضرال منہ کی راہ سے دی جائے یا نمل اخضر نگہا یا جلے، یا برنخ حلق پر آب پاش سے کوکین چھڑکا جائے غذا جو کچھ بھی مریض کھا سکے دی جائے اور بہتر ہے کہ مہرنگی راہ سے قلبی حقنہ کیا جاوے۔

جمرہ خبیثہ

یہ مرض عصی جمریہ کے مددی کے باعث پیدا ہو جاتا ہے، جو بھیر مویشی اور

ملہ برنخ الحلق۔ فاسز۔
ملہ آب پاش۔ اسپرے اپرٹس۔
ملہ جمرہ خبیثہ۔ انتھرکس۔
ملہ عصی جمریہ۔ انتھرکس پیس۔

ملہ علاج بالتحقیف { پہلی ایڈیٹرینٹ
ملہ علاج لمطع
ملہ اخضرال۔ کلورل۔
ملہ نمل اخضر۔ کلور فارم۔

دیگر جانوروں میں ایک قسم کا بخار (حی طالعیدہ) پیدا کر دیتا ہے جس میں بخار کے ساتھ طحال بڑی ہو جاتی ہے + انسان میں اگر عصی جمریہ کا عدوی تلخ جلد کے باعث پیدا ہو جاوے تو اس سے ایک قسم کا مقامی التہابی درم ہو جاتا ہے جسے بشرۃ خبیثہ کہتے ہیں، یا زیادہ پھیلا ہوا اور وسیع تیج ہو جاتا ہے جسے اوذیتیا جمریہ کہتے ہیں اور جو گلے جمرۃ خبیثہ کے بعد نمودار ہوتا ہے + اگر یہ جراثیم ریا انکی سمیت پیچھے یا معار کی راہ سے جذب ہو جاتے ہیں تو ایک عمومی التہابی مرض پیدا کر دیتے ہیں جسے سمۃ جمری کہتے ہیں +

عصی جمریہ: یہ جراثیم مرضیہ کی سب سے بڑی قسم ہے۔ جسکا طول ۱ سے ۲۰ سنٹا میٹر تک اور عرض اسے ۱/۲ صغیرہ تک ہوتا ہے + یہ مریض حیوانات کے خلاء میں ڈنڈوں یا ڈوروں کی شکل میں ہوتا ہے جو متعدد (دو سے دس تک) بیض اجزاء سے مرکب ہوتا ہے + یہ ہوائی، غیر متحرک ہوتا ہے، حرارت برینہ کے درجہ میں خوب بڑھ سکتا ہے، اور ہلکی مادہ کو گھٹا کر فیت کر دیتا ہے + جب اسے مصنوعی طور پر حمضین کی موجودگی میں اگایا جائے تو یہ عصی کے اندر نمایاں ابدار پیدا کر دیتا ہے، مگر زندہ ساختوں میں اس کے ابدار کی پیدائش نہیں پائی جاتی + چند ثانیہ تک اُبانے سے یہ جراثیم مرجاتے ہیں، لیکن جن لاش میں یہ موجود ہو اس کی تحلیل (عفونت) ایکو تقریباً ایک ہفتہ کے اندر ہاک کرتی ہے۔ مگر اس کے ابدار نہایت سخت جان ہوتے ہیں اور اگر انھیں ایک فی صدی سیال محض

۱۔ صغیرہ (صغیرہ کی جمع) نامزد

۲۔ ثانیہ سکند۔

۳۔ تحلیل۔ ڈی کمپوزیشن۔

۴۔ محض اطرائی۔ کار بولک ایسڈ۔

۱۔ حی طالعیدہ۔ سپلیک فیور۔

۲۔ بشرۃ خبیثہ۔ ٹنٹس پچول۔

۳۔ اوذیتیا۔ جمریہ۔ انفیکس ایڈیا۔

۴۔ سمۃ جمریہ۔ انفیکس جمریہ۔ مرض نازک ہوتا

۵۔ رادون۔ مٹھے مالون کا مرض (رادون سائزیز) کہتے ہیں

قطرانی میں ڈبو کر رکھا جاوے تو ایک مہفتہ تک زندہ رہتے ہیں، درآسنا ایک حص
قطرانی کا یہی سیال ان جراثیم کو صرف دو دقیقہ میں ہلاک کر دیتا ہے + علاوہ انہیں
الکھول اور سیال حص قطرانی (۲۰ فی صدی طاقت) بھی ایذا پر اور سوقت تک اثر
نہیں رکھتے جب تک کہ ایک طویل وقت تک دنپر عمل نہ کریں + اگر حمی تھالیہ کے
اثر سے مرے ہوئے کسی جانور کے خون میں سوئی کی نوک کو تر کر لیا جاوے، اور پھر
اس سوئی سے کسی چوبیہ رقتہ کی دم کی جڑ کے پاس چسید دیا جاوے، تو اس طرح
تلقیح شدہ چوبیس گھنٹے سے کم مدت میں ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کے
تقریباً ہر عضلین عصیہ جزیہ ہائے ہاتے ہیں +

بعض جانور، خصوصاً بڑی ذات کا چوہا (جرٹو) اور کتا، طبعی طور سے بھرہ خبیثہ
کے مرض سے مانوٹ ہوتے ہیں + علاوہ باسٹور کی تحقیقات میں ایک نہایت اہم
اور مفید ایجاد یہ بھی ہے کہ اس نے جبرہ خبیثہ کی سیتہ رجراثیم کی کشتوں
کو پہلے حرارت کے اثر سے تخفیف دیکر مویشی اور بھیڑ میں تلقیح کر کے ان میں اکتسابی
مناعت پیدا کرنے کا طریقہ دریافت کیا +

علامات - عصیہ جزیہ کا عدوی عموماً چرواہوں میں جو زندہ مویشی کو کھاتے ہیں
یا مضایٹوں میں جو بے جان مویشی کو ہاتھ لگاتے ہیں، پایا جاتا ہے + نیز یہ ان ہیشہ
دروں میں بھی ہوتا ہے جو چرے اور اڈن کا کام کرتے ہیں +

بشرہ خبیثہ - یہ عموماً چہرہ اور گلانی پر ہوتا ہے، اور مقام تلقیح پر ایک سرخ مکدر پٹنی

۱۔ دقیقہ - منٹ۔	۲۔ مامون - امیون۔
۳۔ حمی طحالیہ - اسپلینک نڈر۔	۴۔ باسٹور - پاچھر۔
۵۔ فار - ماؤس۔	۶۔ مناعت کسبیہ - کوآرڈامیونیٹی۔
۷۔ جرڈ - ریٹ۔	۸۔ بشرہ خبیثہ - ملگنٹ پچبول۔

کی صورت میں نمایاں ہو کر شروع ہوتا ہے، جو بہ سرعت پھیل جاتا ہے، اور جس کی جڑ برقعدہ میں مواد کے انصباب و ترشح کی بڑی کثرت ہانی جاتی ہے۔ مگر پنج میں آہستہ ہوتے ہیں، ان آبلوں کے اندر کی رطوبت (مصل) خون آلود ہو کر سیاہی اٹل بھور سے رنگ کی ہو جاتی ہے اور اس میں عسی جبرینہ مخصوص شکل کے موجود ہوتے ہیں۔ اس درجہ میں درد مطلق نہیں ہوتا مگر نہایت سخت کچلی اور لسع و طبن اہوتا ہے۔ جوں جوں بڑھتا چلتا جاتا ہے، اس کا مرکزی حصہ پہلے بھورا اور آخر میں کالا پڑ جاتا ہے اور یہی خشک ریشہ (کھنڈ) بن جاتا ہے۔ اس مرکزی حصہ کے گرد اردو (احتقان دموی و اجتماع خون) اور تہیج و درم رخو کے باعث ایک نہایت سخت متورم و تر کا حصہ بن جاتا ہے جس پر آبلوں کا تنگ حلقہ سا نمودار ہو جاتا ہے۔ یہ مقامی کیفیت بتدریج زیادہ نمایاں ہوتی جاتی ہے اور عروق دمویہ اور غدود جاذبہ بھی اس میں مبتلا ہو کر بڑھ جاتے ہیں۔ عموماً کسی قدر بخار اور کسٹل مانگی بھی ہوتی ہے جو چوتھے یا پانچویں دن تک زیادہ شدید نہیں ہوتی، اس کے بعد بخار ۱۰۲ یا ۱۰۴ درجہ (مقیاس مروج) تک ہو جاتا ہے، نبض سریع اور غیر منتظم ہو جاتی ہے، نذیع معدہ، تے، اور نفخ شکم زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر مرض بغیر کسی روک تھام تکلیف کے پھیلتا رہے تو قرب و جوار کے جھنص اذیہا منتشر میں مبتلا ہو جاتے ہیں مثلاً وہ چہرہ سے پھیلک گردن، سینہ اور پشت تک پہنچ سکتا ہے سانس سختی رکھ گہرا اور زک زک کر آنے لگتا ہے اور عمومی بدنی غزلی کے خطرناک علامات مثلاً ہذیان و قرا پیدا ہو کر بچارہ مرعیض عموماً ایک ہفتہ سے کم مدت میں، یا گا کہ ابتداء مرض سے صرف عیس یا چالیس گھنٹے کے اندر ہی، شکار اجل ہو جاتا ہے۔ لیکن

۱۔ اذیہا منتشر ۱۰ سپرڈنگ لایڈیا۔

۲۔ قوا۔ نبات بکرا

۱۔ نبض غیر منتظم۔ اریگورس۔

۲۔ لون معدہ۔ نمیدیک اریٹھیٹی

بیشتر یہ مرض اس شدت کا نہیں ہوتا اور صرف مقامی تغیرات و ظہا ہر کسی ہی محدود رہتا ہے، جو بتدریج دفع ہو جاتے ہیں اور خشک ریشہ ملحدہ ہو جاتا ہے اور کچھ بھی غائب ہو جاتا ہے + البتہ اگر مرض کے مراکز متعدد مقامات پر ہوں تو انجام مرض (انتظار) قدر تا زیادہ خراب ہوتا ہے +

اوڈیٹا جمریہ - اسکا دوران نہایت تیز اور ٹھنک ہوتا ہے + یہ اکثر چہرہ اور پوٹوں کے قریب ظاہر ہوتا ہے، اور جلد سرخ بادہ کی طرح سخت، متورم اور سرخ ہو جاتی ہے، اور کچھ عرصہ کے بعد دانوں اور چھانوں سے ڈھک جاتی ہے بالآخر غائرانا کے دھتے (مکڑے) نمودار ہو جاتے ہیں + عروق ہاذبہ کی نالیاں اور غدود ہی متاثر ہوتے ہیں +

یہ مقامی حالت، مادہ چپک کے اتقاقیہ ٹیکے سے یا جراثیم عقودیہ صدیہ کی چھوت سے مشابہ ہوتی ہے (اور اکثر غلطی سے یہی سمجھی جاتی ہے) مگر چھانوں کے اندر کی رطوبت میں عصی جمریہ کی موجودگی کے باعث اہلی مرض کی شناخت ہو سکتی ہے + مشتبہ صورتوں میں اس رطوبت سے کشیش میار کر کے جراثیم دیکھ جاسکتے ہیں +

تسم جمری (اڈن کے ڈھینوں کا مرض) - یہ اس عمومی حالت کا نام ہے جس میں اگرچہ کوئی خارجی سقم یا جراثیم نمودار ہوتی، مگر عصی جمریہ نظام جسم کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں + مرض کا زہر خشک ابتداء کے نکلنے یا تنفس میں داخل ہونے کے باعث نظام جسم میں پھیل جاتا ہے، جس سے دو قسم کے علامات پیدا ہو سکتے ہیں +

۱۔ تسم جمری - انتھر اسپیا

۲۔ دول سارٹس ڈیزیز

۱۔ انتھر کس
۲۔ اڈیٹا

(۱) تنفسی ہو اگر کہ اعضائے تنفس میں داخل ہو جاتا ہے تو مریض کو ابتدا میں چند روز تک بخار اور کسل و اندگی کی شکایت ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک قسم کا ذات الریہ عشا بکہ مصلیہ لپیڈہ پیدا ہو جاتا ہے جس کی رطوبت میں عصی جبریہ بہتر موجود ہوتے ہیں۔ اس کی رفتار نہایت تیز ہوتی ہے، بہت تیز بخار اور غیر تنفس اور دوران خون میں ضعف ہوتا ہے آخر میں زیادہ مریضوں کو اضمحلال قوی لاحق ہو جاتا ہے۔

(۲) معوی۔ اگر جراثیم معدہ میں داخل ہو جاتے ہیں، تو اکثر تو وہ ترش کیلیوس جس کے اندر ترش رطوبت معدیہ ہوتی ہے اسے باعث ہلاک ہو جاتے ہیں لیکن اگر بعض جراثیم یا اونکے انڈے آنتوں تک پہنچ گئے تو دماغ امعاء کے کھاری مادہ کے اندر انکے نشوونما کے لئے زرخیز زمین میسر ہو جاتی ہے اور یہ انتڑی کی دیواروں کو بعد مبتلائے مرض کر دیتے ہیں جس سے مرض پھیل جاتا ہے۔ درد شکم، مرہ اور اینٹین کے دورے آتے، خلی دست راہل الدم، اس حالت کی نمایاں علامات ہیں۔

یہ قسم معوی اس قدر مہلک یا زہری نہیں ہوتی جتنی کہ تنفسی، مگر قسم جلدی جلد والی کی نسبت تو یقیناً زیادہ خطرناک ہے۔



علاج۔ جمرہ کی قسم جلدی میں مرے ہوئے آس پاس کے سوچے ہوئے حصہ کو قطع کر کے خارج کر دینا چاہئے، اور پھر آگ سے داغ دینا چاہئے، یا خاص خاص قطراتی سے جلد دینا چاہئے۔ اس قسم کا علاج گزشتہ زمانہ میں متعل تھا، مگر جن لوگوں نے

ملہ وقت تنفس و سپنا۔
ملہ ماضی قطراتی۔ کارہلک ایسڈ۔

ملہ ذات الریہ عشا یہ مصلیہ لیڈہ یہ دفعہ نہیں
پلیور و مرنٹا۔

اس کے متعلق تجربہ کیا ہے اور کیا خیال ہے کہ یہ طریقہ نہایت کم مفید ہے اور وہ تکیدات (سینک) پر زیادہ استناد رکھتے ہیں +

مصل دفع جبرہ (رتیاقین جبرہ) کسی قسم کے لیاریکے لگے ہیں، اور اون کے استعمال سے جبرہ میں مفید نتائج حاصل ہوئے ہیں، خصوصاً مقامی اقسام کے جبرہ میں (مثلاً) وہ کا لیاریکا ہوا مصل بیشتر استعمال کیا جاتا ہے + اس کے لیاریکے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بکروں یا گدھوں میں علامہ ناشتور کے طریقے سے بنایا ہوا مادہ قلیق لگا کر مصنوعی طور سے اکتسابی مساعت پیدا کر دی جاتی ہے اس مادہ قلیق میں عصی جبرہ کی زندہ کشتیں ۱۴۰ درجہ (صدور جاتی) کی حرارت میں تخفیف کی ہوتی ہوتی ہیں + اس کے بعد ان میں شدید زہریلی کشتوں کی کثیر مقادیر لگائی جاتی ہیں + اس طرح حاصل کیا ہوا مصل (رتیاقین) علاج جبرہ میں استعمال کیا جاتا ہے، جس کی پیکاری کی مقدار ۲۰ سے ۴۰ مکعب سنتی میٹر ۳۴ قطرہ سے ۶۰ قطرہ تک) ہے، جو حسب ضرورت چھ میں گھنٹوں میں دوبار دی جاسکتی ہے زیادہ شدید حالتوں میں مصل کی پیکاری دریدی راہ سے کی جاوے + مونیہیم کا مصل جبرہ بھی، جو مختلف طریقے سے بنایا جاتا ہے اور مندرجہ بالا مقدار ہی میں دیا جاتا ہے، اچھے نتائج پیدا کرتا ہے + ان دونوں اقسام مصل کے استعمال کے بعد مریض کو بخار اور پسینہ آتا ہے مگر مریض کی حالت میں اکثر نہایت جلد اصلاح ہو جاتی ہے + اندازہ ہے کہ مصل کے اثر سے ہجوم مہیادات میں تحریکیں ترقی ہوتی ہے اور مریض شفا یاب ہو جاتا ہے +

نتیجہ تجربہ

علم اسقلاوہ - اسکیرو -

علم باستور باسچر -

علم اودہ قلیق - وکیسین -

سوزاک۔ سیلان نہری

سوزاک (سیلان نہری۔ سیلان غاطی) ایک مرض متحدی ہے جو ایک خاص نوعی جراثیم ”کریٹیاٹ نہرہید“ یا کثیبات زوجیہ سوزاک کے فعل اثر سے پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کی خصوصیت (نہایت عام شتم میں) یہ ہے کہ مجری آبول (اطیل) اسے پیپ کی رطوبت خارج ہوتی ہے +

جراثیم سوزاک۔ ”کریٹیاٹ زوجیہ“ کی شتم سے ہیں، انکے جوڑے میں کا ہر ایک کروئیہ شکل میں گردہ نمایاں شیم کے بیج سے مشابہ ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں ایسی وضع میں ہائے جاتے ہیں کہ انکے مقعر کنارے ایک دوسرے کے بالمقابل ہوتے ہیں گلابے ایک ایک کروئیہ تنہا چار چار کے گردہ (رباعیات) بھی ہوتے ہیں، مصنوعی طور سے یہ آسانی سے نہیں اگتا اور اس کے اگالنے کے لیے ذموشن کی زمین کی ضرورت ہوتی ہے + کشتوں کے لئے مناسب زمین تیار کرنے کا نہایت سادہ طریقہ یہ ہے کہ معمولی زمین اجاڑ کی سطح پر قدرے مطہر خون پھیلا دیا جائے + اس کی نوآبادیاں چھوٹی چھوٹی اور نیم شفاف ہوتی ہیں اور شبنم کے ننھے ننھے والی کی کے مانند نظر آتی ہیں + اگر اس طرح کی مصنوعی کشتوں کو انسانی طیل کے اندر داخل کر دیا جائے تو سوزاک پیدا ہو جاتا ہے + چنانچہ اس تجربے سے علاج۔ جزوہ کی ایک کے جراثیم بھی کریٹیاٹ زوجیہ ہیں، کیونکہ علامہ کاغ کے

مکروہ نما۔ کنڈی شیبہ۔

مکسیم کانج۔ بین

مکرباعیات۔ شمرڈز۔

مکرومین۔ برموگلوبین۔

مکاجار۔ اگار۔

قطع کر کے خارج کر دینا چار گنڈو یا

سے جلا دینا چاہئے + اس کو کاکس۔

کاکس گندی

مکفات الریہ غشائیہ معلیہ لیفہ

پیور و مونیٹا۔

اصولاً موضوع کو تمام وکمال پورا کرتے ہیں + ادنیٰ حیوانات اس مرض سے لمبا محفوظ ہیں + کرویات سوزاک طریقہ جہرام سے رنگ نہیں قبول کرتے (مقام منفی) یہ خصوصیت تشخیص مرض کے کاظہر نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ کیونکہ کرویات زوجہ کے بیشتر اقسام رجو جراثیم سوزاک سے مشابہ ہوتے ہیں (جہرام مثبت ہوتے ہیں یعنی طریقہ جہرام سے رنگنے پر رنگت قبول کر لیتے ہیں اور اس کو قائم رکھتے ہیں + جراثیم سوزاک کی پیپ میں کرویات سوزاک کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں اور بیشتر کثیر مقدار میں بیضات کے اندر ہوتے ہیں + یہ انکی ایک ممتاز خصوصیت ہے، مزید برآں یہ خصوصیت بھی اہم ہے کہ اگرچہ بیشتر سفید دانے (کثیر انوات بیضات) تو ان کرویات سے خالی ہوتے ہیں، مگر جن سفید دانوں کے اندر یہ پہنچ جاتے ہیں ان میں انکی تعداد کثیر جمع ہوتی ہے +

سوزاک کی پیپ کے اندر خلیات بشریہ ہی موجود ہوتے ہیں، جو جھلی کی سطح سے چھکراتے ہیں۔ اور جنکے اوپر با اندر بہت سے کرویات (جراثیم) اکثر پائے جاتے ہیں +

ماہیت جراثیمی۔ دارالبقرہ (مغل) میں سوزاک کی تشخیص کے لئے اکثر طریق زرعیت کا شست کے طریقے (کی چنداں ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ پیپ کے مسطح کو (مخصوص طریقہ سے) رنگ کر امتحان کیا جاتا ہے + رنگنے کا بہترین طریقہ طریقہ جہرام ہے جس کے بعد امتیاز حاصل ہونے کے لیے ٹیلین سرخ قطرائی (فگس قطرائی) مخفف سے انھیں لگ دیا جاوے تاکہ جراثیم سوزاک اور دوسرے جراثیم میں مختلف قسم کا رنگ چڑھ کر تمیز میں آسانی ہو + اس ترکیب سے کرویات سوزاک

۱۔ پیپیش۔ مس گرام نیچے ڈالنا	۲۔ ٹیلین سرخ قطرائی۔ کاربال فگس لگس ایک
۳۔ پانی پھر لیکو سائٹس۔ مس طریقہ زرعیت پھر	۴۔ جرسی کا نام ہے جسکے نام ٹیلین سرخ کا نام رکھا گیا

سرخ ہو جاتے ہیں اور دیگر اقسام کے کرویات سوزاک سے مشابہ ہوتے ہیں وہ سب گہرے بنفشی رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح ان کے مابین تیز نہایت آسانی سے ہو سکتی ہے (تلمین تیزی) + علاوہ ان کے کرویات سوزاک کا خلیات کے اندر منتظم ہونا اور پھنا پیپ کے بیشتر دانوں کا اپنے باطل خالی ہونا، اور صرف بعض پیپ کے دانوں کا ان سے باطل پڑ ہونا۔ یہ سب متاخر خاص ہیں جن سے سوزاک کی تشخیص قائم ہو سکتی ہے + لیکن گاہے بعض کرویات سوزاک غیث یعنی دانوں سے باہر یعنی غیر ظری ہوتے ہیں +

مرزوں میں سوزاک کا ابتدائی تفرق اتصال یا ابتدائی سقم مجری بول کے سامنے کے حصے میں زنگی التهاب ماد کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے، اور یہ التهاب جلد تھیں (پیپ بننے) میں بدل ہو جاتا ہے، اور مجری المول کے گہرے حصوں میں حتیٰ کہ غده ثدی مثلاً انڈیڈوس تک پہنچ سکتا ہے + عموماً مرض اسی حد تک پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے، مگر بعض حالتوں میں کرویات سوزاک دوران خون میں ہی داخل ہو جاتے ہیں اور اعضائے بعیدہ پر اثر کر دیتے ہیں + چنانچہ اس سے نیاہ تر معاصل (جذ) متاثر ہوتے ہیں، لیکن گاہے حقیقی قیح الدم کے علاوہ ہر پیدا ہو جاتے ہیں (تھیم دم زہری) جس سے پھوڑے (خراجات ثانویہ) اور التهاب بطانہ قلب تقری پیدا ہو جاتے ہیں +

مجری بول کے التهاب زہری حاد کے علامات - (مرزوں میں) مدت حیات

ماتق دم زہری - کانو کوکیا دغون میں
کرویات سوزاک کی موجودگی
مخراجات ثانویہ - سکندری پسند -
مخراجات قلب تقری - سرشاد و کوا

ماتق تیزی - کانو نر اسٹین
مخراجات زہری - کانو نر اسٹین
مخراجات زہری - کانو نر اسٹین
مخراجات زہری - کانو نر اسٹین
مخراجات زہری - کانو نر اسٹین

دو تے آٹھ دن تک ہوتی ہے اور التهاب مجری البول عموماً عددوی کے بعد چند
 ہی دنوں میں پیدا ہو جاتا ہے + ابتداءً دانہ اعلیٰ پر خارش سی محسوس ہوتی ہے
 اور پیشاب کرتے وقت جلن اور درد ہوتا ہے، اس کے بعد عددوی کے تیسرے یا
 چوتھے دن (مواد آنے لگتا ہے جو شروع میں پیلا اور مخاطی ہوتا ہے، گہرے جلد ہی گاڑا
 پیلا اور مقدار میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے + دانہ اعلیٰ کے کنارے متروک ہو کر رنج
 جاتے ہیں + یہ حالت کم و بیش عرصہ تک جاری رہتی ہے، اور گاہے پشت دگر
 میں بہت کھنچاؤ کا درد ہوتا ہے، اور ساتھ ہی تمام بدن میں خلل اور کھارہ ہی ہوتا
 ہے + عموماً قبض موجود ہوتا ہے اور اشتہا کم ہو جاتی ہے + گاہے مجری البول
 کی غٹٹے مخاطی کا التهاب اس قدر شدید ہوتا ہے کہ اس کے باعث اعتباس البول
 ہو جاتا ہے یا مجری البول سے خون جاری ہو جاتا ہے (بول الدم) + پہلی بار مریض کا
 حملہ بہ نسبت مابعد کے حملوں کے زیادہ تکلیف دہ اور خطرناک ہوتا ہے، اگرچہ پہلا
 حملہ علاج سے جلد تر شفا یاب ہو سکتا ہے + تقریباً خراج اور گٹھیا والے (حداری)
 اشخاص کا علاج زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور ان میں پیپ (مواد) بند ہونے کے
 بعد اکثر اعادہ مرض ہو جاتا ہے + یہ بھی مشہور ہے کہ بہ نسبت سیاہ فام اشخاص کے
 گورے آدمی زیادہ مبتلا ہوتے ہیں +

اگر مناسب علاج جاری رکھا جاوے تو دو تین مہینے کے بعد مواد باطل بند ہو جاتا
 ہے، لیکن اگر علاج میں بے پرواہی کی گئی تو التهاب پیچھے کی طرف پھیل جاتا ہے اور

۱۔ اعتباس البول۔ ری مشق آت یوں۔
 ۲۔ بول الدم۔ یوریتھل ہورج۔
 ۳۔ تقریباً۔ گائٹی۔
 ۴۔ حدار (گٹھیا) روماتزم۔

۱۔ التهاب مجری البول
 ۲۔ درم اعلیٰ
 ۳۔ اعلیٰ۔ یوریتھل۔
 ۴۔ کھنچاؤ کا درد۔ ڈیگنگ بین۔

دہ حالت پیدا کر دیتا ہے جسے عموماً التهاب اچلیل مؤخر کہتے ہیں، کیونکہ یہ مجری بول کے اوس مؤخر حصہ کو متہب کر دیتا ہے جو عضلہ عاصرہ فائزہ کے پیچھے واقع ہے۔ یہ حالت گھسے باقاعدہ علاج پر بھی ہو جاتی ہے۔ یہ التهاب دوسرے ہفتہ کے آخر میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کی ممتاز علامات یہ ہیں کہ پیشاب بار بار اور درد کے ساتھ آتا ہے، عجان رسیوں میں درد اور بھاری پن معلوم ہوتا ہے۔ پیشاب میں گھسے قدرے غن بھی آجاتا ہے اور عام بدنی اضطحال اور ضعف محسوس ہوتا ہے۔ یہ التهاب کا پیچھے کی طرف اس طرح پھیلنا ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں ایسے عوارض پیدا ہو جاتے ہیں جو فحشہ ذی، خبیثین اور عینہ سنی، کوئنتائے مرمن کر دیتے ہیں اور جو خطر سوزاک مرمن یا نہقلہ کی پیدائش کا بنیاد عام سبب ہیں۔ سوزاک مرمن رزقہ کی حالت میں کچھ عرصہ تک مواد کم پیش زیا دہ مقدار میں جاری رہتا ہے اور گھسے گھسے پیشاب کرتے وقت جلن اور درد محسوس ہوتا ہے، مگر اور کوئی تکلیف دہ علامت نہیں پائی جاتی۔ مواد اکثر تھلا اور غامی صدیدی رسیپ اور بلغم آمیز ہوتا ہے، اور اتنا خفیف ہوتا ہے کہ اس سے صرف مجری البول کے دانہ کے ب چپک جاتے ہیں یا صبح سوکر اٹھنے کے بعد مجری البول کے دانے سے قدرے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ مواد ایک عرصہ دراز تک بلکہ برسوں تک جاری رہ سکتا ہے، اور زیادہ رکھنا چاہئے کہ محض اس قسم کی حالت میں بھی سوزاک مرض مرمن سے عورتوں کو لگ سکتا ہے۔ بعض اوقات مجری البول کی حشائے غامی کے کسی حصہ میں تفرج ہونے یا انگو کی کیفیت

۱۔ خبیثین۔ شینیر۔

۲۔ ادعیمہ سنی۔ سینل مسالکاز۔

۳۔ سوزاک مرمن رزقہ۔ کراک گندہ یا گھٹا۔

۴۔ غامی صدیدی۔ میوکو۔ پروٹسٹ۔

۵۔ التهاب اچلیل مؤخر۔ پوسٹیریئر۔
۶۔ بد تغییراتی مش۔

۷۔ عضلہ عاصرہ فائزہ۔ ڈیپ کانٹرکٹر مسل۔

۸۔ عجان۔ پرے نیم۔

پیدا ہو جانے کے باعث بھی سوزاک مزمن (رذفقہ) ہو جاتا ہے + ایسی حالت میں سوزا زورنگ کا ہوتا ہے اور سلفائی (بجسٹ) ڈالنے سے پیشاب کی نالی (اطیل) میں درد محسوس ہوتا ہے + زخم (تقرح) یا انگور کے دانوں کی شناخت منظر برونی کے ذریعہ ہو سکتی ہے + بعض دیگر حالات میں سوزاک مزمن (رذفقہ) کا باعث غذائی مادی کا التهاب مزمن ہوتا ہے جس کے ساتھ عموماً اوجیہ منی بھی مزمن طور پر بڑے ہوئے ہوتے ہیں + مؤخر الذکر حالت کی شناخت معائنہ عظیم کے امتحان سے ہو سکتی ہے جس کی صورت یہ ہے کہ سبزیں (تنگی) ڈالکر دیکھا جاتا ہے + اور جب غذائی مادی میں مرض ہوتا ہے تو اس کی تشخیص اس طرح ہوتی ہے کہ پیشاب کے اندر رکھ کر خانیہ کے روغن، گرم نمادھاگ کے مانند نکلتے ہیں، جو خصوصاً مہر کے اندر ادھکی ڈالکر غذائی مادی کی مانع کرنے یا دہانے کے بعد نمایاں طور پر نکلتے ہیں +

جب مرض سوزاک عرصہ دراز تک جاری رہتا ہے، یا جب اس مرض کے متواتر حملے ہو جاتے ہیں، تو مجری البول کے اس کم کم پیش رطوبات کا اجتماع پیشنی طور پر پایا جاتا ہے اور پیشاب کی مٹی تنگ ہو کر غلیظ پیدا ہو جاتا ہے۔ مجری البول کی جھلی میں زخموں اور انگوری دانوں کے خشک ہونے اور اس سے نمبلی ساخت کے پیدا ہونے کے باعث بھی منق الاطیل ہو سکتا ہے +

امتحان قارورہ۔ سوزاک میں قارورہ کے رسم امتحان سے اکثر اس مرض کی رفتار و وسعت وغیرہ کے متعلق مفید معلومات حاصل ہو جاتی ہیں + سوزاک حاد میں شیشہ کے ایک برتن میں پہلے قریب ۳-۵ اوقیہ کے

۱۔ منق الاطیل۔ اسٹرکچر آف بورجیلز۔

۲۔ نمبلی ساخت۔ میکیرٹیل ٹشو۔

۳۔ اوقیہ۔ اونس۔

۱۔ سلفائی۔ بجسٹ۔

۲۔ منظر برونی۔ ہر تقراسکوپ۔

۳۔ التهاب غذائی۔ پرکستانی ٹسٹ۔

پیشاب جمع کرایا جائے + باقی اندہ پیشاب دوسرے برتن میں کرایا جائے +
 اگر مجری البول کے صرف سامنے کا حصہ ہی مبتلا ہے مرض ہے تو ممدیج
 کے پہلے ۴-۵ اوقیہ دے حصہ ہی میں شامل ہو کر نکل آئے گا، اور اس کے
 برتن کا پیشاب غلیظ اور گدے رنگ کا ہو جائیگا اور ادس کے اندر پیچے
 تار یا گائے (دندہ) موجود ہونگے + اگر مجری البول کے پچھلے حصہ میں مرض
 ہے تو دوسرے برتن کے اندر کا پیشاب بھی قریب قریب پہلے برتن کے
 پیشاب کی طرح گدلا ہوگا + اور اگر اس کے ساتھ ساتھ الہتاپ مثانہ بھی
 موجود ہے تو دوسرے برتن کے اندر کا پیشاب ادب بھی زیادہ سیلا اور
 گدلا ہوگا + اس مرض کی مژمن حالت میں جبکہ صرف زرقہ موجود ہو
 تو پہلے مجری البول کے مقدم حصہ کو ۵-۶ اوقیہ حامض برتنی کے محلول
 سے دھو لینا ضروری ہے + اس دھوؤن کو امتحان کئے لئے غلغلو رکھ
 لینا چاہئے + دھوئے کے بعد پھر دوسرے برتنوں میں پیشاب کرایا جائے
 (جیسا کہ اوپر درج ہو چکا ہے) + اگر امتحان سے پہلے اس طرح دھویا نہیں
 جاوے گا تو مجری البول کے پچھلے حصہ کی پیپ پیشاب کی دھار سے دخل
 کر باہر آجائے گی اور شناخت غلط ہو جائیگی + زرقہ کی حالت میں مٹھا کر
 بونی یا مٹھا کر باطنی کے ذریعہ بھی امتحان کرنا چاہئے + یہ آرائیکہ حالت
 کی نکلی ہے جس کے اندر بکلی کی روشنی اس طریقہ سے پہونچانے کا نظام

۱۔ منظر باطنی۔ برتن پر مسکوپ۔

۲۔ روح کا گالہ (دندہ) ٹیک۔

۳۔ منظر باطنی۔ انڈر مسکوپ۔ وہ آلہ

۴۔ الہتاپ مثانہ۔ سستانی ٹش۔

جس سے جسم کی کوئی تضلیاتی کے اندر

۵۔ زرقہ۔ گلیٹ۔

نظارہ کیا جائے۔

۶۔ حامض برتنی۔ برک ایسڈ۔

ہوتا ہے کہ جس سے مجری البول کی دیواریں نظر آ جاتی ہیں + مجری البول کو پہلے دھونگنی (منفخ) سے ہوا بھر کر پھلایا جاتا ہے + اس طرح دیکھنے سے ضیق الاطیل ابتدائی درجہ میں یا مقامات متفرقہ یا بعض حصص کے انگوری دانے جو ادبھار نام و بیشیش نامہ بخیمہ کی صورت میں ہوں اور اسی طرح کی دوسری باتیں شناخت کی جاسکتی اور اس کے علاوہ مناسب مقامی علاج رزخم یا انگور پر دوا وغیرہ لگانا ابھی بخوبی کیا جاسکتا ہے۔

پیپ کا اخراج ہر وقت لازمی طور سے سوزاک ہی کا نتیجہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایسی عورت کے ساتھ صحبت کرنے سے بھی مجری بول میں سادہ التهاب ہو سکتا ہے جو محض سیلان الرحم (سیلان ایض) کا عارضہ رکھتی ہو یا جو ہاری ایام (داد ارض) سے کئی طور پر فسخ نہ ہو چکی ہو، اور جسے کسی قسم کے جراثیمی مرض کا شائبہ نہ ہو، ان حالات میں ایسے عددی کا باعث محض معمولی کرویات صدیدہ یہ ہو سکتے ہیں یا یہ بھی ممکن ہے کہ علم حسی قرونی ہوں جو نہایت کثرت کے ساتھ اذام ہناتی اور مہل کے اور لم (التهاب فرج و مہل) کا سبب مانے گئے ہیں + سادہ (غیر نوعی) التهاب مجری البول کی تشخیص خود مریض کی بیان کردہ حقیقت حال سے ایک حد تک ہو سکتی ہے، اگر طبیب جب تک پیپ کا غور دینی امتحان کر کے کرویات سوزاک کی غیر موجودگی کا بخوبی پتہ نہ ملے معائنہ نہ کرے۔ تشخیص مرض یقینی نہیں ہو سکتی + بائینہم یہ یاد رکھنا چاہئے کہ گاہے کرویات سوزاک عرصہ دراز تک غشائے مخاطی کی خلاؤں اور شکنوں میں بحالت جمود

۱۔ دوا راحیض - منشر و اشین۔	۱۔ دھونگنی - منفخ - بلوز۔
۲۔ جامعی مرض - دینرل ڈیزیز۔	۲۔ زوائد بخیمہ - پولی پانڈ۔
۳۔ کرویات صدیدہ - پایو بیک کا کافی۔	۳۔ التهاب مجری البول - ادہ ہپل پور تھیرانی ٹش
۴۔ معنی قلعنی عام - میسیس کولائی کیڈوس۔	۴۔ سیلان الرحم - سیلان ایض - لیڈ کریا۔

دسکون پوشیدہ رہتے ہیں، اسی وجہ ایک ایسا شخص جسے ایک مرتبہ سوزاک ہو چکا ہو، اگرچہ بظاہر اوس میں سوزاک کی کوئی علامت نہ ہو تو یہی وہ دوسرے شخص تک اس مرض کے منتقل کرنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ مزید برآں نفرسی مزاج کے بعض میں قارورہ کا تیزی کے ساتھ ترش ہونا، اور خصوصاً اوس میں حامض بولی کی قلموں کا بکثرت موجود ہونا، تازہ تحریک پہنچا کر ایک عرصہ کے غائبہ التهاب مجری البول کو از سر نو تازہ کر سکتا ہے۔ بار بار یہ اتفاق پیش آتا ہے کہ سوزاک ہونے کے بعد ہی کرنے یا نہ کرنے کے متعلق طبیب سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ محض پیپ یا مواد کا بند ہو جانا اس بات کی کافی ضمانت نہیں ہے کہ شادی بلا احتمال ضرر کی جاسکتی ہے۔ ایسے حالات میں بے خطر اور بہترین طریقہ امتحان کا یہ ہے کہ کسی کیلادی ٹینج مثلاً نفرو ٹوڈاگین کے محلول (حصہ ۱۰۰ حصے میں) کی پچکاری لگا کر التهاب از سر نو پیدا کیا جاوے اور پھر مواد کا امتحان علم الجراثیم کے روستے طریقہ معینہ کے مطابق دارالتجربہ میں کر کے کر دیا ت سوزاک کی موجودگی یا غیر موجودگی کا یقین حاصل کر لیا جاوے۔

علامہ۔ سوزاک حاد کے ابتدائی درجوں میں قلیات (شور) کے استعمال سے پیشاب کی ترشی رفع کر دینی لازمی ہے، امعاء کے نفل کو تحریک دیکر آزاد رکھنا چاہئے اور مقامات داؤت کے تین میں مسکنات کے ذریعہ مثلاً شیخنج سے سکون پیدا کرنا چاہئے غذا سادہ مکی ہو اور محرک نہیں ہونا چاہئے، ہر قسم کی شراب سے قلعی بہیز لازم ہے نیز چائے، کافی (رقہہ) انیس پنی چاہئے۔ مریض کو ہدایت کی جائے کہ سادہ لطیف

مثلاً حامض بولی۔ یورک ایسڈ۔	مثلاً ترشی۔ اسید ٹی۔
مثلاً قلم۔ بلذات۔ کرسٹلز۔	مثلاً مسکنات۔ سید ٹیوز۔
مثلاً نفرو ٹوڈاگین۔ نائٹریٹ آف سڈر۔	مثلاً بیج۔ اجائن خراسانی۔ ہن مین۔
مثلاً قلیات۔ الکلیز۔	مثلاً محرک۔ ہسٹری مولٹ۔

دسکن چیزیں مثلاً آتش جزا دودھ، مادہ الزیہ (کھاری بوتل) وغیرہ بکثرت پیا کرے۔
 مٹن یعنی کیسہ منجیہ کو سہارا دیکر معلق رکھنا چاہئے، اور مریض کو ہدایت کرنی چاہئے
 کہ سخت یا دیر تک ورزش اور جسمانی محنت نہ کرے۔ مقامی علاج کسی قسم کا اس
 درجہ میں ضروری نہیں ہے، اگرچہ گرم حمام نصفی سے درجہ جن میں تخفیف ہوتی ہے۔
 فی الحقیقت بھری البول میں ادویہ کی پیکاری اس درجہ میں نقصان کا باعث ہوتی
 ہے۔ جب تک مواد زیادہ آتا رہے اور پیشاب کی طبع جاری رہے صرف یہی علاج جاری
 رکھنا چاہئے۔ مگر جو ان ہی ان علامات میں تخفیف و اعتدال پیدا ہو جاوے یعنی
 بساات مثلاً روغن صندل (۱۰ قطرے کیس ہامی کے اندر رکھ کر روزانہ تین سے
 چہر بار) بٹاشن کو بانی (۱۰ قطرے کیس کے اندر یا مزینج کی صورت میں روزانہ تین بار)
 یا کباب چینی (نصف سے ایک درہم کی مقدار میں کا غذائی غلاف میں لپیٹ کر)
 کا استعمال قائم نہ ہوتا ہے۔ کباب چینی اور بٹاشن کو بانی ہر دو کے خصوصاً بٹاشن
 کو بانی کے استعمال سے تیز بخار، سرخ چھینیاں پیدا ہو جاتی ہے جس میں سخت نسفع
 و طبع، تمام بدن پر ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔

مجرائی بول میں غلوات کی پیکاری کے متعلق سخت اختلاف ہے۔
 سب باتوں پر غور کر سنا کے بعد ہمارا خیال ہے کہ سوزاک حاد کے معمولی مریضوں

مٹہ الزیہ، سوڈا وائٹ۔	مٹہ روغن صندل۔ صندل آئل۔
مٹہ عصفن، ہسکریٹم۔	مٹہ کیس ہامی۔ کپشولان۔
مٹہ معلق (س پینڈل) ایک تھیلی نا	مٹہ بٹاشن کو بانی۔ کوپہ با۔
کرچی ہوتی ہے، جس میں عصفن کو سہارا دیکر	مٹہ مزینج۔ کمپنر۔
معلق رکھتے ہیں۔	مٹہ کباب چینی۔ کیوب۔
مٹہ حاد مضعفی۔ ہسپ یا تھ۔	مٹہ کا غذائی غلاف۔ ویلیر پیر۔
مٹہ روغن بٹاشن۔ اولیو باسوم۔	مٹہ طبع جلدی۔ رین۔

میں جن میں زیادہ شدت کا مرض نہیں ہو، پچکاری کے علاج سے کامیابی کے ساتھ
 معالجہ ہو سکتا ہے، اور جب نمایاں طور سے مقامی نتیجہ اور صلیب موجود ہو تو عموماً انکا
 استعمال ترک کر دینا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن جب پیپ سواد کا بہنا زیادہ عرصہ تک قائم
 رہے، یا جب گزشتہ حملوں کے باعث مجرائی بول کی جھلی دبیز اور مٹی ہو گئی ہو
 اور خصوصاً جب زلفہ دسوزاک مزمن کی حالت ہو تو پچکاری سرنوں کا استعمال لازمی
 طور پر کرنا چاہئے۔ پچکاری کے استعمال کا بہترین طریقہ درج ذیل ہے:-

پہلے مرلیض پیشاب کرے تاکہ مجرائی بول کا راستہ بخوبی دھل کر مواد سے صاف
 ہو جائے۔ اس کے بعد فوراً پچکاری سے دوا اندر داخل کی جاوے۔ شبیہ کی
 ایک چھوٹی پچکاری رجن میں بقدر ڈیڑھ تولہ کے پانی آسکتی ہو لیکن پچکاری کی
 گول ٹونٹی مجرائی بول کے دمانہ میں داخل کر کے سوراخ کے لبوں کو ٹونٹی کے اوپر
 داب لیا جاوے۔ پھر دوا مجری لبوں کے اندر داخل کیے پچکاری کو اس ترکیب سے
 نکال لیا جاوے کہ جب پچکاری ہٹائی جائے تو اونٹلی اور انگوٹھے سے سوراخ کو دبایا
 جاوے اور دوا کو غریب میں ٹائیڈ کے اندر ہی رہنے دیا جاوے۔ اس وقفہ کے
 بعد اونٹلی اور انگوٹھے کو ڈھیلا چھوڑ دیا جاوے تاکہ دوا باہر نکل آوے۔ بعض دیگر
 اقسام کی مثلاً برتر وغیرہ کی پچکاریاں بھی استعمال کی جاتی ہیں لیکن بلاشبہ شبیہ
 کی پچکاری سب سے بہتر اور زیادہ مطہر ہوتی ہے۔ مختلف اقسام کے غسولات کی
 پچکاری رائج ہے، مگر نسخہ جات ذیل نہایت مفید معلوم ہوتے ہیں۔

(۱) صبیح کات ہندی ۱۰ قطرے

آب مطہر۔ ۱ اوقیہ۔

مٹا بسم۔ ٹونٹی۔ نزل۔	مٹا ربر۔ مطا۔ ربر۔
مٹا ٹائیڈ۔ سکند۔	مٹا صبیح کات ہندی۔ ٹیچر کیے کو۔

(۲) غار صین کبریت آگین۔ ۲ قحہ۔

آب مطہر۔ ۱- اوقیہ

(۳) غار صین منغیس آگین اعلیٰ۔ ۱ قحہ

آب مطہر۔ ۱ اوقیہ

(۴) فضہ شور آگین۔ ۱ قحہ

آب مطہر۔ ۱- اوقیہ

(۵) فضہ زلال گین (پر دھار گال) ایک فی صدی محلول۔

اکثر زنی التهاب میں مواد درطوبت کو روکنے اور خشک کرنے کے چاندی

(فضہ) کے حیوانی مرکبات استعمال کئے جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت مستدل

ہوتے ہیں اور خراش نہیں پیدا کرتے۔ فضہ زلال گین (پر دھار گال) فضہ

اور حامض نوڈی کا ایک مرکب ہے۔ فضہ اور حامض نوڈی کے بہت

سے مرکبات آجکل بنائے گئے ہیں۔ چنانچہ فضہ زلال گین سے بہتر

آر جے رال (فضائل) اور سل وال (نقرال) اور ان دونوں سے

بہتر فضین (آر جنٹین) کو سمجھا جاتا ہے (چاندی اور حامض نوڈی کا

ایک تین مرکب ہے)۔ یہ دوا میں مقامی طور سے غشیہ مخاطیہ کے التهاب

میں اب بہت علاج میں اور سوزاک کے علاوہ ان کا مقامی استعمال پھریری کے

ذریعہ انگوٹھوں کے ردھوں میں بہت کثرت سے رائج ہے۔ مترجم

۱- حامض نوڈی۔ نیوک ٹاک ایسڈ۔

۲- فضائل۔ آر جے رال۔

۳- نقرال۔ سلوال۔

۴- فضین۔ آر جنٹین۔

۵- فضہ شور آگین۔ اعلیٰ۔ پرینگے نیٹ آف نیوک۔

۶- فضہ شور آگین۔ انٹریٹ آف سلور۔

۷- فضہ زلال گین (پر دھار گال) چاندی اور

زال گین (ایسوز) کا زرد سفوف ہے۔

نہایت اہم راز کی بات یہ ہے کہ پہلے ان دواؤں کی پیکاری روزانہ چار بار
اور بعد میں صبح و شام ایک ایک بار اور سوت بھی جاری رکھی جاوے جبکہ بظاہر مواد و
پیسپ کا ٹھنڈا ہل بند بھی ہو گیا ہو + پیکاری کی دوا کو ہمیشہ ۱۰۰ درجہ کی حرارت دیکر
گرم کر لینا چاہئے اور اس بات کا بخوبی خیال رکھنا چاہئے کہ پیکاری کی دوا میں زیادہ
تیز مقدار میں ہرگز نہ دی جاوے ورنہ خراش اور جلن زیادہ ہو جاوے گی اور مجبائی بول
کی جھلی کو نقصان پہونچے گا +

لیکن یہاں اس بات کا اظہار ضروری ہے کہ بہت سے ماہران امراض اعضائے
بول و تناسل اس امر میں بالکل مختلف خیالات رکھتے ہیں اور ادائیگی رائے ہے کہ سوزاک
کا علاج نہایت کامیابی کے ساتھ اس کے ہر درجے میں شکاریہ منغیس آگین اعلیٰ کے
کمزور محلول کی کثیر المقدار پیکاریوں سے کیا جاسکتا ہے۔ اور پیکاری ایسی طاقت سے
دینی چاہئے کہ مجبائی بول کے تمام حصے (غلاٹین اور ٹکڑے) خوب پھیل جائیں اور انہیں
بلکہ شانہ میں دوائے وافع عفونت بخوبی پہونچ جائے + اونکا خیال ہے کہ اس طریقہ
علاج سے ابتدائی سوزاک بہت جلد بند کر دیا جاسکتا ہے اور مرض آگے بڑھنے
نہیں پاتا +

سوزاک مزمن کا علاج - یہ ہمیشہ بہت مشکل سے اور وقت سے جاتا ہے
ابتدائی درجہ کی طرح، اس درجہ میں بھی مریض کے عام عادات و اطوار کی اصلاح
ضروری ہے + معاد کا فضل باقاعدہ کرنا اور قبض ددر کرنا چاہئے، اور مریض کے لئے
عورت کی صحبت سے قطعی پرہیز کرنا و تجربہ کا قایم رکھنا ضروری ہے تاکہ حد درجہ نہ
پھیلے + قبض دفع کرنے کے لئے محلول حدیدہ اخضر آمیز اعلیٰ بڑی معیت درار میں

۱۰ محلول حدیدہ اخضر آگین اعلیٰ لاکٹوفلانی
پر کلورائیڈ -

۱۰ شکاریہ منغیس آگین اعلیٰ پر مینگے نیٹ
آف پوٹاش -

رخ فرنگی کی مناسب مقدار کے ساتھ دینا چاہئے۔ اس عمومی علاج کے ساتھ پڑانے
سوزاک کے لئے مقامی علاج بھی پچکاریوں کی صورت میں، جیسا کہ اوپر درج ہو چکا
ہے ضروری ہے۔ گاہے و گاہے کی سرد دھوس محبت (دستانی) ہر تیسرے چوتھے
روز داخل کرنے سے بھی نہایت مفید اثر حاصل ہوتا ہے۔ مجری البول کو آگے نہ بڑھنے
دے۔ ممدودہ کے ذریعہ باقاعدہ پھیلائے کی ترکیب کو بھی بعض اہلکار نے مفید بتلایا ہے
اس سے تمام چھوٹی ظلائین اور فضائیں رجو مجری البول کے گرد جاتی ہیں (و باقی
ہیں اور ان کے اندر سے بھرا ہوا مواد نکل جاتا ہے)۔ غذائے ذمی اور ادویہ مٹی کی
بالش مہر زکی راہ سے ہفتہ میں ایک یا دو بار مفید ہے، جبکہ یہ حصص بھی مبتلائے
مرض ہو چکے ہوں۔ مجری البول کے بعض حصص میں جب التهاب کے ساتھ دانہ
ساختیں بھی بن گئی ہوں تو ان دانوں پر فضا شورائین ایک سے ۵ فی صدی قوت
تک کی پھیری آگے منظر الاظہیل کے اندر سے مقامی طور پر لگائی جائے۔ اگر ان
وسائل سے کامیابی نہ ہو تو مجری البول کے پچکلے حصہ کا مقامی علاج براہ راست
ایسی ادویہ سے کرنا چاہئے جیسے فضا شورائین کا محلول (۱۰ حصہ ہزار حصوں میں)
یا محلول شخار یہ منغیس آگین (۱۰ حصہ ہزار حصوں میں)۔ اسکا سادہ اور بہترین طریقہ
غالبا یہی ہو سکتا ہے کہ ایک ربڑ کا قانا طیر جبکہ اطول ناپ کر معین کر لیا گیا ہو اور تقریباً

مسطح فرنگی۔ اپر سائٹ۔

مٹا التهاب مینیٹی۔ گرے نیولر انفلامیشن۔

مٹا محبت۔ بوجی۔

مٹا فضا شورائین۔ مائٹریٹ آف سلور۔

مٹا ممدودہ۔ مومتعہ۔ ڈائی بیٹر۔

مٹا منظر الاظہیل۔ یورے تھراسکوپ۔

مٹا ممدودہ ذمی۔ پراسٹیت گلینڈ۔

مٹا شخار یہ منغیس آگین۔ اعلیٰ۔ برینگلے نیٹ

آف پوٹاش۔

مٹا ادویہ مٹی۔ ویسی کیولی سی سٹیز۔

مٹا قانا طیر دیکھئے۔

۱۔ قیڑ (مجرى البول) میں داخل کیا جاوے اور پھر اس قیڑ کے اندر سے دوا کا پانی اندر داخل کیا جاوے۔ اس طرح ہفتہ میں دو یا تین بار کرنا چاہئے۔
 سوزاک اور عوارض سوزاک کا علاج تلیق جراثیمی (مادۂ تلیق) سے تلیق جراثیمی سوزاک و عوارض سوزاک کے علاج میں بہت مفید ثابت ہوئی ہے، اگرچہ مجرى البول کی راہ سے پیپ و مواد کے لیے یہ اتنی مفید نہیں ہے جتنی کہ سوزاک کے دیگر عوارض کے لئے، تاہم بعض حالات میں جبکہ مزمن زرقہ ہوا درجہ تحت کاذ میں جبکہ مواد میں کمی آ رہی ہو، تلیق جراثیمی مفید ثابت ہوئی ہے۔ امراض مفاصل امراض چشم، امراض اعضاء و احشاء باطنہ جب سوزاک کے اثر سے پیدا ہو جائیں تو علاج بالتلیق نہایت مفید اثر رکھتا ہے۔ مادۂ تلیق کے طیار کرنے کا طریقہ علم الجراثیم کے باب میں مفصل درج ہو چکا ہے۔ مقدار چھکاری معمولاً دس کرور سے پچاس کرور مردہ جراثیم سوزاک مادۂ تلیق کی ایک خوراک میں ہونے چاہئیں۔

عوارض سوزاک

عوارض سوزاک حسب ذیل عنوانات کے تحت میں باسانی منضبط ہو سکتے ہیں

(۱) وہ عوارض جو سوزاک کے براہ راست پھیلنے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔

مردوں میں جو عوارض سوزاک کے براہ راست پھیلنے سے ہو جاتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) التهاب حشفہ جن مریضوں میں قلعہ زیادہ لمبا ہونے سے، ادن میں درم

حشفہ اکثر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ درم عموماً معمولی جراثیم صمدیہ کے باعث پیدا ہوتا

۱۔ التهاب حشفہ بے نانی ش۔

۱۔ مادۂ تلیق۔ دیکھیں۔
 ۲۔ تحت الحاد۔ سب ایکوٹ۔

ہے نہ کہ رویت سوزاک کے باعث + بطور ثانوی نتیجہ کے قنصب کی عرق جاذبہ متورم ہو جاتی ہیں اور گاہے کچ ران میں بد (خیلوجل اُربی) بھی نمودار ہو جاتا ہے گاہے درم حشفہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سُرُخ دانہ دار ساختیں جو سلعہ حلیہ کے طور پر ہوتی ہیں، اور جنکو ٹائٹل سوزا کہتے ہیں پیدا ہو جاتی ہیں + ایسے سوزا کی متے خصوصاً حشفہ کے اوپر اور بھرتے ہیں، مگر گاہے یہ قلفہ کے حاشیہ (کنارے) پر بھی ہوتے ہیں اسکا مفصل بیان امراض قنصب و امراض مجری البول میں درج ہوگا +

(۲) خراج جُنْبَنی۔ جب جراثیم سوزاک یا ادنکے ساتھ کے جراثیم صمدیہ کا عددی مجری البول کی ایک یا ایک سے زائد فضائوں میں پہنچ جاتا ہے تو ان میں پھوٹا پیدا ہو جاتا ہے + ایک سخت دردناک سُرُجن، مجری البول کی زیریں دیوار کے برابر ہوتا اور مجری البول کے اندر اور بھر کر یا تو اسی میں پھوٹ جاتا ہے یا مجری البول سے باہر کی طرف پھوٹتا ہے یا اندر اور باہر دونوں جانب پھوٹ پڑتا ہے + اس آخری حالت میں یعنی جبکہ وہ مجری البول کے اندر اور باہر دونوں طرف پھوٹے ماصور قنصبی پیدا ہو جاتا ہے +

لہذا جس قدر جلد ممکن ہو پھوڑے کو باہر کی طرف سے نشتر لگا کر چیر دینا چاہئے تاکہ ماصور قنصبی پیدا نہ ہونے پائے، ورنہ ماصور قنصبی بہت مشکل سے اچھا ہوتا ہے + اگر ماصور قنصب، مجری البول کے دانہ سے قریب ہی واقع ہو۔ (جو نہایت عام ہے) تو وہ شانہ ہی خود بخود اچھا ہوتا ہے، لیکن بعض حالات میں یہ بڑی کئی

۱۔ خراج جُنْبَنی۔ لیکٹیوزالس۔

۲۔ ماصور قنصبی۔ چائل نچولا۔

۳۔ برقی کی۔ انکثرک کا ڈٹری۔

۱۔ خیلوجل اُربی۔ انکثرل بیو۔

۲۔ سلعہ حلیہ۔ پیلوا۔

۳۔ ٹائٹل سوزاک۔ کنوریل وارٹس۔

۴۔ حشفہ۔ گلاس پےس۔

رجلی کا داغ یا فستہ شور آگین کے لگانے سے بند کیا جاسکتا ہے + اس پر ہی ہوت
 نہ ہو تو ہا صورت کو بحری البول کے دانہ میں بذریعہ نشتر کے کھول دینا چاہئے + اگر ناصو
 قضیب کے جسم میں ہو تو اکثر عمل تریقہ کی ضرورت لاحق ہوتی ہے + یہ اس طرح کیا
 جاتا ہے کہ پہلے ہا صورت کے کناروں کو زچنی سے برابر کاٹ لیا جاتا ہے، پھر اس کے
 دونوں طرف کی جلد کو اوڑھ لیا جاتا ہے اور پھر اس کو قضیب کے خط وسطانی میں
 رٹا لکوں اسے بند کر دیا جاتا ہے +

(۳) التواء زہری - یعنی قضیب کی دردناک خیمہ گی - یہ قضیب کے جسم اسفنجی یا
 دونوں جسم اجوف میں سے کسی ایک میں ترشحات کے مجتمع ہو جانے سے پیدا ہو جاتا
 ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قضیب حالت استدادگی میں نیچے کی طرف یا اطراف میں
 سے کسی ایک طرف دوائیں یا زہریں جھٹک جاتا ہے + اس کو روکنے کا بہترین طریقہ
 یہ ہے کہ شفا بخش آمیز یا دیگر مسکنات کا استعمال شب کو سوتے وقت کیا جائے
 جب یہ مرض موجود ہو تو اس کا علاج خارجی صوری سے ٹمنڈک پہنچا کر کرنا چاہئے
 دشنام برف کا پانی یا اسکی گری سہ تمال کی جیسے +

(۴) غدد ووی کا التهاب - ان غدود کے التهاب سے بعض مریضوں میں گلن
 ریسون کی گہرائی میں پیپ پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر اس کا علاج نشتر لگا کر بد نہ کیا
 جاوے تو ناصو وور بولی پیدا ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے -

۱۔ فستہ شور آگین - ہا صورت	۲۔ عمل تریقہ - چارٹک آپریشن
۳۔ التواء زہری - کارڈی	۴۔ جسم اسفنجی - کارپس اسفنجی اورم
۵۔ جسم اجوف - کارپس کورنوسم	۶۔ غدد ووی - کوپر س گلینڈ
۷۔ ناصو وری - یورینری فنجولا	۸۔ دشنام برف کا پانی

- (۵) التهاب غددہ مذی (سوزاک سے)
- (۶) التهاب اورعیہ منی (")
- (۷) التهاب اغدیہ دوس (")
- (۸) التهاب مثانہ (")

۲) اعوارض سوزاک جو براہ راست سمیت سوزاک کے منتقل ہونے سے پیدا ہوتے ہیں

(۱) سوزاک کی التهاب مقعد۔ یہ مستورات میں لگتا ہے اور رطوبت کے حدی سے

پیدا ہو جاتا ہے جو خارج سے خارج ہوتے ہیں، علاوہ ان میں مرد اور عورت دونوں میں عاداتِ خلاف وضعِ فطرت (لواطت) کے باعث بھی پیدا ہو سکتا ہے + مرد و عورت دونوں اور گارٹھر کا غلطی صمدیدی مواد کا نکلنا اس کی نمایاں علامات ہیں + علاوہ رطوبت و خلیج آگین اور ایندھن کا یا حمض بڑھتی کا حقہ کریں +

(۲) سوزاک کی التهاب انف بھی بعض حالتوں میں پایا جاتا ہے + نہایت کثیر مقدار میں پیپ ناک سے خارج ہوتی ہے + علاوہ مسکنات کی گرم پککاری سے دھونا چاہئے اور پھر تھوڑی دیر بعد رقیق قابضات سے +

(۳) سوزاک کی رتھہ۔ یہ بالغ اور بچوں اور دو میں پایا جاتا ہے + بالغ مرینوں میں استسما ایک ہی آنکھ میں ہوتا ہے + بچوں میں یہ دونوں آنکھوں میں ہوتا ہے اور دوران وضع حمل میں ماں کے اندام نہانی سے عدوی پیدا ہو جانے کے باعث ہوتا ہے (رٹھ صبیانی - رد مولود) +

۱۔ غددہ مذی - پراسیٹ گلیڈ	۲۔ رصاص خلیج آگین - اسی ٹیٹ آف ایڈ
۳۔ اورعیہ منی - ویسی کیلی سی سے نیر	۴۔ حمض بڑھتی - بورک ایڈ
۵۔ اغدیہ دوس - اپنی ڈڈاس	۶۔ التهاب لالہ - رانی ہائی ٹل
۷۔ التهاب مقعد - پرائی ٹل	۸۔ التهاب حوض - آنکھ ٹل
	۹۔ رطوبت - آفٹلیا نیوے فورم

یہ ایک نہایت عجیب واقعہ ہے کہ اگرچہ سوزاک اس قدر عام مرض ہے پھر بھی نہایت کم مریضوں کے اندر لقمہ میں سوزاکی عدوی پایا جاتا ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ التهاب لقمہ پیدا ہونے کے لئے اول تو سوزاکی سمیت کا براہ راست لگنا ضروری ہے دوم اس جھلی کا ایسی حالت میں ہونا بھی ضروری ہے کہ اس میں قبولیت مرض کی استعداد اس وقت موجود ہو۔

بالغ مریض میں سوزاکی التهاب لقمہ میں شروع ہوتا ہے کہ پہلے آنکھ میں سرخی اور لندہ و ہچان پیدا ہو جاتا ہے پھر جلد ہی مواد آنے لگتا ہے جو پہلے غاطی ہوتا ہے لیکن جلد ہی صدیدی (پسپ دار) ہو جاتا ہے۔ پوٹے سرخ اور تترم ہو جاتے ہیں لقمہ مٹا ہو کر تہی ہو جاتا ہے۔ اور مواد کیلئے لقمہ کے اندر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اگر اسے روکا نہ جاوے تو تقریباً قرنیہ، بلکہ مناد و قرنیہ (غانغرا) اور ممکن ہے کہ التهاب مقلہ عمومی واقع ہو جائے۔ بچوں میں اندامین عموماً اسی کے باعث پیدا ہو جاتا ہے۔

علاج۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مقابل کی آنکھ کو مرض سے محفوظ رکھنے کا فوری انتظام کیا جاوے۔ اس مطلب کے لئے سپرچسٹم و ترس بور (شہور ہے) موم جامہ کا ایک چھوٹا ٹکڑا لیا اور ایک گول حلقہ درمیان میں کاٹ کر گھڑی کا شبیہ اس غائی حلقہ کے اوپر چایا جائے۔ اور پھر اسکو مقابل (سج) آنکھ پر نصف کے ذریعہ بخوبی چپکا دیا جاوے۔ (شخاف کاغذ کے باعث دیکھنے میں کوئی وقت نہیں ہوگی) جس آنکھ میں التهاب لقمہ ہے اس کی رات دن احتیاط کے ساتھ نگرانی کرنی چاہئے

۱۔ سپرچسٹم۔ آئی شیلڈ۔

۲۔ ترس بور برس بشیلڈ۔

۳۔ موم جامہ۔ سیکن ڈش۔

۴۔ نصفہ پلاسٹر۔

۱۔ لقمہ کیمرس۔

۲۔ کیلئے لقمہ کنبڈائی دل سیک۔

۳۔ مناد و غانغرا۔ ٹکرکس۔

۴۔ التهاب مقلہ عمومی۔ ہان انفلامی ٹش۔

تاکہ اوشن میں رطوبت و موائج نہ رہے + بار بار گرم بورتی غسل سے آنکھ کو دھویا جاوے، اور ہر چار گھنٹہ کے بعد غسل مذکور سے دھو کر آنکھ کو صاف پھاتے سے خشک کر کے پھر غسل فتنہ شور آگین (دھتھرہ ایک اوقیہ پانی میں) نرمی کے ساتھ دھویا جاوے اور اس کے بعد مہتر سال نکین آنکھ میں بہا کر صاف کر لیا جاوے + درمیانی وقفوں میں شاکہ کی ہٹی برف سے ٹھنڈے کیے ہوئے بورتی غسل میں ترکے چھوڑ کر آنکھ کے اوپر رکھی جاوے + یہی طریقہ علاج جاری رکھا جاوے، حتیٰ کہ پیپ بند ہو جائے + جب پیپ آہستہ بند ہو جاوے تو فتنہ شور آگین کا استعمال ترک کر دیا جاوے، اور صرف سادہ قابضات مثلاً جشت اخضر آمیز یا جشت کبریت آگین کام میں لائے جاویں +

شیر غار بچوں میں اس مرض کی رفتار نہایت شدید اور تیز ہوتی ہے، اور قریبہ میں زخم (تقرح قرینہ) یا آکل ہونے کا بہت احتمال ہوتا ہے، اکثر اس قسم کے عارضہ کے بعد رطوبت جلیدیہ آنکھ سے خارج ہو جاتی ہے اور اندام پن مودار ہو جاتا ہے + لہذا اس خطرناک مرض کے حفظ و مقدم کے لیے قریبی کی رائے ہے کہ ہر روز اندیدہ بچے کی آنکھ کو فتنہ شور آگین (۴ فی صدی) یا سیلانی مسعد (دار چینہ) کے غسل سے پیدائش کے بعد فوراً دھو لینا چاہئے + جب پیپ پیدا ہو جاوے تو روزانہ میں علاج بطریق مذکورہ بالا کرنا چاہئے، مگر اس حالت میں دوسری آنکھ کو

۱۔ جشت اخضر آمیز - کلورائڈ آف زینک -

۲۔ جشت کبریت آگین - سلفیٹ آف زینک -

۳۔ رطوبت جلیدیہ - لنز -

۴۔ فتنہ شور آگین - ٹائٹریٹ آف سلور -

۵۔ سیلانی مسعد - کریمو سلانی سیٹ -

۱۔ غسل بورتی - بورک لوشن -

۲۔ فتنہ شور آگین - ٹائٹریٹ آف سلور -

۳۔ شاکہ (لینٹ) ایک نرم روٹیں دار

کپڑا ہے +

۴۔ قابضات - اسٹرنجٹ -

بچانے کے لیے سپرچیم کا استعمال چنداں فائدہ مند نہیں ہو سکتا کیونکہ عدوی
دو دونوں آنکھوں میں برابر پہنچ چکا ہے +

(۳) عمومی انجذاب سمیت کے عوارض

(۱) سوزاک کے باعث عوارض مفاصل۔ یہ عموماً سوزاک کے تحت الحاد درجہ
میں پیدا ہو جاتے ہیں (۱) مفصل بیان اور علاج باپ مفصل میں درج ہوگا +
(۲) اور الم صلیبہ۔ ہر ایک عضلی، وترئی، رباطی، یا صفائی ساخت، سوزاک کے دوران
میں متورم ہو کر دردناک ہو سکتی ہے + تکرر کی محراب کو سہارا دینے والے رباطات
اس قسم کے درم میں بستلا ہو جاتے ہیں + لہذا اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ اگر گرمی
ایسی حالت میں چلتا پھرتا رہے گا تو تکرر کی محراب صانع ہو کر پاؤں کا تکرر ہمیشہ کے
لئے چپٹا پڑ جائے گا (قدم روعا۔ چپٹا ملو) +

(۳) التهاب طبقة صلیبہ (سوزاک سے) تکرر کے نیچے کی گہری یعنی ساخت
کا التهاب نہایت شاذ ہوتا ہے، اور یہ سوزاک التهاب تکرر سے بالکل جدا گانہ طور پر
پیدا ہو جاتا ہے + اس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ زیر تکرر سرخی زیادہ نمودار ہو جاتی
ہے اور آنکھ کے ذیل (مقلد) میں چھوٹے سے بہت درد پیدا ہو جاتا ہے، جو ہر علاج
کا مقامی استعمال کرنا چاہئے، اور اگر ضرورت ہو تو کپٹی کے مقام پر جو نکلیں ملا

ملا تکرر کی محراب۔ آسج آفندی فوٹ۔

ملا چپٹا تکرر (قدم روعا) فلیٹ فوٹ۔

ملا التهاب صلیبہ۔ اسکے ردائی سٹل۔

ملا جو ہر لفتح۔ اثر و بین۔

ملا مندرجہ۔ کپٹی۔ ٹیل۔

ملا جو نکلیں۔ پچھڑ۔

ملا تحت الحاد سب ایکوٹ۔

ملا درم یعنی۔ فاشر و سانی سٹل۔

ملا وترئی۔ سٹڈی سٹل۔

ملا رباطی۔ لگا سٹل۔

ملا صفائی (اپر نیور ویک) صفائی چوٹے

اور تکرر چپٹے ہوئے ہوں۔

لگاؤی جاویں +

تنبیہ۔ اذرام لیثیہ اور التهاب صلیبیہ ان دونوں حالات کی ماہست آپ تک مشکوک وغیرہ تحقیق ہے + غالباً یہ اسوجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں کہ چند کرویات سوزاک جن کی حدت سیمہ کمزور پڑ گئی ہو، ان ساختوں میں موجود ہو کر مرض پیدا کر دیتے ہیں + یا سوزاک کی مقامی آفت سے سینق پیدا ہو کر جذب ہو جاتے ہیں اور یہ عوارض اُسے پیدا ہو جاتے ہیں +

(۴) حقیقی سوزاک تفتیح دم (تفتیح دم زہری) اسکو تسنم زہری بھی کہتے ہیں یہ گاہے پیدا ہو کر بدن کے مختلف حصوں میں دوسرے پھوٹے بنا دیتا ہے جن میں صرف کرویات سوزاک پائے جاتے ہیں + یہ پھوٹے عموماً گہری ساختوں سے شروع ہوتے ہیں اور کسی قدر مزمن ہوتے ہیں + لیکن بعد میں تفتیح کے عام نمودار نہیں نمایاں ہونے لگتے ہیں + انکو نشتر سے کاٹ کر غب کھول دینا چاہئے جس کے بعد اچھی طرح مندل ہو جاتے ہیں اگرچہ اندام میں ذرا دیر لگتی ہے +

(۵) گاہے سوزاک کے مدوی کے اثر سے صدمات قلب میں التهاب ہو جاتا ہے اور جراثیم سوزاک قلب کے اندر مونی استر میں التهاب و تفتیح بھی پیدا کر دیتے ہیں + (۶) حقیقی سوزاک تعفن دم - یہ بہت نادر ہے اور جب حقیقی سوزاک تعفن دم ہوتا ہے تو مریض کے خون میں جراثیم سوزاک پیدا ہو جاتے ہیں اور ہلکرت کا باعث ہوتے ہیں +

ملک سوزاک تفتیح الدم - گنور ہیل -	ملک صمام قلب - کارڈیک ویلو -
پانی سیا -	ملک التهاب و تقرح بطب ذہ قلب {
ملک تفتیح دم زہری گنور ہیل پانی سیا -	السرٹیو انداد کارڈائیٹس -
ملک تسنم زہری - گادو کے سیا -	ملک سوزاک تعفن دم - گنور ہیل پی سیسیا -

مستورات میں سوزاک

سوزاک مستورات میں کسی طرح کیاب نہیں ہے، فاحشہ بازاری عورتوں میں تو یہ کم و بیش شائع موجود ہوتا ہے + اکثر اس کی موجودگی عدم توجہی یا غلط تنہیں کے باعث ظاہر نہیں ہونے پاتی اور پھر اس کے اثر سے امراض رحم و امراض عانہ اکثر پیدا ہو جاتے ہیں + غالباً مستورات میں سوزاک اس وجہ سے عام ہے کہ عوام و سوزاک مزمن کی شکایت رکھتے ہیں۔ اور پھر بھی انکو شادی کی اجازت ہوتی ہے + گاہے یہ مرض مستورات میں بطور چھوت کے عام پیشاب خانوں سے یا گندہ تریوں پر ملا اور لباس کی چھوت سے پیدا ہوتا ہے +

اس مرض کی ابتدائی آفت اکثر حلیل یا عنق الرحم کے اندر فی استریا و ونس میں شروع ہوتی ہے + سوزاک کے اثر سے التهاب فرج بھی ہو سکتا ہے، مگر بالغ عورت میں سوزاک التهاب ہبل ایک غیر معمولی بات ہے + بعض اوقات عنق الرحم سے مواد نکل کر ہبل میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہاں اون میں عفونی تغیرات ہونے لگتے ہیں اور حملہ شمی سمیں کے اثر سے براہ راست التهاب ہبل پیدا ہو جاتا ہے مگر گردیات سوزاک ہبل کی غلاف سے مخاطی پر حملہ نہیں کرتے + لیکن بچوں میں حقیقی التهاب فرجی ہبلی پایا جاتا ہے +

علامات - درجہ حاد میں اندام ہنائی کے اندر ملین اور گرمی ہوتی ہے پیپ دار مواد خارج ہوتا ہے۔ اور پیشاب کرتے وقت درد ہوتا ہے + حلیل یعنی پیشاب کا سوراخ

۱۔ التهاب فرج - دوائی ش -	۱۔ سوزاک مستورات - گنوریا ان و ونس -
۲۔ التهاب ہبل - دوائی بیٹی ش -	۲۔ امراض جسم - یو ٹرائن ٹرائل -
۳۔ التهاب فرجی ہبلی - درد و دجائی -	۳۔ امراض عانہ - پلوک ٹرائل -
نانی ش -	۴۔ پیشاب خانہ - مارٹ کلوزٹ -

باقہ لگانے اور دیکھنے سے سوجا ہوا معلوم ہوتا ہے، اور اسکا منہ دوہانہ سرخ اور متورم ہو جاتا ہے + ادسکو دبانے سے پیپ نکلتی ہے + اگر عنق الرحم بھی مبتلا ہے مرض ہے تو، رحم میں احتقان دوسری راجستان خون) اور درد ہو جاتا ہے، کمر میں شیش درد ہوتا ہے، اور اکثر پیڑوں دبانے سے درد محسوس ہوتا ہے، اور خون آلود مواد نکلتا ہے +

زیادہ مزمن حالات میں کوئی خاص علامت نہیں پائی جاتی ہے، البتہ ایام مہواری درد کے ساتھ آتے ہیں۔ کسی قدر سیلان الرحم ہوتا ہے اور گاہ بگاہ پیشاب میں تخلیفت ہوتی ہے اور بار بار پیشاب آتا ہے +

ہر حالت میں درم کے پھیلنے اور شانہ تک یا رحم کی راہ سے قاذوٹ کی نالیوں (التهاب قاذوٹ) یا خصبۃ الرحم اور باریطون (پر دہ صفاق) تک پہنچنے کا امکان ہے + اس آخری حالت میں دیکھنے جب کہ مرض رحم کی راہ سے آگے بڑھتا ہے اور قاذوٹ وغیرہ تک پہنچ جاتا ہے (التهاب صفاقی اور درد درجہ کا ہو کر قاذوٹ کے طرف مشرشر (جھاردار) میں التھان پیدا کر دیتا ہے یعنی اس کی ساخت باہم چپ جاتی ہے + اس قسم کے التصاقات عورت میں اکثر عقر (بانجھ پن) کے اہم اسباب بنتے ہیں + گاہے زیادہ پھیلا ہوا اور عمومی التهاب صفاق پیدا ہو جاتا ہے (دیکھو امران باریطون) +

علاجہ۔ الکی دافع لطفن اور یہ کی چکائیاں در شانہ لیزائل ایک دو ہزار میں بیغاصہ

۱۔ سیلان الرحم۔ بیکوریا۔	۲۔ اکثر بیٹا آف فلورین ٹیوب۔
۳۔ قاذوٹ۔ فلورین ٹیوب۔	۴۔ التھان۔ اٹھسٹن۔
۵۔ التهاب قاذوٹ۔ سپنجائی ٹس۔	۶۔ عقر، عقم۔ اسٹریکیٹ۔
۷۔ خصبۃ الرحم۔ اوویریز۔	۸۔ التهاب صفاق۔ پری ٹونائی ٹس۔
۹۔ قاذوٹ کا طرف مشرشر۔ نمبرائی اینڈ	۱۰۔ لیزائل۔ لائی سال۔

۲ ہزار حصص میں) اندام بنانی کے اندر کی جائیں اور مجری بول اور رحم کی اصلاح کے وسائل اختیار کیے جائیں + جب مجری بول میں بہت درم و مواد ہو تو غذا مناسب اور باقاعدہ دی جاوے + اور قلیات کا استعمال جس طرح مردوں میں کیا جاتا ہے، کیا جاوے + بسائیات اور پککاری کی ادویہ بھی مفید ہونگی +

مرض کے آخری درجوں میں (مزمن حالت میں) فضا شور آگین کی قلموں کو مقامی طور سے مجری بول میں لگایا جاوے + چونکہ عورتوں میں مجری بول بہت چھوٹا ہوتا ہے اس طرح کی مقامی ادویہ آسانی سے لگائی جاسکتی ہیں اور استعمال کے بعد التهاب اکثر زیادہ مدت تک قائم نہیں رہ سکتا +

عنق الرحم کے اندرونی التهاب میں پہلے پکاریوں اور عنولات کے ذریعہ مقام ماؤن کو خوب صاف کر لیا جاوے اور پھر منظر نگار فضا شور آگین دس فی صدی مقامی طور سے اندر لگایا جائے +

قرحہ رخوہ

قرحہ رخوہ رزم قرحہ) ایک مقامی متعدی (عفونی) مرض ہے جو عضائے تناسل کے علاوہ اور کسی دوسرے مقام پر شاذ ہی ہوتا ہے + یہ مرض تقریباً ہمیشہ بدکاری کا نتیجہ ہوتا ہے، اور ایک مخصوص عصی روڈنڈہ ناجرٹومہ کے باعث پیدا ہوتا ہے، جو نہایت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور چھوٹی زنجیریں بناتے ہیں + انکے بذر نہیں ہوتے اور طریقہ مجرم سے یہ رنگ نہیں متبذل کرتے + انکی مصنوعی کششیں لگائی جاسکتی

التهاب بطانة عنق الرحم - انڈو
سر دانی سانی مش
منظر - اسپے کیولم
مک قرحہ رخوہ - ساف مشنگ - ایکس ملی

مک قلیات - الکلینز
مک بسائیات - باسز
مک فضا شور آگین - ٹائٹریٹ آف
سلورہ

ہیں۔ اگرچہ یہ مشکل کے ساتھ آدگتے ہیں اور انکے ساتھ اکثر پیسپ کے معمولی جراثیم بھی موجود ہوتے ہیں، مگر اس میں شک نہیں کہ ”قرحہ رخوہ“ کا یہ خاص باعث ہیں + مصنوعی طور سے اگر ان کی تلیق رکھ پکاری بدن کے اندر کی جادے تو اس کے اثر سے چند مناظر خاصہ کے واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ جو میں گھنٹے میں ایک شرخ دانہ یا دو بھار نو دار ہو جاتا ہے، اور دو یا تین دن میں ایک آبلہ دکھائی دیتا ہے جس کے گرد شدید احتقان دموی کا ایک ہالہ (گھیرا) ہوتا ہے + اس پھلے کے اندر کا مصل راسیت (جلدی گدلا پڑ جاتا ہے اور چوتھے یا پانچویں دن ایک اچھا خاصہ بٹنولا (بھنٹی) بن کر نکل ہو جاتا ہے + جو ہی اس بھنٹی کے اوپر کی کھال (بشرہ) نکل جاتی ہے، ایک قرحہ نمودار ہو جاتا ہے جس کے کنارے (حاشیہ) نہایت ہموار اور صاف کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور جس کے حدود نہایت نمایاں اور واضح ہوتے ہیں + یہ قرحہ بتدریج بڑھ کر ایک خاصی حد تک ذریعہ ہو جاتا ہے + پھر اگر اسکو صاف ستھرا رکھا جاوے تو قریب تین ہفتے میں اچھا ہو جاتا ہے + اس مضم کے زخم (قرحہ) قفسیکے حصہ پر دسکتے ہیں، لیکن بالخصوص یہ قلعہ اور حشفہ یا اکیل حشفہ پر پائے جاتے ہیں اور ان میں بہت درد ہوتا ہے اور چھونے سے ہی درد محسوس ہوتا ہے + انکاموا (ترشح) نہایت سخت معذی ہوتا ہے اور اگر مریض کے جسم میں کسی دوسری جگہ لگ جاتا ہے (تلیق) تو باطل ویسا ہی خصوصیات کا زخم (قرحہ) وہاں پیدا کر دیتا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ مرض محض مقامی ہے اور اس کے ہونے سے عام مہنی

مٹ دانہ۔ پے پبول۔	مٹ بشرہ۔ کید نیگل۔
مٹ آبلہ۔ چھالہ۔ راس نیگل۔	مٹ قلعہ۔ ہری پیوس۔
مٹ ہالہ۔ زون۔	مٹ حشفہ۔ گلاس۔
مٹ بشرہ۔ پیچبول۔	مٹ اکیل حشفہ۔ کارونا گلیٹنڈس۔

مناعت نہیں حاصل ہوتی +

اس میں اور حقیقی قرعہ آتشک (قرعہ افزنجیہ) میں یہ فرق ہے کہ قرعہ آتشک کا مواد مگر اس طرح کسی مقام پر لگ جاوے تو اگرچہ اس کے اثر سے ایک مقامی پھنسی (برخہ) تر پیدا ہو جاتی ہے لیکن آتشک کا متاثرہ زخم نہیں ہوتا + اکثر ایک ہی وقت میں بہت سے "قرعہ رخوہ" پیدا ہوتے ہیں، اور ایک زخم (قرعہ) کا مواد کسی متصلہ جلدی یا مخاطی سطح پر لگ کر بالکل ویسا ہی زخم پیدا کر سکتا ہے (قرعہ تابعہ) + مثلاً قرعہ رخوہ قلفہ سے پھیل کر حشفہ میں یا حشفہ سے قلفہ میں اسی طرح فرج کے ایک لب سے دوسرے لب میں پیدا ہو سکتا ہے + یہ ایک عجیب و غریب مگر اصل حقیقت ہے کہ قرعہ رخوہ اعضائے تناسل کے علاوہ، جسم کے کسی اور حصہ میں نادرہ نادرہ پائے جاتے ہیں +

قرعہ رخوہ کے مختلف تغیرات - قرعہ رخوہ کی ہیئت میں بعض حالات میں مختلف تغیرات پیدا ہو جاتے ہیں، جو اکثر مریض کی بے احتیاطی یا مبالغہ فکری کے باعث واقع ہوتے ہیں + مثلاً اگر قلفہ زیادہ لمبا ہو تو تمام مواد اس کے عقب میں اکٹھا ہو جاتا ہے اور وسیع تقرح پیدا ہو جاتا ہے + گاہے اس قسم کے قرعہ حشفہ تک پھیل کر قلفہ کے بالائی حصہ کے اندر سے ہوتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں اور جب ایسا ہوتا ہے تو قلفہ میں چھید ہو کر وہ حشفہ کے نیچے آ پڑتا ہے + اگر تقرح قید الحشفہ میں واقع ہو تو اس چٹ کے اندر جو ایک شریانی شلخ ہوتی ہے اس میں زخم (قرعہ) ہو جانے کے باعث بہت سیلان خون ہو جاتا ہے + جب قرعہ رخوہ میں شدید التهاب ہوتا ہے تو انتہائی ترشحات کے باعث اس کے پینے

علیٰ قید الحشفہ (قرعہ زخم) حشفہ کے زیریں جانب ایک چٹ ہے +

علیٰ قرعہ تابعہ مثلاً مثلاً مشککہ

میں نہایت سختی (رقتِ شلب) ہو جاتی ہے۔ جو حقیقی آتشک کے قرعہ (قرعہ صلبہ) سے مشابہ ہو جاتا ہے۔

گاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرعہ رخوہ اور حقیقی آتشک ہر دو کا عددی (تلفیح) ایک ساتھی یا قریب قریب ایک دوسرے کے بعد ہی حاصل ہو جاتا ہے، تو اس حالت میں جو قرعہ پیدا ہوتا ہے وہ زیادہ عرصہ تک قائم رہتا ہے، اور صحت رکھنے پر ہی جلد مندمل نہیں ہوتا، اور کچھ عرصہ کے بعد مریض میں آتشک کے خصوصی علامات ظاہر ہو جاتے ہیں۔

بہر حال، ہر صورت میں اس پاس کے غلہ جاذبہ متورم ہو کر بڑھ جاتے ہیں، چھوڑنے سے اعلان میں درد ہوتا ہے، اور پیپ پیدا ہونے (تلفیح) سے بکا ہو جاتا ہے (خیبرجل)۔ اس قسم کے متورم غدو سے جو بند (خیرجل) ہو جاتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔

(الف) "کبسیط" یا "شیخی" (خیبرجل) (سادہ بد) جو ننگی سطح یا مقام ماؤن سے معمولی جراثیم صدیدیہ کے باعث پیدا ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں اس کا مواد (پیپ) اگر کسی دوسری جگہ تنقیح کے ذریعہ داخل کر دیا جائے تو اس سے ایک بڑھ (بھنسی) پیدا ہو جائے گا، مگر حقیقی قرعہ رخوہ نہیں پیدا ہوگا۔ علاوہ ازیں معمولی بد (بسیط خیبرجل) میں علواً ہر مریضہ عرف غدو کے اندر دنی صہ تک ہی محدود رہتے ہیں۔

(ب) خیبرجل سی (موزی بد)۔ یہ نہ صرف معمولی جراثیم صدیدیہ سے بلکہ اونکے

عل غدا ذہر۔ لطفہ مک گینڈز۔

عل خیبرجل۔ بد۔ بیرو۔

عل خیبرجل بسیط۔ سہل بیرو۔

عل خیبرجل سی۔ ویرولنٹ بیرو۔

ساتھ ساتھ قرعہ رخوہ کے مخصوص جراثیم کے انجذاب کے باعث پیدا ہوتا ہے۔
 لہذا اگر یہ پیپ کسی دوسری جگہ داخل کر دی جائے (تلقیح) تو وہاں ہمیشہ ایک حقیقی
 قرعہ رخوہ پیدا ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں اس قسم کے بدن نہ صرف غدد کے اندر پیپ
 ہو جاتی ہے بلکہ غدد کے آس پاس کے محلی صفر میں بھی پیپ بکثرت پیدا ہو جاتی
 ہے (التهاب محیط غدد) +

لہذا جلد ایک وسیع رقبہ میں کھوکھلی ہو جاتی ہے، اور جب یہاں کے پودے کو
 چیر دیا جاتا ہے تو کچھ ران میں ایک زخم بڑے قحطہ رخوہ کی صورت میں نمایاں
 ہو جاتا ہے جس کے وسط میں گلی (غدة جاذبہ) دکھائی دیتی ہے جو محض معمولی
 طور پر بڑھی ہوئی ہوتی ہے + اکثر یہ کیفیت بہت آہستہ رفتار سے جاری
 رہتی ہے اور جلد کی سرخی بہت نمایاں ہوتی ہے مگر اس کے ساتھ بہت تھوڑی
 پیپ پائی جاتی ہے +

علاج۔ زخم کو صاف رکھنا چاہئے، اس کی سطح پر نسل بنفشی چھڑکنا چاہئے،
 زخم کے اوپر غسول سیال یا حامض بورق کے عنول میں نشا بھگو کر رکھا جائے +
 اس سے دس سے بیس دن کے اندر زخم مندمل ہو جاتا ہے + جب التهاب حشفہ
 زیادہ ہو تو قلعہ کو شکاف دیکر چڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر حشفہ اس وقت
 تک نہیں کرنا چاہئے جب تک کہ قروح مندمل نہ ہو گئے ہوں + خالص تیزاب شورہ
 یا حامض قطرائی بھی زخم پر جراثیم کو مارنے اور سرعت اند مال کے لیے لگایا جاتا ہے

۱۔ التهاب محیط غدد۔ پری ایڈی نائیٹل۔	۲۔ حامض بورق۔ بدک ایڈ۔
۳۔ کھوکھلی۔ اندر ماسٹ۔	۴۔ نشا۔ بٹ۔
۵۔ نسل بنفشی۔ آریڈو فارم۔	۶۔ حشفہ۔ سرکمی شن۔
۷۔ غسول سیال۔	۸۔ تیزاب شورہ۔ ٹائٹرک ایڈ۔
۹۔ حامض قطرائی۔ کاربملک ایڈ۔	

مگر اوزن کا استعمال اس وقت کرنا مناسب ہے جبکہ معمولی رسی دس درجہ بالا علاج سے زخم کا پھیلنا نہ رک سکے + اگر نسل بنفشی کا استعمال بوجہ اوس کی بدبو کے قابل اعتراض سمجھا جائے، تو بجائے اوس کے بنفشینہ (آبو ڈول) یا بنفشی حاشینہ (ارسٹول) کا سفوف چھڑک دیا جائے +

بد زخیر جل (کا علاج) - ابتدائی درجہ میں تو مریض کو آرام و سکون دینا چاہئے، اور گرم نمکد کرنا چاہئے، کرہ مصاصہ (کلیپ کا) رجب کا بیان التباب خاد کے علاج میں آچکا ہے) لگایا جاوے + ان ترکیبوں سے گاہے درم تحلیل ہو جاتا ہے، مگر جب پیپ پیدا ہو گئی ہو تو پھوڑہ میں عمودی رکھڑا (شگاف دینا چاہئے تاکہ پیپ بخوبی خارج ہوتی ہو) عمودی خط میں شگاف دینے سے یہ فائدہ ہوگا اگر مریض میٹھا مواد وقت ہی کچ کران سے پیپ خارج ہوتی ہوگی) +

پھر گھاؤ کے اندر نسل بنفشی میں بسانی ہوتی رہتی (روسام) بخوبی بھردی جاوے اور اوپر سے پٹی حسب معمول باندھ دی جاوے + بعض جرح چند چھوٹے شگاف دیکر مذکورہ کرہ مصاصہ سے مواد خارج کرتے ہیں + بعض دیگر اہباء کا خیال ہے کہ بڑھی اور متورم غدود کو جلد چیر کر نکال دینا چاہئے + لیکن اس قسم کی کاڑھائی کی چنداں ضرورت نہیں پڑتی + علاوہ انہیں غدود کے گرد و پیش کی ساختیں اس قدر سخت ہو جاتی ہیں کہ غدود کو بخوبی شناخت کے ملنے نہ نکالنا بہت وقت طلب مرحلہ ہوتا ہے اور وہاں کی دوسری ضروری ساختوں کے کٹ جانے کا اندیشہ رہتا ہے + نیز کچ کران کی غدود کو تمام و کمال خارج کر دینے کے بعد گاہے

مل رسی علاج - روٹین ٹریٹمنٹ -	روٹین یعنی تھائی سول اور بنفشیں کام کر کے
مل بنفشینہ - آبو ڈول -	مل کرہ مصاصہ کلیپ - کلیپ کشن - بال +
مل بنفشی حاشینہ - ارسٹول - آبو ڈول تھائی سول -	دکرہ - گنیدہ مصاصہ - چھسنے والا

پاؤں یا بیرونی اعضاءے تاسل کے عروق جاذبہ میں نہایت خطرناک انسداد پیدا ہو جانے کا خدشہ ہو جاتا ہے +

عمر تک آرام و سکون دینا، پھوڑے کو آزادی کے ساتھ نشتر سے چیرنا، ناسور اور گھاؤ کو اندر سے بخوبی کھرج کر مواد کو خارج کر دینا اور پھر نل منغشی کی بتی بھر دینا، یہ علاج عموماً کافی ہوتا ہے اور اس سے زخم مندل ہو جاتا ہے اگر اندام تسست و فقارت ہو تو مریض کو تبدیل ہوا کے لئے لب ساحل کے مقامات پر جانا چاہئے +

آتشک. باد فرنگ

(آبلہ فرنگ. افزنجی مرض مبارک)

اب یہ بات حق حور سے پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ آتشک عُنَیَاتِ طفیلیہ کی ایک قسم کے باعث پیدا ہوتی ہے جسے علامہ سیغل اور شوڈین نے سنوڈاؤ میں دریافت کیا اور مندرجہ حلقہ و نیہ باہتہ یا خیموٹ حلقہ و نیہ باہتہ و شعراں ملزوں گھونگھہ باہتہ پھیکا رنگ کے نام سے منسوب کیا + یونہی پیدارجائیم کی شکل جنیں علی العموم دھن اور گندے زخموں میں پانی جاتی ہیں، مگر عُنَیَاتِ آتشک اپنی مخصوص شکل و شباہت اور رنگ قبول کرنے کے خصوصی امتیازات کے عہد دیگر غیر اہم پیدارجائیم سے آسانی تیز کیے جاسکتے ہیں + حال ہی میں علامہ نقوچی نے

۱. شعریہ ملزونیہ باہتہ. اسپائرکٹیا سیل ڈا

۲. خیموٹ ملزونیہ باہتہ. ٹریپوٹا باہتہ.

۳. ملزونیہ. گھونگھہ کے مانند ہمار.

۴. نقوچی. نوگوچی.

۵. آتشک. سیگل.

۶. عُنَیَاتِ طفیلیہ. پیراسائیک پرڈوٹوزاؤ.

۷. سیغل سیگل.

۸. شوڈین. شوڈین.

عُیُنَات، آتشک کی کشتیں اجالہ اور مائیت، استقامت کی مخلوط زمین میں سخت غیر ملکی حالات کے اندر کامیابی کے ساتھ ادگائی ہیں + آتشک کے جراثیم آسانی سے رنگ قبول نہیں کرتے، اسی وجہ سے وہ ایک عرصہ دراز تک مشاہدہ میں نہیں آسکے بلکہ شکل و شباهت عُیُنَات آتشک ایک نہایت نازک، رقیق، پیچدار و بکوار مخلوق فی یالوبی (ریبہ کی شکل کا ہوتا ہے، جس میں آٹھ سے بارہ ٹک پیچ ہوتے ہیں، یہ پیچ باہم تقریباً یکساں ہوتے ہیں + اس ریشہ کا انتہائی سرا (دُم) نہایت تیز اور نوکدار ہوتا ہے اور باریک دُم کی صورت میں ختم ہو جاتا ہے + اس کا طول مختلف ہوتا ہے مگر بالادسط ہر ریشہ خون کے سرخ دانوں کے قطر کے برابر ہوتا ہے اور اس کا ہر قیڑا کے پچیسویں حصے (۱/۲۵ قیڑا) کے برابر ہوتا ہے + جراثیم آتشک کے مقابلہ میں معمولی قسم کا علزونیہ عکاسہ جو عموماً دہن اور قرح میں پایا جاتا ہے نسبتاً زیادہ بڑا اور زیادہ چوڑا ہوتا ہے اور اس کا انتہائی سرا اتنا تیز اور نوکدار نہیں ہوتا اوس کے پیچ بھی تعداد میں کم ہوتے ہیں اور جرثومہ آتشک کی طرح یکساں اور باقاعدہ نہیں ہوتے +

پیچدار جراثیم کی متنوں میں عُیُنَات آتشک کی سیرت حیات اور خصائص زندگی کے متعلق ایک نہایت کم واقفیت ہم پہنچ سکی ہے +

یہ جراثیم مرض آتشک کے لئے مخصوص (نوعی) ہیں، اس کا ثبوت بیشتر یہی ہے کہ یہ آتشک کے مریضوں کی ایک بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں جبکہ زیادہ اصریاط ان کی تفتیش و امتحان میں برقی جلے اور تفتیش کنندہ جبکہ زیادہ سلیقہ

مٹا علزونیہ عکاسہ - اسپانز و کیڑی زفر بخش

ایک دم کا پچکار پیچدار جرثومہ جو عموماً

دہن میں اور دوسرے زخموں میں پایا جاتا ہے

مٹا اجالہ - اکار -

مٹا مائیت استقامت - آسانی تک فلوڈ -

مٹا قیڑا - ایک فی میٹر -

و شہور کام میں لائے اور مقدار مرعیان آتشک میں انکی موجودگی زیادتی کے ساتھ پانی جاتی ہے) مزید برآں یہ کہ یہ جسم کے بعض ایسے حصص میں ہی دیکھے گئے ہیں جہاں اتفاقیہ جھوٹ کا احتمال نہیں ہو سکتا، مثلاً مردہ پیدا شدہ آتشکی جنین کے پھیپھڑوں، جگر، تلی، اور دیگر اندرونی اعضا میں + نیز یہ جراثیم کتسابی آتشک کے اوس زخم میں دیا او کی کھر جن میں ابھی دیکھے جاسکتے ہیں جو آتشک کے اصلی اور مخصوص زخم سے پہلے نمودار ہو جاتا ہے، درجہ دوم میں یہ جراثیم حصہ مٹوف کے غد میں، جلد کے زخموں یا اوکے قرب جوار کے آبلوں کی رطوبت میں، تلی اور شاذ و نادر مریض کے خون میں ہی ہوتے ہیں۔ درجہ سوم میں یہ اور ارام صغیہ یا اس درجہ کے دیگر مخصوص دانوں اور زخموں میں پائے جاتے ہیں، مگر بیشتر اوقات اس درجہ میں یہ نہایت دقت اور مسلسل امتحان و تلاش کے بعد ہی مل سکتے ہیں، خصوصاً آتشک کے اولیٰ عصبی امراض میں جنکو اعراض نتائج آتشک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے + رجکواب آتشک کا چوتھا درجہ مانا جاتا ہے۔ اس میں عصبی امراض مثلاً ہزال شخاع۔ تشویش حرکت وغیرہ آتشک کے نتیجے سے ظاہر ہوتے ہیں +

حکومات میں مرض آتشک صرف حضرت انسان ہی میں ملاحظہ واقع ہوتا ہے لیکن تلیق کے ذریعہ بندر کی بعض اعلیٰ سنوں میں بھی ایک اسی قسم کا مرض پیدا کیا جاسکتا ہے جو آتشک سے مشابہ علامات رکھتا ہے +

ان حیوانات میں اکثر متواتر تجربات کے ذریعہ نہایت دلچسپ علامات مرض کا مشاہدہ کیا گیا ہے جو تلیق کے بعد نمودار ہو جاتی ہیں + انسانی مریض کا مادہ آتشک خواہ کسی درجہ سے پایا گیا ہو تلیق کے بعد ان حیوانات میں یہ مرض پیدا کر دیتا ہے +

۱۔ اعراض نتائج آتشک۔ پیرا سفلکس
افلکس۔

۲۔ اورام صغیہ۔ گیٹا۔



(۲۶) طزو نیه با هتر یعنی جسر ایم آتشک



(۳۸) آتشکی مردہ جنین کے پھیپھڑے کی ساخت میں آتشک کے جراثیم نظر آتے ہیں

مثلاً مریض آتشک کے خون، مٹی، درجہ ابتدائی کے قروح کی رطوبت، درجہ دوم کے زخموں اور دانوں کی رطوبت، حتیٰ کہ اورام صغیر کی رطوبات بھی ہی اثر رکھتی ہیں +
 تلیق کے بعد مرض تین سے چار ہفتہ کے اندر نمودار ہو جاتا ہے، جو اولاً ایک سخت ادبہ ہوئے واسطے کی صورت میں ہوتا ہے اور پھر یہ پھوٹ کر تقرح پیدا کر دیتا ہے +
 اس زخم کے ساتھ ساتھ غد دیہی بڑھ جاتے ہیں + اس کے بعد درجہ دوم کے علامات بھی خفیف قسم کے دیکھے جاتے ہیں، مگر درجہ سوم کے علامات نہیں پائے جاتے +
 یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اگر تلیق کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر پارہ کے مرکب نے پیشِ حلقہ (سیلاب شیریں) کے مہریم کی خارجی مالش مقامی طور سے کر دی جاوے تو مرض پیدا نہیں ہونے پاتا، لیکن تلیق کردہ مقام کو قطع کرنے سے پیدائشِ مرض صرف اور سبقت ملتی ہو سکتی ہے جبکہ یہ عمل (قطع) تلیق کے بعد آٹھ گھنٹے کے اندر اندر بخشیا دیا جاوے +

آتشک کی تشخیص تجر بہر گاہ (محل) میں

محل میں آتشک کی تشخیص دو طریقہ پر کی جاتی ہے۔ (۱) حویلیات آتشک کے عینی مشاہدہ سے یا (۲) تشخیص بہ طریق فاسرمان +

(۱) حویلیات آتشک کا عینی مشاہدہ۔ مشتبہ ابتدائی زخم کے کناروں کو آہستہ سے کھرچ کر مٹا کی مائیت و رطوبت کا خوردبینی امتحان کر کے جراثیم آتشک کا مشاہدہ کیا جاتا ہے + یا منور عم غد کو چھید کر اونکی مائیت و بارنگالی جاتی ہے اور اس کا امتحان کیا جاتا ہے تو جراثیم آتشک ملتے ہیں + آتشک کا ابتدائی زخم پہلے بالکل معمولی حیثیت کا ہوتا ہے اور چند دنوں تک اس میں حقیقی آتشکی زخم کے مخصوص خصائص نہیں ظاہر ہونے پاتے + چنانچہ اس قسم کے خصائص نمودار ہونے سے

بہت پیشتر ہی اگر معمولی ابتدائی زخم کی مائیت کا امتحان کیا جاوے تو اس میں جراثیم آتشک پائے جاتے ہیں + در اہل زخم آتشک کے حاشیوں میں سختی اور ادبھار کا پیدا ہونا قدرت کی طرف سے ایک عمل محافطت ہے جس کے باعث جراثیم مقامی طور پر محدود و مقید ہو جاتے ہیں + چونکہ اس قسم کی حالت میں جراثیم اندر مہلک ہوئے رہتے ہیں اس وجہ سے ادویہ کا مقامی استعمال ادنیٰ پر آسانی اثر نہیں کر سکتا + رطوبت زخم کے امتحان سے پہلے دافع عفونت اور جرم کش دواؤں کا استعمال مناسب نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے حیاتیات آتشک اور بھی گہری سانحوں میں رد و پیش ہو جاتے ہیں +

جراثیم آتشک کا معائنہ تین طریقوں سے کیا جاسکتا ہے، جو ہج

فیل ہیں +

(۱) تازہ مادہ کا خوردبینی امتحان فضائی تاریکی کی تنویر سے (خردبین برتر) یہ بہترین طریقہ امتحان ہے جس سے جراثیم نہایت آسانی سے دیکھے جاسکتے ہیں + اور انکی مخصوص نقل و حرکت کا نظارہ نظر کے سامنے آ جاتا ہے +

عواذ خوردبین کے استعمال اور خوردبینی اجسام کے دیکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ مشتبہ مواد یا عودت کی باریک تہ کو ایک شفاف سطح (شیشہ) پر رکھا جاتا ہے + پھر اس شیشہ کو خوردبین کے تختہ (درجہ) پر رکھ دیا جاتا ہے + اس تختہ کے عین وسط میں ایک گول چمید ہوتا ہے جس کے اندر سے روشنی اگر شیشہ زیر معائنہ کی سطح کو منور کرتی ہے + یہ روشنی ایک متعز آئینہ دو درجہ کے شیچ لگا ہوا ہوتا ہے اسے ذریعہ سورج کی روشنی سے

سطح خوردبین برتر (الٹرائی کرہکوپ

سطح درجہ - شیچ -

سطح فضائی تاریکی کی تنویر - ڈارک بیک

گراؤڈ المیویشن -

اس طرح معکوس کی جاتی ہے کہ اوس کی عمودی شعاعیں براہ راست تختہ کے
جھید میں سے گزر کر تختہ کے اوپر رکھے ہوئے شفاف شیشہ کو منور کرتی ہوئی
خردبین کے عدسہ (کلاں ناسشیشہ) اور اوس کی نی میں داخل ہو کر دیکھنے
والے کی آنکھ میں عکس ملنے لگتی ہیں + یہ معمولی اصول خردبین کے
استعمال اور خردبینی اجسام و جراثیم وغیرہ کے دیکھنے کا ہے جس میں صورت
یہ ہے کہ تختہ پر رکھا ہوا شیشہ نیچے سے روشنی کی معکوس عمودی شعاعیں
لا کر روشن کر دیا جاتا ہے تاکہ شیشہ منور ہو جائے اور اجسام جراثیمی
بخوبی نظر آجائیں +

لیکن اگر اس شیشہ پر جو درجہ پر رکھا ہوا ہوتا ہے اس طرح عمودی شعاعیں
نہ ڈالی جائیں اور کسی ترکیب سے جیسی کہ درجہ ذیل ہے تمام برہمنی
قطع کر دی جائے تو اوس کی شفاف سطح بالکل تاریک ہو جائے گی اور
رکھی ہوئی کوئی بھی چیز نظر نہیں آدے گی + لیکن اگر اسی سطح کے نیچے
سے اوس کی متوازی شعاعیں داخل ہو کر اوپر گزرنے دی جائیں تو
شیشہ کی شفاف سطح ان متوازی شعاعوں کو کھینچ کر خود روشن ہو جائیگی
اور اوپر رکھے ہوئے اجسام جراثیمی منور ہو کر دکھائی دینے لگیں گے۔
اگرچہ ہر قسم کی متوازی شعاعیں خردبین کے عدسہ (شیشہ کلاں نما)
اور اس کی نی کے اندر خود داخل نہ ہوں گی + ایسا کرنے کے لئے ایک
خاص ترکیب ہے۔ وہ یہ کہ خردبین کے عدسہ کے چاروں طرف ایک
حلقہ لگا کر اس پاس کی روشنی اور شعاعیں منقطع کر دی جاتی ہیں +
اب درجہ کے نیچے سے جو روشنی آئے گی اوس کے لئے ایک خاص

جائے انور کام میں لایا جاتا ہے اور روشنی کے لینے ایک نہایت طاقتور
شمع استعمال کی جاتی ہے۔ ہاں انور کو اس طرح لگایا جاتا ہے کہ جو شامیں
اس طاقتور شمع سے ملتی ہیں وہ اس جاس سے خارج ہو کر شیشہ نکالنا
وہ دمہ ایک پہونچنے سے پہلے ہی اسل شفاف کے متوازی ہو جاتی ہیں۔
اس ترکیب کو جس کے ذریعہ عمودی شمعیں قطع کر دی جاتی ہیں اور بجائے
اونکے متوازی شمعوں سے شیشہ شفاف کو منور کر دیا جاتا ہے تنویر
فضائے تاریک کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔

چونکہ بعض جراثیم بذاتہ چکدار اور منور اجسام رکھتے ہیں، جیسے کہ خونیات
آتشک، لہذا انکو اچھی طرح دیکھنے اور انکی نقل حرکت کا معائنہ کرنے
سیکیے ضروری ہوتا ہے کہ انکو فضائے تاریک میں دیکھا جائے۔ تاریک
زمین میں انکے چکدار جسم کی نقل حرکت اور انکے خط وخال نمایاں نظر آتے
ہیں، اور روشنی کی غیر ضروری جگہاں ہٹ ہی نہیں پیدا ہوتی۔

بعض اجسام جبکہ تقریباً فی ستر سے کم ہوتا ہے اس قدر ضعیف جسامت
کے ہوتے ہیں کہ وہ فی الحال قوی ترین مدد کی مدد سے ہی نہیں دیکھے
جاسکتے۔ اس طرح چند جراثیمی اور متعدی امراض مثلاً آنکھوں کے رقبے
الہاب نخلہ راوی مقدم، زرد بجلد وغیرہ انسان میں اور حیوانات میں
سود مزاج کلی، ہیضہ خنزیر، و غیرہ ایسے ہیں جنکا متعدی ہونا اگرچہ ایک

۱۔ الہاب نخلہ راوی مقدم۔ انیٹریر
پولیو مانی لائی ٹس۔

۲۔ زرد بجلد۔ یونیور۔

۳۔ سود مزاج کلی۔ ڈاگس ڈس ٹیپر۔

۴۔ ہیضہ خنزیر۔ ڈاگ کالا۔

۵۔ جاس انور کنڈ ستر۔

۶۔ تنویر فضائے تاریک۔ ڈارک گرافٹ

ایلیوی ڈیشن۔

۷۔ ایک ملی میٹر واپ قیراط کے برابر۔

۸۔ روسہ۔ ڈاگ کالا۔

یقینی امر ہے مگر اونکے مخصوص جراثیم ابھی تک کسی طاقت کی غور و بین سے قابل تیز نہیں ہیں + اس قسم کے ناقابل معائنہ خفیف ترین اجسام و ذرات کو برتزا (معا) نڈہ خرد بینی کہتے ہیں۔ اس قسم کے متعدی ہونے کا ثبوت دیگر وسائل سے بعض حالات میں حاصل ہو چکا ہے مثلاً انکی رطوبت کی تفتیح سے بعینہ اسی مرض کا پیدا ہو جانا وغیرہ +

غور و بین کے کلاں مناسبتہ (عدسہ) کی طاقت کا اندازہ اس طرح کیلجا جاتا ہے کہ کسی شفاف شیشہ کی ایک قیراط سطح پر نہایت باریک لکیریں کھینچی جاتی ہیں + اگر یہ لکیریں باطل صاف علحدہ علحدہ نظر آتی ہیں تو انکی انتہائی تعداد کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ یہ شیشہ (عدسہ) فلاں مخصوص طاقت کا ہے + زیادہ سے زیادہ طاقتور غور و بینی شیشہ (عدسہ) اس طرح ایک قیراط کے اندر ایک لاکھ ساٹھ ہزار لکیریں صاف الگ الگ بنا سکتا ہے + لیکن اگر لکیریں اسکی زیادہ تعداد میں ہوں تو وہ صاف صاف نظر نہیں آتی ہیں بلکہ مخلوط دکھائی دیتی ہیں + اس لئے اس مؤخر الذکر فیثقیقی تعداد کی لکیروں کو برتزا معائنہ خرد بینی یا ناقابل مشاہدہ کہا جاتا ہے +

اس قسم کے اجسام کو دیکھنے کے لئے بعض اوقات فضائے تاریک کی تنزیر سے دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے جیسا کہ حیاتیات آتشک کے متعلق تاو پر درج کیا گیا ہے + اکثر آتشک بے تازہ مواد کو "قطرہ آویزناں" کی صورت میں غور و بین کے نیچے رکھ کر غور دیکھنے سے جراثیم آتشک کی نقل و حرکت تاریک زمین میں بخوبی نظر آتی ہے +

ملاحظہ فرمائیں۔ ہینگنگ ٹراپ۔

ملاحظہ فرمائیں۔ اسٹائیگر اسکوپ

(ب) اسی قسم کا نظارہ کم میٹھ ایک دوسری ترکیب سے بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ زخم آتشک کی رطوبت کو ہندوستانی روشنائی کے ساتھ خوب ملا لیا جائے اور پھر اس کا ایک قطرہ کسی شفاف شیشہ (روح) پر پھیلا کر ہلکی سی تر (عشاوہ) جمالی جائے اور اس سے کہ خشک کر لیا جائے۔ اب اگر اس خشک تر کا معائنہ خوردبین کی مدد سے "فضائے تاریک" کے اندر کیا جائے، تو جراثیم آتشک سیاہ زمیں پر بے رنگ یا شفاف صورت میں نظر آئیں گے، اگرچہ خشک ہو جانے کی وجہ سے اب انکی نقل حرکت تو زندہ جراثیم کی طرح نہیں دکھائی دے گی + یہ طریقہ اس کا نہایت سادہ اور آسان ہے اور بلا وقت مزید جلد قابل عمل ہے +

(ج) حویثات آتشک کے لگنے کے طریقے متعدد اقسام کے رائج ہیں جن میں سے بیشتر روٹاؤنکی کی اصلاح کی ہوئی صورتیں ہیں +

حکسی تصویر کشی کے ذریعہ بھی جراثیم مختلف طریقوں سے نمایاں کیے جاتے ہیں، جیسا کہ درمیان اس کیلانی اصول پر ہے کہ روشنی کے اثر سے نکلیات فضہ رچاندی کے مرکبات کی ترکیب ٹوٹ جاتی ہے + (تجزیہ) یہ طریقہ اس وقت خصوصاً مفید ہوتی ہیں جبکہ جراثیم کو گہری ساختوں کے اندر سے تلاش کرنا مقصود ہو +

(۲) تشخیص بہ طریقہ دیگر - (تفاعل فاسرمان) شناخت آتشک کا یہ دوسرا طریقہ ہے، جس میں مریض کے خون کا امتحان کیا جاتا ہے + اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آتشک درجہ اول کے اواخر میں، دینر درجہ دوم و درجہ سوم میں مریض کے

۱۔ ہندوستانی روشنائی - انڈین ایک	۲۔ نکلیات فضہ - سلور سائٹ
۳۔ رومانوفسکی - رومانوفسکی ایک مالم	۴۔ تجزیہ - ری ایکشن
۵۔ فاسرمان - فاسرمان ری ایکشن	۶۔ فاسرمان - فاسرمان ری ایکشن

خون کی مائیت میں ایک ایسی غیر معمولی شے موجود ہو جاتی ہے، جسے اگر قلب یا جگر کے خلاصہ الکھولی میں جسے سیال نکلیں کی آمیزش سے ہلکا کیا گیا ہو، ملایا جاوے تو اس مخلوط مکملہ نامی مادہ جدا ہو جاتا ہے +

تکملہ کے جدا ہو جانے کی شناخت اس طریقہ سے کی جاتی ہے کہ اگر اس مخلوط کے اندر سرخ گزرات ذی جن بنا کر ملا دیے جاویں تو تکملہ کی موجودگی میں نوکریات بالکل حل ہو جائیں گے۔ اور اگر کمریات میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو تو سمجھنا چاہئے کہ مخلوط میں تکملہ موجود نہیں ہے +

پس اگر طریقہ مندرجہ سے تکملہ کا موجود ہونا ثابت ہو جاوے تو اس امتحان کو تفاعل فاسرہائی مثبت کہا جاتا ہے، اور تکملہ موجود نہ ہو تو اسے تفاعل منفی کہا جاتا ہے +

علامہ آتشک کے یہ امتحان چند دیگر امراض میں بھی مثبت پایا جاتا ہے۔ مثلاً قحطی جذام۔ مرض النوم (افرنقی) اور گاہے موسمی بخاریں + مرض آتشک میں یہ امتحان علی العموم ابتدائی زخم کے مندرار ہو جانے کے بعد دوسرے اور چھ ہفتہ کے درمیان مثبت پایا جاتا ہے + اس عرصہ میں ایک آدھ مرتبہ اس امتحان کا منفی ہونا مرض کے غیر موجود ہونے کی کوئی قوی دلیل نہیں ہے۔ لہذا مشتبہ حالت میں نغم آتشک

۱۔ ذی ص بنتے ہوئے سرخ کریات۔ سنی
۲۔ نازو۔ روڈ کار پکڑ۔

۳۔ تفاعل فاسرہائی مثبت۔ ہاری ٹولازین
ری امیشن۔

۴۔ تفاعل منفی۔ نیگے ڈری کمیشن۔

۵۔ دم تفتی۔ یاز۔

۶۔ مرض النوم۔ سی پنگ کمسن۔

۱۔ خلاصہ الکھولی۔ الکھولک کسٹریکٹ
۲۔ خلاصہ جسے الکھول کی آمیزش سے

طیار کیا جاوے)

۳۔ تکملہ کپلی منٹ۔ مخصوص طریقہ سے

حسنت حاصل کردہ سرخ ذرات خون۔

۴۔ حناس کریات احمر۔

کی رطوبت کا امتحان جراثیم کے معائنہ کی غرض سے کرنا چاہئے۔ اور امتحان فاسرمان کچھ عرصہ کے بعد کرنا چاہئے۔ امتحان فاسرمان درجہ اول اور درجہ دوم میں مثبت ملتا ہو بشرطیکہ وہ ادویہ اور علاج سے غائب نہ ہو گیا ہو۔ درجہ سوم کی ابتداء میں چند مریض ایسے ملتے ہیں جن میں یہ منفی ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کی تعداد بتدریج بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بہت پرانے مریضوں میں امتحان مثبت کی تعداد ۹۰ فی صدی سے گھٹ کر تقریباً ۱۰ فی صدی پر آ جاتی ہے۔ لیکن یہ امر قابل غور ہے کہ فاسرمانی امتحان سے محض عدوائی آتشک کا موجد ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس زمانہ کا ہر زخم آتشکی ہے۔

سلسلہ علامات۔ آتشک کی علامات، عددی کی شدت سمیت اور ساختوں کی قوت و مقدار و افعت کے لحاظ سے، مختلف مریضوں میں بہت مختلف ہوتی ہیں۔ مگر جیسا کہ ایک محقق نے بتایا ہے، اس مرض میں یہ قاعدہ ہے کہ اس کے تین درجے ہوتے ہیں۔

درجہ ابتدائی، جس میں کم بیش مختلف عرصہ کی مدت حضانت کے بعد ایک زخم نمودار ہو جاتا ہے، جسے عام طور پر قرعہ صلیبہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد

سلہ یہ تمام علامات و شمار ایسے مریضوں سے لیے گئے ہیں جنکا علاج طریقہ قدیم کے مطابق صرف پارہ کے مرکبات سے کیا گیا تھا۔

مگر جدید طریقہ علاج درجہ اول نے بالکل گیا پلٹ کر دی ہے۔ چنانچہ وازن کے امتحان پر نئے علاج سے جراثیم تباہ ہوئی، اور کئی تفصیل مسودہ عمل احتقان میں شرح درج ہے۔ اس سے بخور دیکھنے کے بعد اس بحث میں اضافات و ترمیم کرنا چاہئے۔

قرعہ صلیبہ۔ مارٹشکر و صلبہ۔
سخت ۱۔

ما محقق ریگارد۔
درجہ ابتدائی۔ پرائمری اسٹیج۔

درجہ دوم چونکہ ہفتہ کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے + اس میں آتشک کا زہر
سائے بدن میں پسلیک عمومی حدودی کے علامات اس طرح ظاہر ہوتے ہیں کہ جلد بدن
اغشیہ مخاطیہ اور غدود جاذبہ ماؤف ہو جاتے ہیں + اس کے بعد

درجہ سیم کی علامات، ایک مختلف وقفہ شاید برسوں کے بعد اس وقفہ
میں بعض اوقات بظاہر علامات مرض غیر موجود ہوتی ہیں (اور تمام صغیہ وغیرہ کی
شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ اور ام بدن کے تمام حصص میں ہو سکتے ہیں +
طریق حدودی (آتشک کی چھوت کیونکر لگتی ہے؟)

اکتابی آتشک قریب قریب ہمیشہ ناپاک مقاربت ریدکاری کے باعث
اعضائے تناسل میں چھوت لگ جانے سے پیدا ہو جاتی ہے + مگر گاہے یہ مرض
بلامقاربت، محض اتفاقیہ طور پر آتشکی زخموں سے بالواسطہ یا بلاواسطہ اتصال کے
باعث بھی پیدا ہو جاتا ہے (آتشک غیر جماعی یا پاک آتشک) + ایسی حالت میں
ابتدائی زخم بجائے اعضائے تناسل پر ہونے کے اکثر جسم کے کسی دوسرے پر ہوتا ہے
(قرعہ غیر تناسلی) + مثلاً مریض آتشک کا استعمال کردہ کجوزہ اور گلاس یا
تباکو کا جھوٹا تھقہ اور پی استعمال کرنے سے ایک تندرست شخص کے لب میں
آتشک کی چھوت لگ سکتی ہے + اسی طرح صرف بوسہ سے یہ مرض ایک سے دوسرے
میں منتقل ہو سکتا ہے + ایک روٹی محقق نے ثابت کر دیا ہے کہ جراثیم آتشک
نہایت نازک مزاج اور کمزور ہوتے ہیں، انکی سہی حرارت خارج از جسم نہایت

مرکزہ دوم۔ سکندریہ آتشک۔	سفن ان سان فی ام۔
مرکزہ سوم۔ ٹرنٹری آتشک۔	مرکزہ غیر تناسلی۔ کسٹرن جی ٹل مشنک۔
مرکزہ اورام صغیہ لگے گا	مرکزہ فی قصبہ پائپ۔
مرکزہ غیر جماعی آتشک (پاک آتشک)	مرکزہ محقق مٹی کاف روہی۔

سرعت کے ساتھ فاش و نابود ہو جاتی ہے + یہی وجہ ہے کہ اگر براہ راست اتصال و تماس نہ ہو تو آتشک کی چوٹ شاذ و نادر ہی لگتی ہے + دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ صحیح و غیر مجروح جلد بدن اور تندرست و سالم غشیہ مخاطیہ کے اندر سے جراثیم نظام جسم میں داخل نہیں ہو سکتے + علاوہ ازیں مرض آتشک ہر درجہ میں یکساں طور پر اور ایک شدت کا متعدی نہیں ہے + درجہ ابتدائی میں صرف زخم آتشک کی رطوبت ہی عذوی اور چھوٹ پیدا کر سکتی ہے، درجہ دوم کے دوران میں چونکہ آتشک کا خصوصیتی زہر خون میں موجود ہوتا ہے، اس لئے وہ تمام مرضی ترشحات و رطوبات و نیز مریض کی مٹی میں پایا جاتا ہے، مگر خالص اور مصفی رطوبات و افرازات (مثلاً آنسو، دودھ، اور پیشاب) آلائش مرض سے پاک ہوتے ہیں، لیکن اگر انہیں کسی مجروح اور رگڑا کھائی ہوئی سطح کی رطوبت آمیز ہو جاوے (جیسا کہ اکثر لعاب ہی کے ساتھ ہو جاتا ہے) تو یہ بھی فی الفور متعدی ہو جاتے ہیں + درجہ سوم کے مریضوں سے بھی چوٹ لگتا لیکن ہے مگر ایسا شاذ ہی ہوتا ہے +

عموماً آتشک کا ایک حملہ مریض میں ایک گونہ قوت ممانعت (مناعت) پیدا کر دیتا ہے جس کے باعث باوجود دوبارہ چوٹ لگنے کے بھی آئندہ اعادہ مرض نہیں ہونے پاتا + مگر اس قسم کی مناعت ہمیشہ یقینی طور پر محفوظ و مصنون نہیں رکھتی اور بعض مریضوں میں متیقن طور پر آتشک کے دوسرے حملے دیکھے گئے ہیں +

درجہ حساسیت کی میعادیں اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ دوسے چھ مہینے تک ہوتی ہے + عام طور پر تیسرے مہینے تک ہی قرح میں صلابت کے آثار پائے

علم قاس۔ کان نیکٹ۔	علم مغذی (چھوٹا) انگلو۔
علم خصوصی زہر ویرس۔	علم درجہ حساسیت۔ سطح آف اکیمنٹ

ہاتے ہیں۔ مقامی سقم زخم ابتدائی کی قطع و برید یا خارج کر دینے سے مرض آتشک کی معمولی رفتار میں مطلق اثر نہیں ہوتا، البتہ عددی کے بعد ہی اگر مقام ماؤن کو قطع کر دیا جاوے یا اگر سلور زان کے ذریعہ علاج جاری رکھا جائے تو مرض رک جاتا ہے۔ بیشتر جراثیم آتشک قرصہ کے اندر محبوس رہتے ہیں جس کے باعث دوران تک نہیں پہنچنے پاتی، لہذا مناسب ہے کہ انکو خارجی قطع و برید کے عمل کے ذریعہ خارج کر دیا جائے۔ اگر مقامی زخم خالصاً آتشکی ہے تو وہ مدت حصانت کے اندر ہی تمام و کمال مندل ہو جاتا ہے اور پھر کوئی مقامی تبدیلی اور سوقت تک نمایاں نہیں ہوتی جب تک کہ زخم آتشک کی مخصوص صلابت ظاہر نہ ہو۔ مگر گاہے اس میں عددی صمدیہ واقع ہو جاتا ہے یا قرصہ رخوہ، یہی ساتھ ہی موجود ہوتا ہے چنانچہ جب قرصہ رخوہ بھی ساتھ ہوتا ہے تو زخم کا اندام بخوبی نہیں بھٹنے پاتا اور کچھ عرصہ کے بعد زخم کی گہرائی میں صلابت پیدا ہو جاتی ہے۔

(۱) درجہ ابتدائی۔ آتشک کے ابتدائی درجہ کے متاز خصائص یہ ہیں کہ اس میں ایک زخم پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی قرب جوار کے غد جاذبہ بڑھ جاتے ہیں۔ عموماً یہ زخم قلفہ کی چڑ میں حشفہ کے ابھرے ہوئے کنارے رکھل (حشفہ) کے پاس یا حشفہ کے نیچے لگی ہوتی جھلی رقیقہ اشعم میں واقع ہوتا ہے۔ مستورات میں یہ زخم زیادہ تر ستر مگاہ کے بڑے شفر کے اندر دینی پہلو یا چھوٹے

۱۔ زخم۔ سور۔
۲۔ غد جاذبہ۔ یعنی تک گلینڈز۔
۳۔ قلفہ۔ پری ہیوس رکلاہ حشفہ
۴۔ رکھل حشفہ۔ کارونا گلاندوس۔
۵۔ قید الحشفہ۔ فرے نم۔
۶۔ شفر عظیم۔ بیسیا سور۔

۱۔ سلور زان۔ سالورسن رنگیا کا ایک نمونہ
۲۔ کامیاب رکبہ جو آتشک کے لیے عملی دوا
سمجھی گئی ہے
۳۔ عددی صمدیہ۔ پالیوے مکان فکشن
۴۔ درجہ ابتدائی۔ پرائمری اسٹیج۔

شعریہ ہوتا ہے، مگر چونکہ عموماً اس سے کسی قسم کی اذیت محسوس نہیں ہوتی اس لئے اکثر اس کی موجودگی نظر انداز ہو جاتی ہے۔


ابتدائی زخم ہمیشہ ایک ہی قسم کی شکل و صورت میں نمایاں نہیں ہوتا، اگرچہ کم و بیش تر شحات کا اجتماع اور صلابت اس کی متاخر خصوصیت ہے۔ اس زخم کی خاص ترین یہ ہو سکتی ہیں۔

(الف) جلیمہ منتشرہ (چھلکے دار اور بھار) یہ قدرے ادبھرا ہوا خراش دار دانہ ہوتا ہے، اس کا رنگ میٹلا اور تقریح سے خالی ہوتا ہے۔ عموماً یہ دانہ چھوٹا مگر سخت ہوتا ہے، اور اس کی بیرونی سطح پر بڑھنے کے چھلکے یا کھرنڈ سے لگے ہوئے پائے جلتے ہیں۔ رگڑ لگ جانے سے یا رطوبات و سدا کے اجتماع اس میں تقریح ہی پیدا ہو سکتا ہے مگر ابتداء صلابت زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر اس قسم کے مادات ملحق نہ ہوں تو اس کی موجودگی محسوس ہی نہیں ہوتی اور اس کی غائبانہ رفتار ختم ہو کر مریض غیر محسوس طور پر آتشک زدہ ہو جاتا ہے اور شاید اس بات کا صحیح اندازہ بھی نہیں کر سکا کہ وہ کس وقت اور کس ذریعہ سے عدوائی آتشک کا شکار ہو گیا۔

(ب) قرعہ صلبہ (زخم سخت) یہ قسم نہایت عام طور پر پائی جاتی ہے۔ اور جلیمہ (ادبھرے ہوئے دانے) میں خراش کے اثر سے یا کسی قرعہ رخہ کی موجودگی میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ابتدائی سطحی خراش درجہ مندل ہو کر اچھا ہو گیا ہے تو اس کے مذہب (نشان زخم) میں ایک مقامی ادبھار کرمی کے مانند نہایت سخت پیدا

۱۔ شہر صغیر منفی۔	۲۔ بشرہ۔ اپنی قسیم۔
۳۔ جلیمہ منتشرہ۔ دس کوسے ٹنگ۔	۴۔ قرعہ صلبہ۔ ہارڈ شکر۔ اندر سے بڑا
پے پیول۔	شکر بننے پر شکر

(۲۹) قرص صلیبہ سی آنشک کا زخم۔ جو قلعہ کی اندرونی سطح سے
 روٹنے پر نظر آ رہا ہے



ہو جاتا ہے اور یہ حقیقی جلد (اؤٹہ) سے خوب چپکا ہوا بلکہ اؤٹہ کے ساتھ منضم ہو جاتا ہے + البتہ اگر ابتداً قرعہ رخوہ پیدا ہو چکے تو اس کی سطح میں کم و بیش گہرائی تک تفرج قائم رہتا ہے، اور ساتھ ہی زخم کا حاشیہ نمایاں طور پر واضح ہو جاتا ہے گو صلابت زخم کی جڑ میں پائی جاتی ہے +

بعض حالات میں دانہ کا او بھار نہایت تہہ دار ہوتا ہے اور سطح پر تفرج نہیں پیدا ہوتا۔ اس قسم کو، جو بیشتر حشفہ پر پائی جاتی ہے، صلابت (رتی) کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے + لیکن جب قلفہ (کلاہ حشفہ) یا جسم تنصیب پر زخم ہوتا ہے تو ان مقامات میں رتج واصل کے ڈھیلے پن کے باعث، نصلب زیادہ پھیلاؤ رکھتا ہے + جب مقام اؤٹ قلفہ کی جڑ ہوتا ہے تو صلابت عموماً عرضاً پھیل کر ایک طوق نما جسامت اختیار کر لیتی ہے + ایسی حالت میں جب قلفہ کے چڑھ کو اوپر چڑھا لیا جاتا ہے تو یہ ایک مخصوص طرز پر دھسکا ہوا اوپر کھینچ آتا ہے + جب مقام اؤٹ قلفہ کا دانہ ہوتا ہے تو صلابت اور سختی اس حصہ میں زیادہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جس کے باعث قلفہ کا چڑھا اوپر نہیں چڑھ سکتا اور قلفہ میں ایک قسم کی تنگی سامنے کے حصہ میں نمودار ہو جاتی ہے (ضیق قلفہ) +

درجہ ابتدائی کی نئی ساخت اور صلابت کی ترکیب - خوردبین سے دیکھنے پر محض گول دانوں (کریات مستدیرہ) اور نوکدار لمبے دانوں (کریات مغزیہ) سے ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ اجتماع ایک دوسرے کے نہایت قریب ہوتا ہے اور

ملہ اؤٹہ - جلد حقیقی - کیوٹش -	ملہ ضیق قلفہ - فانی موبس
ملہ صلابت رتی - ریکورڈی - ہارچ منٹ	ملہ گول دانے - کریات مستدیرہ -
انڈیوریشن آف ریکورڈی -	راؤنڈ سیلز -
سیرنج و اہل - کنکونٹشو -	ملہ نوکدار لمبے دانے - ہسٹنڈل سیلز -

اور ان دانوں کے درمیان قدرے سیفی ساخت ہوتی ہے جو دانوں کو آپس میں جوڑتی ہے + گلہ ہے اس ساخت میں خلیات عظیمہ (کریات کثیر النوی) بھی پائے جاتے ہیں + اس ساخت کے اندر عروق بہت کم ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس میں تقریح بہت آسانی سے واقع ہو جاتا ہے +

مگر اس بات کا اندازہ بخوبی کر لینا چاہئے کہ ”صلابت“ کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی آتشک کی تشخیص ضرور دین کی مدد سے کی جاسکتی ہے، اور جب تک اس طرح صحیح تشخیص ابتداء ہی میں قائم نہ کر لی جاوے اور مناسب علاج فوراً شروع نہ کر دیا جاوے، شغلے کلی کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے (اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتدائی زخم ہی سے آتشک کی تشخیص کر کے مناسب علاج سلور زان وغیرہ کے ذریعہ فوراً شروع کر دینا چاہئے۔ اور صلابت کے ظاہری علامات کا انتظار نہ کرنا چاہئے ورنہ شغلے کلی کی امید کم ہوتی ہے) +

ایک ہی مریض میں ایک سے زائد قروح آتشک، پائے جاسکتے ہیں بشرطیکہ انکی چھوت ایک ہی وقت لگ چکی ہو + اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی مریض دو مختلف اوقات میں (جن کے درمیان وقفہ نہ ہوڑا ہو) یکے بعد دیگرے دو ہی ماحول کرے لیکن قرحہ آتشک بذاتہ اپنی چھوت سے دوسرا قرحہ عموماً نہیں پیدا کرتا یعنی مریض آتشک اپنی آتشک سے دوسرے عضو میں متاثر نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب قرحہ قلعہ کے نیچے پیدا ہوتا ہے تو اس کی چھوت سے حشفہ پر (جو پاس ہی ہے) دوسرا زخم پیدا نہیں ہوتا۔ جب قروح متعدد ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور اول میں سختی نسبتاً بہت کم ہوتی ہے +

خلیات عظیمہ کی جانتھ سیلا۔

بڑے دانے (جن میں ایک سے زائد ذات ہوتے ہیں) +

قرحۃ الخلیل۔ یہ عموماً مجری البول کے بول پر اندرونی پہلو میں ہوتا ہے اور ایک ایسا زخم بناتا ہے جس کی جڑ سخت ہوتی ہے، اگر مجری البول کے دمان کو اونگیوں میں پکڑ کر ٹٹولا جاوے تو یہ قرح بطور ایک سخت دانے یا گٹھلی کے محسوس ہوتا ہے اور اس کے اندر سے ایک قسم کی مائی (مصلی) رطوبت جس میں خون کی آمیزش بھی ہوتی ہے، خارج ہوتی ہے + گاہے خود مجری البول کے دمان میں قرح سخت واقع ہوتا ہے اور اس کو گھیر لیتا ہے جس کے بعد ضیق طویل واقع ہو سکتا ہے + ضیق طویل مجری بول کی ننگی

قرحۃ غیر تناسلی۔ غیر تناسلی قرح عام طور پر لب، اونگی اور غلہ (سرپستان) کے اوپر پائے جاتے ہیں + اکثر نکایہ خاصہ ہوتا ہے کہ التهاب صدیدی کے باعث ان میں انصباب و ترشح زیادہ ہوتا ہے مگر بقاء بلع اعضائے تناسل کے قرح کے ان میں سختی چنداں نمایاں اور محدود و رقبہ میں نہیں ہوتی چنانچہ ان قرح میں درم بہت ادبھرا ہوا اور خون کی رگیں پھولی ہوئی ہوتی ہیں اور اگر تقرح ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ مواد بھی نسبتاً زیادہ نکلتا ہے اور یہ مواد خشک ہو کر زخم کی سطح پر کھڑنڈ بنا دیتا ہے + پاس کے غدود جاوہ بھی اکثر اوقات متورم ہو کر بہت بڑے جاتے ہیں اور ان کے آس پاس ترشحات و رطوبات کا اجتماع ہو جاتا ہے + اس قسم کی حالت غلطی سے سلعہ بشریہ سمجھی جاتی ہے، مگر اس کی تفریق و تشخیص، قرح کی صلابت اور اس کے ابھرے ہوئے کناروں سے، نیز اس کی تیز رفتار و سرعت تکمیل سے اور غدود کے جلد بڑھ جانے سے آسانی ہو سکتی ہے + گاہے قرح غیر تناسلی کی حالت تناسلی قرح کے نسبت زیادہ شدید پائی جاتی ہے اور

۱۔ قرح غیر تناسلی۔ اکثر جینیٹل شنگر۔

۲۔ سلعہ بشریہ۔ اپنی فیلی ادا

۱۔ قرح خلیل۔ یورٹھریل شنگر

۲۔ ضیق الخلیل۔ اسٹرکچر آف یورٹھریا

غالباً یہی وجہ ہوتی ہے جس کے باعث اسکی صحیح تشخیص ابتدائی درجہ میں قائم نہیں ہو سکتی، بلکہ اسوقت قائم ہوتی ہے جبکہ آتشک کے درجہ دوم کی علامتیں نمودار ہوجاتی ہیں +

قرح اصبغیہ (انگیوں کے آتشکی زخم) یہ عموماً تیار داروں جراثیم اور بچہ جنانے والوں (مؤلمین) میں دیکھے جاتے ہیں اور ناخن کے پہلو پر شروع ہوتے ہیں + یہ ایک غیر مؤلم وغیر دناک (زخم ہوتا ہے، پھر یہ انضباب طوبات کے باعث سو جتا اور تقرح سے پھوٹ جاتا ہے اور ناخن کے مقام پیدائش کے نیچے اور اس کی ہلکی چنٹ (ثیمہ ہالیہ) کی سیدھ میں پھیلنا رہتا ہے + اس سے رطوبت بہت کثیر مقدار میں خارج ہوتی ہے اور دردی شدید ہوتا ہے اور اونگی کا انتہائی پور پیاز کی گانٹھ کی طرح سوج کر بھول جاتا ہے۔ ازاں بعد کئی اور نفل کے خدد (خدد فوقیہ اللقمیہ اور خدد البلیہ) متورم ہوجاتے ہیں + ان سب علامات کے باعث اکثر اوقات ایسی حالتوں کو سہوا درم غیث سمجھ لیا جاتا ہے + مگر کبھی کبھی یہ زخم اس قدر چھوٹا اور غیر نمایاں ہوتا ہے کہ (ابتداء) محسوس بھی نہیں کیا جاتا +

قرحہ اکالہ۔ یہ ایک مسم کا پھیلنے والا تقرح ہوتا ہے، جنکی زمانہ اماراتیں شہریہ (تناسلیہ) اور خصوصاً آتشک کے علاوہ دیگر حالات میں بہت کیاب ہوتا ہے +

ملا درم خبیث۔ گلنٹ ڈیزیز۔	ملا قرح اصبغیہ۔ ڈی جی ٹل شکر۔
ملا قرحہ اکالہ۔ نیچے ڈینا ربتول بعض اسکا دیر	ملا مؤلمین۔ اکوشر۔
نام (زرب بھی ہے)	ملا ثیمہ ہالیہ۔ سی لیون فرلو۔
ملا امراض ہریہ۔ ونیرل ڈیزیز عموماً	ملا خدد فوقیہ اللقمیہ اپنی کانٹیلانڈ گلینڈز۔
امراض تناسلیہ کہتے ہیں +	ملا خدد البلیہ۔ اگلاری گلینڈز۔

یہ ہمیشہ کمزور اور میلہ اشخاص میں ہوتا ہے اور بیشمار اولیٰ رطوبات کے باعث ہوتا ہے جو کلاہ حشفہ کے تنگ ہو جانے کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں + قلعہ اور عضو تناسل کا انتہائی سراسخ و متورم ہو جاتا ہے اور اس میں رطوبات کا اجتماع ہو جاتا ہے + قلعہ کو اوپر چڑھایا جائے یا کاٹ کر دیکھا جائے تو مقام ماؤن کی سطح سڑی ہوئی رنگی ہوتی اٹھتی ہے اور اگر تفریح کو مناسب علاج سے روکا نہ جائے تو وہ سرعت کے ساتھ پھیل کر حشفہ اور قلعہ کو گلا دیتا ہے، بلکہ جسم قسب تک پہنچ جاتا ہے +

علاج - اگر قلعہ گل نہ گیا ہو تو اسکو کاٹ دینا چاہئے، پھر اس کے بعد مریض کو گرم پانی میں بیٹھ کر حمام نصفی کرانا چاہئے + درمیانی وقفوں میں زخم پر نل بنفشی چھڑکنا ضروری ہے + غسل سیاہ میں بھگونے سے روکا نہ جائے + اس کے بعد کمالیج اسی اصول پر ہونا چاہئے جیسا کہ آتشک کے درجہ اول کا ہوتا ہے، اگرچہ مریض کی صحت عامہ کی کمزوری بعض اوقات مقتویات کے استعمال کے لئے اور بعض اوقات بحری آب ہوا میں سکھنے کے لئے مجبور کر دیتی ہے + اگر کسی خاص سبب سے حمام نصفی دینا غیر ممکن ہو تو اصول قدیم کے مطابق قرصہ کو چیل کر زخم کی گہرائی میں جاٹھنض نظرانی یا تیزاب شوریہ کی پھیریری خوب تھیر دینی چاہئے + جبکہ ساختیں بہت لگی ہوئی ہوں تو یہ آخری طریقہ حمام نصفی سے پہلے نہایت مفید نتائج رکھتا ہے +

رضعی حمام میں داخل کرنے سے پہلے زخم کو اسی طریقہ سے جلا دیا جائے +

۱۔ حمام نصفی - ہپ بانہ -	۲۔ متاثرہ سینہ -
۳۔ نل بنفشی - آیوڈو فام -	۴۔ حمام قطرائی - کاربوئک ایسڈ -
۵۔ محلول سیاہ - لوشیونگر -	۶۔ غدود جاذبہ - لفے کاک گلیکینڈز -
	۷۔ مائیت - لوت -

پہونچتی ہے، ممتاز طور پر متورم ہو کر بڑھ جاتے ہیں، یہ غدود ہلانے سے بخوبی
 جلد کے نیچے ہتے ہیں اور بندوق کی گولی یا غصرونی ٹکڑوں یا بادام کی سختی
 رکھتے ہیں راسی بادامی سختی کے باعث اکثر ایسے غدود کے لئے اصطلاحاً **آلو زری**
 یا بادام نما کا خطاب استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں درد بالکل محسوس نہیں
 ہوتا اور نہ تفتیح پیدا ہوتا ہے۔ البتہ اگر ابتدائی زخم میں قرصہ مرغہ کا سم نوعی
 یا کر دیات مسدیدیہ کی چھوٹ بھی شامل ہو جائے تو پیپ پیدا ہو جاتی ہے۔
 بعض اوقات اول عروق جاذبہ میں جو قرصہ اور غدود جاذبہ کے درمیان
 میں واقع ہیں، مزمن التهاب پیدا ہو کر یہ عروق زیر جلد سخت رسی کی طرح محسوس
 ہوتے ہیں۔ اس طرح پشت قضیب کی عرق مانی ر عرق جاذبہ اکثر التهاب کے
 باعث مسدود ہو جاتی ہے اور اس کے اسناد کی وجہ سے قلفہ اور حشفہ کا
 اوزیا رتیج بھر ہوا پیدا ہو جاتا ہے۔ علیٰذا اگر قرصہ میں تفتیح پیدا ہو جاوے
 تو اس کے اثر سے عروق جاذبہ میں بھی پیپ و پھوڑا خارج ہن جاتا ہے۔
قرصہ آتشک کی تشخیص۔ قرصہ آتشک اور قرصہ مرغہ کے درمیان
 تشخیص قائم کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ البتہ شبہ اس وقت نہیں پیدا ہو سکتا
 جبکہ زخم میں تقرح نہ ہو اور قاعدہ زخم میں ممتاز مصلابت پائی جائے۔ لیکن تشخیص
 میں دقت تو اس وقت ہوتی ہے جبکہ ابتدائی قرصہ میں تفتیح واقع ہو کر ایک گہرا
 زخم پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے گرد کی ساختیں انضباب مواد اور استلاء دومی
 کے باعث متلی ہو کر حلقہ بنالیتی ہیں۔ ایسی حالت میں قرصہ کی اصلیت کا اندازہ
 شکل سے ہو سکتا ہے۔ کچ ران کے غدودوں حالتوں میں بڑھ جاتے
 ہیں اور پیپ کا موجود ہونا کوئی بات نہیں بھرتا۔ حتیٰ کہ تفتیح ذاتی کے باعث
 مسدود ہونے یا بادام نما لگنا۔ مثلاً التهاب عروق جاذبہ۔ لطفائی ٹشن مقلع ذاتی۔ آوٹا کرٹن

قرحہ تائبہ کا موجد ہونا ہی صرف قرحہ رخوہ کی موجودگی کو ثابت کرتا ہر لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آتشک موجد نہیں ہے + زخم کی کھرچن (حکا کرنا) میں یا اس رطوبت میں جو کچھ ران کے متورم غدوسے خارج کرنے کے بعد محتہ جلد یہ دیکھاری کی سوئی کے ذریعہ نکالی جاوے۔ اگر آتشک کے مخصوص ہچکار جراثیم اس میں بل جائیں تو یہ ایک قطعی ثبوت آتشک کی موجودگی کا ہے گا ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ قطعی تشخیص کے متعلق رائے دینے کے لیے درجہ دوم کی علامات کا انتظار کرنا پڑتا ہے +

قرحہ ابتدائی کی مدت۔ یہ مختلف حالات میں مختلف ہوتی ہے، اور اسکا انحصار بیشتر اس امر پر رہتا ہے کہ جلد علاج شروع کیا گیا یا دیر سے + اگر مریض پہلے چہرہ ہفتوں کے اندر ہی اندر طبیب کے معائنہ میں آگیا اور پھر اور اسکا علاج فوراً پارہ کے مرکبات سے مسلسل طور پر جاری رہا تو قرحہ مندمل ہو جاتا ہے، اور صلابت عموماً چہرے سے آٹھ ہفتہ میں غائب ہو جاتی ہے، تاہم کچھ ران کے غدود کچھ زیادہ عرصہ تک بڑے ہوئے رہتے ہیں + علاج کے شروع کرنے میں جلد سے تاخیر کی جاوے گی ادوی لحاظ سے سختی دیر پا ہوگی + اگر پاسے کا استعمال نہ کیا جاوے تو صلابت بارہ مہینوں سے بھی داند عرصہ تک قائم رہ سکتی ہے، اور پھر ہندرتیج کم ہو کر غائب ہو جاتی ہے، اگرچہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے بہت کم عرصہ لگے، غیر مخلوط قرحہ آتشک کے بعد نہایت خفیف ندبہ (نشان زخم) باقی رہتا ہے، اگرچہ قرحہ رخوہ یا پیپ پڑے ہوئے قرحہ (قرحہ عفتہ) کے بعد نہایت نمایاں داغ باقی رہتا ہے +

متا کھرچن۔ حکاکہ۔ ہسکرے چکس۔

متا قرحہ تابعد۔ شلائٹ مشکو۔

متا قرحہ عفتہ۔ سپورے ٹنگ مشکو۔

قرحہ تراجمہ۔ (صلابت راجعہ۔ لوستے والی سختی) گاہے پارہ نکا استعمال بہت جلد ترک کر دینے سے، یا کسی مقامی خراش و سبجان کے باعث یا از سر نو تازہ عدد ہی حاصل ہونے سے نشان زخم (ندبہ) میں دوبارہ تضلیب پیدا ہو جاتا ہے اس قسم کی رجعت تضلیب کو قرحہ راجعہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے بعض اوقات قرحہ راجعہ درجہ سویم کی وجہ سے یا اور ام صغی کے باعث ہی ذاق ہو جاتا ہے اگر ایسی حالت میں عروق و غدود جاذبہ کے عوارض موجود نہیں ہوتے۔

(۴) آتشک ثانوی

آتشک کے درجہ دوم میں مرن کی سمیت خون کے ذریعہ (جو خود بھی فی ذات معذی ہوتا ہے) پھیل کر سارے جسم میں سرایت کر جاتی ہے جس سے عام جسمانی عوارض کم و بیش پیدا ہو جاتے ہیں، مریض کا مزاج حسست ناساز اور طبیعت مضطرب ہوتی ہے اور بعض حالات میں نمایاں بخارا در دسر اور لاغری ہو جاتی ہے۔ اکثر اوقات شدید فقر الدم (رکی خون) موجود ہوتا ہے اور خون کے آٹکان میں سرخ دانے لکریات حرام مقدار میں کم پائے جلتے ہیں اور ان کے اندر رنگین مادہ حرمت و دشویرہ کی مقدار بھی کم ہوتی ہے۔ سفید دانہ کی معمولی کثرت بھی ہانی جاتی ہے، جس میں لکریات مایہ اور کزیات سالمیہ کی زیادتی بالخصوص ہوتی ہے۔ درجہ دوم کے خاص علامات و مظاہر یہ ہیں کہ بدن کے غدود جاذبہ

۱۔ حرمت دمویہ۔ ہیموگلوبین۔	۱۔ قرحہ راجعہ۔ ری لیب سنگ شکن۔
۲۔ کثرت بیضادات۔ لیکوسائیٹس۔	۲۔ صلابت راجعہ۔ ری انڈیوریشن۔
۳۔ لکریات مایہ۔ لفوسائٹس۔	۳۔ اور ام صغی۔ گیشا۔
۴۔ لکریات سالمیہ۔ پلانڈامیل۔	۴۔ آتشک ثانوی۔ سکندری غل۔

نام نمود پر بڑھ جاتے ہیں اور ساقہری جلد اور غشیہ مخاطیہ پر مختلف اقسام کے دانے (طفح جلدی) پیدا ہو جاتے ہیں، اور بال گرسنگتے ہیں، بعض علامتیں ایسی بھی ہیں جو شاذ و نادر ظاہر ہوتی ہیں۔ ایسی علامات کا تعلق آنکھوں اور دماغ وغیرہ سے ہوتا ہے۔

یہ علامات تلیق مرض (چھوت) کے بعد عموماً چھ سے نو مہینہ تک ظاہر ہوتی ہیں مگر بعض اوقات اس میں بہت تاخیر بھی ہو جاتی ہے۔ علامات کی شدت میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، کبھی تو کوئی علامت بشکل ظاہر ہوتی ہے، اور کبھی مرض کے شدید علامات بخوبی ظاہر ہوتے ہیں۔ علاوہ ان میں علاج کی تاخیر کا بھی علامات پر بہت اثر ہوتا ہے۔ علاج کی ابتداء جب قدر جلد درجہ ابتدائی کے بعد ہی (کردی جاوے) اسی قدر درجہ دوم کے علامات خفیف ظاہر ہوتے ہیں۔ درجہ دوم کے دانے (طفح جلدی) انکی متاخر خصوصیت یہ ہے کہ ان کی کوئی متاخر شکل نہیں ہوتی۔ جو دوسروں میں نہ پائی جاتی ہو۔ بلکہ یہ ہر قسم کے دانوں (طفح جلدی) سے مشابہ ہو سکتے ہیں۔

علاوہ ان میں ایک ہی مریض میں تمام جسم پر ایک ہی قسم کی ٹھنپیاں نہیں پائی جاتی ہیں بلکہ بدن کے مختلف حصوں میں خاص خاص طرز کی کئی نمایاں قسمیں ہوتی ہیں (تعدد شکل) یہ دانے ترتیب و وضع مقام میں اکثر یکسانیت رکھتے ہیں دیکھنے اکثر بدن کے اُسی حصہ پر دونوں جانب ہوتے ہیں (انکارنگ ابتداء گھڑ سیاہی مائل سرخ (پچھلے لحم خنزیر کی طرح) ہوتا ہے، مگر کبھی یہ چکدار گلابی رنگ بھی مکتے ہیں۔ اس قسم کے دانے کچھ عرصہ کے بعد غائب ہو جاتے ہیں مگر اکثر انکی جگہ حارصی طور پر سیاہی مائل تانبے کے رنگ کے داغدار چٹے روچنے (ارد) جلتے ہیں۔

تعدد شکل - پالی مار فزئم -

جلد کو دبائے سے یہ دانے بالکل غائب نہیں ہوتے بلکہ اسی قسم کے بھڑکنے سے داغ کی طرح دکھائی دیتے ہیں + ان میں خارش یا جلن نہیں محسوس ہوتی + انکی رفتار نہایت سادگی سے شریع ہوتی ہے یعنی ابتداً جبکہ جلد میں محض معمولی امتلاء و موی ہوتا ہے + اسوقت یہ بالکل سادہ سُرخ یا نل صورت رکھتے ہیں + بعداً جبکہ رطوبات موزیہ کا اجتماع ہو جاتا ہے تو انکی صورت زیادہ شدید ہو جاتی ہے +

دانوں کی سادہ ترین قسم میں محض معمولی امتلاء و موی ہوتا ہے + جس سے جلد میں سُرخ و سیاہی نل دجے نظر آتے ہیں + درودیت (فرنجیہ) + تشکی سُرخ + یہ دجے جلد مڑ جاتا ہے + اور گاہے موجود ہی رہتے ہیں جبکہ انکے ساتھ ساتھ دوسرے طرز کے دانے بھی نکلتے رہتے ہیں + کبھی ساخت جلد کے نیچے کے اوجھا (خلیات) میں انصباب و امتلاء و موی ہونے سے یہ متورم ہو جاتے ہیں (حلیات فرنجیہ) + گاہے رطوبت دار دانے یا آبے بن جاتے ہیں (نفاظہ فرنجیہ) + بثور (فرنجیہ) مگر اس قسم کی تبدیلی بہت نادر واقع ہوتی ہے + یا نہایت کمزور + نجف مرینوں میں پانی جاتی ہے + دانوں کی ایک اور قسم بھی ہوتی ہے جسکو قشور (فرنجی) کہتے ہیں + اسکا نشان استیازی یہ ہے کہ اس میں انصباب مواد و امتلاء و موی کے دھبوں کے ساتھ ساتھ سطح پر قشور (چپکے) ابھی ہوتے ہیں + یہ عموماً بدن کے دونوں جانب ہوتے ہیں اور برخلاف سادہ صدفیہ یا چپل کے عضلات قاضیہ کی سطح پر واقع ہوتے ہیں + چپل عضلات باسط کی سطح پر عموماً ہوتا ہے +

مثلاً بثور فرنجیہ (تشکی) لٹے + بچور سفلائڈ۔

مثلاً درودیت فرنجیہ + روزیوس سفلائڈ۔

مثلاً قشور فرنجیہ + ہسکوس سفلائڈ۔

مثلاً حلیات فرنجیہ + پیویر سفلائڈ۔

مثلاً صدفیہ چپل + بیورائی سس۔

مثلاً نفاظہ فرنجیہ (تشکی) لٹے + وسائی کیر سفلائڈ۔

آخری درجہ میں جلد بدن کے اندر نمایاں کانٹھیں یا گودھڑے (او بھار) پیدا ہو جاتے ہیں جو گاہے پوٹ کر تقرح کے درجہ تک پہنچ جاتے ہیں رعنقد افرنجی دھرتا (افرنجی)۔

آتشکی دانوں کی وضع قیام۔ عام طور پر خصوصی مقامات پر ہوتی ہے، چنانچہ در دیت افرنجیہ اکثر اوقات جسم کے درمیانی حصہ یعنی دھرتا (جذع) میں محدود ہوتی ہے، مگر دیگر اقسام کے دانے سارے جسم یعنی دھرتا اور اطراف (ماہتہ، پافاں) میں منتشر رہتے ہیں، اگرچہ بسا اوقات یہ عضلات قابضہ کی سطحوں پر بہ نسبت عضلات باسطہ کی سطحوں کے زیادہ پائے جاتے ہیں، گاہے علینات افرنجیہ ایک عجیب صورت میں پیشانی پر پائے جاتے ہیں جسے کبھی اکلیل الزہراء کے نام سے نامزد کرتے ہیں۔

اعنشیہ مخاطیہ بھی آتشک ثانوی میں بیشتر اوقات اسی طرح مبتلائے مرض ہو جاتی ہیں جس طرح جلد بدن، برزخ حلق یا زرم تالو استلام دوسری کے باعث متورم اور سرخ ہو جاتا ہے، متورم حصہ بالائی صورت کا ہوتا ہے اور اس کی حد یکایک ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اکثر اوقات برزخ مذکور میں دونوں طرف زخم (تقرح) پڑ جاتے ہیں، تقرح غلصمہ کے اگلے محراب سے شروع ہو کر نو ذنین تک اور اسی طرح زرم تالو سے ہوتا ہوا ہاۃ (کونا) تک پھیل جاتا ہے، یہ زخم زیادہ گہرے نہیں ہوتے مگر انکے حاشیے صاف اور باریک کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان زخموں کی رنگت

سدا کا ٹٹھ۔ نو ذنین۔

سدا ابھار۔ گودھڑے۔ ٹیو برکل۔

سدا رعنقد افرنجی۔ ٹیو برکل سفلا نڈ

سدا دھرتا۔ جذع۔ زہک۔

اکلیل الزہراء { کارونا و نیروس۔
تاج زہری

سدا غلصمہ کا اگلا محراب۔ انٹریریلر {

آف دی فاسز۔

مخصوص طرز کی یعنی بہوری سی ہوتی ہے + آتشک ثانی میں طلق کا زخم شاذ و نادر ہی ساختوں کو زیادہ لگاتا ہے، لہذا اس کے اثر سے صلیق طلق (رطل کی تنگی) نہیں پیدا ہوتا + بنا کو نوشی کے اثر سے ان حالات میں زیادتی و شدت پیدا ہو جاتی ہے + طلق کے مندرجہ بالا عوارض کے ساتھ ساتھ زبان کی پشت پر بعض مقامات میں بشرہ کے غائب ہو جانے سے چنے بن جاتے ہیں + یا گالوں کے اندرونی پہلو پر یا لبوں پر یا زبان کے کناروں پر چند چھوٹے چھوٹے سطحی زخم رقرج ہو جاتے ہیں جن میں بہت شدید درد و محسوس ہوتا ہے + یہ زخم کھردرے دانٹوں کی غراش ہو جانے کے باعث پیدا ہو جاتے ہیں +

عقد مخیطیہ رغشاء مخیطی کے او بھار اور ادرام لقیہ (سلو لقیہ) کے بھی ایسے ہی عوارض ہیں، جو اگرچہ نسبتاً زیادہ شدید ہوتے ہیں مگر آتشک ثانی میں انشیمہ مخیطیہ اور جلد کے اون حصص میں پیدا ہو جاتے ہیں جو نرم اور طبیعتاً سے تر رہتے ہیں +

عقد مخیطیہ او بھرے ہوئے دانے ہوتے ہیں جو بشرہ کے نیچے کے جلدی خلیات (او بھاروں) کے بڑھنے اور انضباب مواد کے باعث پیدا ہو جاتے ہیں + بیضا رنگ کے او بھار ہوتے ہیں کیونکہ ان کی بالائی سطح پر بشرہ کے خلیات تری کے باعث پہول جاتے ہیں اور اکثر ان میں تقرج بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ خوردین کے ذریعہ مشاہدہ کرنے سے بشرہ کے نیچے کے او بھار (خلیات) صریح طور پر بڑھے ہوئے پائے جاتے ہیں، اور اون پر بشرہ تدریجاً جھکا ہوا دکھائی دیتا ہے + اس قسم کے او بھار عموماً گوشہ دہن، گالوں کے اندرونی پہلو، زبان کے کنارے یا عقد کے

۱۔ عقد مخیطیہ - فیرخیل لے نو سس۔

۲۔ عقد مخیطیہ - یوکس ٹیڈر برکل۔

۳۔ عقد مخیطیہ - یوکس ٹیڈر برکل۔

۴۔ عقد مخیطیہ - یوکس ٹیڈر برکل۔

کنائے پر پائے جاتے ہیں۔ جاشیہ و مقعد پر اکثر یہ دائیں بائیں دونوں جانب ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایک جانب کے ابھار کی چھرت سے دوسری جانب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ عام طور پر پیر کی اونگلیوں کے درمیان میں بھی ہو جاتے ہیں، اور اس جگہ ان کی وجہ سے جو زخم (قرح) بن جاتے ہیں وہ نہایت بدبودار ہوتے ہیں۔ اور ارام لقمیہ بھی اسی طرح خلیات کے بڑھ جانے کے باعث پیدا ہوتے ہیں ان میں اور عقد خلیہ میں فرق صرف ادبھاروں کے چھوٹے بڑے ہونے کا ہے۔ یعنی اورام لقمیہ کی صورت میں بہت بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اورام لقمیہ مٹول (ٹولول) کی طرح ایک محدود مقام میں بڑھ کر گاہے گاہے کبھی کے پھول کے پتوں کے مانند بہت بڑی جسامت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ عموماً فرج اور مقعد کے قرب و جوار میں پائے جاتے ہیں اور انے نہایت بڑی مقدار میں اور بہت معنوی قسم کی رطوبت خارج ہوتی ہے۔ مبرز کے مقام پر اکثر مریض انکو دیکھ کر برا سیر کے منے سمجھنے لگتے ہیں۔ بعینہ اسی قسم کی حالت گاہے پشت زبان میں بھی پائی جاتی ہے۔

غدد جاذبہ۔ آتشک ثانی میں عموماً سارے جسم کے غدد جاذبہ بڑے ہو جاتے ہیں اور جلد کے نیچے گول گول اور سخت اورام کی صورت میں محسوس ہوتے ہیں۔ غالباً منہ کے درجہ سینہ کا اندازہ ان غدد کی حالت سے ہو سکتا ہے۔ یعنی عقد یہ شکایت زیادہ ہوگی۔ اسی قدر سبب مریض زیادہ سوجھی جلمے گی، اگر دن کے پچھلے حصہ (گدی) کے غدد اور کبھی کے غدد فوقی القلمہ اگر مریض طویل سے بڑے ہوں پائے جائیں اور انکے متوزن ہونے کا کوئی صریح سبب موجود نہ ہو تو یہ آتشک کی

علاج مسہ۔ ٹولول۔ دارٹ

علاج گدی کے غدد۔ نیوکل گلیڈر۔

علاج جکو ٹولول مبشخصون کہتے ہیں۔ (دبچن سن) اٹ

علاج غدد فوقی القلمہ۔ اپنی کاغذ یا مائیکلینڈ

موجودگی کی ایک غالب دلیل ہے +

آتشکی داء الثعلب (داء الثعلب - بال جھڑ جانا) بالوں کا رنگ پیکا اور اونکی چمک غائب ہوجاتی ہے + سر کی جلد بھول اور ڈاڑھی وغیرہ کے بال یا تو جگہ جگہ سے ریزیرہ ناصورت میں جھڑ جاتے ہیں یا تمام بال عام طور سے باریک اور پتے پڑ جاتے ہیں + مگر بالوں کی جڑیں (عند الشعر) نہیں ضائع ہونے پاتی اور کچھ وقفہ کے بعد بال پھر بدستور آگ آتے ہیں +

آتشک ثانوی کے بدیر ظاہر ہونے والے عوارض مندرجہ ذیل ہیں :-
(۱) ہڈیوں میں شدید درد کا ہونا (دفع اعظم) + (۲) الہتاب طبقہ عنیبہ (۳) مختلف اقسام کے عصبی عوارض + (۴) قصبہ کبریٰ اور دوسری ہڈیوں کی جھلی میں اور ام کے باعث کانٹھیں بننا + عقدہ منزعجی یعنی غشاء اعظم کی گرہ (۵) بدن کے دونوں جانب مفاصل کی غشیہ زلالیہ کے اندر مزن طور سے رطوبات کا اجتماع ہوجانا +

طبقہ عنیبہ کے الہتاب کی علامت یہ ہے کہ آنکھ میں درد ہوتا ہے جو عموماً عصبہ فوق الجھری طرف لوٹ جاتا ہے، نظر میں فرق آجاتا ہے (دراصل کئی نہیں دیتا) اور اکڑ آنکھوں میں سے پانی بہتا ہے اور روشنی سے چکا چوندہ ہوتی ہے اسحان سے قرنیہ کے ٹھیک باہر کی طرف (گردا گرد) ایک تیز رخ رنگ حلقہ پایا جاتا

دواء الثعلب - اوپے شیا -	مک عقدہ منزعجی - پیسی اسٹیل نوڈ -
مک عند الشعر - میر فالیکلا -	مک غشیہ زلالیہ - ساقی نوویل لمبرین -
مک دفع اعظم - آسٹیکوپ -	مک عصبہ فوق الجھری - سوپرا آرٹیکل زور -
مک الہتاب عنیبہ - آئی رائی ٹس -	مک آنسو بہنا - میکی میٹن -
مک کانٹھ - عقدہ نوڈ -	مک چکا چوندہ - فوٹو فریا -

ہے جو عروق ہذیبہ میں استقامت ہونے کے باعث بن جاتا ہے + عنینہ کی چمک کم ہو کر وہ مکدر ہو جاتا ہے اور اس کے کنارے دھندلے اور خراب رنگ کے ہو جاتے ہیں + عنینہ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے اور اگر طبخا اوسکا رنگ نیلا ہے تو وہ مائیت کی موجودگی کے باعث زرد و سبزی مائل ہو جاتا ہے + ثقبہ عنینہ دھکیلی + جھوٹا پڑ جاتا ہے اور شاید اوسکا دائرہ (حلقہ) نامہ دار بھی ہو جاتا ہے + پتلی کی حرکت دھبھوٹا پڑا ہوا بڑی پوری نہیں ہونے پاتی اور گاہے وہ سائے کی طرف قرینہ کی پھیلی سطح سے جڑ جاتی ہے۔ (التصاق عنینہ مقدم) یا پیچھے کی طرف رطوبت جلدیہ کے غلاف سے چمک جاتی ہے (التصاق عنینہ مؤخر) ان دونوں حالات میں پتلی باطل ہے حرکت ہو جاتی ہے + گاہے اوس کی سطح پر چھوٹے چھوٹے زرد دانے دکھائی دیتے ہیں + یہ دانے مائیت نکوینہ کے ہوتے ہیں مائیت نکوینہ جس سے کوئی عضو یا ساخت نئی بنجائے +

آتشک ثانوی کی مدت اور نوعیت بہت مختلف ہوتی ہے + مناسب علاج جس قدر جلد شروع کیا جائے، اسی قدر درجہ ثانوی کے دعوارض اپنی شدت میں خفیف پائے جاتے ہیں + مگر جن حالتوں میں علاج میں زیادہ دیر لگائی جاتی ہو رہ زیادہ وقت طلب ثابت ہوتے ہیں + لہذا قرعہ غیر تاسلیہ کے بعد یا مستورث میں جو اکثر قرعہ ابتدائیہ سے فاضل رہے خبر رہتی ہیں، آتشک ثانوی کی علامات اکثر شدید ہوتی ہیں + جب عروہی کے بعد علاج چار یا پانچ ہفتہ کے اندر شروع کر دیا جائے تو درجہ ثانوی بہت خفیف ہوتا ہے اور دوا دیا اس سے بھی کم مدت میں مرض کا اثر نائل ہو جاتا ہے + لیکن جب آتشک ثانوی کے جلدی دانوں کے

مثلاً التصاق عنینہ مؤخر۔ پوسٹیر یسی کیا۔

مثلاً عروق ہذیبہ۔ یسی اری و سلسلہ۔

مثلاً مائیت نکوینہ۔ پلاسٹک لیمٹ۔

مثلاً التصاق عنینہ مقدم۔ انٹیر یسی کیا۔

ظاہر ہونے کے بعد علاج شروع کیا جاتا ہے تو درجہ دوم کی مدت نیا دہ عرصہ نکات جاتی ہے + علاوہ ازیں مریض کی صحت عامہ اوس کے دیگر عادات و خصائل کا خصوصاً شراب نوشی شایت مرض کے ساتھ نہایت گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ کمزور صحت والوں نشہ باز و بد اطوار اشخاص میں آتشک زیادہ شدید علامات پیدا کر دیتی ہے + ضعیف قوی کے دوہ مریض جو فضلی بخاریا ممالک حارہ کے دیگر امراض سے متاثر ہو کر اچھی صحت و ثروت کھو چکے ہیں، جب وہ آتشک میں مبتلا ہوتے ہیں تو بہت زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں اور ان میں مرض آتشک شدید رفتار اختیار کر لیتا ہے + اگر علاج مسلسل طوے سے نہ کیا جاوے اور درمیان میں چھوڑ دیا جاوے تو پہلے بارہ مہینوں کے اندر پھر آتشک کا دوسرا حملہ ہو جاتا ہے اور مرض از سر نو عود کرتا ہے ان حالات میں آتشک کے دانے لمخ جلدی از زیادہ خصوصی و مستی بازی طرز کے ہوتے ہیں اور طلیات (اوجھار) گرہ در گرہ دائرہ ناشکل میں بجھتے پائے جاتے ہیں +

(۲) درجہ متوسط یا درجہ ثانیہ متاخرہ ۱۰ اس درجہ کو مندرجہ بالا علامات کے اور درجہ سوم کے درمیان ایک کڑی سمجھنا چاہئے یعنی یہ درجہ مذکورہ بالا علامات کے بعد اور درجہ سوم سے پہلے ہوتا ہے۔ گویا یہ درجہ دونوں کے درمیان درمیہ اتصال ہے) مگر اس درجہ کے آغاز و اختتام کی کوئی خاص حد تعین نہیں ہو سکتی + اور جبکہ مریض کی عام صحت جسمانی اچھی ہو اور علاج بھی پابندی وقت کے ساتھ مسلسل ملے پر کیا گیا ہو تو اس درجہ کا ظاہر ہوتا بھی ضروری نہیں ہے + آتشک ثانوی کے علامات میں سے بعض خصوصاً مفاصل و عظام کے عوارض اس درجہ میں بدستور بل سکتے ہیں، اور اگر بالفرض وہ غائب بھی ہو چکے ہوں تو درجہ دوم کی بعض شکایتیں از سر نو جلدی امراض کی شکل میں اور گسے التهاب اخذیہ و س کی صورت میں لاحق

را غلیات ہے ہولز۔

۱۰ التهاب اخذیہ و س۔ اپیڈویمائیٹس۔

ہو جاتی ہیں + اس درجہ میں اور اس کے مابعد یہی عروق دموید اکثر مبتلائے مرض ہو جاتے ہیں اور ان عروق کے اندرونی پردہ کا استر (بطانہ) نئی ساخت سے بڑھ کر موٹا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے عروق کا اندرونی دائرہ سکڑ کر تنگ ہو جاتا ہے جس سے عضو متعلقہ کے تغذیہ میں کمی آ جاتی ہے اور اس کو خون برابر نہیں پہنچنے پاتا یہی شکایت بڑی شریافوں کے عروق العروق میں لاحق ہونے کے باعث شک میں تھجڑ و صلابت پیدا ہو جاتی ہے (تھجڑ شریانی) اور اگر عروق دماغیہ میں ہی اسی قسم کا تھجڑ واقع ہو جائے تو مختلف اقسام کے عصبی عوارض پیدا ہو سکتے ہیں + چنانچہ کسی ایک عضو کا استرقا (استرقا و صلابت) یا نصف حصہ جسم کا استرقا (دفعان) بعضی ظاہر ہو سکتا ہے نیز یہ ہی ممکن ہے کہ مرض صرف ایک دماغی پٹھے تک محدود رہے یا صرف شدید درد پیدا کر دے اور ان نامساعد شکایات پر علاج کا مطلق اثر نہ ہو + اندرون چشم کے امراض (مثلاً التهاب مشیمیہ و شبکیہ) بھی کثرت پائے جاتے ہیں۔ جلد کا مخصوص ماضی جو اس درجہ میں عموماً ملتا ہے (تشکی صدقہ) (چپل تشکی) ہے + یہ عموماً ہیٹلیوں اور تلوں میں ہوتا ہے + آتشک ثانی کے بیان میں اوپر درج ہو چکے ہیں کہ درجہ دوم میں عموماً قشر افرنجی ظاہر ہوتا ہے مگر یہ اول تو جسم کے دونوں جانب ہوتا ہے و دوم پارہ کے اثر سے جلد غائب ہو جاتا ہے + برخلاف ازیں درجہ متوسط کی برآف دو جانی اور گلے یک جانی ہوتی ہے + اگر وہ جلد ظاہر ہوتی ہے تو دونوں جانب۔

۱۔ بطانہ۔ اندرونی تعلیم۔	۲۔ دفعان بعضی۔ ہیٹلیا۔
۳۔ عروق العروق۔ واسا ویدوم۔	۴۔ مشیمیہ۔ کورائڈ۔
۵۔ تھجڑ شریانی۔ آرٹیریا سکے روس۔	۶۔ شبکیہ۔ رٹنا۔
۷۔ استرقا و صلابت۔ موٹو پلجیا۔	۸۔ صدفیہ۔ سورانی سس۔
	۹۔ قشر افرنجی۔ اسکوش سفلاٹو۔

ہوتی ہے اور اگر دیر سے پیدا ہوتی ہے تو صرف ایک ہی جانب ہوتی ہے +
 پہلی صورت میں جبکہ وہ دونوں جانب ہو بشرہ کی نئی پیدائش بکثرت ہوتی ہے
 اور ساتھ ہی جلد میں گہری دھڑکیں اور شکاف پائے جاتے ہیں + دوسری صورت
 میں جبکہ وہ ایک جانبی ہو بشرہ میں نوساختہ غلیات بہت کم بنتے ہیں مگر ان کے
 حواشی اور کنارے سانپ کی شکل کے ہوتے ہیں۔ اور ان کے لبوں پر الہابی مواد
 کا اجتماع ہوتا ہے +

فقاعیۃ درازہم اور جادرسیہ (قارہ) یہ دونوں قسم کے قروح و ثبور،
 آشک کے اس درجہ میں ہوتے ہیں، خصوصاً ایسے مریضوں میں جو نقص تغذیہ کے
 باعث لاغر و نقیم ہوں + ان دونوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جلد سے گوند کے مانند
 رطوبت تیرخ ہوتی ہے۔ اس کے بعد زخم پیدا ہو جاتے ہیں + پہلے مریض میں زخم
 کی سطح پر رطوبات بجمہ ہو کر ایک مٹایاں کھڑی بنا دیتی ہیں + جب رطوبت کا ایک پرت
 خشک ہو کر جم جاتا ہے تو اس کی زیریں سطح سے پنے درپے دوسرے پرت نکل کر
 جتے جاتے ہیں اور نیا پرت اوپر کے پرت سے کسی قدر بڑا ہوتا ہے + اس ترتیب
 کے باعث بالآخر ایک بڑا سا کھڑی بن جاتا ہے جو شکل میں گھوگھے کے پوست (سیپ)
 سے مشابہ ہوتا ہے اس کے نیچے ایک الہابی سطح ہوتی ہے جہاں استسقاء خون ہوتا
 ہے + جسم کے ہر حصہ میں یہ مرض ہو سکتا ہے + جادرسیہ (قارہ) میں نقامیہ کی
 طرح قرص کی سطح پر کھڑی نہیں بنتا، یا اگر بنتا بھی ہے تو فوراً جدا ہو جاتا ہے اور اس کے
 نیچے سے ایک کم گہرا زخم نمودار ہو جاتا ہے، جس کے گرد ایک احتقانی حلقہ پایا
 جاتا ہے +

فقاعیۃ { درازہم
 و رومیہ

جلد جادرسیہ (قارہ) اکھتی ہوتا ہے۔

نشد رجب بالا دو نو قسم کے قروح مناسب علاج سے درست ہو جاتے ہیں، مگر جلد پر انکے نشان گہرے رہ جاتے ہیں جنکا رنگ پیدیں مائل ہوتا ہے اور اس پس اکثر رنگدار مادہ کے باعث رنگین داغ رہ جاتے ہیں +
اس درجہ کے خواہر میں سے ایک کیاب عرض اخضر دوس کا التهاب غیر عادی جو دونو جانب ہوتا ہے۔ اس حالت میں جل آگنی بھی مرنہ۔ متورم اور دردناک ہو جاتا ہے +

(۴) آتشک ثلثانی - تیسرے درجہ کی آتشک

آتشک کے تیسرے درجہ کے عوارض حدوی سے چہ ہینہ کے اندر اندر ظاہر ہو سکتے ہیں اور گاہے وہ بیس سے تیس سال کی مدت تک ظاہر ہی نہیں ہوتے + ان عوارض کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جسم کے نیچے دھل کی پیدائش بہت بڑھ جاتی ہے اور انہیں مواد کا انصباب ہو جاتا ہے، یہ افزودنی و انصباب گاہے ایک ہی مقام پر ہوتا ہے اور گاہے متعدد مقامات پر، اور اسی طرح گاہے مقامی و محدود درجہ کا ہوتا ہے اور گاہے وسیع و منتشر + جب یہ عمل وسیع اور پھیلا ہوا منتشر ہوتا ہے تو عضو یا مقام مازن سخت اور بڑا ہو جاتا ہے اور نیچے نیچی پیدائش کے باعث، اس میں تجر پیدا ہوتا ہے + مگر جب یہی عمل مقامی اور محدود ہوتا ہے تو صرف درم صمغی (سلعہ صمغیہ) ظاہر ہوتا ہے + (منع گوئد)
ساختمات جسمانی میں سے ہر قسم کی ساخت کے اندر صمغی مادہ (روسب صمغی) کی

۱۔ اضمیدوس - اپنی ڈوس۔	۲۔ فروم صمغی {
۳۔ جل بینی - اسپرینک کارڈ۔	۴۔ سلعہ صمغیہ {
۵۔ نیچ نیچی - فائبرو ایکٹریشل ٹش	۶۔ روسب صمغی - گے ش ڈیہاژٹ۔


پیدا نکل ہو سکتی ہے + یہ گاہے بغیر کسی ظاہری سبب کے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن گاہے ان کے ظہور سے پہلے ضربہ و نقطہ کی موجودگی ہی پانی جاتی ہے + مقام ماؤن پر بڑے اور صغیری خلیات ملتے جلتے اور چھوٹے خلیات مستحکمہ (خلیات مانیہ) کا ترشح ہوتا ہے، اور عموماً کئیات سالمیہ بھی کثیر تعداد میں موجود ہوتے ہیں +

درم صغریٰ کے ترکیبی اجزاء درم سے مشابہ ہوتے ہیں مگر بایں فرق کہ ان میں اجزاء کی ترتیب گانٹھوں کی صورت میں نہیں ہوتی اور نہ اجزاء کی ترتیب حلقوں کی صورت میں ہوتی ہے + نظام ہوتا ہے + علاوہ انہیں اور ام صغیریہ میں عموماً کئیات عظیمہ موجود نہیں ہوتے (اگرچہ شاذ و نادر پائے ہی جاتے ہیں اور کئیات عظیمہ درم سے مشابہ ہو سکتے ہیں) + اس قسم کے بنے ہوئے درم صغریٰ کے اندر عروق بہت کم داخل ہوتے ہیں، ورنہ معجزہ آریک (انگوری ساخت) سے بالکل مشابہت رکھتے، درم صغریٰ بتدریج حجم میں بڑھ کر اور عضوی طبعی ساختوں کے اندر ترشح ہو کر اون کی جگہ لے لیتا ہے اور بیل کر ان کے قائم مقام بن جاتا ہے +

اور ام صغیریہ کا خاتمہ - اور ام صغیریہ جب بخوبی بن کر مکمل ہو جاتے ہیں تو آخر ان کا خاتمہ کیونکر ہوتا ہے + اس کا جواب مختلف حالات پر منحصر ہے + اگر مددی معمولی شدت کا ہے اور خصوصاً اگر مناسب علاج کیا گیا ہے تو اکثر خلیات (کئیات) بخند ہو جاتے اور باقی ماندہ یعنی ساخت میں منتقل ہو جاتے ہیں + اس طرح ایک بڑا درم صغریٰ بھی بالکل غائب ہو سکتا ہے اور اس کی جگہ صرف ایک چھوٹا سا یعنی نشانِ خرم باقی رہ جاتا ہے

۱۔ خلیات ملتے جلتے۔ اندر و تھیل سلیز۔	۲۔ درم۔ ٹیڈر بکل۔
۳۔ خلیات مستحکمہ۔ رادہ ڈ سلیز۔	۴۔ کئیات عظیمہ۔ جاسٹن سلز۔
۵۔ خلیات مانیہ۔ لغو ساخت۔	۶۔ نیسج اریک۔ گرے نیو لیشن ٹشو۔
۷۔ کئیات سالمیہ۔ پلازما سلیز۔	

(۳۰) اورام صفیہ ٹانگ میں



لیکن اگر معقول علاج نہیں کیا گیا تو بیشتر اورام صفیغہ میں تلخ و مناد واقع ہو جاتا ہے جو اس ساخت کو گلا دیتا ہے ۔ یہ تغیر و مناد ورم مذکور کے مرکز سے شروع ہو کر محیط کی طرف پھیلتا ہے ۔

یہ تغیر آہستہ آہستہ بڑھ کر ذہن کی طرح اس میں ہی مناد ٹھہری اور مناد جینی واقع ہو سکے ہیں ۔ گاہے اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے اور سانچیں یہ عورت ایک مہر کے مناد تکھا ملی میں مبتلا ہو کر گندہ میسی صمدت اختیار کر لیتی ہیں جس کی وجہ سے اسے صفیغہ (رگنہ دالا) کا لقب دیا گیا ہے ۔ ایسے ورم کو اگر در بیان سے قطع کر کے دیکھا جاوے تو اس کے وسط میں سفید رنگ کا ایک بڑا حصہ نظر آئے گا۔ جو غیر منسوج ہوگا (یعنی کوئی بناوٹ نہوگی) اس کے اندر سرے ہونے والے مواد یا مواد جینی (جنیر کے مانند) ہوتے ہیں ۔

اس مرکزی مردہ حصہ کے آس پاس خانہ دار (خلوی) ساخت کا ایک طبقہ محیط ہوتا ہے جو بتدریج اس حصہ کی لمبی ساختوں سے مخلوط ہو جاتا ہے اورام صفیغہ کی ساخت کے مردہ و فاسد ہونے کے دو سبب ہیں۔ اول تجربہ مرض کے سینٹ کے باعث، و دوم خانہ دار ساخت کے مرکزی حصہ میں قلت عروق سے خون کے نہ پہنچنے کے باعث ۔ اورام صفیغہ میں اول تو عروق بغضہ کم ہوتے ہیں، مزید براں یہ کہ ان عروق کے اندرونی استریں الٹا ہونے سے کچھ عرصہ بعد خون کی درآمد اور بھی کم ہو جاتی ہے ۔ علاوہ ازیں بعض اوقات اورام صفیغہ کا مرکزی حصہ اس وقت تک مردہ و تلخ نہیں ہوتا۔

ملاوہ جینیہ کیسی اس میٹریل

سین۔ ٹاکسین۔

ملاوہ جینی۔ فیٹی ڈی جنریشن۔

ملاوہ جینی۔ کیسی ایشن۔

ملاوہ جینی۔ میوکانڈری جنریشن۔

جب تک کہ پہلے اس کی ساخت ہندل ہو کر یعنی ساخت نہ بن جاوے + چنانچہ یہ نئی ساخت عروق پر اور بھی دباؤ ڈال دیتی ہے جس سے اس کے اندر خون کی روانی میں دقت اور قنوت پیدا ہو جاتی ہے +

جیسا کہ اوپر درج ہو چکا ہے معقول علاج سے اور ام صمغیہ تا مگر منجذب ہو جاتا ہے اور یہ انجذاب اس میں فنا و جبنی اور مردہ ہو جانے کے بعد بھی واقع ہو سکتا ہے + لیکن گاہے اس قسم کا عمل انجذاب واقع نہیں ہوتا اور اور ام صمغیہ کے مرکزی حصے میں جو ریم آئیز صمغی رطوبت پیدا ہوتی ہے وہ پھوٹ کر سطح تک پہنچتی اور خارج ہو جاتی ہے +

لیکن جب مردہ شدہ رقبہ بہت بڑا ہوتا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ تفرق پیدا ہو جانے کے بعد اس پاس کی طبی ساختوں سے چپکا ہوا رہ جاتا ہے جو کسی قدر مطلوب بلد انشعاف کے مانند نظر آتا ہے + گاہے مرکزی مردہ حصہ کے گرد ایک قسم کی لینی ساخت محیط ہو کر غلاف سا بنا دیتی ہے پھر اس کے اندر چونہ کسے مواد پیدا ہو جاتے ہیں + ایسا عموماً دماغ، خضیتیں اور جگر میں ہوتا ہے + اور ام صمغیہ کے علامات - بگاڑ مقام کے ریاہ جلد میں ہے یا جلد کے نیچے علامتیں مختلف ہوتی ہیں +

و قوم صمغی جلدی - یہ عموماً آتشک درجہ سویم میں اور خصوصاً اس کی ابتداء میں ہوتا ہے + گول گول سخت اور سیاہی مائل سرخ گانٹھوں (عقدہ) کی صورت میں ہوتا ہے، جس میں درد بہت خفیف سا ہوتا ہے، اور اگر یہ گانٹھ پھوٹ جاتی

تو لینی ساخت - فائبرس نشو -

تو جلد انشعاف - رواش لیدرم بھیڑ کا بنایا ہوا

چڑا جو رغن میں تیار کیا جاتا ہے اور ہرن کے جڑے کے

مانند ہو تلے شیشہ اور تانبہ وغیرہ اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے

تو رطوبت صمغی ریم آئیز - گئی سیسی

پروٹسٹ فرڈ -

ہنہ تہ مخصوص طرز کے گول زخم پیدا ہو جاتے ہیں + اس قسم کے بہت سے دوائے
 گاہے ایک ہی مقام پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جب یہ تقرح سے پھوٹ جاتے
 ہیں تو سب زخموں کے اختلاط و اتصال سے ایک قرص بن جاتا ہے جس کے
 کنارے گول یا سانپ کی طرح ہوتے ہیں + تقرح کے بعد ساختیں بہت کچھ متاثر
 ہو جاتی ہیں مگر یہ جلد ہی مندرج ہو کر گہرے اور ناہموار سفید رنگ کے مذہبہ و نشان
 زخم بنا دیتی ہیں جن کے گرد اگر درنگین داغ نظر آتے ہیں + جسم کے ہر حصہ پر درم
 جلدی ہو سکتا ہے، مگر یہ عام طور پر گھٹنے کے قریب جوار میں یا گھٹنے کے ٹھیک
 نیچے اور زیادہ تر پندلی کے باہر کی طرف ہوتا ہے +

گاہے اس درجہ میں جلد کے اندر کو بیچ حصہ میں انصباب و ترشح ظاہر ہوتا ہے
 جو ایک سنجہ اور احتقانی رقبہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے حاشی گول یا
 اہریے دار ہوتے اور شکل میں قرعہ نامی درم سے مشابہ ہوتے ہیں + اس کے
 حاشی بہت سرعت سے بڑھتے اور پھیلتے جاتے اور نمایاں طور پر موٹے ہو جاتے
 ہیں + ان حاشی کے اندر چھوٹی ٹکائیٹھیں بھی لگے ہوتی ہیں۔ جن میں تقرح ہوتا ہے
 لیکن خواہ تقرح واقع ہو یا نہ۔ مذہبہ و نشان زخم (درم) بن جاتا ہے + یہ آسانی مطلق
 سے مندرج ہو جاتے ہیں اور انکی مدت قرعہ کی نسبت چھوٹی ہوتی ہے اور ان میں
 سیٹ کے ہام کے سے انگوڑ نہیں پائے جاتے جو قرعہ نامی قرص میں یقیناً
 ہوتے ہیں +

درم صمغی زیر جلد۔ یہ ایک سخت عقدہ (گرہ) یا غیر نمایاں دبازت (معدے
 پن) کی صورت میں پیدا ہوتا اور آس پاس کی ساختوں میں انصباب مواد ہونے

۱۔ درم صمغی زیر جلد۔ سب کیوٹے
 نہیں لگتا۔

۲۔ قرعہ۔ یو پس۔
 ۳۔ ہام سیب۔ اپیل جیلی۔

سے بند بیک حجم میں بڑھتا رہتا ہے اور بالآخر سطح تک جا پہنچتا ہے + کچھ قرضہ کے بعد اس کے مرکزی حصہ میں نرمی اور چمک پیدا ہو جاتی ہے اور دھانے سے اس میں درد اور تورج محسوس ہوتا ہے + جب جلد مستحکم مرض ہو جاتی ہے تو درد کے ساتھ اس کا رنگ سیاہی مائل ہو جاتا اور اس میں تپج راولیا ابھی ہوتا ہے + اب اگر یہ قرضہ کے باعث چھوٹا ہے تو اندر سے مواد خارج ہو کر ایک گول اور گہرا قرضہ بن جاتا ہے جس کے کنارے تیز کٹے ہوئے اور گاہے نیچے سے کھوکھلے ہوتے ہیں + اس قرضہ کی گہرائی انگوڑی ساخت (سینج) ایک سے بتی ہو اگر چہ گاہے اس پر خاص قسم کی گلی ہوئی ساخت (تاکل) بھی پھیلی رہتی ہو + آتشک ثلثانی کے وہ عوارض جو مخصوص اعضا و اعضاء میں پیدا ہوتے ہیں وہ آئندہ ایران میں اپنے اپنے مناسب موقعوں پر درج کیے جائیں گے مگر آتشک اور نظام عصبی کے باہمی تعلقات کا بیان عموماً اس کتاب میں داخل نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کا تعلق علم الجراثیم اور جراح سے چنداں نہیں بلکہ زیادہ تر اس کا تعلق طبیب سے ہے +

انذار آتشک - (۱) انجام امراض آتشک بالآخر نظام جسم پر کیا اثر چھوڑے گا اور اس کا خاتمہ کیونکر ہوگا؟ اس کے متعلق گزشتہ چند سالوں میں جن دو اسباب نے صحیح نقطہ نظر قائم کر دیا ہے وہ یہ ہیں - (۱) چونکہ قرضہ ابتدائیہ میں مخصوص ملکات کے واقع ہونے سے پہلے ہی آتشک کے جراثیم دیکھے جاسکتے ہیں، اس لیے اب ہمارے قبضہ میں ایک ایسا یقینی ذریعہ آگیا ہے جس کی مدد سے مرض آتشک کی تشخیص ابتدائی حالت میں فوراً کی جاسکتی ہے (۲) نکھیا کے جدید مرکب سال فرسان اور اس سے مشابہ مرکبات کی ایجاد کرنے میں ایک ایسا کارگر حلقہ ہم پہنچا دیا جو

(۳۱) پھیلا ہوا درم صمغی کائی میں۔



جنس کے ذریعہ سے تمام جراثیم آتشک رہا ہوتا ہے اور جراثیم کے جو بڑی شرابی کی دیواروں اور داغ و خراج کے اندر داخل ہو چکے ہیں (ہلاک کیے جاسکتے ہیں)۔

اگرچہ موجودہ معلومات کی بنا پر اس سوال کا کہ آیا مرض آتشک سے کئی شفا ہو سکتی ہے یا نہیں، یقینی جواب دینا ایک حد تک قبل از وقت ہوگا۔ لیکن زمانہ حال کے اعداد و شمار اور خصوصاً وہ اعداد و بعض فوجی اور بحری ماہران جراثیم کی طرف سے شائع ہوئے ہیں جنہیں آتشک کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے نامہ مواقع حاصل ہیں) اس قدر امید افزا معلوم ہوتے ہیں کہ ادنیٰ بنا پر اب یہ کہا جاسکتا ہے کہ بالآخر یہ نسل انسان کا یہ ہونک دشمن (آتشک) مغلوب ہو کر قابو میں آئیگا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ اعداد و شمار ابتدائی درجات کے مریضوں آتشک سے تعلق رکھتے ہیں اور جب تک دس یا بیس سال کا عرصہ (بغیر اعادہ مرض کے) منقضي نہ ہو جاوے شفا کی کئی حکم لگانا پیش از وقت ہے، کیونکہ ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ علاج سے جسے ہم آتشک کا حقیقی تریاق سمجھ رہے ہیں (دیر میں ظاہر ہونے والے امراض کا بھی اسناد دہرایا نہیں۔ مثلاً عروق کے امراض (اور سٹوما وغیرہ) عصبی مراکز کے امراض (ہزال نخاع) یا تشوش حرکت استرخا عام جنونی وغیرہ)۔

موجودہ حالات میں ہم اسی قدر کہہ سکتے ہیں کہ آتشک کے انجام کا دار و مدار بظاہر ان چار اسباب پر منحصر ہے۔

(۱) مرض کی تشخیص میں ابتدائی درجہ کا ہونا +

۱۔ اور سٹوما۔ اور سٹوما۔	۲۔ تشوش حرکت۔ لوکو موڈ ٹیکسیا۔
۳۔ ہزال نخاع۔ ٹیٹس بیز ڈائریسیس	۴۔ استرخا عام جنونی۔ جنرل پرائے سن آف

(۲) ابتدائی درجہ ہی میں معقول علاج سال فرسان اور پارہ سے محسوس طور پر ہونا +

(۳) سال فرسان کے طریقہ علاج کے ختم نام پر پارہ کے مرکبات کا عرصہ درج تک جاری رکھنا +

(۴) وقتاً فوقتاً امتحان فاشرمان کے ذریعہ سے جراثیم آتشک کی موجودگی یا غیر موجودگی کا یقین کرنا +

اس امکان کی اہمیت کے متعلق گذشتہ صفحات میں تذکرہ کیا گیا ہے، اگر پہلا دوبارہ یہ ظہور کر دینا مناسب ہے کہ خواہ یہ طریقہ امتحان صحیح ہی معلوم ہو مگر اس صحیح نتائج کا مترتب کرنا نہایت اہم اور ضروری ہے +

ایک مریض جسے طبیع نے ابتداء مرض ہی میں دیکھا ہے اور جس کا علاج سال فرسان اور پارہ کے مرکبات سے قائم اور مسلسل طور پر کیا گیا ہے، ایسے مریض کا امتحان کرنے سے ادائل علاج ہی میں امتحان مذکور کا منفی نتیجہ ظاہر ہونا چاہیے + لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ مریض شفاء کلی پا چکا ہے۔ اور اس میں اب آتشک کا باطل اثر نہیں + بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سلسلہ علاج کے اختتام پر مختلف وقفوں کے بعد مریض کے خون کا بار بار امتحان کیا جائے اور بالآخر اگر ایک سال کے بعد تک امتحان مذکور بدستور منفی رہے تو یہ سمجھنا چاہئے کہ غالباً مریض شفا یاب ہو گیا۔ اگر دو سال کے بعد بھی امتحان مذکور کا نتیجہ بدستور منفی ملے تو سمجھنا چاہئے کہ اس کی صحت تقریباً متیقن ہے + ایسے مریض جنہیں آتشک کے آخری درجات میں دیکھا گیا ہے انہیں باوجود مسلسل اور دیر پا علاج کے بھی امتحان مذکور کا نتیجہ بدستور منفی ہرگز ظاہر نہیں ہوتا + ایسے مرضی تقریباً لا علاج ہیں باریں سمجئے کہ اگر ان کا علاج بند کر دیا جاوے تو

ان میں عوارض آتشک از سر نو پھر پھوٹ پڑتے ہیں، لیکن ایسے مریض دوسرے تندرست اشخاص کو اپنے مرض کی جھوت نہیں لگا سکتے، اور انکی اولاد بھی غالباً کئی طور پر تندرست پیدا ہوگی۔ تفصیل بالا سے واضح ہے کہ امتحان فاشرمان کا مثبت ہونا مسئلہ ازدواج کے متعلق وہ اہمیت نہیں رکھتا جو وہ آتشک کے ابتدائی درجات میں رکھتا ہے۔

جراثیم آتشک کی بعض نسلیں نسبتاً زیادہ شدید اور دیر پلے مٹنے کی ہوتی ہیں خصوصاً ممالک حارہ میں، اسی طرح بعض اشخاص ان جراثیم کو قبول کرنے کی استعداد نسبتاً زیادہ رکھتے ہیں۔ نیز خصوصیت مزاجی اور استعداد ذاتی کے باعث بعض اشخاص سال فرسان مرکبات پارہ، یا شکاریہ نفیش آمیز جیسی مفید ادویہ کو باسانی قبول نہیں کر سکتے، جو نہایت امنونک وقت ہے۔

مدد دہی آتشک کے وقت مریض کا موجودہ درجہ صحت یا دیگر امراض کی موجودگی بھی جراثیم آتشک کے نشوونما کی رفتار پر مناسب یا مخالف اثر رکھتے ہیں۔ اگر مریض میں عوارض درنیہ (سبل وغیرہ) پہلے سے موجود ہیں یا موروثی آتشک کا اثر ہے تو، اور بھی زیادہ برا اثر پڑتا ہے۔ آتشک ثانوی کے دانوں کی نوعیت اور متوزن مدد کی عام وسعت سے مرض کی شدت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ پیپ بھرے ہوئے دانوں (شور آتشک) کی موجودگی ہمیشہ خطرناک اہمیت رکھتی ہے۔

آتشک ثانوی کے مظاہر میں سے کوئی ہلاکت کا باعث نہیں ہوتا، البتہ گرم ممالک کی بعض شدید اور دیر پلے مٹنے کی انتہا کی آتشک ثانوی گاہے گاہے ہلاکت ہوتی ہے۔

۳۳ خصوصیت مزاجی۔ ایڈریسنگرہی۔

۳۴ فاشرمان۔ دارسن۔

۳۵ شکاریہ نفیش آمیز پیپ بھرے ادویہ۔

۳۶ مثبت۔ پارہ نو۔

آتشک ششانی میں جبکہ دماغ، نخاع، جگر وغیرہ جیسے اعضاء رسیہ و شریفہ مبتلا
مرض ہو جاتے ہیں تو موت کا واقع ہونا عموماً ممکن ہے۔ نظام عصبی کے عارض
مثلاً ہزال نخاع (تشوش حرکت) اور فلج عام، اکثر ایسے مریضوں میں ہو جاتے
ہیں جنکو دماغی محنت و کاوش زیادہ تر ہوتی ہے مثلاً معالجوں اور وکیلوں میں
بعض حالات میں یہ مرض ناقابل شفاء ہوتا ہے (آتشک تشبہیت) جس کا سبب
غالباً یہ ہوتا ہے کہ اول تو مرض ہی بہت زہریلا اور شدید درجہ کا ہوتا ہے دوم
یہ کہ علاج ہی بہت دیر سے شروع کیا جاتا ہے۔ ایسی حالت اگر مستورات میں
دیکھی جاتی ہے۔ جبکہ آتشکی دانے بہت سرعت کے ساتھ فاعلیہ یا اورام صغیہ
کی صورت میں مبتدل ہو جاتے ہیں اور درجہ ثانوی کے مظاہر سرعت کے ساتھ
درجہ سویم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

وقایت (حفظ) تقدم (اگر مقام مدوی کو چھوت گئے کے بعد ایک
یا دو گھنٹے کے اندر ہی شیمانی (دارچکنہ) یا شخار منغیس آگین اعلیٰ کے عنول
مظہر سے بخوبی دھویا جاوے، یا اگر شیباب شیریں کے مرہم کی خوب
مالش مقام ماؤف پر کر دی جاوے تو ممکن ہے کہ آتشک سے حفظ تقدم
ہو جاوے۔

علاج آتشک۔ دُر حاضرہ میں آتشک کے طریقہ علاج میں نمایاں افعال

۱۔ شیمانی۔ دارچکنہ۔ کر سوبلی ریٹ۔

۲۔ شخار منغیس آگین اعلیٰ۔ پریسنگ ریٹ

آف پوٹاش۔

۳۔ شیباب شیریں۔ کیلول۔

۴۔ غُذینت۔ پروٹوزوا۔

۵۔ ہزال نخاع۔ ٹے بیڑ۔

۶۔ فلج عام۔ جنرل پیرلسس۔

۷۔ آتشک خبیث۔ ملگت سفلس۔

۸۔ فاعلیہ۔ روپا۔

۹۔ حفظ تقدم (اگر پروفاقی لیکس۔

وقایت)۔

ہو گیا ہے، اسکا باعث یہ ہے کہ آتشک کے مخصوص جراثیم (جو طبقہ حوئیات سے تعلق رکھتے ہیں) اب متیقن طور پر دریافت ہو چکے ہیں اور انکی قرابت مرض ذم اور بعض دیگر ہم جنس امراض کے حوئیات سے متحقق ہو چکی ہے۔ ابتداً تو شکلیا کے عضوی مرکبات کے ذریعہ آتشک کے علاج کی کوششیں خاطر خواہ کامیاب نہیں ثابت ہوئیں اور بعض مرکبات مثلاً اناگزول، زرنج غیر شتم، سوائین، آرس ایسی ٹین وغیرہ کو آزمایا گیا، مگر انکے استعمال سے باستثناء بعض نتائج کے بیشتر حالات میں نہایت اُمید شکن تاثرات ظاہر ہوئے۔ کبھی کبھی تو ان مرکبات کے دیر پا اور مسلسل استعمال سے نہایت مہلک اور خوفناک زہریلی علامات (مثلاً ہزال، تھصبہ، جُوزہ، طاری ہو گئے۔ مگر جرمنی کے مشہور محقق اہرلک (ارل) (مغرب) اور ان کے رفیق استاذ ہائے اپنے مسلسل مساعی اور تجربات کے بعد بالآخر شکلیا کا ایک بے ضرر مرکب سال فارسان (سال فرسٹن) دریافت کر کے طبی دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ مرکب ایک چکیلا زرد رنگ کا سفوف ہو جہانی میں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ نخل ہو جاتا ہے، اسکا تقاضا مل ماضی ہے یعنی امتحان سے تیزابیت ثابت ہوتی ہے۔ جو ان مریضوں کے لئے اکی مقدار سے بڑا شہ تک ہونی چاہئے، جسے معمولی شیشال ٹک مٹھر میں حل

۱۔ مرض ذم۔ سلی پنگ کنس۔ مثلاً حوئیات آ۔ ۲۔ عضوی۔ آرگینگ۔ ۳۔ اناگزول راتوکیل، غیر شتمی زرنج۔ ۴۔ سوائین۔ سوائین۔ ۵۔ آرس ایسی ٹین۔ آرسائین (مغرب)۔ ۶۔ ہزال، تھصبہ، جُوزہ۔ آپٹک زو۔ ۷۔ اثراتی۔	۱۔ سال فارسان (سال فرسٹن)۔ ۲۔ مرکب مل۔ ۳۔ تقاضا مل۔ ری ایکشن۔ ۴۔ ماشہ۔ تقریباً گرم کے مساوی ہے۔ ۵۔ معمولی شیشال ٹک۔ نارمل سولر۔ ۶۔ سولیشن۔ ۷۔ مٹھر۔ اسٹراٹل۔

کر لینا چاہیے۔ ریال مذکور آب مقطر میں بنایا ہوا ہو، پھر اس طرح ہلیار کے تھنے سیال کے اندر ۵۱۵ فی صدی طاقت کا سیال ریسیڈ آب لیگن اسقدر ملا دینا چاہئے کہ اس کے ڈالنے سے ابتداءً جو رسوب سا بکرتہ نشین ہو جاتا ہے وہ بخوبی حل ہو جاوے۔ پھر اس ہلیار شدہ مرکب میں معمولی سیال فیکین اتنی مقدار میں ملا دیا جاوے کہ سب مقدار ۲۵۰ سے ۳۰۰ مکعب سنتی میٹر ہو جاوے + بالآخر اس مرکب سیال کو (حرارت بدنہ کے درجہ تک گرم کر کے مریض کے بازو کی دریدیں پچکاری کے ذریعہ داخل کر دینا چاہئے +

پچکاری دینے سے پہلے مریض کو باحتیاط تمام اسی طرح ہلیار کیا جاوے جیسا کہ کسی عمل جراحی کے لئے کیا جاتا ہے + مریض کو پچکاری کے دن سے پہلے شب میں ایک جلاب دینا چاہئے اور پچکاری سے پہلے اور اس کے بعد تین چار گھنٹے تک کسی قسم کی غذا نہیں دینی چاہئے + پچکاری کے بعد مریض کو چوبیس گھنٹے تک بستر پر آرام رکھا جائے، اور اگر حرارت یا بخار ہو جاوے یا اعضا شکنج، درد و غیرہ (علامات تغافل) محسوس ہوں تو زیادہ عرصہ تک آرام و سکون کے ساتھ بستر پر ہی رکھنا چاہئے +

سال فارسان سے مشابہ مرکبات - ۱۹۱۲ء یعنی جنگ عظیم کے ایام سے بہتیرے مرکبات سال فارسان سے مشابہ ایجاد کیے گئے ہیں، مثلاً خازمی دان گئے، آرتھرو نوزنزال وغیرہ یہ سب لمحاظ کیماوی ترکیب کے سالورسن سے

۱۔ ریسیڈ آب لیگن - سوڈیم ہائیڈرٹ -	۲۔ تقریباً ایک گرام یا ایک ماشہ سا آہے -
۳۔ مکعب سنتی میٹر کی ایک مٹی میٹر -	۴۔ جانیوئی - ٹینیل ربا لینوس کے متبرک
۵۔ ایک مکعب سنتی میٹر کے اندر آب مقطر	۶۔ نام کی طرف منسوب ہے -
۷۔ درجہ حرارت سے چوتھے درجہ کا	۸۔ آرتھرو نوزنزال - ٹرینو جواوین -

مشابہ ہیں اور اس کی جگہ متعل ہو سکتے ہیں +

سال فارسان جدیدہ یہ علامہ ارنج راہر لکٹ کا ہیار کردہ شکلیا کا ایک دوسرا کھاری مرکب ہے + جنگ جرم کے بعد اس کے مشابہ بہت سے مرکبات تجارتی دنیا میں مختلف ناموں سے داخل ہوئے ہیں، مثلاً غارسی دان جدید آئسٹ نو بینزال جدیدہ آرسی نو بلون جدیدہ وغیرہ + اور یہ اس وقت کثرت متعل ہیں + یہ ایک صاف زرد رنگ کا سفوف ہوتا ہے، جو پانی میں فی الفور نخل ہو سکتا ہے + اس سرعت انحلال کے باعث اسکا سیال بہت کم مقدار (۵ سے ۱۰) کعب سختی میتر تک میں پککاری سے دیا جاسکتا ہے + علاوہ انہی چونکہ یہ ایک کھاری نک ہے لہذا پککاری سے پہلے اس کے سیال کی تبدیل رنگ مٹا کر معتدل کرنے کی ضرورت نہیں اور پانی میں حل کر کے فی الفور اس کی پککاری دی جاسکتی ہے + یہ سیال ہوائیں کھٹا رکھنے سے جلد خراب ہو جاتا ہے لہذا جب اسکا رنگ سیاہ ہو جاوے تو اسے استعمال نہیں کرنا چاہئے + آرسینو بینزال جدیدہ ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ گرام (ماشہ) کی مقداروں میں کانچ کی ٹکلیوں میں طیار شدہ رکھا جاتا ہے + سال فارسان جدیدہ کی ۱۰ ماشہ مقدار طاقت میں سال فارسان کے ۱۰ ماشہ کے برابر ہوتی ہے + چنانچہ دونوں میں پککاری کے مقدار کا تو ابستہ اختلاف ہے ورنہ دونوں مرکبات یکساں طور پر مفید اثر رکھتے ہیں + مگر بعض محققین کی رائے ہے کہ سال فارسان کا اثر بہ نسبت سال فارسان جدیدہ کے زیادہ دیر پا اور مستعمل ہوتا ہے +

بینو آرسی نو بینزال -

۱۰ سال فارسان جدیدہ نیو سولرسن -

۱۰ سال فارسی ان جدیدہ نیو غارسی دان -

۱۰ سال فارسی ان جدیدہ نیو غارسی دان -

نو بلون (فرانسیسی نام)

۱۰ سال فارسی ان جدیدہ نیو سولرسن -

اس دوا کا محلول غلیظ یا محلول خفیف تیار کر کے درید پککاری کے ذریعہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اگر غلیظ محلول دینا ہے تو پہلے کانچ کی ادس ٹنگی کو جس میں دوا کا سفوف محفوظ ملتا ہے گردن کے پاس سے ریتی کے ذریعہ کاٹ کر توڑ لینا چاہئے۔ پھر ایک مٹھر پککاری میں جس کی وسعت دس کعب سنتی میٹر کی ہو آپ سر و مٹھر مقطر پککاری کی سوئی سے کچھ کر بھر لیا جائے۔ اب پککاری میں سے قریب دو کعب سنتی میٹر (۲ ماشہ) پانی دوا کی ٹنگی میں ڈالکر اور سفوف کو خوب ہلکا کر محلول کر لیا جائے۔ پھر اس محلول دوا کو پککاری میں بھر لیا جائے اب پککاری کے پانی میں یہ محلول دوا بخوبی حل جا دیگی اور بازو کی درید کے اندر داخل ہونے کے لائق ہو جائے گی۔ پہلے ہاتھ کو بخوبی دھو کر مٹھر کر لیا جائے پھر ایک مضبوط اور مٹھر ربکی نلی بازو کے گرد کھینے سے اوپر پسٹ کر گئی دینی چاہئے ایسا کرنے سے کھینے کے سامنے کی وریدیں رہا سلیقی متوسط اور قیغالی متوسط) پھول کر خوب نمایاں ہو جائیں گی۔ اب پککاری کی سوئی ان وریدوں میں سے کسی ایک کے اندر بہ احتیاط داخل کر دی جائے۔ جب سوئی ورید کے اندر داخل ہوگی تو خون پککاری کے اندر زور کے ساتھ چرٹھ آوے گا۔ اور سبز رنگت نمودار ہوگی جو اس بات کی علامت ہے کہ سوئی صحیح مقام پر یعنی اندرون ورید پہنچ گئی ہے۔ لہذا اب بازو کی بندش کو کھول دینا چاہئے اور پھر آہستہ آہستہ پککاری کی ڈنڈی ہلکا کر دوا درید کے اندر داخل کر دینی چاہئے۔

نیا دہ ہلکا محلول داخل کرنا اب ایک بوسیدہ طریقہ ہو چکا ہے اور بہت کم استعمال ہے، لہذا اس کا بیان کرنا چنداں ضروری نہیں۔

۱۔ ہلیقی متوسط۔ میڈین بزرگ دین۔

۱۔ محلول غلیظ۔ کن سن ٹریٹر و سولیوشن۔

۲۔ قیغالی متوسط۔ میڈین کیفیلک دین۔

۲۔ محلول خفیف۔ ڈاکٹر و سولیوشن۔

نسال فرسان اور سال فرسان جدید ہر دو کا اثر بظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس نے وہ تمام حینیات آتشک نیست و نابود ہو جاتے ہیں جو انکی گرفت میں آنے کے قابل ہوتے ہیں + یعنی وہ جراثیم جو دوران خون یا ساختوں میں موجود ہوتے ہیں مگر اسوقت جبکہ عدوی بہت قدیم ہو یا یہ جراثیم عروق کی دیواروں کے اندر داخل ہو کر یا رطوبت و اعینہ نخی عیبہ میں محصور و مجبوس ہو چکے ہوں تو سال فرسان یا ادس کے مشابہ مرکبات کا اثر انہیں پہنچنا ناممکن ہو جاتا ہے، لہذا ان حالات میں نظام جسم جراثیم کے اثر سے کامل طور پر پاک نہیں کیا جاسکتا + اس بات کو بھی بخوبی یاد رکھنا چاہئے کہ علاج آتشک میں سال فرسان کی ایجاد نے پارہ کو ہرگز بے دخل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ایک دوسرا نیا حربہ اناالہ مرض کے لیے دستیاب ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اب پارہ کی ضرورت کم مقدار میں پڑتی ہے اور آتشک کی چھوت کم مدت تک باقی رہتی ہے +

فوجی طبیعوں اور جراحوں نے آتشک کے ابتدائی درجات کے لیے جس طریقہ علاج کی سفارش کی ہے وہ درج ذیل ہے +

(۱) پہلے ۱۰ ماشہ سال فرسان کی دریدی پککاری (۲) پھر مسکہ سیابی رزبہ (الزینق) کی ہفتہ وار پانچ پککاریاں (۳) اس کے بعد پھر ۱۰ ماشہ سال فرسان کی دریدی پککاری (۴) پھر سیابی مسکہ کی ہفتہ وار پانچ پککاریاں (۵) اس کے آخر میں پھر ۱۰ ماشہ سال فرسان کی تیسری دریدی پککاری +

یہ زبردست طریقہ علاج دوران جنگ میں نہایت کامیابی کے ساتھ اختیار کیا گیا تھا لیکن فوجی عہدہ دار اطمینان سے جو ملکا طریقہ علاج مقرر کیا ہے

۱۰ رطوبت و اعینہ نخی عیبہ سر بردہ پاشل قلوٹ	۱۰ مسکہ سیابی
۱۰ ماشہ تقریباً گرام	۱۰ رزبہ الزینق

وہ بول ہے۔

(۱) پہلے ۳۱ ماشہ سال فرسان جدید کی درمی پکاری کی جلسے (۲) ایک ہفتہ بعد پھر اسی مقدار کی درمی پکاری (۳) اس کے بعد ۳۱ ماشہ کی پانچ درمی پکاری پانچ ہفتہ تک۔ اس طرح سب ملکر ۳۱ ماشہ دیدیا جاوے۔ ساتھ ہی نصف نئی پارہ کی عضلی پکاری ہر ہفتہ دی جاوے۔ اس طریقہ علاج کے ختم ہونے کے بعد امتحان فاسرمان منفی سنے گا۔ اب سال فرسان جدید نو بند کر دیا جاوے مگر پارہ کا استعمال طریقہ مذکورہ بالا کے مطابق ایک سال تک جاری رکھا جائے۔

اس قسم کے مریضوں کی سخت نگہانی کہ ان کو ایک سال تک رکھنی چاہئے۔ اس عرصہ میں پہلے تو برہاد اور پھر ہر تیسرے بیٹے مریض کے خون کا امتحان فاسرمان کے طریقہ پر کرتے رہنا چاہئے۔ اگر امتحان مذکور کے ذریعہ یہ مریض کی دیگر علامات جسمانی سے اعادہ مرض کے آثار ظاہر ہوں تو مندرجہ بالا طریقہ علاج کے مطابق پھر پکاریوں کا دوا دیکھیں اور سر نو شروع کرنا چاہئے۔

آتشک کے درجہ سوم میں سال فرسان کی دوا سے تفرق کے جذبہ اندام میں موقوف ہے مگر اس وجہ میں بیشہ پارہ اور شخاریہ بنفش آئین کے استعمال پر علاج کا دار مار رہنا چاہئے۔ اندرونی اعضاء اور احشاء طبع کی آتشک میں اور خصوصاً آتشک کے عوارض بعید و میں سال فرسان کا اثر بہتر لگائی کے ہے۔ ان زور دار اور کئی ادویہ کے استعمال کے بعد بعض اوقات مضبوطی بھی ظاہر ہوتے ہیں اور مریض کی ایک مختصر تعداد میں ہلاکت بھی واقع ہو جاتی ہے سال فرسان کی پکاری کے بعد اسی دن در داسرا بکار لڑوہ وغیرہ نمودار ہوتے ہیں،

مل شخاریہ بنفش آئین پر داسرا
مل آتشک کے عوارض بعید و۔ پیرا سفلے مکمل لگائی
مل یرقان۔ جاناس۔

جو جلدی رخ ہو جاتے ہیں + گاہے تے اور اسہال بھی ہوتے ہیں + چند روز بعد یرقان ظاہر ہوتا ہے + یہ اکثر خفیف ہوتا ہے مگر گاہے نہایت شدید بھی ہو جاتا ہے جس کا سبب یہ ہے کہ جگر میں زرد دم کے ہزال کا پیدا ہو جاتا ہے + علاوہ انہیں مختلف اقسام کے جلدی امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں، مثلاً نفلہ، شدید التهاب جلدی منتشر وغیرہ جو گاہے مہلک بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر اس قسم کے ناگوار حادثات دن بدن کمتر ہوتے جاتے ہیں اور اُمید ہے کہ جوں جوں ترکیب استعمال میں درستی اور صفائی مزید تجربات کے ذریعہ حاصل ہوتی جائے گی اُمید ہے کہ یہ کمتر ہوتے جائیں گے + یہ مضر اثرات کچھ تو ادویہ سنگلہ کی سمیت کے باعث پیدا ہوتے ہیں اور کچھ اس وجہ سے کہ دوران خون کے ٹوٹنا آتشک کی ایک بہت بڑی تعداد کیا رہے گی ہلاک ہو جاتی ہے اور بہت بڑی مقدار میں ان جراثیم کے مواد سیہ باہر نکل پڑتے ہیں (سمین خدوی) سال فرسان اور اس سے مشابہ مرکبات کا استعمال بول زلانی کی صورت میں اور جبکہ قارورہ میں قشور ڈسائے (پسے جاتے ہوں جائز نہیں ہے +

علاج آتشک میں پارہ - نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن صرف پارہ کے تنہا استعمال سے خاطر خواہ نتائج نہیں حاصل ہو سکتے اور اس کے ساتھ سال فرسان اور اس کے مشابہ مرکبات کا استعمال ضروری ہے۔ البتہ اگر سالوون ٹیشر نہ ہو تو مجبوراً صرف پارہ کا استعمال ہی کرنا پڑتا ہے + چونکہ پارہ کے مسلسل

سمین اندرون غلیظ
سمین خدوی

مک بول زلانی - البیومی فوریا -

مک قشور
مک کاسٹ -

مک ہزال زرد جگر - بلو اثر مونی آف لیوود

مک نفلہ - ہر پیز

مک التهاب جلدی منتشر - ڈری نائیٹس

امس فونی اسے ٹیا -

استعمال سے بعض ناگوار نتائج پیدا ہو جاتے ہیں اس لئے مطح نظریہ ہونا چاہئے کہ اوس کے بہترین فوائد کثرت حاصل ہوں مگر مریض کو تکلیف بہت کم ہو + اسی غرض سے پارہ مختلف طریقوں سے دیا جاتا ہے، جن میں سے خاص خاص طریقے حسب ذیل ہیں:-

(۱) منہ کی راہ سے پارہ اکثر دیا جاتا ہے اور خصوصاً سفوف زرد گوہیوں (رجوب) کی صورت میں (۱-۳ قحہ دن میں تین بار) یا تنفش آمیز سبز رپ سے ۱- قحہ تک دن میں تین بار) سفوف زرد پارہ کے استعمال کی غالباً بہترین صورت ہے۔ پہلے دو قحہ کی مقدار دن میں تین مرتبہ دینی چاہئے، بعض مریضوں میں ٹیڑھ قحہ دن میں چار مرتبہ دیا جاتا ہے + اگر اس سے اسہال آئے تو اس کے ساتھ قدر خلاصہ انیون یا سفوف عرق الذهب ملا کر دینا چاہئے + مگر ہمیشہ ان چیزوں کو شامل کرنے کی چنداں ضرورت نہیں +

(۲) حارجی مالش کے ذریعہ پارہ کا مرہم نہایت کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے + اس کا خاص فائدہ یہ ہے کہ قوت ہاضمہ کا فتور (اسہال وغیرہ) نہیں ہونے پاتا + اگر معمولی پارہ کا مرہم (جیسا کہ قرابادین برطانی میں درج ہے) استعمال کیا جاوے تو اس کا ایک ٹکڑا بادام کے برابر بیکر بغل یا کنج ران میں

۵ سفوف زرد + عرق الذهب مرکب - ہوس
اپنی کاک پہنڈ -

مالش { انگشت
دھک { انگشت

۶ مرہم سیلاب - آئسٹنٹ آف
مرکری -

۷ قرابادین برطانی - برٹش فارماکوپیہ -

۸ سفوف زرد +
۹ محو سنجانی { گرسے پاؤڈر -

۱۰ قحہ گرین - ایک گہول یا ایک جو
یا نصف رتی کے برابر -

۱۱ تنفش آمیز سبز گرین آؤڈاؤڈ -

۱۲ خلاصہ انیون - اسٹریکیٹ

آف اوپیم -

شنب کے وقت خوب لٹا چاہئے اور صبح کے وقت ادس حصہ کو بخوبی دھو کر صاف کر دینا چاہئے اور پھر مرہم اس معتم پر تین چار روز تک نہیں لگانا چاہئے۔ بلکہ دوسری جانب لگانا چاہئے۔ اگر مرہم ادکی مصفیٰ چربی (صوفین) کے ساتھ بنا ہوا ہے تو اس کی کم مقدار لینی چاہئے۔ ماش کا طریقہ پارہ دینے کے لیے بہترین ترکیب ہے جس کا اثر مریض پر جلد تر ہو جاتا ہے۔ بعض ساحلی مقامات مثلاً اکس ٹشپل اور مارو گیٹ وغیرہ میں یہ طریقہ خصوصی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مریض کو گندھک کے پانی سے غسل بھی دیا جاتا ہے جو بطور خود ایک مصفیٰ ہے۔ پارہ کے مرہم کی ماش جلد میں ہاتھ سے کی جاتی ہے یا شیشے کے دلاکٹ سے۔ اور اس کا سلسلہ چہ ہفتے تک جاری رکھا جاتا ہے اور سال بھر کے اندر پھر دوبارہ اسی طرح چہ ہفتے ماش کی جاتی ہے۔

(۳) پارہ کے بخارات کی دھوئی۔ (دہ پارہ کے استعمال کا تیسرا طریقہ یہی ادس وقت خصوصاً مفید ہوتا ہے جبکہ جلد بدن پر پھنسیاں زیادہ پھیلی ہوئی ہوں۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ پہلے برہنہ مریض کو بیٹ کی کرسی پر بٹا دیا جاتا ہے اور پھر ایک کبل سے یا ایک مخصوص قسم کے باڈو سے ادس کے جسم کو زمین سے گردن تک ڈانپ دیا جاتا ہے مگر اس ترکیب سے کہ کپڑا یا کبل جسم کو نہ چسوکے پھر کرسی کے نیچے ایک چراغ بید و دور رکھ کر ادس کے ذریعہ تقریباً ایک اوقیہ پانی کو

۱۔ مصفیٰ { جام بخاری } درہرہ

۲۔ بیت { کین } خیران

۳۔ باڈو { کلک } دمار

۴۔ اوقیہ { اونس }۔

۱۔ صوفین { لیزوین } ادکی مصفیٰ چربی

۲۔ ان مقامات پر گندھک کے چٹھیں

۳۔ دلاکٹ { ماش کے کاکر } ربرز۔

ایک برتن میں گرم کیا جاتا ہے، اس اُبلتے ہوئے پانی پر ایک رکبی میں تقریباً ۳۰ قحہ زہین طور کھرا دوس کے انجارات کا بھارا مریض کو دیا جاتا ہے۔ اس ترکیب سے تقریباً مین دقیقہ کے اندر رکبی کا تمام پارہ بخارات کی صورت میں اوزون مریض کے جسم کی جلد پر کچھ جمع جاتا ہے اور مریض کو اس بھاراہ کے عمل میں خوب پسینہ بھی آتا ہے۔ پھر مریض کو بغیر بدن پر چھ بستر پر گرم کمبلوں کے اندر لٹا دینا چاہئے۔ بھاراہ کے ساتھ ساتھ پارہ کا استعمال داخلی طور سے بھی کرنا مناسب ہے۔

(۴) پارہ کے مرکبات کے استعمال کا چوتھا طریقہ عضلی پچکاری ہے + یہ بھی ایک مفید طریقہ ہے اگرچہ بعض کا خیال ہے کہ اس میں تیج لپسپ ٹپنے) اسناد عروق۔ کثرت سیلان لعاب جیسے خطرات کا احتمال ہے + با اینہم مسلسل تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر کافی احتیاط اور مہارت کے ساتھ پچکاری لگائی جاوے تو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہو سکتا + فوجی جراحوں نے اسکا استعمال بکثرت کر کے اس عمل کے فوائد کو ثابت کر دیا ہے + پارہ کے ناقابل انحلال مرکبات اور خاص کر خالص پارہ کو کھن کی صورت میں تیار کر کے پچکاری کے ذریعہ استعمال کرتے ہیں + ذیل میں ایک مفید نسخہ اسی قسم کا درج کیا جاتا ہے +

خالص پارہ نصف اوقیہ +

۱۰ سیلان لعاب۔ سیلاڈیشن۔

۱۰ ناقابل انحلال۔ انسابل۔

۱۰ اوقیہ۔ اونس۔

۱۰ رکبی { پیٹ۔

۱۰ زہین طور۔ کیلول۔

۱۰ کمبل { لینکٹ۔

چربی صوف رجب کا پانی خارج کر دیا گیا ہو) دوا دینیہ +

پیرافین سیال رجب میں ۲ فی صدی مائٹن قطرائی آمیز کیا گیا ہو) ۵۔ قیوہ
اس بیمار شدہ کے قطرے میں ایک قطرہ پارہ ہوگا +

پارہ کے عضنی پیکاری دینے کا مناسب مقام مان کا عضلہ الویہ کبیرہ
ہے اور اس طرح دینے سے پارہ دیر کے ساتھ مگر بتدریج مسلسل جذب ہوتا رہتا
ہے اور زہریلی علامات کا خطرہ نہیں ہوتا +

۱۔ نبتہ لاکہ۔ پارہ کے دوران استعمال میں مریض کی عام صحت اور عادات
کو بخوبی منضبط رکھنا چاہئے۔ شراب سے قطعی احتراز لازم، غنیمت اور ورزش
بہت مختصر ہونی چاہئے، دہن، دانتوں اور مسوڑھوں کو نہایت احتیاط کے
ساتھ صاف رکھنا چاہئے + پھلکری اور شکاریہ اخضر آگین جیسی قابض اور مسفی
دہن ادویہ سے غرغہ کرانا چاہئے۔ اگر دانتوں میں کیرا لگ گیا ہے یا گڑھا ہو
تو دانت نکال دینا چاہئے یا گڑھے کو خاص مرکب سے بھر دینا چاہئے لیکن
دندان ساز کو مرض کی نوعیت سے ضرور مطلع کر دینا چاہیے۔

دہن اور طبع کے امراض کے خطرے سے بچنے کے لئے مناسب ہے کہ
تباک نوشی کم از کم چہ ماہ ترک کرادی جائے + پارہ کی مقدار مختلف مرضی میں
بلحاظ ادنیٰ حالت کے مختلف ہونی چاہئے یعنی قوی مریضوں میں تو زیادہ مقدار
دی جاوے اور لاغر اور مضحل مریضوں میں تھوڑی مقدار ہو + پارہ کا استعمال
مسلسل جاری رکھنا چاہئے حتیٰ کہ پارہ کے مخصوص تاثرات مثلاً مسوڑھوں
کی خفیف تکلیف پیدا ہو جاوے مگر شدید علامات مثلاً سیلان لعاب وغیرہ ظاہر نہ

۲۔ عضلہ الویہ کبیرہ۔ گلوٹیس گز میں۔

۳۔ شکاریہ اخضر آگین۔ کلورائیڈ آف پوٹاش

۴۔ چربی صوف۔ ادنیٰ پسینہ۔

۵۔ مائٹن قطرائی۔ کاربونک ایسڈ۔

ہونے پادیں + عموماً پارہ کا استعمال زیادہ مقدار میں چار یا پانچ مہینے تک
 ہونا چاہئے پھر ایک سال ختم ہونے تک مقدار کو ختم کر کے بند کر دینا چاہئے +
 مگر مناسب یہ ہے کہ ڈیڑھ تا تین سال تک پارہ کا استعمال اس طرح جاری رکھا
 جائے کہ سال بھر میں دو دفعہ تین تین ماہ تک پارہ دیا جاوے +
 قسم تیسویں - (سمیت سیاب) چونکہ بعض اشخاص میں پارہ کی خفیف مقدار دینے
 سے بھی زہریلی علامات نمودار ہو جاتی ہیں - لہذا علاج نہایت تھوڑی مقدار سے
 شروع کرنا مناسب ہے +

علامات زہریہ میں سوسٹھے نرم ہو کر پھول جاتے ہیں اور ذرا سادبانے سے
 بھی اوند میں خون نکل آتا ہے + پھر سیلان لعاب کا مرض ہو جاتا ہے بلکہ ساری
 زبان میں درم و انتہاب (انتہاب اللسان) ہو جاتا ہے تنفس بربودار ہو جاتا ہے
 دانت بٹنے لگتے بلکہ گرہ بھی جاتے ہیں اور دانتوں کے اداری (گرٹھے) سرٹنے
 لگتے ہیں + ہاضمہ میں فتور واقع ہوتا ہے اور اسہال یا شدید درد شکم (قولنج)
 ہو جاتا ہے +

علامہ - پارہ کا استعمال فوراً ترک کر دیا جائے اتیز نگیں سہل کے ذریعہ دست
 باری کئے جائیں اور پھولے ہوئے سوزنوں کے لئے پٹنکری اور غبار آخضر لگیں
 وغیرہ کے غرغرے کرائے جائیں +

مندرجہ بالا صفحات میں آتشک کے لیے سنگیہ اور پارہ کے مرکبات کے
 فوائد استعمال کا بیان ہو چکا + ایک تیسرا ضروری اور نہایت مفید مرکب شکار
 نبش آمیز ہے جو تیسرے اور درمیانی درجات کے لئے خصوصاً مفید ہے + اس کا

۱۰ شکار نبش آمیز - گوریل آف پٹاش۔

۱۱ شکار نبش آمیز - آئو ڈائڈ آف پٹاش۔

۱۲ قسم تیسویں - مرکب سیاب۔

۱۳ انتہاب اللسان - گھاسانی ش۔

کا بیشک طریق عمل و اثر متیقن نہیں ہے مگر غالباً اسکا خاص اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ
صنعتی ٹشاختوں کو عمل جذب کے ذریعہ خارج کر دیتا ہے مگر سبب مرض رجحان
آتشک پر کوئی اثر نہیں رکھتا۔ یہ مرکب آتشک کے دوبارہ حملہ کو روک نہیں
سکتا اور اس کے استعمال کے بعد بھی اعادہ مرض کو روکنے کے لیے سال فارسانہ
ادویہ کی ضرورت رہتی ہے۔ ابتداً اس کی مقدار غوراکہ فنجہ سے زیادہ نہیں
ہونی چاہئے مگر اسے بتدریج بڑھایا جائے۔ حتیٰ کہ بعض مریضوں میں ایک ڈرہم
ہمک و لنڈس چار بار دیا جاسکتا ہے۔ اس دوا کے دینے کے بعد فوراً پانی زیادہ
مقدار میں پلانا چاہئے تاکہ اس کی تیزی لگی پڑ جائے اور دوا جلد منجذب ہو جائے
بعض اوقات اس کے استعمال کے بعد شکم کے مٹم شرابی میں تنگی کو ہاؤ سا
عموس ہوتا اور جی ڈوبنے کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جسکی حفظ مانتھم
کے لیے اس کے ساتھ ہندوہ بوند روح نوشادریہ عطری یا نوشادریہ فم آگین
دینا مناسب ہوتا ہے۔ اکثر اس کے استعمال سے زکام کی ریزش ہونے لگتی
ہے اور جہرہ اور کندھوں کے قرب جہار میں ہاسے کے سے دانے نکل آتے
ہیں مگر یہ ناگوار تاثرات اس دوا کی مقدار بڑھا دینے سے رفع ہو جاتے ہیں۔
شاذ و نادر اس کے باعث رطوبت بھرے آبلے (نقاطات مائیدہ) بھی پیدا ہو جاتے
ہیں۔ جب یہ دوا زیادہ مقدار میں دی جاوے تو اس کے ساتھ ریہ فم آگین ثانی

مٹ نوشادریہ فم آگین۔ کاربونیٹ
آف ایونیا۔

مٹ نقاطات مائیدہ۔ بجا۔

مٹ ریہ فم آگین ثانی۔ بانی کاربونیٹ
آف سودا۔

مٹ صنعتی ساخت۔ گے ش۔ بٹو۔

مٹ درہم۔ ڈام (تقریباً ۳ ماشہ)۔

مٹ مٹم شرابی۔ اپنی گیسٹریم

مٹ کوئی کامتھام

مٹ روح نوشادریہ عطری۔ اسپرٹ آف
ایونیا۔ ایدوے ٹک۔

یا شکاریہ غم آگین ثانی ملا دینا چاہئے تاکہ رطوبت بخد یہ اس کی ترکیب کو فاسد نہ کر سکے۔ اگر ساتھ ہی پارہ دینا بھی مقصود ہو تو شکاریہ بنش آمیز کے مزيج کے ساتھ پارہ کے سیال دیال سیاب اخضر آمیز اعلیٰ انہیں آمیز کرنا چاہئے کیونکہ اس سے ہاضمہ میں مستور آجاتا ہے لہذا اس کی بہترین صورت سفوف درو (سحق سنجابی) ہے۔ اس کے ساتھ بعض دیگر ادویہ مثلاً عشبہ نکھیا (سم الثمار) فولاد وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں اور یہ آتشک کے آخری درجات میں مفید اثر رکھتی ہیں۔

آتشک کا خارجی علاج

آتشک کا خارجی علاج خصوصاً پارہ کے مرکبات سے کیا جاتا ہے۔ قرعہ ابتدائی (درجہ اول) کا علاج شکاف سے۔ دارغ سے۔ مرہم زینق حلوا ۲ فیصدی سے کیا جاتا ہے۔ عنول سیاہ بھی مفید ہوتا ہے۔ پارہ کے خارجی استعمال سے زخم کے ریشہ دار جال میں جو جراثیم آتشک موجود ہوتی ہیں وہ تلف ہو جاتے ہیں۔

حدیثات مخاطیہ۔ جو مریض فرج کے قرب جوار میں یا پیر کی انگلیوں کے درمیان ہو جاتے ہیں۔ انکے علاج کا معقول طریقہ یہ ہے کہ انہیں نہایت صاف

۱۔ سحق سنجابی۔ گرے پاؤڈر۔

۲۔ عشبہ۔ سار سپرلا۔

۳۔ سم الفار۔ آرسینک۔

۴۔ زینق حلوا۔ کیلول۔

۵۔ عنول سیاہ۔ لاشیہ نگرا۔

۶۔ حدیثات مخاطیہ۔ میوکس ٹیڈرکل۔

۱۔ شکاریہ غم آگین ثانی۔ بانی کاربونیٹ آف پوٹاش۔

۲۔ رطوبت معدیہ۔ گیسٹرک جوس

۳۔ مزيج۔ کچر۔

۴۔ سیال سیاب اخضر آمیز اعلیٰ

۵۔ لاکر ہیڈ راجائی پر کلورائیڈائی۔

اڈوزنٹک رکھا جائے اور انکی سطح پر سیاہ شیریں اور نشاستہ کا سفوف ملا کر
چمڑکا جاوے۔ یا سیاہ شیریں کا مرہم لگایا جائے اور دانوں (عدبات) کے
مستوانی پہلوؤں کو رگڑتے محفوظ رکھنے کے لیے انکے درمیان نشانہ کا ٹکڑا رکھ دیا
جاوے۔

حلق کے تقریح ثانی کے لیے عموماً کسی خارجی علاج کی چنداں ضرورت
نہیں پڑتی کیونکہ پارہ کے داخلی استعمال سے یہ جلد رفع ہو جاتا ہے۔ تاہم
بوقت ضرورت پارہ کے محلول مرکبات سے غرغہ کرایا جاسکتا ہے یا زیادہ
خراب حالتوں میں حلق کے اندر حلویں زین اخضر امیر علی (احصہ ۲ ہزار حصص
میں) کی پھریری لگانا چاہئے۔

سطحی قروح صمغیہ کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے (ان کا کبرڈر بشکر شیم)
نکالا جائے اور پھر پارہ کا کوئی مرہم لگا دیا جائے۔

عمیق قروح صمغیہ کی حالت میں انکو نہایت احتیاط کے ساتھ مٹھ کر مٹا
جاوے، کیونکہ اگر ان میں عددی دھنوت پہنچ جاتی ہے تو صحت کی رفتار میں
سخت رکاوٹ ہو جاتی ہے خصوصاً جبکہ یہ ہڈی سے متعلق ہوں۔ بے احتیاطی
کے باعث خراب صورتوں میں زخم نہایت گندہ اور بدبودار ہو جاتا ہے
اور مزمن حالات میں روزانہ شام کو پنچار (حمی وقت) اور احتشائے باطنیہ میں
فساد نشوئی واقع ہو جاتا ہے۔ جب اورام صمغیہ سطح تک پہنچ جاویں

۱۔ گلیسرین۔ باندھا جرائی پر کھورائڈائی
۲۔ قروح صمغیہ گے مل السز

۳۔ فساد نشوئی۔ امی لائڈ
۴۔ ڈیجریش۔

۱۔ سیاہ شیریں۔ کیلول۔

۲۔ نشاستہ۔ اشارج۔

۳۔ نشانہ۔ ہنٹ۔

۴۔ حلویں زین اخضر امیر علی۔

اور باہر نہ کریں اور سوت انہیں معمولی خراج کی طرح بہ احتیاط تمام شکلات
دیکر پیر دینا چاہئے، اور پھر مٹھر مرہم کی پٹی کر دی جائے یا مٹھر کپڑے کی
بٹی دوسام غسل سیاہ میں بھگو کر ان کے اندر بھر دی جائے +

افرنجی وراثی - آتشک موروئی

آتشک وہ والدین کی اولاد شکم مادر میں اکثر درجہ تکمیل تک نہیں پہنچنے
پاتی اور حاملہ کو چھٹے یا ساتویں مہینہ میں اسقاط ہو جاتا ہے + جنین کا جسم گاہے
صحیح و سالم ہوتا اور ولادت کے بعد وہ کچھ عرصہ زندہ بھی رہ سکتا ہے، مگر عموماً
مردہ کچھ ہی پیدا ہوتا ہے اور بیشتر اس کا جسم گلا ہوا پایا جاتا ہے + ایسی حالت
میں بچہ کے جسم میں لا تعداد جراثیم آتشک بھرے ہوتے ہوتے ہیں + گاہے
بار بار اسقاط ہوتا اور آخر میں کوئی زندہ رہ جاتا ہے + بعض مثالیں ایسی بھی
ملتی ہیں کہ باوجود اس کے والدین میں عدوائی آتشک موجود ہے پھر بھی پہلا
حمل پورے دنوں تک پہونچ کر بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے + ایسا بچہ ولادت کے
وقت ہی آتشک کے علامات رکھتا ہے، مگر بیشتر تو ایسا ہوتا ہے کہ وضع حمل
کے بعد کچھ بظاہر باطل صحیح و تندرست معلوم ہوتا ہے مگر کئی مہینوں کے بعد
اس میں آتشک کے خصوصی علامات نظر آتے ہیں +

ان مظاہر کے متعلق ملحقہ المباد میں خوب مباحثے ہوتے رہے ہیں اور اس
مسئلہ میں بھی رد و ذکر ہوتی رہی ہے کہ آتشک کا عدوی زیادہ ترال کے ذریعہ
ہوتا ہے یا باپ کی طرف سے + زمانہ عدوی کے تعین کے لیے ذیل کے تین
اوقات بطور نظر یہ کے پیش کیے گئے ہیں +

علم افرنجی وراثی - ان ہرے مذہب فلس -

(۳۲) موردی آتشک میں یہ بچی سہتا ہے۔



(۱) بوقتِ استقرارِ نطفہ مرضِ مال اور باپ ہر دو کے ذریعہ یا صرف ایک سے جنین میں پہنچ جاتا ہے اور حُیّاتِ آتشک عورتوں کے بیضہ کے ذریعہ یا مردوں کی منی کے حُیّات کی وساطت سے یا ان ہر دو کے ذریعہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ مشاہدہ سے آتشک کے جراثیم انسان اور بنِ ناس کی رطوبتِ منویہ میں پائے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ ابتدائی مددِ حیّی باساقِ جنین کے سائے جسم میں سرایت کر سکتا ہے۔ ایسی شالیں جن میں حاملہ کو جلد اسقاط ہو جاتا ہے اور حُیّاتِ آتشک سے بھر اہو بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے، غالباً اسی زمرہ سے نفلن رکھتی ہیں۔

(۲) حلِ قایم ہو جانے کے بعد یعنی دورانِ حل میں رحم کی اندرونی جھلی رُغشا مخاطی کے مددِ حیّی سے جسمِ جنین میں مددِ حیّی پہنچ سکتا ہے۔ خصوصاً جبکہ رُغشا سا قحط کا دو حصہ، ذوق ہو جو شیمہ بناتا ہے۔

یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ حاملہ اور جنین کا دورانِ خون ایک دوسرے سے جڑا رہتا ہے مگر جب میٹھے مہستہ سے مرض ہوتا ہے تو جراثیمِ آتشک باساقِ مال کے دورانِ خون سے جنین کے جسم میں پہنچ سکتے ہیں۔

(۳) یہ بھی ممکن ہے کہ انتقالِ مددِ حیّی وضعِ حل کے زمانہ تک نہ واقع ہو اور وضعِ حل کے وقت میں جبکہ میٹھے (آنزل) جدا ہو رہا ہو اور وقتِ جراثیمِ میٹھے سے متعلق ہو کر وید السہ در ریزنا سے ان کی راہ سے جنین تک پہنچ جائیں۔

۱۔ بیضہ انٹری۔ آڈوم۔ ۲۔ حُیّاتِ منویہ { اسپرے لوزون ۳۔ اجسامِ منویہ { ۴۔ بنِ ناس۔ اپ۔ ۵۔ پچھلے ساق (ڈیسی ڈوام) وہ جھلی جو رحم	۱۔ میں بحالتِ حل جنین کے گرد خلافت ۲۔ باقی ہو۔ اور وضعِ حل کے وقت گرجاتی ہو ۳۔ میٹھے پے سٹا۔ ۴۔ ویدناقت { ابلاکلین ۵۔ وید سترہ {

ولادت کے بعد نوزائیدہ بچہ میں چند مہفتہ کے بعد تک علامات آتشک کا ظاہر نہ ہونا اس نظر یہ کی ایک دلیل ہے، اگرچہ اس کی توجیہ یہ بھی ممکن ہے کہ دورانِ عمل میں آتشک کے جراثیم کی سیت (سین) جنین کے جسم سے خارج ہو کر ماں کے خون میں اخل ہو جاتی ہے، اور سین کے اس انتقال کے بہت جنین میں مرض کی علامات کچھ عرصہ تک ظاہر نہیں ہونے پاتیں، اگرچہ جنین کے اندر عددی محدود ہوتا ہے۔ اس موقع پر یہ جاننا بھی غالی از دلچسپی نہ ہو گا کہ اگرچہ ماں کے اعصاب سے متاثرہ قرواح موجود رہتے ہیں لیکن پھر بھی نوزائیدہ بچہ کے جسم پر قروح ابتدائے نہیں پائے جلتے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا بچہ کسی مابین عدوی کے باعث قوتِ ساعدت مائل کر لیتا ہے اور اسے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یا یہ کہ بطنِ مادر میں جنین کے جسم پر ایک مٹم کا جینی مادہ ہوتا ہے وہ اسے محفوظ رکھتا ہے (جنین پنیر)۔

بعض شارلر میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ماں میں بظاہر مرض کے علامات نہیں پائے جلتے اور بچہ کے بھوں اور سوزھوں میں زخم موجود ہوتے ہیں اس بچہ کو ماں اپنا دودھ پلاتی ہے تو مبتلائے مرض نہیں ہوتی لیکن اگر اسی بچہ کو کسی دایہ کا دودھ پلایا جائے تو دایہ کے سر پستان (غلہ) پر قرح ہو جاتا ہے اسکو فاضول کو لیس کے نام سے منسوب کرتے ہیں کیونکہ اسے علامہ کا لیس نے ششہ میں اعلان کیا۔ گذشتہ زمانہ میں ماں کی اس قسم کی ساعدت کی توجیہ یوں کی جاتی تھی کہ جنین کے جسم میں اجسامِ تریاقیہ (اجسامِ دفاہیم) بنکر ان کے خون میں منتقل ہو جاتے ہیں اور یوں ماں کو ساعدت مائل ہو جاتی ہے اگر اب علامہ غیر سنے بڑی فاسات کے بندروں پر تجربات کر کے ثابت کر دیا ہے

کہ مریض آتشک کے متصل دومی میں نہ کسی قسم کے محفوظ رکھنے والے اجسام تریاقیہ بنتے ہیں اور نہ حفاظت کرنے والے مواد و مواد و قانیہ پیدا ہوتے ہیں، لہذا اغلب یہ ہے کہ ماں کی مناعت کا اصلی باعث یہ ہے کہ خود اسکو آتشک کا خیفہ سامریں ہو جاتا ہے جو اگرچہ نمایاں اور صریح نہیں ہوتا مگر مناعت پیدا کر دیتا ہے +

ناموس بر و فیتا پر و فیتا کا قانون) یہ مذکورہ بالا قانون کو اس کے بالکل متضاد ہے اور اس کی رو سے یہ خیال کیا گیا ہے کہ آتشکی ماں یا باپ کا بچہ آتشک کے لیے قوت مناعت رکھتا ہے، اگرچہ اس بچہ میں آتشک کے علاوہ کبھی بھی ظاہر نہ ہوئے ہوں + اسکا حاصل یہ ہے کہ بلا حد و ث مرض بچہ آتشک سے محفوظ (مینع) ہو جاتا ہے + مگر معلومات حاضرہ کی روشنی میں یہ بات قابل وثوق نہیں سمجھی جاسکتی +

مریض آتشک میں انتقال مرض کی قابلیت کب تک رہتی ہو؟
یا بر الفاظ دیگر آتشک کا اثر والدین سے بچہ میں کب تک منتقل ہو سکتا ہے اور مریض آتشک کب تک شادی کرنے کے قابل ہوتا ہے؟ یہ سوال بار بار رحلج کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اسکا جواب نہایت مشکل ہے + ایسے موقع پر لائحہ عمل یہ ہونا چاہیے کہ شادی کی اجازت مریض کو (خواہ عورت ہو یا مرد) اُس وقت تک نہ دینی چاہئے جب تک کہ امتحان فاسرمان ستواڑ و دو سال تک منفی نہ ثابت ہو۔ اور پورے دو سال سے علامات آتشک غائب نہ ہوں۔ بلکہ مزید احتیاط کے لیے ضروری ہے کہ شادی سے قبل تین ماہ تک مسلسل پارہ کا خیفہ استعمال کرایا جاوے اس کے بعد شادی کی اجازت دی جاوے +

مل مواد و قانیہ کیوریٹوسس ٹنس۔
مل ناموس بر و فیتا پر و فیتا لالہ۔

بعض اوقات باوجود اس قسم کی احتیاط و علاج کے استخوان فاسرمان کا نتیجہ مثبت ملتا ہے، مگر ان حالات میں جب کہ تمام ظاہری علامات رفع ہو چکی ہوں تو معدوی کا امکان نہایت ضعیف ہو جاتا ہے اور شادی کی سخت مخالفت نہیں کی جانی، اگرچہ بہ نظر احتیاط یہ مناسب ہے کہ اس قسم کی شادی کے بعد اگر حل قرار پائے تو حاملہ کا علاج جاری رکھا جائے۔

تیسری نسل تک آتشک کے منتقل ہونے کا مسئلہ نہایت دلچسپ ہے اور اس کے متعلق بھی حکماء میں سخت اختلاف رائے موجود ہے۔ آتشک کا مخصوص جراثیم سے پیدا ہونا اور ان جراثیم کا ادا خدیجہ سویم تک پایا جانا ان دونوں نتائج سے سمجھا جاتا ہے کہ اس مرض کا انتقال ممکن ہے۔ لیکن اس امر کا محقق ہونا سخت مشکل ہے کہ دوسری نسل ان سے پاک ہوتی ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ کے متعلق ابھی مزید شواہد کی ضرورت ہے۔ جس کے بعد آخری محاکمہ کیا جائیگا۔

بیشتر حالات میں پیدائش کے بعد بچہ قوی و تندرست معلوم ہوتا ہے اگرچہ گاہے کسی قدر چھوٹا اور ناقص الخلقیت ہوتا ہے۔ پیدائش کے بعد تین مہینے تین ماہ تک اس بچہ میں مرض کی صورت ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ لاغری کے ساتھ جلد میں جھریاں پڑ جاتی ہیں اور جلد کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔ چہرہ پر طماں معلوم ہوتا ہے اور بوڑھوں کے مانند خشک ہوتا ہے۔

ہمیشہ کی خون و فقر الدم نمایاں ہوتی ہے اور عرصہ دراز تک قائم رہتی ہے۔ مختصر یہ کہ آتشک خلقی کے تمام علامات آتشک اکتسابی سے مشابہ ہوتی ہیں۔ صرف ابتدائی قرحہ اکتسابی آتشک میں ہوتا ہے آتشک موروثی میں نہیں پایا جاتا۔ چنانچہ بچہ کی پیدائش کے بعد ایک سال کے اندر مختلف قسم کے عوارض (طبع جلدی) طبع جلدی کیونے نہیں ارسپن۔

(۳۳) موردی آتشک میں یہ مریض مبتلا ہے۔ اس کی ناک
اور میانی کی لمبندی دہی ہوئی ہے۔



(۳۴) موردی آتشکد میں استان ہشمنون



عدبات مخاطیہ، تقرح سلی (منودار ہو جاتے ہیں) گاہے ابتداءً عنبی رنگ کی سرخی (دورویہ) سرین پر خصوصیت سے منودار ہوتی ہے مگر یہ جلد ہی رفع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد عدبات مخاطیہ گوشہ دہن (لیچھا) میں، ناک میں، مبرزکے گرد، کچران میں اور فوطہ اور ران کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں، گاہے لبوں کے زخم بہت نمایاں ہو کر تقرح پیدا کر دیتے ہیں اور جب یہ خشک ہو کر مذہب بناتے ہیں تو ان کے شاکرے سے گوشہ دہن میں شاعی خطوط اور نشانات رہ جاتے ہیں بعض دیگر جلدی عوارض بھی ظاہر ہوتے ہیں، مثلاً قشور افرنجیہ پاؤں کے تلوں پر ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی بدن پر ادجبار (حلیات افرنجیہ) اور ضعیف اور کمزور بچوں میں آہٹے بھی بن جاتے ہیں جن میں پیپ بھر جاتی ہے (نفق) ابتداءً درجہ میں ہمیشہ التهاب الانف اور زکام پیدا ہو جاتا ہے جس کے باعث ناک سے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے اور آواز کے ساتھ تغش ہوتا ہے جس میں خرافا نشانی دیتا ہے۔ التهاب الانف اکثر بہت دیر پا ثابت ہوتا ہے اور ناک میں زخم و قروح کے ساتھ ساتھ ناک کی ہڈیوں اور کریوں کی بوسیدگی تک پیدا کر دیتا ہے جس کے باعث ناک چھٹی ہو جاتی ہے اور یہ چٹاپن جوانی تک قائم رہتا ہے جو آتشک خلقی کی ایک ممتاز نمایاں علامت ہے۔ اور بسا اوقات تھی اور جگر بھی بڑھ جاتے ہیں۔

ایسے بہتر سے بچے تغذیہ اور کمزوری کے باعث زندگی کے پہلے سال

۱۔ عدبات مخاطیہ۔ میوکس نیو برل۔	۲۔ قشور افرنجیہ۔ اسکولس سفلائڈ۔
۳۔ تقرح سلی۔ سوپرنیشیل {	۴۔ حلیات افرنجیہ پے پیوس سفلائڈ۔
۵۔ السریشن۔	۶۔ نفق۔ پیچنگس۔
۷۔ دورویہ۔ روزی اولہ۔	۸۔ التهاب الانف۔ ربانی سالی ش۔

ہی میں مزجائے ہیں۔ لیکن اگر مناسب اور باقاعده علاج کیا جاوے تو ایک مشابہ
تعداد چھ سے آٹھ ماہ کی عمر تک تندرست ہو سکتے ہیں اور علامات مرضیہ جو اوپر
بیان ہوئی ہیں رفع ہو سکتی ہیں، اگرچہ اونکے بدن پر داغ اور دھبے باقی رہ
جائیں گے۔

البتہ اس مرض کے اثر سے بچہ کا آئندہ نشوونما ناقص رہتا ہے اور عموماً اس کے
چہرہ کی ہیئت متاثر رہتی ہے جس سے موروثی آتشک کا لگان فوراً ہوتا ہے۔
سال بھر کی عمر کے بعد آتشک ثلثی کے عام مظاہر و علامات بعینہ آتشک
اکتابی کے مانند ظاہر ہوتے ہیں۔ مزید برآں اور علامات بھی ہیں جو موروثی آتشک
سے مخصوص ہیں خصوصاً دانٹوں ہڈیوں اور طبقہ قرنیہ کے عوارض + اندرونی
کان میں بھی جو نامرض ہو جاتا ہے۔ جس کے باعث گلبے بہرا پن ہو جاتا ہے۔

عوارض دندان

دانت۔ موروثی آتشک میں بیشتر اوقات ایک مخصوص ہیئت دانت
کے ہوتے ہیں + دودھ کے دانت اکثر معمول کے نسبت جلد نکل آتے ہیں،
اونکارنگ خراب گدلا ہوتا ہے اور جلد ٹوٹ کر گل جاتے ہیں + دائمی دانت
دانتان دائرہ عموماً صحیح اور اچھے نکلتے ہیں مگر گلبے ہیڈول اور بد وضع
بھی ہوتے ہیں + اوپر کے جڑے کے درمیانی اسنان قواطع (ٹٹیا) بیشتر مبتلا
مرض ہوتے ہیں، لیکن اوپر کے پہلوی قواطع (رباعیات) اور نیچے کے قواطع
بھی گلبے مبتلائے مرض ہوتے ہیں + معمولی دانت جڑے کے حصہ میں سکرے
اور چھوٹے اور باہر کی طرف چوڑے ہوتے ہیں لیکن موروثی آتشک کے مرض
مل اسنان قواطع۔ اساتذہ رحمۃ۔

میں دانت جڑے کی طرف سے چوڑے ہوتے ہیں اور بیرونی حصہ کی طرف نکل کر چھوٹے اور تنگ ہوتے جاتے ہیں اور اونکی ساخت نامکمل رہ جاتی ہے اور بجائے ایک دوسرے سے ملے اور جڑے ہونے کے ایسے دانتوں کے درمیان فاصلہ اور درزیں چوڑی رہ جاتی ہیں۔ اس قسم کے دانتوں کا بیرونی آزاد کنارہ بجائے اس کے کہ سیدھا ہو وسط میں مقعر ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر دانت کی بیرونی سطح پر جو سفید رنگ کا چکدار سخت مادہ (مینا) ہوتا ہے دانت پر ہوتا ہے اور وہ دانتوں کی بیرونی حفاظت کا کام دیتا ہے وہ اس مرض میں ناقص اور غیر مکمل رہ جاتا ہے جس سے دانت غیر محفوظ رہ جاتا ہے اور جلد بڑھ کر نکل جاتا ہے۔ گاہے دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں اور جڑ سے باہر کی طرف بل کھا کر ٹکڑے جاتے اور اونکا آزاد کنارہ سیدھا ہوتا ہے۔ آجکل انسان ہشمنوں (جن کے کٹاے مقعر ہوتے ہیں) عام طور پر نہیں دیکھے جاتے۔ عوارض عظام درجہ مفصل بیان امراض عظام کے باب میں آئے گا۔

عوارض قرنیہ

التهاب قرنیہ خلالی۔ یا قرنیہ کا پھیلا ہوا درم۔ قرنیہ کی عام خلالی ساخت میں درم و التهاب عموماً سن بلوغ کے قریب یا اس سے پہلے ہوتا ہے۔ ابتداء اس قسم کا التهاب ایک ہی آنکھ میں نمودار ہوتا ہے لیکن بعد میں دونوں آنکھوں

۱۔ التهاب قرنیہ خلالی۔ انٹرسٹیشیل {
کیرائٹیٹس۔
۲۔ خلالی ساخت۔ انٹرسٹیشیل ٹشو۔

۱۔ اسٹن ہشمنوں۔ جین سن ٹیجہ۔
۲۔ میناے اسٹن۔ اٹال {
آف ٹیجہ۔

میں یہ شکایت ہو جاتی ہے + قرنیہ کی شفاف سطح دھندلی ہو جاتی ہے اور سیاہی چشم کے حلقہ کے قریب رہتی جگہ میں ۱۱ امثالے دموی کے باعث سرخی ہو جاتی ہے۔ سطح قرنیہ پر دھندلی سفیدی کے درمیان بعض بعض مقام پر سرخ دھبے بھی نظر آتے ہیں جو نئے عروق بن جانے کے باعث ہوتے ہیں + عموماً قرنیہ پر زخم نہیں پیدا ہوتے لیکن اگر التهاب زیادہ دیر پارہے تو زخم کے بعد آنکھ میں پھول پڑ جاتا ہے (عنبہ مقدّمہ) قرعہ قرنیہ میں شاذ ہی ہوتا ہے۔ لیکن بلین قرنیہ باوجود علاج کے اکثر باقی رہ جاتا ہے + التهاب گاہے قرنیہ سے پھیل کر طبقہ عنبیہ اور جسم دہنی تک پہنچ جاتا ہے + مناسب احتیاط و علاج سے عموماً اچھا نتیجہ ہوتا ہے اگرچہ گاہے سالہا سال تک علاج جاری رکھنا پڑتا ہے۔ پھر بھی قرنیہ میں دلغ رہ جاتا ہے (ریاض قرنیہ) +

آتشک خلقی کی تشخیص۔ امتحان فاسرمان کا نتیجہ مرض کے ابتدائی اور شدید درجات میں تو مثبت ملتا ہے، مگر آخری درجات میں راکتسانی آتشک کے درجہ سوم کے (ادار کی طرح) فاسرمان منفی پایا جاتا ہے + آتشک خلقی کے بعض علامات و عوارض مرض کسٹح اور درن سے مشابہت رکھتے ہیں + ان امراض سے تفریق کرنے میں مندرجہ ذیل امور کا لحاظ رکھنا چاہئے جو آتشک خلقی کے لیے ممتاز ہیں +

۱۔ مٹا جگہ عنبیہ۔ آنکھ۔	۱۔ مٹا جگہ عنبیہ۔ آنکھ۔
۲۔ جسم مٹی۔ سی لی اری باڈی۔	۲۔ سی لی اری ریجن۔
۳۔ فاسرمان۔ دائرہ من۔	۳۔ عنبہ مقدّمہ۔ انٹیریئر فیلو (عنبہ۔ انگور) {
۴۔ کسٹح۔ رکے ش۔	
۵۔ درن۔ ٹیوبرکیولوسس +	۵۔ بیاض قرنیہ۔ آپسی ٹی آف دی کورنیا۔

(۱) دربیانی چوڑے دانتوں (شایا) میں گڑھے کا موجود ہونا آتشک مروئی کی خاص علامت ہے +

(۲) قرنیہ میں التهاب خلی کا ہونا +

(۳) پنڈلی کی بڑی بڑی میں ورم کا ہونا +

(۴) کھوپڑی کی ہڈیوں میں عقدہ یعنی گرہوں کا ہونا +

(۵) ناک کی جڑ کا چپٹا ہونا۔ دہن کے کناروں کا پچٹا ہوا ہونا۔ تالو اور

حلق میں داغ کا پایا جانا +

(۶) جگر کا بڑا ہونا۔ (عظم الکبد مزمن)

(۷) بار بار زکام اور آبلوں اور پھینسیوں کا ہونا۔ بعد اس کی والدہ میں اسقاط کا اکثر ہونا +

آتشک مروئی کا علاج۔ علامات کے ظاہر ہوتے ہی علاج فوراً شروع کرنا چاہئے + بچہ کی عام صحت درست کی جائے اور اگر ماں دودھ پلانے کے قابل نہیں ہے تو باہر کا دودھ شیشی وغیرہ کے ذریعہ دیا جائے۔ لیکن کسی دایہ یا آٹا کا دودھ ہرگز نہیں دینا چاہئے۔ کیونکہ بچہ کا مرض اسکو یقیناً لگ جائیگا + بارہ کی خارجی ماسن بچہ کے پیٹ پر کی جائے یا شب کے وقت پارہ کا مرہم بچہ کے تنوں پر ملا جائے۔ پارہ کے خارجی استعمال کا بہترین طریقہ ہے مگر پارہ کا اندرونی استعمال بھی مفید ہوتا ہے۔ مثلاً سفوف زرد (شوق سنجابی) نصف قحہ دن میں تین بار قدرے شکر کے ساتھ ملا کر دیا جائے +

پارہ کا استعمال تمام علامات رفع ہو جانے کے بعد ہی تین یا چہ ماہ تک جاری رکھنا چاہئے + عام صحت کی درستی اور تقویت کے لیے مچھلی کا تیل

ملے مسوق سنجابی۔ گرسہ پاؤڈر۔

(رودعن جگر ماہی) مرکبات فولاد اور مرکبات زور آگین دینا مفید ہے +
جب درجہ سویم کے علامات ظاہر ہو جائیں تو شکاریہ فیش آئیز اور پارٹکے
مرکبات ملا کر دینا چاہئے جیسا کہ کتانی آتشک میں دستور ہے + خارجی
عوارض مثلاً پھینسیوں دانوں وغیرہ کا خارجی علاج ہی کتانی آتشک کے
مانند کر دیا جائے +

تذرن

(پیسپرے کی سل بھی تذرن کی ایک قسم ہے)
تعریف: تذرن اس حالت کو کہتے ہیں جو عصبی درنیدہ کی پیدائش
لاحق ہوتی ہے جس میں جسمانی ساختوں کے مخصوص نوعیت کے اجسام پیدا
ہو جاتے ہیں۔ یہ اجسام اڈرنل (گرہ) ابھار (کھلاتے ہیں) جو پھوٹ کر گڑے
اور زخم بنادیتے ہیں +
اسباب (۱) استغلا دموروثی۔ ذرنی مرعیوں کے بچے اگر چھڑوٹی
طور پر یہ مرض عموماً نہیں حاصل کرتے، مگر ایسے بچوں میں جراثیم درنیدہ کے
مقابلہ کی طاقت خلقی طور پر نسبتاً کمتر ہوتی ہے (یعنی اس میں مستحکم ہونے کی
زیادہ قابلیت رکھتے ہیں) +

ط ر د عن جگر ماہی۔ کاڈیور آئل۔	ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جراثیم جس طرح پیسپرے
ط زور آگین۔ فاسفیٹ۔	میں سل پیدا کرتے ہیں اسی طرح دیگر اعضاء
ط شکاریہ فیش آئیز۔ آبدار آؤ آف پوائش۔	میں بھی ان جراثیم سے امراض پیدا ہوتے ہیں
ط تذرن۔ نیور کیو کوسس۔ تذرن کے	اسباب اس مرض کے لیے یا غلط تذرن
معنے مگرہ بنایا ابھار ہوتا ہے۔ اب	تجزیہ کیا ہو۔ سل بھی مرسل تذرن روئی ہے

(۲۱) عمر اگرچہ وزن کے امراض دس برس سے کم کی عمر والوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں، لیکن یہ مرض ہر عمر میں ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ بڑا بچے کی عمر میں بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔

(۲۲) عام صحت جسمانی کا کمزور ہونا جس سے صحت بالہ مرض کی قوت گھٹ جاتی ہے، یہ حدوث وزن کا ایک نہایت اہم اور عام سبب ہے۔ اکثر مرض صیبائی مثلاً حمی طغیہ، ریچک، خسرہ، حصہ وغیرہ مرض کساح، شہقہ یعنی کالی کمانی وغیرہ کے بعد یا بالغ مردوں میں انف، العنزہ کے بعد خلق اور امعاء کی اعشیہ مخاطیہ میں التهاب کا اثر پڑتا ہے اور ان میں عصبی ذیہ نہایت آسانی سے اپنا مرکز عفونت قائم کر سکتے ہیں۔

(۲۳) خراب آب و ہوا اور مضر صحت حالات سے صحت عامہ پر اور بھی مزید اثر پڑتا ہے اور قوت مقابلہ و طاقت مقادست کمزور پڑ جاتی ہے۔ صاف ہوا اور روشنی کی کمی، گھسان آبادی کے مکانات مثلاً اندھیرے مکانات، مدارس و مکاتب کی بھری ہوئی کونٹھریاں اور گنجان آبادی کے میلے مکانات وغیرہ بطور خود طبیعت و قوت کو گھٹا دیتے ہیں اور اگر اس قسم کے حالات میں دق و سل کے مریض پہلے سے موجود ہوں تو ان کے تھوک اور طہم سے ہوا اور یہی خراب ہو جاتی اور عددی عفونت پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے غربا میں وزن (سل و دق) ایک علم مرض ہے مگر طبقہ امرا میں بھی یہ بکثرت ہوتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کی غذا اور

۱۔ عصبی ذیہ۔ جیسا کہ نیو رکیو کوسس۔

۲۔ حمی طغیہ۔ اگر سخت سے سل فیورز۔

۳۔ حصہ۔ میزلس۔

۴۔ کساح۔ کے ٹس۔

۵۔ کالی کمانی۔ ہورینگ کف۔

۶۔ مرکز عفونت۔ انی ڈس۔

لباس خلات معمول ہوتے ہیں + الغرض مضر صحت آب و ہوا، ناقص و خراب غذا اور صفائی و روشنی کی قلت، ایسے اسباب ہیں جو حدوث مرض میں بڑی حد تک معاون ہوتے اور امراض درنہ کی استعداد پیدا کر دیتے ہیں +

(۵) مقامی اسباب مبعوثہ (الف) خیف قسم کی مقامی جراثیم بالخصوص مزمن التهاب کے بعد عصی درنہ کی افزائش کے لیے مرکز ہٹا کر دیتی ہے۔ مثلاً متورم غدد جاذبہ جو مزمن صورت میں ہوں یا عظام و مفاصل جن کے اندر کسی خفیف اور غیر محسوس سبب سے جہتلم خلل ہو۔ یہ جراثیم درنہ کے لیے بہترین سامان افزائش ہٹا کر دیتے ہیں + برعکس اس کے شدید ضرب کے اثر سے جوش کے مقام پر ساختوں میں التهاب پیدا ہو جاتا ہے جس سے مقامی مرض کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر مزمن اور خفیف التهاب جیسا کہ خفیف پٹ سے ہو جاتا ہے دیر تک قائم رہتا ہے اور عصی درنہ کے لیے مرکز نشو و نما ہٹا کر دیتا ہے + (ب) سردی کے اثر سے بھی عضواؤں کی قوت مقاومت کمزور پڑ جاتی اور عصی درنہ کے حلوں کو رد کرنے کی طاقت سلب ہو جاتی ہے +

(۶) ورن کا سبب و اصل یا سبب محرک عصی درنہ ہے جو ساختی جسم میں نشو و ارتقا حاصل کر رہا ہے (عصی درنہ کا دریافت کنندہ علامہ کلنچر) عصی درنہ چھوٹے چھوٹے سیدھے یا قدرے مڑے ہوئے ڈنڈے کی شکل کے ہوتے ہیں جنکا طول بقدر ۴ یا ۵ صغیر اور عرض ۱ یا ۱.۵ صغیر کے ہوتا ہے +

۱۔ صغیرہ (۲) بگرن / ایک ملی میٹر کا ہزار سال
حصہ ملی میٹر ایک قراط پچیسویں سالہ اچھے
کے برابر ہوتا ہے۔

۱۔ اسباب مبعوثہ۔ بدی و سپورنگ
کاز۔
۲۔ غدد جاذبہ۔ لیسے تک کلینڈرز

گاہے ان میں خصوصاً ان کی مصنوعی کاشت میں لمبی شاخیں (فیصلہ) ہی پائی جاتی ہیں۔ جب عضلی درنیہ کو زہیل نرس کے طریقہ سے رنگ دیا جاتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے ڈنڈے کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ ان کا رنگ تیزاب کے اثر سے نہیں اوڑتا (متسک) بالتحض (اس کے ڈنڈے چھوٹے چھوٹے نقطوں یا دانوں سے مرکب ہوتے ہیں اور سرخ رنگ پوری لمبائی پر یکساں نہیں چڑھتا بلکہ سرخ دانوں کے درمیان ایسے حصے نظر آتے ہیں جو رنگ سے قالی ہوتے ہیں جس سے ایک زنجیرنا شکل بن جاتی ہے اسی وجہ سے اس کی شکل نزدیکیات معدیہ کی لٹی سے مشابہت رکھتی ہے + عضلی درنیہ غیر متحرک ہوتا ہے، اس کے ادھاب نہیں ہوتے اور نہ بڑھتا۔

جس طرح انسان میں ہیل و درن ہوتا ہے اسی طرح گائے ہیل اور دوسرے چھاپوں میں بھی ہوتا ہے مگر یہ امر ابھی تحقیق طلب ہے کہ آیا انسانی اور بقری درن دونوں ایک ہی قسم کے امراض ہیں یا مختلف + بظاہر درن انسانی اور درن بقری ہر دو نوع سے انسان میں مرض درن پیدا ہو سکتا ہے مگر لگان غالب یہ ہے کہ درن بقری سے صرف درن معوی (دانتوں کا درن) اور درن جراحی (یعنی غدود، عظام اور مفاصل کا درن) ہو سکتا ہے، درن انسانی درن سے ہل رشومی (درن رنوی۔ ہل) اور ترن عمومی (حاد ہوتا ہے +

۱۔ درن بقری۔ بردانی۔ ٹیور کیو کوس
۲۔ گائے ہیل اور اسی قسم کے چھاپوں کا درن
۳۔ درن معوی۔ انشائیل ٹیور کل۔
۴۔ درن جراحی۔ سر جیکل ٹیور کل۔

۵۔ درن رنوی۔ مل رنوی۔ پٹونی خانی نرس
۶۔ درن عمومی۔ اکیوٹ جنرل ٹیور کیو کوس

۱۔ فیوٹا۔ فلائش۔ دھاگے۔
۲۔ متینک۔ بالتحض۔ راسیڈ فاسٹ
جس پر تیزاب کا اثر نہ پڑ سکے۔ اور تیزاب
جس کا رنگ نہ اوڑھے +

۳۔ ادھاب۔ فلائش۔
۴۔ بڑا۔ اسپور۔

عصی درنیہ جسم میں مختلف راستوں سے داخل ہو سکتے ہیں :-

(الف) استنشاق یا تنفس کی راہ سے - یہ طریقہ نہایت عام ہے -

ہل کے مریضوں کا بلغم میں عصی درنیہ بیشمار موجود رہتے ہیں، جو بلغم کے خشک ہو جانے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں اور ہوا اور گر د وغبار کو آلودہ کر دیتے ہیں لہذا یہ امر نہایت ضروری ہے کہ مریضان ہل کو مکانوں اور عام شاہراہوں پر تھوکنے نہ دیا جائے اور حتی الامکان تھوکنے کی عادت کا ضرور اسناد کیا جائے علاوہ انہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک حقیقت یہ ہے کہ کھانسنے اور بات چیت کرنے کے دوران میں مریضان ہل کا ملوٹ بلغم نہایت باریک اور بظاہر غیر محسوس ذرات کی صورت میں خارج ہوتا رہتا ہے اور یہ ملوٹ ذرات عرصہ دراز تک ہوا میں معلق رہتے ہیں تنفس کی راہ سے یہ ذرات تندرست اشخاص کے سینہ میں داخل ہو کر مرض ہل پیدا کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات ابتداءً شعب قصبہ کے غدہ میں مرض پیدا کر دیتے ہیں اور پھر ان غدہ سے مرض دوسرے اعضا و احشائے باسانی منتقل ہو جاتا ہے +

اس سے ظاہر ہے کہ مریضان ہل کو عام آبادی سے علیحدہ اور دور رکھنا کس قدر ضروری ہے اور ان کے بلغم کو مطہرات و دوائی عفونت ادویہ سے مطہر کرنا کس قدر اہم ہے +

(ب) اکل و شرب یعنی غذا کے ذریعہ - مثلاً ملوٹ دودھ کے کھینے جو کہ ایسی لگنے سے نکلا ہوا ہو جس کے تھنوں میں مرض درن ہو + ایسا عموماً بچوں میں ہوتا ہے + عصی درنیہ جو دودھ میں موجود ہوتے ہیں وہ نو زائمن یا مطلق کے غدہ کی راہ سے گردن کے غدہ میں پہنچ کر وہاں مرض پیدا کر دیتے ہیں

مل غدہ شعب قصبہ کے غدہ - براکیل گھینڈز -

یا متعدہ کی راہ سے لعا میں داخل ہو کر آنتوں کے یا ماساریقا کے غدود میں حشر
مرض کا باعث ہوتے ہیں +

بڑے شہروں میں دودھ کے باقاعدہ امتحان کی ضرورت اس سے
ظاہر ہے +

(ج) تلیق کے ذریعہ - یہ صورت نہایت نادر الوقع ہے اور خصوصاً
ایسے ملازمین اور ایسے اشخاص میں واقع ہوتی ہے جو لاشیں چیرتے ہیں جن میں
درن کی مقامی تلیق اتفاقی طور پر لگ جاتی ہے جس سے مقامی طور پر ٹولکہ
موتیدہ نمودار ہو جاتا ہے +

تشخیص درن کے لئے محل تجسس گاہ میں حسب ذیل طریقہ
رانج ہیں +

(۱) خوردبین کے ذریعہ عصی درنیہ کا مشاہدہ پہلے مشتبہ مواد کو حسب
دستور شیشہ پر پھیلا کر زہل نس کے طریقہ پر رنگا جاتا ہے + عموماً اس طرح بلغم
کا امتحان کیا جاتا ہے + مگر جب مشتبہ مواد میں عصی درنیہ زیادہ تعداد میں
نہیں ہوتے جیسا کہ قارورہ، پیپ، امیت عشاء، الصدر وغیرہ میں ہوتا ہے
تو دوسرے وسائل سے عصی درنیہ کی تلاش کی جاتی ہے۔ مثلاً

(۲) تلیق کے ذریعہ مشتبہ مواد کو حیوانات دارنب مصری کے جسم میں
رانج ران کی جلد کے نیچے داخل کیا جاتا ہے، اور تلیق کردہ حیوان کو تین ہفتے
کے بعد مار کر اس کے غدود جاذبہ اور احشاء اندرونی کا امتحان کیا جاتا ہے
جو بصورت مرض، ذرن ثابت ہوتے ہیں یعنی اگر مشتبہ مواد میں جراثیم درنیہ

عشاء الصدر و پیپ۔

دارنب مصری، گینی پگ۔

مثلاً ٹولہ موتیمہ
ویرد کا بکر دے نکلا

(سلیہ) پائے جاتے ہیں۔ تو ان حیوانات میں اسکا اثر پورے طور پر ہوجاتا ہے۔
 (۳) رطوبات درنیہ کی ترکیب میں کئی اقسام مائید اکثر بہت بڑی مقدار میں
 پائے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ شناخت مرض یقینی تو نہیں ہے۔ مگر اس سے وزن
 کی موجودگی کا ایک حد تک احتمال ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اکثر رطوبت غشاء، اصداء
 رطوبت باریطون، رطوبت عشیئہ دماغ وغیرہ کو اس طریقے سے دیکھ کر تشخیص مرض
 میں امداد ملی جاتی ہے۔

(۴) بعض اوقات جب مقامی وزن ہوتا ہے تو مقام ماؤف کا ایک
 حصہ قطع کر کے اسکا امتحان خوردبین سے کیا جاتا ہے اور عصی درنیہ کی
 تلاش کی جاتی ہے۔

(۵) وزنیں۔ ابتداء علامہ کا خنہ وزنیں اس طریقہ سے طیار کی کہ حلوتین
 اور شوربہ کی زمین میں عصی درنیہ کی مصنوعی کاشت اگا کر اور اسکو چھان کر
 عصی درنیہ کو علیحدہ کر دیا، پھر باقی ماندہ چھنے ہوئے مادہ کو ترکیب مناسب
 لٹکا کر کے ہلکا کر دیا۔ عصی درنیہ کے جدا ہونے کے بعد اب اس میں صرف سمین
 غیر خلوی ہی باقی رہ گئی۔ وزنیں اسی غیر خلوی سمین کو کہتے ہیں، اور یہ ابتداء ابکا
 سے اب تک تشخیص مرض کے لئے مستعمل ہے۔ اگر پیکاری کے ذریعہ وزنیں کی تلیق
 تندرست انسان میں کی جاوے تو کسی قسم کا اثر نمایاں نہیں ہوتا، لیکن اگر تلیق
 کردہ شخص پہلے مربع وزن ہے تو پیکاری کے چند ہی گھنٹے کے بعد اس سے
 تیز بخار پیدا ہوجاتا ہے۔ وزنیں کی پیکاری خطرہ سے خالی نہیں ہے اور اسکا
 استعمال اسی وقت جائز ہے جبکہ طبیب کو اس بات کا قسمی یقین ہو کہ معمول

ملائکات مائید۔ مغروسات۔

ملائکات وزنیں۔ نمبر کوئین۔

ملائکات حلوتین۔ نمبر کوئین۔

ملائکات سمین غیر خلوی۔ انڈونائین۔

ہر قسم کا ثانوی مدوی (مثلاً مدوی کرویات عقدیہ) سے بہتر اور پاک ہے +
مگر اس ترکیب تشخیص کی دو اصلاح شدہ صورتیں ہیں جو مستقل ہو سکتی ہیں +

(الف) "تفاعل قال میت" درزین کے ہلکے کلک رستوں میں ایک یا دو رستوں
میں ایک کے ایک دو قطرے مشتبہ مریض کی آنکھ میں ڈالے جائیں۔ اگر مریض
دُرنی ہے تو چند ہی گھنٹہ کے بعد اس کی آنکھ میں خفیف آشوب چشم (التهاب ملتحمہ)
شرح ہو گا اور چوبیس گھنٹے کے اندر رفع بھی ہو جائے گا +

(ب) "فان ذریعہ" کا تفاعل جلدی۔ یہ ترکیب بعض اوقات خطرہ سے خالی نہیں۔ کیونکہ گاہے
اس کے اثر سے شدید التهاب ملتحمہ، قرح قرنیہ و عنیبہ وغیرہ نمودار ہو کر آنکھ
مناسخ ہو جاتی ہے۔ اگرچہ یہ حادثہ بہت شاذ ہوتا ہے +

(ب) "فان ذریعہ" کا تفاعل جلدی۔ یہ ترکیب خطرہ سے خالی ہے +
جلد کو خفیف سا کھرج کر اوپر درزین کے محلول (۲۰ یا ۲۵ فی صدی طاقت کا)
کے چند قطرے خارجی طور سے لگا دیے جائیں۔ اگر مریض دُرنی ہے تو چوبیس
سے ۴۸ گھنٹے کے اندر اس مقام پر ایک چھوٹا سا ادبھار (حلمہ) نمودار ہو جائے گا
جس کے گرد احتقان دموی کے باعث سرخی محیط ہوگی + یہ ذریعہ تشخیص بچل
میں خصوصاً بہت مفید ہوتا ہے + لیکن بعض اوقات جبکہ درنی مادہ نہایت
خفیف طور پر نظام بدن میں مہرود ہو تو اس عمل کا نتیجہ مثبت ظاہر نہیں ہونے
پاتا +

علاج درن میں درزین کا استعمال بحیثیت "دہ ستقیق ہراثی" کا ایک

مسحوقان فریٹ کا تفاعل جلدی۔ دان
فریکٹس سکین دی کشن
مسحوقان قلع۔ بکسین۔

مسحوقان فریٹ کا تفاعل جلدی۔ دان
فریکٹس سکین دی کشن
مسحوقان قلع۔ بکسین۔

کامیاب ثابت نہیں ہوا ہے بلکہ نہایت خلاف امید اور بہت نکلن ثابت
ہوتے ہیں۔ مختلف صورتوں میں دین کی اصلاح کو کئے گئے نئے سرے
تلقی ایجاد کیے گئے ہیں جن میں سے بعض جملہ ہر امیتہ اور معلوم ہوتے
ہیں۔ (راسکریان آئندہ آئے گا)۔

(۶) معیار ملذذات کے ذریعہ اوقات درن کی تشخیص میں ادا دیتی ہے دیکھنا
ہر باب جزائیم۔ بیان اجسام لذذہ تندرست شخص میں یہ معیار بیہ اور بیہ کے درمیان
کم و بیش قائم رہتا ہے، مگر جب ان اعداد کی حد سے اوپر یا نیچے معیار پایا جائے
تو مرض کا شہدہ ہونا چاہئے، اور جب دن و رات اس معیار میں بہت نمایاں
یا کمی بیشی متواتر نظر آئے تو یہ درن کے پڑنے کی علامت ہے۔

درن کی تشوکی مامیت۔ درن میں جو ممتاز مخصوص ساخت بن جاتی
ہے وہ چھوٹے چھوٹے دانے یا گہریں ہیں جنکو درنہ کہتے ہیں۔ یہ دانے
ہمارے دانوں سے مشابہ ہوتے ہیں اس لیے انکو درنہ دُخنیہ کا نام
دیا گیا ہے۔

درنہ دُخنیہ۔ چھوٹے چھوٹے بھوسے رنگ کے دانے ہوتے ہیں۔ ہر دانہ
چند غلیات کے جستل سے بن جاتا ہے۔ عصی درنہ جسم کی ساختوں میں عروق
درن کی رگوں کے ذریعہ پہنچتے ہیں۔ عصی درنہ کی تحریک سے عروق کے
بطانہ (اندرونی جھلی) اور عروق کے گرد یعنی ساخت اور یعنی غلاف میں پھیلنا
اور تغیر و تبدل واقع ہوتا ہے جس سے مقام باؤٹ میں غلیات کا اجتماع ہوجاتا
ہے۔ یہ غلیات خون کے سفید دائلوں (کریات بیضاء) سے ذرا بڑے ہوتے ہیں۔

مل معیار ملذذات۔ آپسونکس {	مل درنہ شیریکل۔
انڈیکس۔	مل غلیات۔ کریات۔ بیضاء۔

آکر دراصل انکا مولد و ماخذ مہی خلیات ہیں جسے بطانہ عروق اور علامات عروق کی یعنی ساخت مرکب ہے + ان مجتمع شدہ خلیات میں سے ایک خلیہ حجم میں ترقی کر کے یا چند خلیات اپنے اتصال سے ایک بڑا خلیہ (خلیہ عظیم) پیدا کرتے ہیں یہ خلیہ عظیمہ درنہ کے مین مرکز میں واقع ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت سے ذرات ہوتے ہیں جو اس کے محیط کے پاس ایک نظم و ترتیب کے ساتھ منتشر ہوتے ہیں + خلیہ عظیمہ کے اندر عصی درنیہ ہی ہوتے ہیں + خلیہ عظیمہ کے گرد اگر دہشری قسم کے کریات تہ ذرات محیط ہوتے ہیں جن سے باہر کی طرف بہت سے خوں کے سفید دانے پاسے جاتے ہیں + یہ سفید دانے انگریسی ساخت کے اندر سے گذرتے ہوئے مقام ماؤنٹ کی طبعی ساخت میں منتقل ہو جاتے ہیں +

درنہ کی مندرجہ بالا ترکیب ساخت ہر صورت میں نہیں دیکھی جاتی اور گاہے خلیہ عظیمہ غیر موجود بھی ہوتا ہے + درنہ کی ساخت کے اندر غل کے عروق نہیں گذرتے اور اس پاس کے عروق بھی التهاب بطانہ کے باعث بہت تنگ ہوئے اور تنگ یا بالکل مسدود ہائے جاتے ہیں + لہذا قلت خون اور نقص تغذیہ کے باعث درنہ میں فساد واقع ہونے کی استعداد زیادہ ہوتی ہے + درنہ کے مارج ارتقائی اور خاتمہ + جب درنہ مکمل طور سے کسی مقام پر بن جاتا ہے تو عصی درنیہ کی حدت سمیتہ اور مریض کے درجہ مقاومت کے لحاظ سے اسکا خاتمہ مختلف طور پر ہوتا ہے +

(۱) اتمام نظری بتلیف^۱، یعنی ساخت بن جانا جب عصی درنیہ شدید سمیت نہیں رکھتے اور مریض کی قوت مقابلہ کافی ہوتی ہے تو درنہ کا دائرہ طبعی ساخت

۱۔ اتمام نظری - نچرل ہیلتھ
۲۔ بتلیف - فائبروسس

۱۔ خلیہ عظیمہ - جاسٹ سیل
۲۔ ذرات - یو کلیس

میں سہل ہو جاتا ہے +

(۲) مناد جینی۔ (تجربہ) جب معی درنہ سمیت شدید رکھتے ہوں اور مرض کی قوت مقادست (قوت مقابلہ مرض) ناقص ہو تو درنہ میں مناد جینی واقع ہوتا ہو۔ اور اس کا مرکزی حصہ نرم اور زرد ہو جاتا ہے + اس تبدیلی کے دو گونہ اسباب ہیں (۱) معی درنہ کے اثر سے طبعی ساخت فاسد ہونے لگتی ہے۔ (۲) التهاب بطن شریان کے باعث ساخت مائت میں قلت خون اور نقص تغذیہ واقع ہو جاتا ہے + چنانچہ ان ہر دو اسباب سے درنہ کا مرکزی حصہ نرم ہو کر جینی (پھیرنا) ہو جاتا ہے + اس طرح قرب دجوار کے ادران بھی نرم ہو جاتے ہیں + مناد جینی اس حد تک ہو چکا بھی گاہے اچھا ہو جاتا ہے۔ قرب دجوار کی ساختوں میں ایسا منہ دار ہو کر درنہ کی جینی رطوبت کو گھیر لیتے ہیں۔ اور پھر یہ رطوبت بتدریج خشک ہو جاتی ہے۔ بلکہ گاہے وہ چرنہ کی طرح خشک نجد ہو جاتی ہے۔ (تجربہ نکش) اس حالت میں شفاء پوری ہوتی ہے۔ مگر بعض اوقات اس خشک مادہ کے اندر بھی معی درنہ زندہ پائے جاتے ہیں اور اس کے گرد کا غلاف اگر چٹ یا ضرب سے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے تو گاہے سوتا ہوا خشک درنہ سالہا سال کے بعد بھی از سر نو زندہ اور تازہ ہو کر اعادۂ مرض کا باعث ہو جاتا ہے +

(۳) خراج ذرنہ۔ مگر بیشتر حالات میں درنہ کے اندر مناد جینی واقع ہونے کے بعد قرب دجوار کی معمولی ساختیں بھی متاثر ہو جاتی ہیں۔ ایک درنہ پہل کر دوسرے

مناد جینی۔ تجربہ۔ کیسی پیشین کہ	مناد جینی۔ تجربہ۔ کیسی نکش۔
پھیرنا۔	مناد جینی۔ تجربہ۔ کیسی نکش۔
مناد جینی۔ تجربہ۔ کیسی پیشین کہ	مناد جینی۔ تجربہ۔ کیسی نکش۔

دندان سے بل جاتا ہے اور میان کی ساخت بھی استحالہ جینی سے نرم بن جاتی ہے اور اس طرح ایک بڑے حجم کا جینی قطعہ ہو جاتا ہے جس میں گاہے ترشحات و رطوبات کا انصباب ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک مزمن خراجِ دُدی بن جاتا ہے۔ اس قسم کے مزمن پھوڑے یونٹو ہر مقام پر بن سکتے ہیں۔ مگر بیشتر ہڈیوں (عظام) جوڑوں (مفاصل) اور عضلات (جذبات) میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں۔ ان میں اکثر گارشی پیپ کے ساتھ شخی و چربی (مواد) کے جسے ہرے ٹکڑے پائے جاتے ہیں اور خراجِ حاد کے پیپ میں تو عصی درنیہ بھی خوردین سے نظر آسکتے ہیں۔ خراجِ مزمن کے مواد میں عصی درنیہ چونکہ کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ اس لئے بشکل نظر آتے ہیں۔ مگر تلقینی تجربات سے انکی موجودگی کی تصدیق ہو سکتی ہے۔

جراثیمِ مدیدیہ کے حملہ (ثانوی مددی) سے بھی درنہ میں پیپ بن سکتی ہے۔ یہ عمل فسادِ جینی سے بالکل مختلف اور مریض کے لیے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ مدعی ثانوی کے پھوڑے کی پیپ بھی خراجِ حاد کے پیپ سے مشابہ ہوتی ہے۔ مگر اس میں عصی درنیہ کی موجودگی ثابت کرنے کے لیے تکنیکی تجربات کی ضرورت پیش آتی ہے۔

خراجِ مزمن۔ جب درنہ میں تدریجاً بنتی ہے اور وہ پھوڑا بن جاتا ہے تو یہ ایک نرم دھچکدار بڑھتے ہوئے درم کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے جس میں متعجب ہایا جاتا ہے۔ اعصاب اور دیگر ذی حس ساخت پر اس کا دباؤ پڑنے سے درد بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ اگر یہ پھوڑا مسطح ہے تو یہ جلد بینی کی سطح میں منہ کر کے پھوٹ پڑتا ہے اور پیپ اور جینی مواد خارج ہونے کے بعد اگر مریض

۱۔ مدعی ثانوی سکندری انگش۔
۲۔ تونج۔ فلکوشین۔

۱۔ عضلاتیہ۔ لینگلیک گینڈز۔
۲۔ تلقینی تجربات۔ اناکریش اکسپرینٹ۔

کی صحت عامہ درست ہے تو بدرجہ اسکا زخم مندمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثر ہکا
جبنی مواد کئی طور پر خارج نہیں ہونے پاتا اور درنی ساخت اکثر اندر باقی رہ جاتی
ہے اس حالت میں اسکا زخم اچھی طرح مندمل نہیں ہونے پاتا اور ایک قرحہ
درمید پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی قسم کے قروح غشیہ غلیظہ کے درن میں ہو جاتے
ہیں۔ بہر حال قروح درنیہ جس مقام پر ہوں ایک متاخر ہینت و شکل کے ہوتے
ہیں۔ ادنکا عا شیشہ نامہوار اور کنارے کھوکھلے اور متورم ہوتے ہیں۔ زخم کے
اندروں گور ہوتے ہیں اُن میں جبنی مواد کے مراکز ہوتے ہیں۔ ان جُبنی
ٹکڑوں کو کھرچ کر جدا کرنے کے بعد ہی قرحہ مندمل ہو سکتا ہے۔

لیکن عین قراح درنی عضلی غلافوں رلغاف کی سطحوں کے متوازی پہلے
اندروں اندر پھیلتا ہے اور اپنی جائے پیدائش سے کہیں دور بیرونی سطح پر
منو دار ہو کر منہ کرتا اور پھوٹ پڑتا ہے۔ مثلاً ریرٹھ کی ہڈی کا مزاج درنی
عضلات مکر (صلبیہ) کے لغائف میں دور تک پھیل کر پھر اہلی مرکز سے دور
دراز مقام پر منہ کرتا ہے۔ اس قسم کے پھوڑوں میں نشتر لگا کر پیپ خارج
کرنے کے بعد عرصہ تک پیپ جاری رہتی ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ اہلی مرکز
عضونت مقام نشتر سے بہت فاصلہ پر ہوتا ہے اور اوس جگہ تک رسائی
مشکل ہوتی ہے۔

خراج درنی کا مستدرتی التمام۔ درنی پھوڑے سطح تک پہنچ کر
ہر حالت میں منہ نہیں کرتے۔ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے مادہ کا قریق ثانی
حصہ خشک ہو جاتا ہے اور جُبنی مواد کے ٹکڑے خشک ہو جاتے ہیں۔ بلکہ چھنے

عضلہ قطنیہ { سوش سل
صلبیہ

عضلہ قطنیہ ٹھیک ٹھیک سر سے اُغیر غلیظہ پر کھینچ
علا عا شیشہ نامہوار

جیسے مادہ میں تبدیل ہو کر خشک ہو جاتے ہیں اور ان کے گرد ایک جھلی کا غلاف محیط ہو جاتا ہے + جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے ان میں ساہا سال کے بعد ہی کسی تحریک کے باعث التهاب دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے اور یکایک اس میں پیپ پڑ جاتی ہے + اس حالت میں اس پھوڑے کا نام خراج باقی رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ عموماً زیادہ خطرناک نہیں ہوتے اور نشتر سے ان کو کمول کر اور خوب دھو کر صاف کر دینے سے اندمال ہو جاتا ہے +

لیکن تدرن کا خاص خطرہ اس کا رجحان توسیع و انتشار ہے، جو اس کی ممتاز خصوصیت ہے + اس قسم کا پھیلاؤ کئی نوع کا ہوتا ہے +
(الف) مقامی طور پر - ورنہ براہ راست اپنی محدود اور اصلی جگہ سے بڑھتا ہوا وسیع ہو جاتا ہے +

(ب) اعضاء بعیدہ - ورنہ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے شدہ کی صورت میں اپنی اصلی جگہ سے بہت دور دراز مقامات میں پہنچ کر اعضاء بعیدہ میں منتقل ہو جاتے ہیں + چنانچہ بہت ممکن ہے کہ ہڈیوں - جوڑوں یا غدود جاذبہ کے سلی مرض سے سل ٹرنوی ہو جائے۔ اسی طرح اعضاء تولید و تناسل کے مرض سے اغلیہ و لایہ میں تدرن ہو جانے +

(ج) انتشار عام - مدہ سلسلے نظام جسم میں منتشر ہو کر پھیل جاتا ہے اور حادثہ تدرن عام پیدا کر دیتا ہے۔ اس طرح تمام بدن کے اندر درنی ٹلنے پیدا ہو جاتے ہیں مریض جلد لاغر ہو جاتا ہے۔ بخار باری کی شکل کا آتا ہے۔ اکثر اسہال - تنگی تنفس بڑیاں اور قوما ہو جاتا ہے۔ اور مریض چند لمحوں میں ہلاک

ملہ خراج باقی - ریساؤ و نزلہ ایس۔

سلسلہ نوزی - مقامی سس۔

ملا توسیع و انتشار - ڈیفیوژن۔

ملا حادثہ تدرن عام - اکیوٹ جنرل ٹیوبریکولوس

ہو جاتا ہے +

علاج تدریجی۔ ابتداءً تدریج کے علاج میں جراحی اعمال اختیار کرنے کا طریقہ بہت رائج تھا۔ لیکن جدید تحقیقات و تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ اس مرض کے علاج میں زیادہ تر مریض کی قدرتی قوتِ مقاومت و الحام کمری دخل ہے + لہذا جراح کو لازم ہے کہ وہ تمام مسائل اختیار کرے جن سے مریض کی صحت عامہ درست ہو، مقامی اور عمومی علاج سے مریض کی قوتِ مقابلہ کو مدد پہنچائے اور جراحی عملیات صرف اُن چند مستثنیات میں اختیار کرے جن میں مقامی و عمومی علاج سے فائدہ ظاہر نہ ہو +

(۱) عمومی علاج۔ کا خاص اصول یہ ہے کہ مریض کو بکثرت صحت و تازگی دیا اور دھوپ کی روشنی پہنچائی جائے جو جراثیم سے پاک ہو۔ مثلاً دریائی اور ساحلی آب دہوا +

پہاڑی آب دہوا سی طرح مفید ہوتی ہے۔ بشرطیکہ جگہ بہت گھٹا اور مرطوب نہ ہو۔ زمین و لہلہ کی نہ ہو، اور دھوپ کی روشنی کافی مقدار میں میسر ہو۔ اگر ساحل اور دیہات کی آب دہوا میسر نہ ہو تو بڑے شہروں کے مصافحات میں باغوں کی ہوا اور کافی روشنی بھی مفید اثر رکھتی ہیں + یہ بھی ممکن نہ ہو تو شہروں کے مکان کی چھتوں اور چاندنیوں پر مریض کو ہوا اور روشنی دیکھا مریض کو گرم لباس اور لحات وغیرہ سے خوب ڈھانک کر اور منہ کھلا رکھ کر ہوا میں رکھنا چاہئے +

تازہ و خوشگوار ہوا اور روشنی کے علاوہ مریض کو غذا نہایت مقوی اور باغذا دی جانی چاہئے، مثلاً دودھ، انڈے، بالائی تازہ گوشت جو بہت پاک اور گھانا نہ ہو، روغنات، گھی، مسکد وغیرہ جس سے بدن کا وزن بڑھے اور قوتِ قایم

رہے۔ مریض کا وزن ہر سہفتہ لینا چاہئے تاکہ مرض کی حالت کا اندازہ ہوتا رہے۔
(وزن بڑھنا بہت اچھی علامت ہے) +

جہاں ورزش و محنت نہایت سختی کے ساتھ محدود کر دینی چاہئے تاکہ مریض کی طاقت ضائع نہ ہو، عرصہ تک آرام و سکون و اطمینان میں مریض کو رکھنا چاہئے یا حسب ضرورت آرام کرسی یا ڈولی پر باغ میں سیر کے لیے بھیجنا چاہئے۔

مقوی ادویہ۔ مثلاً روغن ہابی، مرکبات نورین، مرکبات بنفشین و فولاد (حدید بنفشین) گواٹھ کال (جیا کول) سنگیہ کے مرکبات، اور دیگر مقویات کا استعمال کرنا چاہئے۔

علاج بالتحقیق۔ درزین جو علامہ کا رخ کی ایجاد ہے، اندر کے علاج میں اپنی ابتدائی صورت میں ناکامیاب ثابت ہو چکی ہے + درزین کی مختلف صورتیں مستقل رہ چکی ہیں، جس میں ہول یہ تباہک عصی درزیہ کو سفوف کر کے حل کر لیا جائے۔ اس طرح جراثیم کے خلوی سمین بھی درزین کے اندر شامل ہوتی رہتی + درزین حلالہ (درزین علوی) تیار کرنے کی ترکیب یہ تھی کہ جدید مصنوعی کاشتوں کے اندر سے عصی درزیہ کو نکال کر خشک کر لیا جاتا تھا، پھر ان میں پانی ملا کر بعد مرکب نامی کل کے ذریعہ خوب ہلکا کر کے صاف پانی کو رسوبے ملحدہ کر لیا

نسی روغن ہابی جو قطران خشی (روڈنار سے

نکالا جاتا ہے)

درزین۔ ٹیوبرکولین۔

درزین علوی سمین۔ انڈوسیلیوز کسین۔

درزین متدیم (ٹیوبرکولین اولڈ۔

درزین علوی (ٹیوبرکولین اور۔

درزین مرکب (درزین علوی و ٹیوبرکولین)

درزین ہابی۔ کاڈیورائل۔

درزین۔ فاسفورس۔

بنفشین۔ آریڈین۔

حدید بنفشین (تیسرے آریڈین و ملاٹ آرن)

جیا کول گواٹھ کال۔ (ایک بے رنگ

روغن) وہ ہے جو کربا زوت (مافظہ لحم)

سے بنایا جاتا ہے۔ مافظہ لحم ایک شفاف

جاتا تھا۔ یہ صاف پانی درین متدیم ہے۔ جس کی تلیق کی جاتی تھی + مگر درین قدیم سے خاطر خواہ کامیابی نہیں حاصل ہوئی، لہذا اس میں مختلف ترکیبیں کی گئی ہیں درین رُسبونی درین سُطلی پہلے طریقہ مندرجہ سے خشک عصی درنیہ کو خوب پیسکر پانی ملا دیا جاتا ہے اور حاصل شدہ محلول کو شیشہ کی ٹی میں رکھ کر آٹا مذکور میں خوب گھمایا جاتا ہے + چکر دینے سے رُسوب نیچے ته نشین ہو جاتا ہے اور صاف پانی اوپر آ جاتا ہے اور پرکا پانی درین متدیم ہے) اب اس صاف پانی کو خارج کر دیا جائے اور پھر جے جوئے رُسوب کو پانی ملا کر حل کیا جاوے اور آٹا مذکور میں گھمایا جائے + جو صاف پانی حاصل ہو اسکو محفوظ رکھا جاوے + اسی طرح کئی مرتبہ کر کے صاف پانی نکال نکال کر علیحدہ رکھ دیا جاوے حتیٰ کہ سارا رُسوب پانی میں نخل ہو جائے اور ٹی کی تہ میں رُسوب کا کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ اب ان سب کو یکجا ٹی مود پر جمع کر لیا جاوے +

درین تجدید - خشک کردہ عصی درنیہ کو پیسکر طویل اور پانی میں ملا کر مخلوط کر لیا جاوے +

مندرجہ بالا طریق پر انسانی اور حیوانی عصی درنیہ دونوں سے قیمتی مادے تیار کیے گئے ہیں اور ایک مخلوط تہرہ ہی بنائی گئی ہے جس میں حیوانی اور انسانی دونوں قسم کی درین مخلوط ہوتی ہے اور جسے درینین مخلوط کہا گیا ہے +

تدریج کے مختلف اقسام میں درین کا استعمال کیا جاتا ہے جس کی مقدار بلحاظ

۱۔ درین رُسبونی { ٹیو بر کوئین۔

درین سُطلی { رزی ڈو۔

۲۔ درین جدید - ٹیو بر کوئین۔

۳۔ طویل - گلیسرین۔

۴۔ درین مخلوط - پانی - آٹا +

کھپرس ٹیو بر کوئین۔

قسم و شدت مرض مختلف ہوتی ہے۔ جراحی درن میں اصولاً بہت کم مقدار کی تیغ کرنی چاہئے۔ درن کا استعمال اندرونی (رٹھ کی راہ سے) بھی کیا جاتا ہے اور مفید نتائج پیدا کرتا ہے۔ تیغ کے نتائج اور ٹھیک مقدار استعمال کے لیے مریض کے معیار لذذات کا امتحان وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہئے + علاوہ انہیں مریض کی نبض، حرارت بدنہ، اور بدنی وزن وغیرہ سے بھی پچکاری کی مقدار کے کم و بیش کرنے کا اندازہ ہو سکتا ہے + پچکاری دس سے چودہ دن کے وقفہ سے کم میں نہیں دینا چاہئے، اور جب مریض درن میں مخلوط عدوی موجود دھو تو درن کی پچکاری کا استعمال نہیں کرنا چاہئے۔ درن میں جدید کے استعمال سے بعض مرضی میں اچھے نتائج حاصل ہوئے ہیں، مگر بہت سے مریضوں میں مایوس کن نتائج ملے ہیں + لہذا اس مرض کے علاج میں آب و ہوا اور مقویات وغیرہ (جنہ صحت عامہ درست ہوتی ہے) مقدم ہیں اور جو جراحی عمل ضروری ہوں اسے بھی فائدہ اٹھانا چاہئے +

(۲) مقامی علاج (غیر جراحی - غیر عملی) سب سے زیادہ مقدم امر یہ ہے کہ تمام ممالک درن کو ہر قسم کے خارجی و داخلی ہیجان و لدغ سے محفوظ رکھا جائے لہذا عضو ماؤت کو آرام و سکون دیکر بالکل غیر متحرک رکھا جاوے، اور ادھر کسی قسم کا دباؤ نہ پڑنے دیا جاوے۔ درنی مفاصل کو لصفہ باریس یا جبارز تختیوں کی مدد سے غیر متحرک رکھنا چاہئے + جب سررژہ کی ہڈی یا اطراف رہا تھ پائل (ماؤت) ہوں تو بدن کا وزن انہیں نہ پڑنے پائے یا حتی الامکان کو شمش کی جائے کہ کم پڑے

۱۔ مخلوط عدوی۔ مکند انگشتن۔

۲۔ لصفہ باریس۔ پلاسٹک پیرس۔

۳۔ جبارز۔ اسپلٹش۔

۱۔ جراحی درن۔ سر جیکل ٹیوبرکل۔

۲۔ معیار لذذات۔ آپونکس۔
۳۔ اندکس۔

اس مرض سے مریض کو ہٹا کر رکھا جاوے یا دیگر مناسب سائل اختیار کیے جائیں
جب خیمیتین میں مرض ہو تو انکو لنگوٹ یا اسی قسم کی پٹی سے اٹھا کر رکھا جائے
تا کہ بوجھ کم پڑے +

عدوی ثانوی کے اختلاط سے روکنے کے لئے احتیاط برتی جائے، خصوصاً
چمکہ خدو دانیہ (جاذبہ) متورم ہوں + جب گردن کے خدو داؤف ہوں تو لبوں،
دانتوں، اور کانوں کے امراض کی بحتیاط خبر گیری کرنی چاہئے + اگر گوزتین
بڑھے ہوئے ہوں یا پھول میں حلق اور ناک کے اندر درم خدوی رضدیدہ +
ہو تو انکو قطع کر کے خارج کر دینا چاہئے تاکہ ان مقامات سے جراثیم نہ پھیل
سکیں +

مندرجہ بالا وسائل کے علاوہ مقامی طور سے دافع التهاب وسائل اختیار
کیے جاویں خصوصاً تیج مقابل یعنی امار (جسکا بیان علاج التهاب میں آچکا ہے)
کے پیدا کرنے کے لیے مختلف ترکیبیں اختیار کرنی چاہئیں + مثلاً آبلہ ڈالا جائے
بنفشین کی پھریری لگائی جائے + اساوہ اسکوٹ استعمال کی جائے یعنی علامہ
اسکوٹ کے طریقہ پر مرہم پی کی جائے + جس میں مروج پارہ مرکب استعمال کیا جاتا ہے
یا احتفال قہری پیدا کرنے کے لیے علامہ نیر کا طریقہ اختیار کیا جائے + (جسکا بیان
علاج التهاب میں درج ہو چکا ہے) نل نفشی کی زیر جلد پکاری بھی کی جائے + یا
جسٹ اخضر آمیزہ استعمال کیا جائے + الغرض ان ترکیب سے مقام داؤف

۱۔ مریض پارہ مرکب - مرکب ویل ہنٹ

منٹ کہو نڈ -

علامہ نفشی - آبلہ داؤ نام -

۲۔ جسٹ اخضر آمیزہ - کور داؤف زنگ -

۳۔ غنیہ - ایڈی نامہ -

۴۔ تیج مقابل - کاؤنٹری شیش -

۵۔ بنفشین -

۶۔ اساوہ اسکوٹ - اسکاٹ ڈرنگ -

نین خون کی زیادتی پیدا کر کے طبعی نفل انتقام کو تیز کرنے کی کوشش کی جائے۔
 (۳) علاج جراحی۔ جب مندرجہ بالا وسائل و مقامی ہتھیات وغیرہ بے سود ثابت ہوں۔ یا دوران مرض میں اتفاقی عوارض مثلاً تقيح یا خراج وغیرہ پیدا ہو جائیں، یا جب مرض کی رفتار اس قدر تیز اور وسیع ہو کہ صرف مریض کی تدریجی قوت مقادست قوت انتقام سے ازالہ مرض کی اُمید نہ ہو سکتی ہو تو اعمال جراحیت کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ عمل جراحی کے ذریعہ مرکز درن کا کلی استیصال ایک قطعی علاج ہے۔ خصوصاً بعض صورتوں میں تو صرف ہی طریقہ موزوں ہے، مثلاً گردن کے متورم اور بڑھے ہوئے غدود جاذبہ کا کلیتہً خارج کر دینا بہت ضروری اور کامیاب طریقہ ہے، بڑی اور مفصل کے تدرن میں سٹری ہونی بڑی یا مؤف مفصل کو عمل شش کے ذریعہ تمام و کمال خارج کر دینا چاہئے۔ لیکن اس قسم کے عمل میں کئی باتوں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، مثلاً عمل جراحی کے خطرات، ایک مرکز محدود سے مرض کے پھیلنے کا امکان، زخم اور اس کے قرب و جوار کی ساختوں میں تدرن کے تعدیہ کا احتمال، اور عمل جراحی کے بعد عضو معمول کے تدرتی نفل میں کمی یا نقص پیدا ہونے کا اندیشہ وغیرہ۔ مرکز درن کے انقطاع کے بعد خاطر غداً نتیجہ کا حامل ہونا ہر حالت میں یقینی نہیں ہے علاوہ ازیں اس عمل کے بعد عرصہ تک علاج جاری رکھنا پڑتا ہے۔
 لہذا عمل جراحی کے اختیار کرنے سے پہلے مندرجہ ذیل امور کے متعلق کافی غور و خوض کر لینا چاہئے:-

- (۱) مرض کس درجہ میں پہنچ چکا ہے۔ ابتداء مرض یا اس کا آخری درجہ ہے؟
- (۲) مرض کی وضع قیام اور اس کا پھیلاؤ اور حدود کہاں تک ہیں؟ (۳) نوعیت مرض

مطابق شش۔ اکی شش۔

مطابق استیصال۔ اکثر پے شش۔

کیا ہے؟ یعنی وہ بہت تیز ہے یا نرم؟ (۴) مریض کی ذاتی قوت مقادیر دست کیسی ہے؟ (۵) جن حالات میں علاج ہو گا وہ قانون صحت کے مطابق کہاں ہیں؟

عملیات جزیئہ۔ بعض اوقات مرکز مرض کو تمام و کمال خارج کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے تو ماؤف حصہ کو محدود و مختصر طور سے کاٹ اور کھرج کر خارج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر مقام ماؤف پر دافع عفونت و مہلک اور یہ لگا دی جاتی ہیں، مثلاً محلول مائض قطرائی، شیرہ نسل نبشتی کی بنی وغیرہ اور اس کے بعد زخم کو مندرل ہونے کا موقعہ دیا جاتا ہے، شری ہوئی ہڈیاں، غدود، ناسور وغیرہ کو اسید سطح کم و بیش کھرجا جاتا ہے اور نتائج اچھے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تازہ صاف اور کھلی ہوئی ہڈیاں مریض کو رکھا جاتا ہے۔

جبکہ مریض ایک سے زائد مرکز مرضیہ رکھتا ہے، مثلاً سِل رنوی کے ساتھ ساتھ کوئی جوڑیا خصیتین مبتلا ہوں، تو اکثر عام علاج سے چنداں فائدہ نظر نہیں آتا۔ ایسی حالت میں مناسب ہے کہ کسی ایک مقامی مرکز کو عمل جراحی کے ذریعہ خارج کر دیا جائے۔ اس کے بعد ممکن ہے کہ مریض کی رفتار صحت میں نمایاں ترقی واقع ہو جاوے۔

مخصوص مقامات اور خاص خاص اعضاء و احشائے کے درجہ علاج آئندہ صفحات میں مناسب موقع سے درج ہو گا۔ (۶) ویکھو امراض جلد، امراض عظام، امراض مغاسل، امراض غدود، امراض گردہ، امراض خصیتین وغیرہ۔

مرکز من خراج درنی کا علاج۔ یہ لمبائی مقام، ماؤف کی وضع قیام اور عضو

۱۔ مائض قطرائی، کاربوئک اسید۔

۲۔ نسل نبشتی۔ تیز و دھام۔

۳۔ حمیہ جزیئہ۔ پارشل اوپریشن۔

کی مخصوص حالت کے مختلف ہے۔ مزمن سلی خراج کا علاج نسبتاً آسان ہے کیونکہ رماں تک سانی آسان ہے۔ مگر عین خراج، مثلاً وہ پھوٹا جو ریشہ کے ستون کی ہڈی کے وزن سے وابستہ ہو، زیادہ وقت طلب ہے اور اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ عددی اصدید یہ نہ ہونے پادے (یعنی معمولی پیپ کے جراثیم نہ داخل ہو جائیں جو ایک بڑی صورت ہے)۔

(۱) خارجی مزمن خراج، بعض حالات میں، مثلاً عند جاذبہ کا پھوٹا، بہت آسانی سے تمام وکال چیر کر قطع کیا جاسکتا ہے۔

(۲) جب جلد تلی ہو اور نیچے کے پھوٹے کے باعث کھوکھلی ہو چکی ہو اور پھوٹا سطح پر منہ کر رہا ہو تو اس کا منہ کھولے بغیر چارہ نہیں۔ لہذا اس کا علاج یہی ہے کہ چیر کر منہ کھول دیا جائے۔ اور اس کے خول کو خوب کھڑچ کر خراب شدہ جلد کو تراش دیا جائے۔ اس کی گہرائی میں دافع تعفن ادویہ (مطہرات) مثلاً فاس حامض قطرائی یا جست اخضر آمیز (۱) قحہ ایک ادقیہ میں) وغیرہ لگا کر نل بنفش کی بتی بھر دی جاوے اور زخم کو آہستہ آہستہ نیچے سے بھرنے دیا جائے۔ ایسی حالت میں اندمال زخم بہت دیر سے ہوتا ہے۔ اصولاً درنی پھوٹے کو ایسے درجہ تک ہرگز نہ بڑھنے دیا جائے کہ اس کا منہ اس طرح کھولنے کی ضرورت پیش آئے۔

(۳) مزمن عمیق خراج۔ جو بہت گہرائی میں واقع ہو اور اس کے اوپر تندرست و صحیح ساخت ہو، اس کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ پھوٹے کی رطوبت کو خارج کیا جائے اور اس کے گرد کی اندرونی جھلی کو جس قدر ہو سکے کھڑچ کر نکال دیا جائے اور پھر اس کے اندر کسی دافع تعفن دوا مثلاً حلورین و نل بنفش کی پککاری لگا کر زخم

ط عددی اصدید یہ۔ یا ریشہ تک نفکشن۔

ط عین خراج۔ ٹوپ اپس۔

کوٹا نگوں سے سدود کر دیا جائے + بیشتر حالات میں یہ مقصد علی بزل کر کے پورا ہو جاتا ہے جس میں آلہ باز لہ اور ابرہ مجوف کا استعمال کیا جاتا ہے + اسکا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پھوڑے کی بیرونی سطح کے اوپر کے چمڑے کو نشتر سے چیرا جاتا ہے، پھر جلد کے نیچے کی ساخت کے اندر آلہ باز لہ اور جوفدار سونے کو داخل کر کے پھوڑے کی گہرائی تک ترجھا سوراخ کر دیا جاتا ہے۔ جس سے تمام پیپ و رطوبت باز لہ کے ذریعہ باہر نکل آتی ہے + پھر گرم سیالانگیں سے پھوڑے کی گہرائی کو خوب دھو دیا جائے اور باہر سے خوب دبا کر اور نچوڑ کر پھوڑے کے کاڑھے اور جے ہونے جینی مواد کو نکال دیا جائے + پھر خوب دھو کر پھوڑے کے اندر نسل نفی اور طویٹن رانی صدی طاقت کا داخل کر کے بیرونی جلد کے شکاف کوٹا نگوں سے بند کر دیا جائے + اس ترکیب سے ایک ہی بیٹھک میں خراج عین کو خاطر خواہ شفا ہو جاتی ہے۔ اور دوبارہ کوئی عمل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی +

لیکن جب مرض زیادہ شدید ہو اور پھوڑے کے اندر سرسری ہونی پڑی موجود ہو تو بیرونی سطح پر بڑا شکاف کر کے پھوڑے تک چیرنا چاہئے تاکہ اونگی اندر بخوبی داخل ہو سکے۔ پھر تیز ہار لہ قحط یا از میٹل بارک فائض اندر داخل ہو کر سرسری ہونی پڑی کے

بہتر ہے جس کے ساتھ باخودار دستہ لگا ہوتا ہے۔ اس عمل کا تعلق بذریعہ نئی کے ایک حوض سے ہوتا ہے جو بلندی پر مریض کے پاس لگا ہوتا ہے۔ چنانچہ حوض یا برتن کا پانی نئی اور خودار دستہ سے گذر کر نرم کے اندر پہنچتا ہے۔ اور جھپٹی یا چمچ کو ان ذرات دھو ڈالتا ہے۔ جو کھر چنے سے ملتے ہیں +

۱۔ بزل۔ ٹپنگ۔
۲۔ آلہ باز لہ۔ زوکار۔ ۳۔ رزہ شیمیولار (جراثیمی)
۴۔ نسل نفی۔ ایوڈو فارم۔
۵۔ طویٹن۔ گلیسرین۔
۶۔ منقہ۔ اسپون۔
۷۔ از میٹل بارک فائض۔ ہارکس فلشنگ گنگ۔
۸۔ از میٹل جھپٹی۔ یہ ہارکس ایک جھپٹی یا تیز دھار چمچ

مکڑنوں اور پھوڑے کی جھلی کو خوب کھینچ کھینچ کر باہر نکال دینا چاہئے + پھر مٹھر
مخلوقات سے زخم کو خوب اندر سے دھو دھو کر صاف کر دینا چاہئے + اگر خون
زیادہ نکلے تو نہایت گرم سیال نکلین کے غسولات کو خوب دھونا چاہئے تاکہ
سیلان خون بند ہو جائے + پھر علویں و نل منفی اندر داخل کر کے اور جلدی
شکاف کو ناکوں سے برابر کر کے بند کر دینا چاہئے۔ اگر زخم اس طرح جلد اچھا
نہ ہو اور دوبارہ پیپ بھر آئے یا ناسور پڑ جائے تو پھر شکاف لگا کر خوب چرتے
رہنا چاہئے +

درفنی نا صورت اکثر بہت مشکل اور وقت سے مندرل ہوتا ہے، کیونکہ اکثر
ادس کی تہ میں سڑی ہوئی ہڈی موجود ہوتی ہے یا اور کوئی وجہ ہوتی ہے مثلاً
مواد پورے طور پر خارج نہ ہوتا ہو یا نا صورت کی دیواروں میں درفنی ساخت لگی
ہوتی ہو، یا عددی صدیدیہ ہو گیا ہو + ایسے نا صورت عموماً بہت گہرے ہوتے ہیں
اور صرف سلفائی زخمیں (ڈاکٹر دیکھنے سے پوری حالت کا اندازہ نہیں ہو سکتا +
ایسی حالت میں اکثر ایک حصہ بہت (اقلیہ) ۲ حصہ فانیہ میں فاکر نا صورت کے
اندر پکپکاری کر کے نا صورت کو شعلہ رافت یعنی سے دیکھنا چاہئے + لیکن جب
تفتح حاو بدن کے بڑے جوفوں میں موجود ہو مثلاً تیغ صدر تو اس قسم کی پکپکاری
اس وقت نہیں دینی چاہئے۔ کیونکہ اس سے خطرناک سی علامات کا خطرہ ہو جاتا ہو
لیکن جب کبھی سڑی ہوئی ہڈی اندر موجود ہو تو مناسب اعمال جراحیہ کے ذریعہ
ادس کا استیصال اور مواد و رطوبت کو خارج کر دینا ضروری ہے +

۱۔ بہت۔ اقلیہ۔ بہتہ۔

۲۔ فانیہ۔ وی لین۔

۳۔ شعلہ رافت یعنی۔ اکس سے۔

۱۔ درفنی نا صورت۔ ٹیوبرکولس {
سائنس۔

۲۔ سلفائی۔ جس۔ پردب۔

سراجہ - سقاوہ

سراجہ دراصل گھوڑوں، خجروں اور گدھوں کا ایک مرض ہے۔ جو ابتداء
! نہیں جانوروں کو ہوتا ہے، مگر تلقیح مباشرت براہ راست چھوت کا لگنا کے
بعد انسانوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے + اسی واسطے یہ عموماً اصل میں کام کرنے
والے ملازمین یا دیگر اشخاص میں، جنکو ان جانوروں سے واسطہ پڑتا رہتا ہو
دیکھا جاتا ہے + یہ مرض عصبی سراجہ یا عصبی مطرقہ کے باعث پیدا ہوتا ہے
اور بدن میں اور ام اور گرہ پیدا کر دیتا ہے جو پھونک کر قرح پیدا کر دیتی ہیں +

سراجہ انسانی ہاتھوں، چہرہ یا ناک کی جھلی میں شروع ہوتا ہے۔ سنہید
وحد سراجہ میں مدت حضانت ۳ سے ۵ یوم تک ہوتی ہے، جس کے بعد تکان
بخار، اور عام بدن میں درد ظاہر ہوتا ہے + مقام تلقیح پر اور ام پیدا ہوتے ہیں
جو بالآخر پھوٹ پڑتے ہیں اور قرح و زخم بن جاتے ہیں + اسی قسم کے اور ام
احشاء شکم میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں + گاہے شدید قسم الدم جاری ہوتا ہے۔ اور
۳ سے ۱۰ یوم کے اندر مریض کو ہلاک کر دیتا ہے + مزمن سراجہ کے عام
علامات و عوارض اسقدر شدید نہیں ہوتے اور پچاس فی صد مریض شفا پا
ہو جاتے ہیں +

تشخیص۔ رطوبت میں عصبی سراجہ کی موجودگی، جو خوردین سے ظاہر ہو سکتی
ہے، اور شہودی وسعت و شدت اس مرض کو چھچک سے متاثر کر دیتی ہے +
آتشک اور دردن سے سراجہ بوجہ اپنی مخصوص تابخ و نوعیت پیدائش کے

۱۔ سراجہ - سقاوہ - گلینڈرٹس۔

۲۔ عصبی سراجہ - گلینڈرٹس بیسیس۔

۳۔ عصبی مطرقہ - بیسیس میلی آئی۔

۴۔ مدت حضانت - ویرطو آئی - ایکسپہ شن

بآسانی پہچانا جاسکتا ہے یعنی یہ مرض ایسے جانوروں کی چھوت سے انسان میں پڑتا ہے جو اس میں پہلے مبتلا ہو + عصی سراجہ کی مصنوعی مٹھ کا شست دسر آجین کی پچکاری دینے سے اگر معمول میں تیز بخار پیدا ہو جائے تو یہ مرض سراجہ کی مخصوص علامت ہے +

علاج - حادثہ سراجہ کے مقامی مرکزوں کو عام مدھی واقع ہونے سے پہلے ہی کاٹ کر خارج کر دینا چاہئے + یہی اس مرض کا علاج ہے + مقامی مراکز کو نشتر سے قطع کر کے بالکل علیحدہ کر دینا چاہئے + یا اگر یہ ممکن نہ ہو تو تین چھ (معلقہ حادثہ) سے کھینچ کر کوئی جلاتے والی رکادی (دوا لگا دینی چاہئے + حادثہ سراجہ کا بھی یہی علاج ہے، مگر اس میں ایک بار کے عمل سے ازالہ مرض نہیں ہوتا اور بار بار نشتر لگانا یا پھیلنا پڑتا ہے +

جذام - کورھ

جذام ایک عام مخدئی (گٹنے والا - چھوت کا) مرض ہے جو عصی جذامیہ کے باعث پیدا ہو جاتا ہے + اس کی ممتاز خصوصیت یہ ہے کہ انگور کے مانند نئی ساختیں (تکونین جدید) مقامی طور پر جگہ جگہ جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں، جو ابتداً جلد اور عصاب

۱۔ سراجین - سیل این درہ خاص رطوبت	۱۔ کالے رازنگ -
۲۔ عصی سراجہ کی کاشت سے حاصل کی جاتی ہے +	۲۔ جذام - پردی -
۳۔ عام مدھی - جنرل انفکشن -	۳۔ عصی جذامیہ - بیسیس پری -
۴۔ معلقہ علاوہ - شارب -	۴۔ تکونین جدید - نیو پلازم -

میں نمودار ہوتی ہیں + یہ مرض اگرچہ مغفوری ہے۔ مگر ایسا زیادہ نہیں +

خصائص جسمانی جذام - عصی جذامیہ عصی درنیہ سے قریبی مشابہت رکھتے ہیں اور عصی درنیہ کی طرح گرام مثبت ہوتے ہیں یعنی گرام کے طریقے سے رنگین ہو جاتے ہیں۔ اور تیزاب سے انکارنگ نہیں اُٹا رہتا (متکٹ بالجامض) زہل نسن کے طریقہ سے یہ رنگ قبول کر لیتے ہیں + لیکن یہ بہت جلد عصی درنیہ کے سیدھے اور باہم کیاں ہوتے ہیں - جذامی رطوبات و مواد میں ہنایت کثرت کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور فافٹ تیغ (ریگریٹ) کے بستوں کی طرح مجمع صورت میں نظر آتے ہیں + انکی مصنوعی کاشت اگاتا سخت شکل ہے + حیوانات میں انکی تلقیح کامیاب نہیں ہوتی یعنی ان کے دانے کرنے سے حیوانات میں جذام پیدا نہیں ہوتا ہے، دراصل ایکہ عصی درنیہ کی تلقیح معمول میں فوراً معضرات پیدا کر دیتی ہے - انکی چھوت بہت کم اثر کرتی ہے اور جذامی مریضوں میں کام کرنے والی تیماردار عورتیں اور مرہم پی کرنے والے ملازمین شاذ و نادر ہی جذامی مریض کے مرض سے متاثر ہوتے ہیں + مصنوعی تلقیح کے ذریعہ جذام نہیں پیدا ہوتا + علامہ جون تان بشنسون کا قوی خیال یہ ہے کہ جذام کا مدوی صرف اونیفیس دوگوں میں پیدا ہو سکتا ہے جو باسی یا سڑی ہوئی پھلی کھانے کے مادی ہوں + ہندوستان میں ہی عمدہ ماہی خیال عرصہ دراز سے رائج ہے - جذام کے موردی مرض ہونے کے متعلق بہت کچھ اختلاف رائے ہے - مگر احتمال غالب یہی ہے کہ قوارث کا کچھ اثر نہیں ہوتا +

علامات - جذام کی دو متاثرات ہیں (۱) درنی یا جلدی جذام اور

۱۔ مشر جو تھن چھین سن -
۲۔ جذام درنی -
۳۔ جلدی

۱۔ گرام مثبت - گرام پازیٹ -
۲۔ متکٹ بالجامض - ایڈناٹ -

۱۲ غیورسانی یا جلد نام ٹھنڈا۔ مگر اکثر یہ دونوں مٹیں کچانی طور پر واقع ہوتی ہیں۔

۱۔ درنی یا جلد سی جدام۔ یہ قسم سرد مالک اور یورپ (اروبا) میں نسبتاً عام ہے۔ ابتدا زردی کے بعد امینوں یا برسوں کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی پھر کچھ عرصہ تک محض ٹمکد طبع، سوسے مضم اور اسہال اور غنودگی کی شکایت کے بعد نمایاں بخار ظاہر ہوتا ہے جو چند دنوں یا مہینوں تک رہتا ہے۔ بخار کے ساتھ جاڑا بھی گاہے ہوتا ہے۔ اور بخار حمی مغترہ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے بعد یا اس کے ساتھ جلد پر سرخ، چمکدار، ادھرے ہوئے چٹے (طفحاشات) ظاہر ہوتے ہیں۔ جو عموماً پیشانی، بازو اور رانوں پر نمودار ہوتے ہیں۔ یہ چٹے ذکی الحس ہوتے ہیں اور ان میں ترشحات الہتایہ شروع سے ہی موجود ہوتے ہیں۔ چند روز میں یہ چٹے اکٹھا جاتے ہیں اور پھر دوبارہ بخار کے ساتھ ادھر آتے ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد ان سرخ چٹوں کے مقام پر چھوٹے چھوٹے سرخ دانے پیدا ہو جاتے ہیں جو آپس میں ملکر اور حجم میں بڑھ کر گائٹھیں اور آبھار (اوران) بنا دیتے ہیں جو بعضہ مرغ کے برابر ہو سکتے ہیں۔ اور پھر انکارنگ زردی مائل اور بھورا ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے آبھار جسم کے ہر حصہ میں ہو سکتے ہیں۔ مگر عموماً چہرہ پر زیادہ ہوتے ہیں اور انکے باعث چہرہ کی صورت بالکل سرخ ہو جاتی ہے اور ایک عجیب موٹی پھوٹی ہونی ڈیڑا ذنی شکل شیر کے چہرہ کے مانند دکھائی دیتی ہے۔

۱۳ حمی مغترہ۔ رمی شٹ فیور۔

۱۴ طفحاشات۔ ارپشن۔

۱۵ ذکی الحس۔ نانی پراسٹھیک۔

۱۶ گائٹھ۔ ورن۔ ٹیورکل۔

۱۷ جدام محدود
۱۸ غیر درنی { اس قسم کی پروری

۱۹ جلدی جدام کیونے نہیں پروری۔

۲۰ ٹمکد طبع۔ سینیز۔

اسی وجہ سے اسکا دوسرا نام داء الکاسل بھی ہے + ترشحات کے باعث اعصاب پر دباؤ پڑنے سے یہ ابھار ہے حس ہو جاتے ہیں + گاہے یہ تحلیل ہو جاتے ہیں اور انکی جگہ گہرے رنگین نشان رہ جاتے ہیں۔ یا تفرق واقع ہو کر یہ ابھار پھوٹ جاتے ہیں + اسی طرح دیگر احشاء اور غدود جاذبہ میں بھی یہ گائٹھیں بنانے کے ساتھ بن سکتی ہیں + اس مرض میں آل خصیتین ہو جاتا ہے اور عورت و مرد دونوں میں قوت با ضائع ہو جاتی ہے + ہلاکت عموماً تعفن الدم، اسٹنڈ خجرہ، یا عوارض مشش و گردہ کے باعث ہوتی ہے، لیکن حبذامی مریض ساہا سال تک زندہ رہ سکتا ہے +

گائٹھوں کی ساخت میں ازراہ مجید کے ساتھ بہت سے بڑے خلیات ہوتے ہیں جن میں عصی جذا میہ پائے جاتے ہیں +

(۲) غیر درنی یا جذام مجذز - یہ قسم گرم ممالک میں نہایت عام ہے + ابتدائے قدر سے ٹنڈر طبع کے ساتھ بہت خفیف و غیر محسوس حرارت ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی محیطی اعصاب کے اضلاع میں تیز سنسناسٹ یا جھنجھناہٹ (جیسے چیونٹیاں چل رہی ہوں) یا چہرے اور دروکا احساس ہوتا ہے + اعصاب کی پوری رفتار میں چھوٹنے سے درد محسوس ہوتا ہے + محیطی اعصاب جو بالخصوص متاثر ہوتے ہیں یہ ہیں - زندی اسفل، متوسط، شقوقی، صائم + اعصاب کے بعد عضلات

۱۔ داء الکاسل (دار بیماری اسٹنڈ خجرہ)

۲۔ تعفن الدم پسٹیلیا

۳۔ اسٹنڈ خجرہ - نیزنجیل آبٹرکٹن

۴۔ محیطی
انتہائی پیری فیرل

۵۔ چہرے میں سیلی نے ٹنگ پین

۶۔ عصب زندی اسفل - السرنزو

۷۔ عصب متوسط - میڈین زو

۸۔ عصب شقوقی - پوزیل زو

۹۔ عصب صائم - کسٹنس زو

متاثر ہوتے ہیں اور عضلات کی کمزوری اور لاغری کے بعد نمایاں استرخاء پیدا ہو جاتا ہے۔ جس سے قوت احساس میں فرق آ جاتا ہے۔ اور جلد، عظام اور مفاصل کا تغذیہ بگڑ جاتا ہے۔

گول، سفید زردی، نائل و سبے جلد میں نمودار ہو جاتے ہیں۔ جو محیط میں پھیلتے جاتے۔ اور چند فکر بیضوی شکل کے بڑے بڑے ابقاعہ و سبے بن جاتے ہیں۔ اکثر انکا حاشیہ ادبھرا ہوا اور ذئی الحس ہوتا ہے۔ لیکن مرکزی حصہ سوکھ کر سفید اور بے حس ہو جاتا ہے۔ بے حسی بتدریج بڑھتی جاتی ہے۔ عضلات ڈبے ہو کر شکر جاتے ہیں اور عضلات و فکریہ النظر اور بد وضع ہو جاتا ہے۔ اور گاہے ہاتھ شیر کے پنجے کے مانند ہو جاتا ہے (جیسا کہ استرخاء زندی اسفل میں دیکھا جاتا ہے)۔ اطراف یعنی ہاتھ پاؤں کے انتہائی سرے کی خلائی ساخت کے تحلیل و جذب ہو جانے کے باعث اونگیلیاں اور دیگر حصص ٹھٹھ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ گاہے اعصاب، وڈہ موٹے ہو کر رسی کی طرح محسوس ہوتے ہیں اور دبائے سے ان میں درد ہوتا ہے۔ احشاء کے عوارض کس قسم میں نسبتاً کیاب ہوتے ہیں، قوت بھی چنداں کم نہیں ہوتی، اور مر بعض عرصہ تک اپنی قوت و صحت قائم رکھ سکتا ہے۔ گاہے یہ حالت بیس سال یا اس سے زائد عرصہ تک قائم رہتی ہے۔ بالآخر عام جسمانی نقاہت یا دیگر عوارض کے باعث بعض ہلاک ہو جاتا ہے۔

علاج۔ اس مرض کا علاج اب تک غیر تشفی بخش ثابت ہوا ہے۔ روغن چال موگرا دشلمو غرام کا خارجی اور اندرونی استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض حالات

۱۔ چال موگرا دشلمو غرام ایک درخت ہے جس کے تخم سے روغن نکالا جاتا ہے۔

۲۔ استرخاء۔ پیرلے سس۔
۳۔ خلائی ساخت۔ انٹرس میٹیل ٹشو۔

میں سلیمانی کی عضلی پککاری رہی جاتی ہے۔ ناشتین کی تخت ابجد پکاری جاتی آتا
 اخضر آمیز کے ساتھ مار دیکاتی ہے جس سے کامیاب نتائج حاصل ہوئے ہیں۔
 اس کی پککاری سے شدید التهاب ہو کر جذای ساخت تلف ہو جاتی ہے
 جذام کے آخری درجات میں گاہے عمل جراحی کے ذریعہ اطراب اعضا
 کو قطع کر دیا جاتا ہے۔

مال ہی میں علامہ سراجہ میں رواج قینین / جذام کے نشینی علاج کی تجربہ
 میں انگلستان کے حکمہ تحقیقات امراض ممالک خارجہ میں تجربات کرے
 ہیں اور انھوں نے روحن چال موگرا سے چند ایسے ہشیادی حسی لامل
 جذبات کیب دی اندیکے ہیں جو جراثیم جذام پر ہلک اثر رکھتے ہیں۔ انکی
 ردوائہ عضلی پککاری سے کثیر تعداد جذامیوں کو مستحضر فائدہ حاصل ہوا
 اور دوا کے اثر سے جذامی قرح وغیرہ سے جراثیم قطعی طور پر مائل ہو گئے
 ہیں۔ اس ذریعہ دوا سے جذامیوں کے بڑے (ہونا ٹوٹا) میں جزا
 مرصیوں کو فائدہ پہونچا ہے اور ان میں سے کچاس فی صدی غیر مستحضر
 تیرم کر کے گئے ہیں۔ از اسب اگست ۱۹۱۵ء

فطرت شاعیہ

فطرت شاعیہ ایک متعدی مرض کا نام ہے جو عموماً چوپایوں میں پایا جاتا

مے جادی آنا اخضر آئید۔ نبروئل
 کلورائیڈ۔

مے قینین۔ ای ٹین۔

مے ہزیارت۔ ریٹیکولز۔

مے فطرت شاعیہ۔ انٹینو، ای کوکس۔

مے سلیمانی۔ دار کھنہ کر دیو سب فی میٹ
 مے ناشتین۔ ناشتین جذام کی گروہ سے
 جذامی شعر مغتول را ستر چو تھ کس لہروں
 کی مصنوعی کاشت کر کے ایک مٹر کی تعلق
 چربی تیار کی جاتی ہے۔ اسی کو ناشتین کہتے ہیں

(۳۵) مریض جذام



یہ ایک ملحق ہے۔ جذام میں کئی سال سے مبتلا ہے۔ چہرہ کا
بشرہ نمایاں طور پر فتاڑ ہے۔ کلاٹیاں بھی موٹی معلوم ہورہی ہیں
کیونکہ زیر جلد اعصاب میں جذام کے مواد جمع ہورہے ہیں +

ہے، مگر گاہے انسان میں بھی ہوتا ہے + یہ مرض فطر شعاعی نامی جرثومہ کی مختلف اقسام کے باعث پیدا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسکا نام فطرت شعاعیہ لکھا گیا ہے + یہ مرض عموماً جراثیم سے آلودہ بخارِ اناج کے کھانسیے مویشی میں پیدا ہوتا اور زبان، جبرے وغیرہ میں مریں ورم نشینی پیدا کر دیتا ہے + اکثر مقامات پر ان اور ام میں مزمنِ اناج اور ناصور بن جاتے ہیں + انسانی فطرت شعاعیہ کے علامات و عوارض بھی مویشی کے مرض سے مشابہ ہوتے ہیں + چونکہ یہ مرض شعر مفتول کے خاندان کے مختلف انواع سے پیدا ہوتا ہے، لہذا فی الحقیقت یہ کوئی نوعی مرض نہیں ہے + فطر شعاعی کے گرد و ساختہ جسم میں پائے جاتے ہیں لیکن مویشی میں جس طرح ان کے ڈنڈے محلی حصہ میں شعل شعل دیکھے جاتے ہیں ویسے انسانی ساختوں کے موہیں نظر نہیں آتے کیونکہ یہ محلی ڈنڈے رنگ جلد قبول نہیں کرتے اور نمایاں نہیں ہوتے + شعر مفتول نامی جراثیم کے اقسام انسانی فطرت شعاعیہ پیدا کرتے ہیں وہ سب طریقہ مگرام سے رنگے جاسکتے ہیں +

اکثر کاشتکار، آلیپینے والے اور دیگر غلہ کا کام کرنے والے اشخاص میں یہ مرض پیدا ہوتا ہے + اور اسکا تعدیہ فطر آمیز اناج کے کھانے یا بذریعہ فطر کے تنفس میں داخل ہونے سے ہو جاتا ہے + بسا اوقات سرے ہوئے دانت یا لوزئین کے ذریعہ فطر کا جرثومہ داخل بدن ہوتا ہے اور ابتدائی مرض منہ کے کئی حصہ سے مثلاً زبان، جبرے یا گردن سے شروع ہوتا ہے اور صلابت و تھج پیدا کر دیتا ہے + گاہے مجرئی غذائی کے دیگر حصص، خصوصاً اعشار در زائدہ دودیر میں یا جگر میں مرض کی ابتدا

۱۔ فطر شعاعی - کیشیزانی سوز سے فگس۔	۲۔ لوزئین - ٹانسلز۔
۳۔ شعر مفتول - اسٹرو پوٹھ کرکس۔	۴۔ مجری غذائی - الی منٹری کیسٹال۔
۵۔ نوحی - پسے سے فگ۔	۶۔ اعور سیکم
۷۔ ڈنڈے - کلب۔	۸۔ زائدہ دودیر {
	۹۔ اعور { اینڈکس مریض دس۔

ہوتی ہے۔ اس طرح شش میں بھی تفتیح اور خلا میں بن سکتی ہیں۔ اور غٹائے صدر کے
ماؤن ہونے سے مقامی تفتیح صدر بھی ہو سکتا ہے۔
الغرض جس مقام پر اسکا تعذیر واقع ہوتا ہے اس جگہ انگریزی ساخت پیدا ہوتی
اور عموماً تفتیح کی نوبت پہنچتی ہے۔ اسکے مواد اور سپ میں زرد رنگ کے دانے سے پا
جاتے ہیں جو نسل سفیدی کے دانوں سے مشابہ ہوتے ہیں اور اس مرض کو ممتاز
کرتے ہیں۔ اس مرض کی رفتار مزمن ہوتی ہے۔

درم ابتدائی کا عام محل وقوع زیریں جہڑے کا زادیہ ہو۔ جہاں ایک متناہمی
سوجن ہو جاتی ہے۔ ابتدائی سوجن کیساں اور چکنی ہوتی ہے اور جلد سوجن قریب جوا
کی ساختوں سے جالٹی ہے۔ اس کے اوپر کی جلد اختقان دوسری کے باعث سرخ
ہوتی ہے۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد اس میں نا ہوا گرہیں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ تنگی
بیر مٹی سطح کی چوٹیاں مخصوص زردی مائل اور بھاروں کی صورت میں ہوتی ہیں۔
یہ اور بھار باقاعز زم پڑ کر باہر نہ نکلتے اور پھوٹ جاتے ہیں۔ اور ان سے لیسدار سپ
خارج ہوتی ہو۔ اس سپ میں خوردبین کے ذریعہ جلاہیم فطر شعاعی نظر آتے ہیں
جب سب مواد خارج ہو جاتا ہو تو پھوٹا نکل جاتا اور زخم بند ہو جاتا ہو۔ پھوٹوں کے
نمودار ہونے پھوٹے اور فٹم ہونے سے اس کی بیر مٹی سطح عجیب طور سے گہرا اور
نکریسی ہو جاتی ہے۔ لگاتار ختم نہیں ہوتا اور حصہ ماؤن میں بہت سے ماسور
رہ جاتے ہیں۔ گردن اور جہڑے کی فطرت میں کڑا زانگ ایک مستقل علامت ہو جو
جلد ہی پیدا ہو جاتی ہے اور خفیف صورت میں بھی نمایاں ہوتی ہے۔

حل (ج)۔ شکاریہ بغش آمیز بہت بڑی مقدار میں (۲۰ سے ۳۰ تحریک میں تین مرتبہ)

۱۰ کڑا زانگ۔ ٹرسس۔

۱۰ غٹے۔ صدر۔ پیورا۔

۱۰ شکاریہ بغش آمیز آہو ڈاؤنٹ پرناشیم۔

۱۰ نسل سفیدی۔ آہو ڈاؤنٹ۔

یا بنفیشین کے دیگر جراثیمی مرکبات میں ضمیمہ ویسا ہی نمایاں اثر رکھتے ہیں جیسا انفلک
میں ہے جب درم میں کوئی کھلنا زخم ہو تو صرف یہی علاج کافی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر
گلٹی کے پھوٹنے سے زخم ہو گئے ہوں تو جراحی اعمال ضروری ہوتے ہیں۔ اسی
حالت میں پورے متورم حصہ کو نشتر سے قطع کر کے خارج کر دینا چاہئے۔ یا ناسور و
کوہرچ کر صاف کرنا چاہئے اور حصہ ماؤن کو کا دیا تھ سے جلا دینا چاہئے۔ جب
احشاء کے عوارض موجود ہوں تو جراحی علاج بہت مشکل و خطرناک ہے۔ خصوصاً
جبکہ معدوی صدیر یہ بھی موجود ہو۔ اسی حالت میں مرض بتدریج مہلک ہو جاتا ہے
گر بنفیشین کے داخلی استعمال سے قدرے افادہ ہو سکتا ہے۔

درم فطری بت فطری

یہ مرض جو فطرت شعا عجمہ سے قدرت مشابہت رکھتا ہے، ہندوستان کے بیشتر
میں خصوصاً اور بعض دیگر گرم ممالک میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ اسکا تعدیہ ننگے پیر پٹے سے
خفیف زخم باز کے ذریعہ ہو جاتا ہے۔ اسکی نمایاں صورت یہ ہے کہ ایک لمبے و درخت حصہ
کے مرکز میں سیاہ یا زرد رنگ میں بن جاتی ہیں اور پھر ننگے پھوٹنے سے پیپ ٹائی ہو جاتی
ہیں۔ اندر سیاہ یا زردی، نل ملنے رختاش کے دانوں کی طرح اپنے جاتے ہیں جو دیگر
فطریہ کے عمل سے بن جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اس قسم کے پھوڑے پورے پیر میں پھیل
جاتے ہیں۔ اور ذریعوں کو کھلا اور گھلا کر دیتے ہیں۔ قدم بردار اور ہیکل ہو جاتا
ہے۔ تب تب بڑھتے یہ مرض ہڈی تک پہنچ جاتا ہے اور شاذ و نادر ہرن کے دیگر حصوں
بھی چھوڑ کے ذریعہ ہو جاتا ہے۔ اسکی گرمی بعض جگہ سخت بعض جگہ نرم ہوتی ہیں اور پیر

یا بنفیشین۔ پیوژن۔

معدوی۔ کاسک۔

معدوی صدیر یہ۔ پایو بیٹک انفکشن۔

معدوی فطری۔ باقی سے نوا۔

معدوی فطری } فٹو راکٹ۔
فٹو فٹ۔

میں متحد ہونا سوسہ پڑ جاتے ہیں + یہ مرض بہت دیر پا اور مزمن ہوتا ہے اور قطعی چھوڑ
سے چھلٹا جاتا ہے + زیادہ تر مزدوری پیشہ اور خاص کر کاشتکاروں کی طبیعت میں ننگے پیر
کام کرنے والوں میں یہ مرض ہوتا ہے + جب کوئی دیہاتی باشندہ یا کسان پاؤں کے مرن
درم کا ہتارے سے لگتا ہے اور مزید درم حصہ میں لیتی چھوٹے چھوٹے اُبھار ہوں بعض سخت
ہوں اور بعض نرم + بعض چھوٹے ہونے ہوں اور کئی ناکھ نظر آویں اور پیر بہت چھوٹا
ہو + تو فوراً درم فطری کا خیال کر دو + اب اگر مریض پہلے سے سوال کے جواب میں یہ
خبر کر دے کہ اس کے موہ میں تو ہونے چھوٹے دانے خارج ہوتے ہیں تو یقین کر لو کہ یہ
درم فطری کا مرض ہے + اس مواد کو سرورین سے دیکھ کر تشخیص کی تصدیق بھی کر سکتے ہو
یہ دانے دوسرے ہوتے ہیں ایک سفید زردی بال اور دوسرے سیاہی بال +
علاج + اگر مریض محدودی تو گرہوں اور ناسور کو خوب کھینچ کر صاف کر دو اور صاف
کو مہلک سے خوب ناسور اور ابھاروں کے مقام پر کدو یا مثلاً بنفشین وغیرہ
لگا دو + بعض اوقات اس محل سے پہلے اور گتے اس محل کے بعد مقدمہ دفت پر غزل قطری
اور امض قطری ایک حصہ + آب مہر مقلد + اسے ۲۰ حصہ یا صرف ۱۰ حصہ کی چھکریاں زیر
جلد دوسے تیس پر نو حصہ دراز تک دینے سے فائدہ ہوتا ہے + اور اگر مرض کم ہو اور اسکا
ابتدائی درجہ ہے تو بغیر دستکاری کے مریض شفا یاب ہو جاتا ہے + اگر مرض بہت بڑھ گیا
ہے دھیر کی بیشتر چڑیاں سر کر بیگا ہو گئی ہیں اور صاف کھینچنے سے فائدہ نہیں ہوا ہے
تو پھر حصہ ناف کو قدرے اوپر تندرست حصہ سے کاٹنا پڑتا ہے + یہ آخری علاج
ہے جو تانگ کو بچانے کے لیے مجبوراً کرنا پڑتا ہے +

۱۔ علامہ محمد عثمان خان امروہی بہت
بڑا دانی سے متعدد درمیں ہوں پر اسکا تجربہ
کیسے جن میں پاؤں کاٹنے کی ضرورت
پہل نہیں آتی +

۲۔ مہر دمن ان ٹکینٹ۔
۳۔ کاوی۔ کا مشق۔
۴۔ بنفشین۔ آیوڈین۔
۵۔ غزل قطری۔ کاربوئک لوشن۔

(۳۶) گردن اور چہرہ میں مرض فطریست شاعیہ



(۱۱) لغات اصطلاحات طبیہ یونانی طبی اصطلاحات کا اس سے بہتر کوئی لغت تیار

نہیں ہوا۔ بہت سے لغات کا خلاصہ ہے۔ اصطلاحات متعلقہ امر جن۔ ادویہ۔ آلات طبیہ۔

کیات۔ معالجات۔ تشریح و منافع الاعضاء کا سلیس بیان ہے۔ قیمت ۱۰۔ مجلد ۳۳۔

(۱۲) لغات الادویہ دواؤں کے عربی۔ فارسی۔ ہندی۔ سنسکرت۔ کیسائی۔ انگریزی۔ یونانی

اور دیگر ناموں کے ناموں کی قف ہے۔ تقریباً ۱۱ ہزار الفاظ کی شرح ہے۔ اگر کسی نسخہ کا کوئی جز

آپ نہ سمجھ سکیں۔ تو اس لغت سے مدد لیں۔ بے نظیر لغت ہے۔ قیمت ۱۰۔ مجلد ۳۳۔

(۱۳) تشریح تصاویر نگین ایک ہاری زبان میں لکھی۔ پتھوں۔ ہڈیوں۔ اندرونی و بیرونی۔

اعضاء کی تصویریں ایسی باقاعدہ نہیں تھیں کہ ہمارے اطباء

(جو تشریح سے واقف ہوں) بطور خود آئی دے کافی تشریحی معلومات حاصل کر سکیں۔ آپ تصویر کی

کُل کتاب نہایت اہم شے لگتی ہے جس میں نگین سادہ تصویریں ہیں۔ وریہ دس شریاؤں اور احصا کے

برنگ رخ۔ زرد اور آسانی چھوڑا گیا ہے۔ آپ گہرے تشریح پڑھیں حصہ اقل حصہ دیم سے کُل ۱۱

صورت اندرونی اعضاء اور قلم احشائی تقریباً ۱۱ تصویریں ہیں۔ شلا دلائع نام

(۱۴) تصاویر حشا کان نام۔ حکم سینہ کے اعضاء۔ آلات تامل زمانہ و مردانہ قیمت ۱۱

مجلدات باہ کا آخری خزائنہ نسخہ جات باہ کا زبردست ذخیرہ۔ اعلیٰ سے اعلیٰ

(۱۵) قانون نسل نسخہ جات اس میں موجود ہیں (کا غذا دینی ہے) حجم ۵۰ صفحات ۱۱ مجلد عام

طبی اصطلاحات کا جامع اور مختصر لغت ہے۔ اصطلاحات متعلق امر جن و

آلات طبیہ کیات۔ معالجات۔ تشریح اعضاء کا سلیس بیان ہے۔ یہ ان غریب طلباء کے لیے

تیار کیا گیا ہے جو بڑے لغت یعنی لغات اصطلاحات طبیہ قیمتی تھے۔ کو خرید نہ سکیں۔ قیمت ۱۰

(۱۶) طب قدیم و جدید کی معرکہ الآراء علمی جنگ طب قدیم پر ڈاکٹروں کو زبردست

سوالات و اعتراضات۔ طب قدیم کے غیر اصولی ہونے کا الزام اور ان کے لچپ خاموشی کا بیان

(۱۷) ترجمہ کامل الصناعہ حصہ تشریح عظام (کامل الصناعہ عربی کا ترجمہ ہے) ۵

آلہ سینہ بین (اسٹےٹس کوپ) کی حقیقت۔ طریقہ استعمال

(۱۸) رسالہ مسمع اصد اور امراض سینہ کی تشخیص قیمت ۱۰

(۱۹) رسالہ مقیاس الحرات آلہ مقیاس الحرات (تھرمیٹر) کی حقیقت

طریقہ استعمال اور بدنی حرارت کا تذکرہ۔ قیمت ۲۔ علاوہ محصول ڈاک۔

(۲۰) رسالہ اسماعیل امراض و اوزان طبسی (۱) ڈاکٹری ناموں کے مقابل

یونانی اور یونانی تامل کے مقابل

ڈاکٹری نام مرض کے بجائے ہیں (۲) رسالہ اوزان میں ڈاکٹری یونانی اور ویدک زفوں کی تشریح ہے قیست

(۲۱) رسالہ قارورہ اس میں قارورہ کا بالکل جدید اسلوب پر بیان ہے۔ امتحان قارورہ

کے تمام نئے قواعد اس میں بتائے گئے ہیں جس سے قارورہ کی کلک

پتھری کا مادہ، صفراء اور تمام امراض میں جو مواد خارج ہوتے ہیں انکو کیمیائی امتحانات

سے جانچی جاسکتا ہے۔ قیست ۴۰

(۲۲) کتاب التکلیس اس میں کشتہ سازی کے متعلق ضروری ہدایات و اصطلاحات۔ جملہ

اور اہم حائز کے کشتہ کرینی معتبر اور مصدقہ تھیں مختلف ادویہ کے جوہر درون حاصل کرینے

نئے نسخے ہیں۔ از تالیف میک عبد اللہ صاحب تامل کا فہرستہ عجم ۹۰ صفحات۔ قیست ۴۱

(۲۳) مہجرات فطن مفید مختصر جملہ (۱) از حکیم مولوی ابو الحسن صاحب نطن

مفید و مختصر چھ نمبریں تھیں جملہ

صفحہ کا پتہ۔ نظم دفتر السبح۔ قول بلغ۔ دہلی

اس

دہلی کا شہرہ آفاق طبسی رسالہ

ہذا اور است حکیم محمد کبیر الدین صاحب بدھ تھا

اس پہلے ایک ہی رسالہ سے متروک ہے جس میں طبی دنیا کے اندر وہ دل چل پیدا کر دی کہ باقی

ملک کا پھرین طبقہ جمہور بجا آئے یہ رسالہ ہر قسم کے طبی مضامین پر تحقیق اور فلسفیانہ مقالات میں

کرتے۔ ڈاکٹری و یونانی اختلافات پہلو بہ پہلو پیش کرتا ہے۔ ڈاکٹری اصطلاحات اور انگریزی نہ

جانتے اسے حضرات کے لیے یہ رسالہ ایک بہرہ ہے۔ اس سال کا اہم مقصد اپنی کمزور بیدار انا

لنا۔ اور دینی اہل علمین شفی و اصلاح کا دوا ہدیا کرتا ہے۔ ہر ماہ علاوہ سرورق کے ۴۰ صفحات

ہوتے ہیں۔ مگر قیمت سالانہ صرف چار بھوت نئی آڈر اور چار بھوت دی لی

پتہ۔ ناظم دفتر السبح۔ قول بلغ۔ دہلی

